

f

AXLIMIRZAYEV A., IBAYDULLAYEV T.T.,
QO'CHQOROV M.U., ZULFIXOROV I.

$a+b$



$(a+b)(a-b)$

g

$g \circ f$

$PSL_2(\mathbb{Z})$

\mathbb{Z}


**MATEMATIKADAN
MASALALAR
TO'PLAMI**

A B C D E F

AXLIMIRZAYEV A., IBAYDULLAYEV T.T., QO'CHQAROV M.U.,
ZULFIXAROV I.

MATEMATIKADAN MASALALAR TO'PLAMI

Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma



Toshkent
"Innovatsiya-Ziyo"
2022

UDK: 517.1
BBK: 22.143
Sh 54

Axlimirzayev A.
**Matematikadan masalalar to'plami. /Ibaydullayev T.T.,
Qo'chqarov M.U., Zulfixarov I./ Oliy o'quv yurtlari talabalari
uchun o'quv qo'llanma. - Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo", 2022, 328 b.**

Ushbu o'quv qo'llanma Oliy o'quv yurtlarining tabiiy, ijtimoiy va gumanitar yo'nalishlari hamda texnik yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlari talabalariga mo'jallangan bo'lib, unda matematika tarkibiga kiruvchi chiziqli algebra, analitik geometriya va matematik analizdan qisqacha ma'lumotlar va ular yordamida yechiladigan misol va masalalar tizimli ravishda berilgan.

Mas'ul muharrir:

Azimov R.K. - ADU matematika kafedrasida katta o'qituvchi, f.-m.f.a.

Taqrizchilar:

Arziqulov F. - ADU matematika kafedrasida dotsenti, f.-m.f.d.
Djalilova T.A. - Andijon mashinasozlik instituti oliy matematika kafedrasida dotsenti

Ushbu o'quv qo'llanma ADU ilmiy kengashining 2020- yil 18 fevraldagi 7-sonli yig'ilishida muhokama qilinib chop etishga tavsiya qilingan.


ISBN 978-9943-7025-1-6

Axlimirzayev A. va boshq., 2022.
© "Innovatsiya-Ziyo", 2022.

So'z boshi

Hozirgi paytda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909 va 2018-yil 5-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokita ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775 qarorida ta'kidlangan, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik usullar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim resurslari va multimediya taqdimotlarini keng tatbiq etish va buning uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish to'g'risidagi vazifalar oliy o'quv yurtlarida ta'lim sifatini va samaradorligini tubdan yaxshilashga qaratilganligidan dalolatdir. Bu vazifalar oliy o'quv yurtlarida o'qitiladigan barcha fanlar, jumladan, matematika faniga ham taaluqlidir.

Oliy o'quv yurtlarida malakali, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda matematika fanining o'rni salmoqlidir. Chunki bugungi kunda barcha sohalarida matematika va matematik usullardan samarali foydalanilmoqda. Shuning uchun ham bugungi kundagi asosiy vazifalardan biri barcha ta'lim muassasalarida matematikani o'qitishning zamon talablariga mos holda takomillashtirishdan iboratdir. Bu borada so'nggi yillarda respublikamiz prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan bir qator muhim farmon va qarorlar qabul qilindi. Bularga misol tariqasida 2019-yil 9-iyuldagi PQ-4387 sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy majlisga murojaatnomasini keltirish mumkin.



Ma'lumki, bugungi kunda oliy o'quv yurtlarining barcha mutaxassisliklarida oliy matematika (matematika) fani o'qitilmoqda. Talabalarni matematikadan chuqur bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlarida o'quv adabiyotlarining, ayniqsa davlat tilida yozilgan qo'llanmalarining jumladan matematikadan yozilgan masalalar to'plamining o'rni beqiyosdir.

Hozirgi kunda oliy matematika va matematik analizdan masalalar to'plami va ularni yechish bo'yicha bir qancha adabiyotlar mavjud. Ular I.A. Maron muallifligidagi "Differentsialnoe i integralnoye ischislenie v primerax i zadachax" nomli, I.A. Kaplan muallifligidagi "Prakticheskiye zaniyatiya po visshey matematike" nomli, P.B. Danko, A.G. Popov, T.Ya. Kojevnikovalarning "Vishsaya matematika v uprajneniyax i zadachax" nomli, V.P. Minorskiy muallifligidagi "Oliy matematikadan masalalar to'plami" nomli, G.M. Zaporozets muallifligidagi "Rukovodstvo k resheniyu zadach po matematicheskomu analizu" nomli, E.F. Fayziboyev va N.M. Sirmirakislar muallifligidagi "Integral xisob kursidan amaliy mashg'ulotlar" nomli, I.I. Lyashko, A.K. Boyarchuk, Ya.G. Gay, G.P. Golovachlar muallifligidagi "Matematicheskiy analiz v primerax i zadach" nomli, A. Sa'dullayev va boshqalarning "Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami" va xokazolardir.

Bunday qo'llanmalar ko'p bo'lishiga qaramasdan ularning aksariyati matematik analiz fanidan hamda davlat tilida emas. Bundan tashqari bu qo'llanmalarda masala va misollar tizimli berilmagan va ularni yechish uchun kerak bo'ladigan nazariy materiallar yetarli

darajada berilmagan. Mualliflar tomonidan yozilgan ushbu qo'llanma yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf qilishga qaratilgan.

Ushbu o'quv qo'llanma oliy matematika (matematika) uchun ajratilgan soat eng ko'p bo'lgan yo'nalishlarga mo'ljallangan bo'lishiga qaramasdan, undan oliy matematika (matematika) uchun eng kam soat ajratilgan yo'nalishlarning talabalari ham foydalanishlari mumkin.

Ushbu o'quv qo'llanmaning qo'lyozmasini o'qib chiqib o'zlarining qimmatli maslahatlarini bergan fizika - matematika fanlari doktori F. Arziqulovga, f.m.f.n R. Azimovga va Andijon mashinasozlik instituti oliy matematika kafedrasida dotsenti T.A. Djalilovaga mualliflar o'z minnatdorchiliklarini bildiradilar.

Mualliflar



I BOB. TO'PLAMLAR

1-§. To'plam tushunchasi. To'plamlar ustida amallar

To'plam matematikaning poydevorida yotgan boshlang'ich tushunchalardan biri bo'lgani uchun u ta'riflanmaydi. To'plam deyilganda hiror bir xususiyati bo'yicha umumiylikka ega bo'lgan obyektlar majmuasi tushuniladi. Masalan 1-kurs talabalari to'plami, kesmadagi nuqtalar to'plami, matematikadagi raqamlar to'plami, bog'dagi mevali daraxtlar to'plami va xokazo. To'plamlar A, B, C, D, \dots kabi bosh harflar bilan belgilanadi. To'plamga kiruvchi obyektlar uning elementlari deyiladi va a kabi harflar bilan belgilanadi. Agar "a" element A to'plamga tegishli bo'lsa, uni $a \in A$ kabi, tegishli bo'lmasa $a \notin A$ yoki $a \notin A$ kabi yoziladi. Elementlari a, b, c, d bo'lgan A to'plam $A = \{a, b, c, d\}$ kabi yoziladi.

Birorta ham elementga ega bo'lmagan to'plam bo'sh to'plam deb ataladi va \emptyset kabi belgilanadi.

Masalan, $x^2 - 1 = 0$ tenglamaning ildizlari to'plami, kvadrati manfiy son bo'ladigan haqiqiy sonlar to'plami, $x^2 + 1 = 0$ tenglamaning ildizlari to'plami bo'sh to'plamdan iborat.

Agar A to'plamga tegishli har bir element B to'plamga ham tegishli bo'lsa u holda A to'plam B to'plamning qismi deyiladi va $A \subset B$ kabi belgilanadi.

Masalan, bo'g'dagi mevali daraxtlar to'plamini A, barcha daraxtlar to'plamini B deb olsak, unda $A \subset B$ bo'ladi.

Ta'rifdan $A \subset A$ va $\emptyset \subset A$ tasdiqlar doim to'g'ri ekanligi kelib chiqadi.

Agar A va B to'plamlar uchun bir vaqtda $A \subset B$ va $B \subset A$ shartlar bajarilsa, bu to'plamlar teng to'plamlar deyiladi va $A = B$ kabi yoziladi.

Masalan, $A = \{-1, 1\}$ va $B = \{x^2 - 1 = 0 \text{ tenglama ildizlari to'plami}\}$ bo'lsa, u holda $A = B$ bo'ladi.

A va B to'plamlar birlashmasi (yig'indisi) deb ularni barcha elementlaridan tuzilgan C to'plamga aytiladi va uni $A \cup B$ kabi yoziladi.

Masalan, $A = \{1, 2, 3\}$ va $B = \{2, 3, 4\}$ bo'lsa, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$

To'plamlar birlashmasi uchun $A \cup B = B \cup A$ va $(A \cup B) \cup (B \cap C) = (B \cap C) \cup (A \cup B)$ hamda $(A \cup B) \cap (A \cap C) = A \cap (B \cup C)$ munosabatlar o'rinlidir.

A va B to'plamlarning kesishmasi (ko'paytmasi) deb ularning har ikkalasiga tegishli bo'lgan elementlardan tuzilgan to'plamga aytiladi va uni $C = A \cap B$ kabi yoziladi.

Masalan, $A = \{1, 2, 3, 4\}$ va $B = \{2, 3, 4, 5\}$ bo'lsa, $A \cap B = \{2, 3, 4\}$ bo'ladi.

To'plamlar kesishmasi uchun quyidagilar o'rinli:

1. $A \cap B = B \cap A$
2. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
3. $(A \cap C) \cup (A \cap B) = A \cap (C \cup B)$
4. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ va $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ bo'lsa $A \cap B = B \cap A$.

A va B to'plamlarning ayirmasi deb A to'plamga tegishli, ammo B to'plamga tegishli bo'lmagan elementlardan tashkil topgan to'plamga aytiladi va uni $A \setminus B$ kabi yoziladi.

Masalan, $A = \{1,2,3,4,5\}$ va $B = \{1,3,7,9\}$ bo'lsa, $A \setminus B = \{2,4,5\}$,
 $B \setminus A = \{7,9\}$ bo'ladi.

To'plamlar ayirmasi uchun

$$A \setminus A = \emptyset, \quad A \setminus \emptyset = A, \quad \emptyset \setminus A = \emptyset$$

va $A \subset B$ bo'lsa, $A \setminus B = \emptyset$ munosabatlar o'rinlidir.

Agar qaralayotgan barcha to'plamlarni biror Ω to'planning qisqa to'plamlari deb qarash mumkin bo'lsa, unda Ω ni universal to'plam deb ataladi.

Masalan, barcha sonli to'plamlar uchun $\Omega = (-\infty; +\infty)$ to'plam universal to'plamdir.

Agar A to'plam Ω universal to'plamning qismi bo'lsa, unda $\Omega \setminus A$ to'plam A to'planning to'ldiruvchisi deyiladi va $C(A)$ kabi belgilanadi.

Masalan, $\Omega = \{\text{tumanadagi barcha fermerlar}\}$, $A = \{\text{rejani bajargan fermerlar}\}$ bo'lsa, unda $C(A) = \{\text{rejani bajarmagan fermerlar}\}$ to'plami bo'ladi.

A va B to'plamlarning Dekart ko'paytmasi deb $A \times B$ kabi belgilanuvchi va $(x, y) (x \in A, y \in B)$ ko'rinishdagi juftliklardan tuzilgan yangi to'plamga aytiladi.

Masalan, $A = \{0, 2\}$ va $B = \{0, 1\}$ bo'lsa, u holda $A \times B = \{(0, 0), (0, 1), (2, 1), (2, 0)\}$ bo'ladi.

To'plamlar chekli, cheksiz va bo'sh bo'lishi mumkin.

Agar A to'plamning elementlari bilan natural sonlar to'plami N ning dastlabki biror m ta elementlari orasida bir qiymatli moslik o'rnatib bo'lsa, unda A chekli to'plam deyiladi.

Masalan, $A = \{\text{O'zbekistondagi barcha odamlar}\}$, $B = \{\text{Kitobdagi varoqlar}\}$, $C = \{\text{Matematikadagi raqamlar}\}$, $D = \{\text{Lotin alifbosidagi harflar}\}$ kabi to'plamlar chekli bo'ladi.

Cekli bo'lmagan A to'plam cheksiz to'plam bo'ladi.

Masalan, natural sonlar to'plami $N = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$, $A = \{(0; 1)$ kesmadagi nuqtalar to'plami, $B = \{\cos x = a (|a| \leq 1)$ tenglamalari (ildizlari), $D = \{\text{tekislikdagi barcha to'g'ri chiziqlar}\}$ kabi to'plamlar cheksiz to'plamlardir.

Agar A va B to'plamlar orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatib bo'lsa, bu to'plamlar ekvivalent to'plamlar deyiladi va uni $A \sim B$ kabi yoziladi.

Masalan, $A = \{\text{toq sonlar}\}$, $B = \{\text{juft sonlar}\}$ bo'lsa, unda $A \sim B$ bo'ladi.

1. $A = \{1, 2, 3\}$ va $B = \{2, 4\}$ to'plamlar berilgan. Bu to'plamlar uchun $A \cup B$,

$A \cap B$, $A \setminus B$, $A \Delta B$ va $A \times B$ lar topilsin.

2. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ va $B = \{2, 4, 6, 8\}$ bo'lsa, $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ lar topilsin.

3. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ va $B = \{1, 3, 7, 9\}$ bo'lsa, $A \setminus B$, $B \setminus A$ lar topilsin.

4. $A = [0, 2]$ va $B = [0, 1]$ bo'lsa, $A \times B$ va $B \times A$ lar topilsin.

5. $A = \{n-3, n-2, n-1, n, n+1\}$ va $B = \{n-1, n+1, n+2, n+3, n+4\}$ bo'lsa, $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ lar topilsin.

6. $A = [n-3, n+1]$ va $B = (n-1, n+5)$ bo'lsa, $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ lar topilsin.

7. $A = \{n-3, n-2, n-1\}$ va $B = \{n, n+1, n+2, n+3\}$ to'plamlar berilgan. Ular uchun $A \times B$ va $B \times A$ lar topilsin.

8. $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ va $F = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}\}$ to'plamlar berilgan. Bu to'plamlar ekvivalent bo'la oladimi? Nima uchun?

9. $E = \{2, 4, 6, 8\}$ va $F = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ to'plamlar berilgan. Bu to'plamlar ekvivalent bo'la oladimi?

10. $M = \{1, 2, 3\}$ to'plam berilgan. Uning barcha to'plam ostlari yozilsin.

11. $A = \{1, 2\}$ va $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ to'plamlar berilgan. A to'plamni B to'plamga to'ldiruvchi to'plam topilsin.

12. $A = \{-1, 1\}$ to'plam bilan $(x-1)^2(x+1)^2 = 0$ tenglamaning barcha ildizlari to'plami o'zaro teng bo'la oladimi?

13. $x^2 - 1 = 0$, $x^2 - 2x + 1 = 0$, $x^2 + x + 1 = 0$, $|x| + x = 0$ tenglamalar yechimlari to'plamini yozing.

14. A to'plam $x^2 - 3x + 2 = 0$ tenglama ildizlaridan iborat va $B = \{0, 2\}$ bo'lsa, $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ lar topilsin.

15. $A = \{a, b, c\}$ to'plamning to'plam ostlari yozilsin.

2-§. Sonli to'plamlar. Haqiqiy sonning absolyut qiymati

Elementlari sonlardan iborat bo'lgan to'plam sonli to'plam deyiladi.

Quyidagilar eng asosiy sonli to'plamlardir:

- Natural sonlar to'plami: $N = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$;

- Butun sonlar to'plami: $Z = \{\dots, -n, \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$;

- Ratsional sonlar to'plami: $Q = \{\frac{m}{n}, m \in Z, n \in N\}$;

- Irratsional sonlar to'plami: $I = \{\text{cheksiz, davriy bo'lmagan, o'qli kasrlar}\}$

- Haqiqiy sonlar to'plami: $R = Q \cup I$

Haqiqiy sonlarni geometrik tasvirlash uchun haqiqiy sonlar o'qi yoki qisqacha sonlar o'qi tushunchasi kiritiladi. Buning uchun biror l to'g'ri chiziq olinadi va quyidagi ishlar bajariladi:

- Bu to'g'ri chiziqda chapdan o'nga tomon yo'nalishni musbat yo'nalish deb olinadi.

- Bu to'g'ri chiziqda ixtiyoriy nuqta olinadi va uni sonlar o'qining boshi deyiladi.

- Bu to'g'ri chiziqda bir birlikni ifodalovchi masshtab kiritiladi.

Chekli a va b ($a < b$) sonlari uchun $a < x < b$ qo'sh tengsizlikni qanoqlantiruvchi barcha x sonlar to'plami interval (oraliq) deb ataladi va uni (a, b) kabi yoziladi.

$a \leq x \leq b$ qo'sh tengsizlikni qanoqlantiruvchi barcha x sonlar to'plami segment yoki kesma deb ataladi va uni $[a, b]$ kabi yoziladi.

$a \leq x < b$ va $a < x \leq b$ lar yarim oraliqlar deyiladi va ularni $[a, b)$ va $(a, b]$ kabi yoziladi.

a va b chegaralardan birortusi ∞ ($-\infty$ yoki $+\infty$), ya'ni $(-\infty, b)$, $(a, +\infty)$,

$(-\infty, b]$, $[a, +\infty)$ bo'lsa, u holda ularni yarim cheksiz oraliqlar deb ataladi. $(-\infty; +\infty)$ ni esa cheksiz oraliq deb ataladi.

Berilgan X sonli to'plam uchun shunday M (yoki m) soni mavjud bo'lsaki, ixtiyoriy $x \in X$ uchun $x \leq M$ (yoki $x \geq m$) shart bajarilsa, X yuqoridan (quyidan) chegaralangan to'plam deyiladi. Agar X ham yuqidan ham yuqoridan chegaralangan ya'ni $m \leq x \leq M$ bo'lsa, u chegaralangan to'plam deyiladi.

Har qanday $x \in R$ sonning absolyut qiymati (moduli) deb shu sondan sonlar o'qining O boshigacha bo'lgan masofaga aytiladi.

Berilgan $x \in R$ sonning absolyut qiymati $|x|$ kabi belgilanadi va ta'rifga asosan,

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

formula bilan aniqlanadi. Masalan, $|4| = 4$, $|-3| = 3$, $|0| = 0$.

Sonning absolyut qiymati quyidagi xossalarga ega:

1. Har qanday $x \in R$ uchun $|x| \geq 0$.
2. Har qanday $x \in R$ uchun $|-x| = |x|$.
3. Har qanday $x \in R$ uchun $|x| \geq x$ va $x \geq -|x|$.
4. $|x| = 0$ tenglik $x = 0$ dagina o'rinli.
5. Har qanday $x \in R$, $y \in R$ uchun $|xy| = |x| \cdot |y|$.
6. Har qanday $x \in R$, $0 \neq y \in R$ uchun $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$.
7. Har qanday $x \in R$, $y \in R$ uchun $|x + y| \leq |x| + |y|$.
8. Har qanday $x \in R$, $y \in R$ uchun $|x - y| \geq |x| - |y|$.

1. Hisoblang:

- 1) $|-7| + |-3| - |-9|$; 2) $|-9| \div |-3| \cdot |-7|$;
- 3) $\frac{|9 - |-4| - |-31|}{|-6| + |-3|}$; 4) $\frac{|-4| - |3.5| + |-0.5|}{|-6.5| + |-3.5|}$.

2. O'zgaruvchining ko'rsatilgan qiymatlarida quyidagi ifodalarning son qiymatlari topilsin.

- 1) $\left|\frac{2x+5}{7-2x^2}\right|$ ni $x = 2$ da; 2) $\left|\frac{2x^2-4}{5-x}\right|$ ni $x = 0$ da;
- 3) $\left|\frac{x-8}{3+x^2}\right|$ ni $x = 4$ da; 4) $\left|\frac{2x^2-3x+7}{3x^2-7}\right| + \left|\frac{6x}{5x^2+2}\right|$ ni $x = 1$ da.

3. x ning qanday qiymatlarida tengsizliklar o'rinli bo'ladi?

- 1) $|x - 3| < 2$; 2) $|x - 1| < 3$; 3) $|3x - 7| < 4$;
- 4) $|x + 1| > 3$; 5) $|3x - 6| > 9$; 6) $|0.5x - 3.5| > 2.5$.

4. x ning qanday qiymatlarida quyidagi ifodalur haqiqiy qiymatlarga ega bo'ladi?

- 1) $\sqrt{9 - x^2}$; 2) $\sqrt{x^2 - 9}$; 3) $\frac{4}{\sqrt{x^2 - 36}}$; 4) $\sqrt{16 - x^2} + \sqrt{25 - x^2}$.

5. Quyidagi tenglamalar yechilsin.

- 1) $|3x - 6| = 4$; 2) $x^2 - 3|x| - 4 = 0$; 3) $|x^2 - 2x| = 2x - x^2$;
- 4) $|x^2 + 5x| = 6$; 5) $|2 - 3x| = |5 - 2x|$; 6) $|3 - |2 + x|| = 1$;
- 7) $|x^2 - 8x + 7| = -7 + 8x - x^2$; 8) $|x - 1|^2 - 8 = 2|x - 1|$;
- 9) $|x| = x^2 + x - 4$; 10) $|x + 2| + |x| + |x - 2| = 4$.

6. Quyidagi tengsizliklar yechilsin.

- 1) $|2x - 3| < 6$; 2) $|x^2 - 5| < 4$; 3) $x^2 - 2|x| < 3$;
- 4) $|x - 1| \geq 2$; 5) $|x - 3| \leq 6 - x$; 6) $x^2 - 3|x| \leq 4$;
- 7) $2|x - 1| \leq |x + 3|$; 8) $|x + 1| > 2|x + 2|$; 9) $1 < |x - 2| < 3$;
- 10) $\left|\frac{3x-11}{10(x+2)}\right| < \frac{1}{100}$.

7. Quyidagi tenglamalar yechimga ega bo'ladimi?

- 1) $|x| = x + 5$; 2) $|x| = x - 5$; 3) $|\sin x| = \sin x + 1$.

8. x ning qanday qiymatlarida quyidagi tengliklar o'rinli bo'ladi?

$$1) \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = \frac{x-1}{x+1} \quad 2) |x^2 - 5x + 6| = -(x^2 - 5x + 6);$$

$$3) |(x^2 + 4x + 9) + (2x - 3)| = |x^2 + 4x + 9| + |2x - 3|;$$

$$4) |(x^2 - 4) - (x^2 + 2)| = |x^2 - 4| - |x^2 + 2|.$$

3-§. Kompleks sonlar va ular ustida amallar

Kvadrati -1 ga teng bo'lgan sonni mavxum birlik deb ataladi va uni i bilan belgilanadi. Demak, $i^2 = -1$ bo'lib, undan $i = \sqrt{-1}$ kelib chiqadi. Mavxum birlikni kiritilishi bilan manfiy sonlardan kvadrat ildiz chiqarish mumkin bo'ladi.

$$\text{Masalan, } \sqrt{-36} = \sqrt{36 \cdot (-1)} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{-1} = 6i;$$

$$\sqrt{-\frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{1}{9} \cdot (-1)} = \sqrt{\frac{1}{9}} \cdot \sqrt{-1} = \frac{1}{3}i.$$

Amalda mavxum birlikning darajalaridan foydalaniladi.

Quyida ularni keltiramiz.

$$i^1 = i;$$

$$i^2 = -1;$$

$$i^3 = i^2 \cdot i = -1 \cdot i = -i;$$

$$i^4 = i^3 \cdot i = -i \cdot i = -i^2 = -(-1) = 1;$$

$$i^5 = i^4 \cdot i = 1 \cdot i = i;$$

$$i^6 = i^5 \cdot i = i \cdot i = i^2 = -1;$$

$$i^7 = i^6 \cdot i = -1 \cdot i = -i;$$

$$i^8 = i^7 \cdot i = -i \cdot i = -i^2 = -(-1) = 1;$$

Bulardan $i^{4k} = 1$, $i^{4k+1} = i$, $i^{4k+2} = -1$, $i^{4k+3} = -i$ ekanligini aniqlaymiz.

a va b haqiqiy sonlar hamda i mavxum birlikdan hosil qilingan $a + bi$ ko'rinishdagi sonlarga **kompleks sonlar** deb ataladi. Bu yerda a kompleks sonning **haqiqiy qismi**, bi kompleks sonning **mavxum qismi** va b mavxum qismining **koeffitsienti** deyiladi. $a = 0$ bo'lsa bi kompleks soni sof mavxum son deyiladi. Agar $b = 0$ bo'lsa, u holda kompleks son a ga teng bo'lib uni haqiqiy son deyiladi. Agar $a = b = 0$ bo'lsa, u holda kompleks son $0 + 0 \cdot i$ bo'lib nolga teng bo'ladi.

$a + bi$ ko'rinishidagi yozuv kompleks sonning **algebraik shakli** deyiladi.

$a + bi$ va $c + di$ kompleks sonlar teng bo'lishi uchun $a = c$, $b = d$ bo'lishi kerak.

$a + bi$ va $a - bi$ ko'rinishdagi kompleks sonlarga **o'zaro qo'shma** kompleks sonlar deyiladi.

Algebraik ko'rinishdagi kompleks sonlar ustida qo'shish, ayirish va ko'paytirish amallari ko'phadlar ustida bajariladigan amallar kabi bajariladi. Ular quyidagicha:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i;$$

$$(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i;$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i;$$

$$(a + bi) + (a - bi) = 2a;$$

$$(a + bi) - (a - bi) = 2bi;$$



$$(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2;$$

Kompleks sonni kompleks songa bo'lish uchun bo'luvchi va bo'linuvchi kompleks sonlarni bo'luvchi kompleks sonning qo'shmasiga ko'paytiriladi.

$$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{(ac+bd) + (bc-ad)i}{c^2+d^2}$$

$a+ib$ kompleks sonning geometrik tasviri boshi $O(0,0)$ nuqtada va oxiri $M(a,b)$ nuqtada bo'lgan \vec{OM} vektordan iborat (1-chizma).

Aytmaylik $Z = a+ib$ kompleks son boshi $O(0,0)$ nuqtada, oxiri $M(a,b)$ nuqtada bo'lgan \vec{r} vektor bilan tasvirlangan bo'lsin (2-chizma). $Z = a+ib$ kompleks sonning moduli deb \vec{r} vektorning uzunligiga aytiladi. Uni $|\vec{r}| = \sqrt{a^2+b^2}$ (1) dan topiladi.



\vec{r} vektorning Ox o'qini musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchagiga kompleks sonning argumenti deyiladi. φ burchakni qiymatini $\cos\varphi = \frac{a}{r}$ va $\sin\varphi = \frac{b}{r}$ (2) formulalardan topiladi.

$\cos\varphi = \frac{a}{r}$ va $\sin\varphi = \frac{b}{r}$ lardan $a = r\cos\varphi$ va $b = r\sin\varphi$ larni topamiz. a va b larning bu ifodalarni kompleks son yozuviga qo'yib $Z = a+bi = r\cos\varphi + ir\sin\varphi = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ ni hosil qilamiz. $Z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ ga kompleks sonning trigonometrik shakli deyiladi.

$\cos\varphi + i\sin\varphi = e^{i\varphi}$ ga Eylar formulasi deyiladi. $Z = re^{i\varphi}$ ga kompleks sonning ko'rsatkichli shakli deyiladi.

Agar $Z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ va $Z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ bo'lsa, u holda quyidagilar o'rinlidir:

$$Z_1 \cdot Z_2 = r_1 \cdot r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)];$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)];$$

$$Z_1^n = r_1^n (\cos n\varphi_1 + i\sin n\varphi_1);$$

$$\sqrt[n]{Z_1} = \sqrt[n]{r_1} \left(\cos \frac{\varphi_1 + 2k\pi}{n} + i\sin \frac{\varphi_1 + 2k\pi}{n} \right).$$

Agar $z = re^{i\varphi}$ bo'lsa, u holda $z^n = r^n e^{in\varphi}$ va $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\varphi+2k\pi}{n}}$ bo'ladi.

1. Hisoblang:

- 1) $i^{66}; i^{193}; i^{216}; i^{137};$ 2) $i^{43} + i^{48} + i^{64} + i^{45} - i^{101} - i^{71};$
- 3) $(i^{36} + i^{25} + i^{17} + i^{14}) \cdot (i^{23} + i^{11});$
- 4) $(i^{64} + i^{17} + i^{13} + i^{82})(i^{72} - i^{34}).$

2. Quyidagi tengliklardan x va y lar topilsin.

- 1) $3y + 5xi = 15 - 7i;$ 2) $(2x + 3y) + (x - y)i = 7 + 6i;$
- 3) $(2x + y) - i = 5 + (y - x)i;$ 4) $(3i - 1)x + (2 - 3i)y - 2 - 3i.$

3. $z_1 = 2 + 3i$ va $z_2 = 5 - 7i$ kompleks sonlar berilgan:

- a) $z_1 + z_2;$ b) $z_1 - z_2;$
- c) $z_1 \cdot z_2;$ d) $\frac{z_1}{z_2}$ lar topilsin.


4. $z_1 = 3 + 7i$ va $z_2 = 9 - 4i$ kompleks sonlar berilgan:

- a) $z_1 + z_2;$ b) $z_1 - z_2;$ c) $z_1 \cdot z_2;$ d) $\frac{z_1}{z_2}$ lar topilsin.

5. Quyidagi berilgan misellarda bo'lish analini ikki hil usulda bajaring.

- 1) $\frac{3-i}{5-3i};$ 2) $\frac{3-7i}{4+2i};$ 3) $\frac{5-7i}{5+7i};$ 4) $\frac{9i}{6-3i}.$

6. Amallarni bajaring:



$$1) \frac{3+2i}{3-2i} + \frac{5+2i}{3+2i}; \quad 2) \frac{6+2i}{3-7i} - \frac{2+3i}{2+5i}; \quad 3) \frac{6+2i}{1-i} - i^{27};$$

$$2) 4) \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{12} + \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{12}; \quad 5) i^{123} + (1-i)^6 + (1+i)^8;$$

7. Quyidagi tenglamalar yechilsin:

$$1) x^2 - 6x + 13 = 0; \quad 2) 9x^2 + 12x + 29 = 0; \quad 3) 2,5x^2 + x + 1 = 0.$$

8. Quyidagi berilgan kompleks sonlarni tekislikda tasvirlang:

$$1) z_1 = 5; \quad 2) z_2 = -3i; \quad 3) z_3 = 3 + 2i;$$

$$4) z_4 = 5 - 2i; \quad 5) z_5 = -3 + 2i; \quad 6) z_6 = -1 - 5i.$$

9. Quyida berilgan kompleks sonlarni trigonometrik shaklda yozing:

$$1) z = 1 + i; \quad 2) z = -2 + 2\sqrt{3}i; \quad 3) z = -3i; \quad 4) z = -3 + 3i;$$

$$5) z = 2\sqrt{2} - 2i\sqrt{6}; \quad 6) z = -10i; \quad 7) z = 6i; \quad 8) z = 5.$$

10. Quyida berilgan kompleks sonlarni ko'rsatkichli shaklda yozing.

$$1) z = 3 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right); \quad 2) z = 3 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{2} \right);$$

$$3) z = 3 - 3i\sqrt{3}; \quad 4) z = -3\sqrt{3} + 3i.$$

$$11. \quad z_1 = 3(\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ) \quad \text{va} \quad z_2 = 2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$$

kompleks sonlar berilgan. Quyidagilar topilsin:

$$a) z_1 \cdot z_2; \quad b) \frac{z_1}{z_2}; \quad c) z_1^4; \quad d) z_2^5; \quad e) \sqrt[3]{z_1}; \quad f) \sqrt[3]{z_2}.$$

$$12. \quad z_1 = 3 \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right) \quad \text{va} \quad z_2 = 5 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

kompleks sonlar berilgan. Quyidagilar topilsin:

$$1) z_1 \cdot z_2; \quad 2) \frac{z_1}{z_2}; \quad 3) z_1^5; \quad 4) \sqrt[3]{z_2}.$$

13. Quyidagilar hisoblansin.

$$a) \sqrt[4]{-16}; \quad b) \sqrt[4]{1}; \quad c) \sqrt[4]{-1}; \quad d) \sqrt[4]{-27}.$$

II BOR. CHIZIQLI ALGEBRA

1-§. Matritsa va ular ustida amallar

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (1)$$

ga m ta satr va n ta ustundan iborat to'g'ri burchakli matritsa deyiladi.

Uu matritsani ba'zan $A = (a_{ij})$ ko'rinishida ham yoziladi. Bu yerda $i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (2)$$

ga n - tartibli kvadrat matritsa deyiladi.

Elementlari $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ bo'lgan diagonal asosiy diagonal elementlari a_{12}, \dots, a_{1n} bo'lgan diagonal yordamchi diagonal elementlari deb ataladi.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (3)$$

matritsaga diagonal matritsa deyiladi.

Agar diagonal matritsada $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn}$ bo'lsa u holda uni skalyar matritsa deyiladi.

Agar skalyar matritsa bosh diagonalining barcha elementlari 1 ga teng bo'lsa, u holda uni birlik matritsa deyiladi va E bilan belgilanadi. U quyidagicha yoziladi:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Xususiyl holda 3-tartibli birlik matritsa quyidagicha yoziladi:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Agar $A_{m \times n}$ to'g'ri burchakli matritsada $m = 1$ bo'lsa, u holda uni satr matritsa deyiladi va u quyidagicha yoziladi.

$$A = (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}) \quad (6)$$

Agar $A_{m \times n}$ to'g'ri burchakli matritsada $n = 1$ bo'lsa, u holda uni ustun matritsa deyiladi va u quyidagicha yoziladi:

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \quad (7)$$

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (8) \text{ ga } \underline{\text{ nol matritsa }} \text{ deyiladi.}$$

A va B matritsa bir hil tartibli va ularning mos elementlari o'zaro teng bo'lsa, ya'ni $a_{ij} = b_{ij}$ bo'lsa, u holda ular teng matritsalar

deyiladi. A va B matritsalar tengligi $A=B$ yoki $(a_{ij}) = (b_{ij})$ ko'rinishida yoziladi.

Agar

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

bo'lsa, u holda quyidagilar o'rinlidir:

$$A \pm B = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & \dots & a_{1n} \pm b_{1n} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & \dots & a_{2n} \pm b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} \pm b_{n1} & a_{n2} \pm b_{n2} & \dots & a_{nn} \pm b_{nn} \end{pmatrix};$$

$$kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \dots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \dots & ka_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ ka_{n1} & ka_{n2} & \dots & ka_{nn} \end{pmatrix};$$

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1n}b_{n1} & \dots & a_{11}b_{1n} + a_{12}b_{2n} + \dots + a_{1n}b_{nn} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + \dots + a_{2n}b_{n1} & \dots & a_{21}b_{1n} + a_{22}b_{2n} + \dots + a_{2n}b_{nn} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1}b_{11} + a_{n2}b_{21} + \dots + a_{nn}b_{n1} & \dots & a_{n1}b_{1n} + a_{n2}b_{2n} + \dots + a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}$$

Matritsalar ustida amallar quyidagi hossalarga ega:

- 1) $A + B = B + A$;
- 2) $(A + B) + C = A + (B + C)$;
- 3) $A + 0 = A$;
- 4) $AB \neq BA$;
- 5) $A(BC) = (AB)C$;
- 6) $(A + B)C = AC + BC$.

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

ga A matritsaning determinanti deyiladi.

$\det A = 0$ bo'lsa, A matritsa maxsus, $\det A \neq 0$ bo'lsa, maxsusmas matritsa deyiladi.

Agar A kvadrat matritsa maxsusmas bo'lsa, u holda $AA^{-1} = A^{-1}A = E$ tenglikni qanoatlantiradigan yagona A^{-1} matritsa mavjud bo'ladi va u A matritsaga teskari matritsa deyiladi.

Teskari matritsa quyidagicha aniqlanadi:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

A matritsaning rangi del, uning noldan farqli minorlarining eng katta tartibiga aytiladi va rang (A) kabi belgilanadi.

Quyidagi almashtirishlar matritsalar ustida elementar almashtirishlar deyiladi:

- faqat nullardan iborat satr (ustun)ni o'chirish;
- ikkita satr (ustun) ning o'rinlarini almashtirish;
- bir satr (ustun)ning barcha elementlarini biror songa ko'paytirib boshqa satr(ustun)ning mos elementlariga qo'shish;
- satr(ustun)ning barcha elementlarini 0 dan farqli bir hil songa ko'paytirish.

$B = (b_{ij})$ matritsa $A = (a_{ij})$ matritsaning transponirlanganini deyiladi agar i va j indekslarining barcha mumkin bo'lgan qiymatlarida $a_{ij} = b_{ji}$ shart bajarilsa.

A matritsaning transponirlanganini A^T kabi belgilanadi.

1. Quyida berilgan A va B matritsalar yig'indisi va ayirmasi topilsin.

$$1) A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix};$$

$$2) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

$$3) A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 16 \\ 0 & 0 & 0 \\ 7 & 10 & 0 \end{pmatrix};$$

$$4) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

2. Berilgan A, B, C matritsalar uchun $(A+B)+C = A+(B+C)$ tenglikni to'g'riiligi isbotlansin.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 5 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 7 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & -3 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

3. Quyida berilgan matritsalarini ko'rsatilgan sonlarga ko'paytmasi topilsin.

$$1) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & -3 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ni } k = 3 \text{ ga};$$

$$2) B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -3 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 4 \\ 4 & 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ni } k = 4 \text{ ga}.$$

4. Berilgan A va B matritsalariga ko'ra $2A - 3B$ va $3B + 4A$ ni toping.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ -1 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 0 & -3 & 5 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

5. Berilgan A va B matritsalar ko'paytmasi topilsin.

$$1) A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix};$$

$$2) A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$3) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$4) A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$5) A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. Agar $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ va $B = \begin{pmatrix} -7 & 4 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ bo'lsa, $C = A^2 + 2B$ topilsin.

7. $AB - BA$ topilsin. Bu yerda

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

8. Agar $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & -1 & 6 \end{pmatrix}$ va $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ bo'lsa, AE topilsin.

9. Agar $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ va $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$ bo'lsa, EA topilsin.

10. Quyidagi matritsalar teskari matritsalar topilsin.

$$1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad 2) B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix};$$

$$3) C = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}; \quad 4) A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix};$$

$$5) A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}; \quad 6) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

2-§. Determinantlar

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ matritsaga mos kelgan ikkinchi tartibli determinant deb $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ songa aytiladi.

Ikkinchi tartibli determinant quyidagicha yoziladi:

$$D = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

matritsaga mos kelgan uchinchi tartibli determinant deb

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{23}a_{11} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{21}a_{12}a_{33}$$

ga aytiladi. U quyidagicha yoziladi:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{23}a_{11} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{21}a_{12}a_{33}.$$

Determinantlar bir qator xossalarga ega:

1) Determinantning satrini unga mos ustuni bilan almashtirilsa u holda uning qiymati o'zgarmaydi.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}$$

2) Determinantning ikkita satr (ustuni)ni o'zaro almashtirilsa uning qiymati qarama-qarshisiga o'zgaradi.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix}$$

3) Satr (ustun) elementlaridan umumiy ko'paytuvchini determinant oldiga chiqarish mumkin.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & ka_{12} \\ a_{21} & ka_{22} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

4) Ikkita satr (ustun) elementlari bir hil bo'lgan determinantning qiymati 0 ga teng.

5) Ikkita satr (ustun) elementlari proporsional bo'lgan determinantning qiymati nolga teng.

6) Agar determinantning biror satr(ustun) elementlariga boshqa bir satr(ustun) elementlarini biror songa ko'paytirib qo'shilsa, u holda uning qiymati o'zgar olmaydi.

$$\begin{vmatrix} a_{11} + ka_{12} & a_{12} \\ a_{21} + ka_{22} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

7) Determinantning bosh dioganali ostida yoki ustidagi barcha elementlari nolga teng bo'lsa, u holda uning qiymati diogonal elementlari ko'paymasiga teng bo'ladi:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$D = |a_{ij}|$ determinantning a_{ij} elementiga mos kelgan M_{ij} minori deb, shu element turgan satr va ustun elementlarini o'chirishdan qolgan elementlardan tuzilgan determinantga aytiladi.

Masalan,

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ bo'lsa, u holda } M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

$D = |a_{ij}|$ determinantning a_{ij} elementiga mos algebraik to'ldiruvchi deb $(-1)^{i+j}$ ishora bilan olingan M_{ij} minorga aytiladi. Uni $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ ko'rinishda yoziladi.

D determinantning ixtiyoriy satr (ustun) elementlarini ularga mos algebraik to'ldiruvchilariga ko'paytmalarining yig'indisi shu determinantning qiymatiga teng.

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} \text{ yoki}$$

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj}$$

1. Quyidagi ikkinchi tartibli determinantlar hisoblansin:

$$1) \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -4 \end{vmatrix}; \quad 2) \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}; \quad 3) \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}; \quad 4) \begin{vmatrix} 0 & 7 \\ -3 & 0 \end{vmatrix};$$

$$5) \begin{vmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{vmatrix}; \quad 6) \begin{vmatrix} a+b & a-b \\ a-b & a+b \end{vmatrix}; \quad 7) \begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix};$$

$$8) \begin{vmatrix} a+b & b \\ 2a & a-b \end{vmatrix}.$$

2. Quyidagi uchinchi tartibli determinantlar hisoblansin:

$$1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix}; \quad 2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}; \quad 3) \begin{vmatrix} 3 & 4 & -5 \\ 8 & 7 & -2 \\ 2 & -1 & 8 \end{vmatrix}; \quad 4) \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 5 & 6 & 7 \\ 8 & 0 & 3 \end{vmatrix};$$

$$5) \begin{vmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \end{vmatrix}; \quad 6) \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix}; \quad 7) \begin{vmatrix} a & -a & a \\ a & a & -a \\ a & -a & -a \end{vmatrix}; \quad 8) \begin{vmatrix} x^2 & x & 1 \\ y^2 & y & 1 \\ z^2 & z & 1 \end{vmatrix};$$

$$9) \begin{vmatrix} 1 + \cos a & 1 + \sin a & 1 \\ 1 - \sin a & 1 + \cos a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}; \quad 10) \begin{vmatrix} \sin 3a & \cos 3a & 1 \\ \sin 2a & \cos 2a & 1 \\ \sin a & \cos a & 1 \end{vmatrix}.$$

3. Quyidagi tenglamalardan x topilsin va ildizlarni determinantga qo'yib tekshirilsin:

$$1) \begin{vmatrix} x^2 & 4 & 9 \\ x & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0; \quad 2) \begin{vmatrix} x^2 & 3 & 2 \\ x & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

4. Quyidagi berilgan determinantlarning barcha minorlari yozilsin.

$$1) D = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & -1 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix}; \quad 2) D = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -2 & 0 & -3 \\ 5 & -3 & 4 \end{vmatrix};$$

$$3) D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 4 & -3 & 2 \end{vmatrix}.$$

5. Uchlari $A(2;3)$, $B(4;-1)$ va $C(6;5)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning yuzi topilsin:

6. Uchlari $O(0;0)$, $A(3;3)$ va $B(5;0)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning yuzi topilsin:

7. Uchlari $O(0;0)$, $A(0;4)$, $B(4;6)$ va $C(7;2)$ nuqtalarda bo'lgan to'rtburchakning yuzi topilsin:

8. $A(1;3)$, $B(2;4)$ va $C(3;5)$ nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotadimi?

9. 1) $(x_1; y_1)$ va $(x_2; y_2)$; 2) $(2; 3)$ va $(-1; 5)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi uchinchi tartibli determinat yordamida yozilsin.

10. Quyidagi determinantlar soddalashtirilsin va hisoblansin:

$$1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -4 & 7 \\ -3 & 12 & -15 \end{vmatrix}; \quad 2) \begin{vmatrix} 24 & 48 & 72 \\ -12 & 18 & 24 \\ 4 & -3 & -2 \end{vmatrix}; \quad 3) \begin{vmatrix} 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} & \sin \alpha & 1 \\ 2\cos^2 \frac{\beta}{2} & \sin \beta & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

11. Quyidagi determinantlarni ikki xil usulda: 1) uchburchak qoidasi bilan; 2) birinchi satr elementlari bo'yicha yoyish orqali hisoblansin:

$$1) \begin{vmatrix} 6 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix}; \quad 2) \begin{vmatrix} -3 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & -3 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}; \quad 3) \begin{vmatrix} -4 & -2 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

12. Quyida to'rtinchi tartibli determinantlar hisoblansin:

$$1) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 6 & 1 \end{vmatrix}; \quad 2) \begin{vmatrix} 2 & 3 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 5 \end{vmatrix}; \quad 3) \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ -2 & 4 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -3 \end{vmatrix}$$

13. Quyida berilgan determinantlarni uchburchak shakliga keltirib hisoblang.

$$1) \begin{vmatrix} 2 & 3 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & -5 \end{vmatrix}; \quad 2) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 9 \\ 1 & -1 & 7 & 4 \\ 1 & 3 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

J: 1) 48; 2) 20.

14. Quyidagi determinantlarni oldin soddalashtirib, keyin hisoblang:

$$1) \begin{vmatrix} x^2 + a^2 & ax & 1 \\ y^2 + a^2 & ay & 1 \\ z^2 + a^2 & az & 1 \end{vmatrix}; \quad 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$$

3-§. Ikki va uch noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasi. Kramer qoidasi. Gauss usuli

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

bu ikki noma'lumli ikkita chiziqli tenglamalar sistemasi deyiladi. a_{11} , a_{12} , a_{21} va a_{22} lar koefitsientlar, b_1 va b_2 lar ozod hadlar deyiladi. Bu sistemadan quyidagi determinantlarni tuzamiz.

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}; \quad D_{x_1} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}; \quad D_{x_2} = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$

D sistemaning asosiy determinanti, D_{x_1} va D_{x_2} lar sistemaning yordamchi determinantlari deyiladi.

Agar $D \neq 0$ bo'lsa, sistema yagona yechimga ega bo'ladi va u Kramer qoidasi bo'yicha quyidagi formuladan topiladi:

$$x_1 = \frac{D_{x_1}}{D}, \quad x_2 = \frac{D_{x_2}}{D}$$

Agar $D = 0$ va D_{x_1} , D_{x_2} lardan aqalli bittasi nolga teng bo'lmasa, sistema yechimga ega emas.

Agar $D = D_{x_1} = D_{x_2} = 0$ bo'lsa, u holda sistema cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi.

Uch noma'lumli uchta chiziqli tenglamalar sistemasi

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

uchun ham quyidagi determinantlarni tuzish mumkin:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}; \quad D_{x_1} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix};$$

$$D_{x_2} = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}; \quad D_{x_3} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

Bu yerda ham D asosiy determinant, $D_{x_1}, D_{x_2}, D_{x_3}$ lar yordamchi determinantlar deyiladi.

Agar $D \neq 0$ bo'lsa, sistema yagona yechimga ega bo'ladi va u Kramer qoidasi bo'yicha quyidagi formuladan topiladi:

$$x_1 = \frac{D_{x_1}}{D}, \quad x_2 = \frac{D_{x_2}}{D}, \quad x_3 = \frac{D_{x_3}}{D}.$$

Agar $D = 0$ va $D_{x_1}, D_{x_2}, D_{x_3}$ lardan aqalli bittasi nolga teng bo'lmasa, u holda berilgan sistema yechimga ega bo'lmaydi va uni birgalikda bo'lmagan sistema deyiladi.

n ta noma'lumli n ta chiziqli tenglamalar sistemasini n ning katta ($n \geq 4$) qiymatlarida Kramer qoidasi bilan yechish qiyinchiliklarga olib keladi. Bunday hollarda sistemani Gauss usulidan foydalanib yechish qulay bo'ladi. Bunda noma'lumlar ketma-ket yo'qotilib, sistema uchburchaksimon shaklga keltiriladi. Agar sistema uchburchaksimon shaklga kelsa, u yagona yechimga ega bo'ladi va undagi noma'lumlar oxirgi tenglamadan boshlab topiladi.

1. Quyidagi chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer usuli bilan yeching.

$$\begin{aligned} 1) \begin{cases} 8x + 3y = 12 \\ 2x - y = 7 \end{cases}; & \quad 2) \begin{cases} 2x - 3y = 11 \\ 6x - 9y = 33 \end{cases}; & \quad 3) \begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x - 5y = 2 \end{cases}; \\ 4) \begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 4x - 5y = 40 \end{cases}; & \quad 5) \begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ 7x + 4y = 8 \end{cases}; & \quad 6) \begin{cases} ax - 3y = 1 \\ ax - 2y = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$7) \begin{cases} 3x + 2y + z = 3 \\ 5x - 2y - 2z = 3 \\ x + y - z = -2 \end{cases}; \quad 8) \begin{cases} 5x + 8y + z = 2 \\ 3x - 2y + 6z = -7 \\ 2x + y - z = -5 \end{cases}$$

$$9) \begin{cases} 2x - 3y + z = -7 \\ x + 4y + 2z = -1 \\ x - 4y = -5 \end{cases}; \quad 10) \begin{cases} 2x - 3y + z = 2 \\ x + 5y - 4z = -5 \\ 4x + y - 3z = -4 \end{cases}$$

$$11) \begin{cases} x - 2y + z = -4 \\ 3x + 2y - z = 8 \\ 2x - 3y + 2z = -6 \end{cases}; \quad 12) \begin{cases} 7x + 4y - z = 13 \\ 3x + 2y + 3z = 3 \\ 2x - 3y + z = -10 \end{cases}$$

Javoblar: 1) (3, -1); 2) sistema cheksiz ko'p yechimga ega;

3) $(\frac{41}{22}, \frac{12}{11})$; 4) (5, -4); 5) (0, 2); 6) $(\frac{2}{a}, 1)$; 7) (1, -1, 2); 8) (-3, 2, 1);

9) \emptyset ; 11) (1, 2, -1);

2. Quyidagi chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan yeching.

$$1) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 5 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = 9 \\ 5x_3 - 2x_2 + 4x_1 = 4 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -3 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 = 4 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 7 \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_4 = 2 \\ 3x_1 - x_3 + x_4 = -3 \\ 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 5x_4 = -6 \end{cases}$$

Javoblar: 1) (2; 1; -1); 2) (0; 0; 1);

4-§. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning matritsalar usuli

n noma'lunli n ta chiziqli tenglamalar sistemasi

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

ni matritsa ko'rinishida $AX = B$ deb yozish mumkin. Bu yerda

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}; \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Agar $\det A \neq 0$ bo'lsa, u holda bu sistemaning matritsa shaklidagi yechimi $X = A^{-1}B$ ko'rinishida bo'ladi. Bu yerda A^{-1} matritsa A matritsaga teskari matritsa.

1. Quyidagi chiziqli tenglamalar sistemasini matritsalar usuli bilan yeching.

$$1) \begin{cases} 3x - 5y = 13 \\ 2x + 7y = 81 \end{cases}; \quad 2) \begin{cases} 3x - 4y = -6 \\ 3x + 4y = 18 \end{cases}; \quad 3) \begin{cases} 5x + 3y = 12 \\ 2x - y = 7 \end{cases};$$

$$4) \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 10 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 23 \\ x_2 + 2x_3 = 13 \end{cases}; \quad 5) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -7 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 4x_2 = -5 \end{cases};$$

$$6) \begin{cases} 5x_1 + 8x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 + 6x_3 = -7 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -5 \end{cases}; \quad 7) \begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 12 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 6 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases};$$

$$8) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_2 + 3x_3 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11 \end{cases}$$

Javob: 1) (16; 7); 2) (2; 3); 3) (3; -1); 4) (4; 3; 5); 5) (-1; 1; -2); 6) (-3; 2; 1); 7) (0; -7; 5); 8) (2; -2; 3).

III BOB. TEKISLIKDA VA FAZODA ANALITIK GEOMETRIYA

1-§. To'g'ri chiziqdagi va tekislikdagi nuqtaning koordinatalari.

Ikki nuqta orasidagi masofa va kesmani berilgan nisbatda bo'lish l o'qdagi $A(x_1)$ va $B(x_2)$ nuqtalar orasidagi masofa quyidagi formula orqali topiladi (1-chizma):

$$d = |x_2 - x_1| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2} \quad (1)$$




1-chizma



2-chizma

2-chizmada tekislikdagi to'g'ri burchakli Dekart koordinatalar sistemasi tasvirlangan. Bunda Ox - absissalar o'qi, Oy - ordinatalar o'qi, O nuqta koordinata boshi. a va b lar M nuqtaning koordinatalari (a - M nuqtaning absissasi, b - M nuqtaning ordinatasi).



$$d = M_1M_2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (2)$$

tekislikdagi ikkita nuqta orasidagi masofani topish formulasi.

M_1M_2 kesmani $\frac{M_1N}{NM_2} = \lambda$ nisbatda bo'luvchi N nuqtaning koordinatalari

$$N_x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad N_y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \quad (3)$$

formuladan topiladi.

Agar N nuqta M_1M_2 kesmaning o'rtasi bo'lsa, u holda $\lambda = 1$ bo'lib, (3) formula

$$N_x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad N_y = \frac{y_1 + y_2}{2} \quad (4)$$

ko'rinishga keladi va uni kesmani o'rtasini topish formulasi deyiladi.

1. Ordinatalar o'qida koordinatalar boshidan va $A(-2; 5)$ nuqtadan baravar uzoqlikda turgan nuqta topilsin. Javob: $(0; 2,5)$

2. Absissalar o'qida $A(-2; 3)$ nuqtadan $3\sqrt{5}$ birlikka uzoqlashgan nuqta topilsin. Javob: $B(4; 0)$

3. Uchlari $A(-3; -1), B(5; 3), C(6; -4)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakka tashqi chizilgan doiraning markazi va radiusi topilsin. Javob: $O(2; -1), R = 5$.

4. Koordinatalar to'g'ri chizig'ida $A(5)$ va $B(-10)$ nuqtalar orasidagi masofa topilsin. Javob: 15.

5. Agar A nuqtadan $B(-10)$ nuqtagacha masofa 6 ga teng bo'lsa, A nuqtaning koordinatalari qanday bo'ladi? Javob: $A_1(-4), A_2(-16)$.

6. Koordinatalar to'g'ri chizig'ida $A(-5), B(+4)$ va $C(-2)$ nuqtalar berilgan va AB, BC va AC kesmalarining uzunliklari topilsin. $AB + BC = AC$ ekanligi tekshirilsin.

7. Uchlari $A(2)$ va $B(-5)$ nuqtalarda bo'lgan AB kesmani 3:1 nisbatda bo'luvchi N nuqtaning koordinatalari topilsin. Javob: $N(-\frac{13}{4})$.

8. Nuqtaning koordinatalari $x + y = 0$ shartni qanoqlantirsa, $M(x, y)$ nuqta qaysi koordinatalar choragida bo'ladi? Javob: II yoki IV.

9. $A(-1; 2)$ nuqta bilan koordinata boshi orasidagi masofa topilsin. Javob: $\sqrt{5}$.

10. Ox o'qida shunday M nuqta topilsinki, u nuqtadan $A(2; 6)$ nuqtagacha masofa 10 ga teng bo'lsin. Javob: $M_1(10; 0), M_2(-6; 0)$.

11. $A(5; 1)$ va $B(-1; 7)$ nuqtalar berilgan. AB kesmani 1:2:3 nisbatda bo'ling.

12. Parallelogramning uchlaridan uchasi $A(3; -3), B(-1; 1), C(1; 6)$ nuqtalarda joylashgan. Uning to'rtinchi D uchi topilsin. Javob: $D(5; 2)$.

13. Uchburchakning uchlari $A(3; 6), B(-1; 3)$ va $C(2; -1)$ nuqtalarda joylashgan. C uchidan tushirilgan balandlik uzunligi topilsin.

14. $A(-2; -1), B(-1; 1)$ va $C(1; 5)$ nuqtalarni bir to'g'ri chiziqda yotishi isbotlansin.

15. Uchlari $A(-4; 2)$, $B(0; -1)$ va $C(3; 3)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak yasalsin va uning perimetri va burchaklari aniqlansin. J: $5(2 + \sqrt{2})$, 90° , 45° .

16. Uchlari $A(-3; -2)$, $B(0; -1)$ va $C(-2; 5)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning to'g'ri burchakli ekanligi isbot qilinsin.

17. $A(-4; 0)$, $B(-1; 4)$ nuqtalar hamda Oy o'qqa nisbatan ularga mos ravishda simmetrik bo'lgan A_1, B_1 nuqtalar yasalsin. ABB_1A_1 trapetsiyaning perimetri aniqlansin.

18. B nuqta birinchi koordinatalar burchagining bissektirissasiga nisbatan $A(4; -1)$ nuqtaga simmetrik. AB kesmaning uzunligi topilsin. J: $5\sqrt{2}$.

19. Uchlari $A(4; 3)$, $B(-3; 2)$ va $C(1; -6)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakka tashqi chizilgan doiraning markazi va radiusi topilsin. J: $C(1; -1)$, $R = 15$.

20. Tekislikda $A(-7; 0)$ va $B(0; 1)$ nuqtalar hamda biriuchi koordinatalar burchagining bissektirissasiga nisbatan ularga simmetrik bo'lgan A_1 va B_1 nuqtalar yasalsin. ABB_1A_1 trapetsiyaning perimetri aniqlansin. J: $18\sqrt{2}$.

21. $A(2; 3)$ va $B(10; 11)$ nuqtalarni birlashtiruvchi kesmani $AC:CB = 3:5$ nisbatda bo'luvchi C nuqtaning koordinatalari topilsin. J: $C(5; 6)$.

22. $A(-5; -2)$ va $B(4; 2,5)$ nuqtalarni birlashtiruvchi kesmani $AM:MN:NB = 3:4:2$ nisbatda bo'luvchi nuqtalarning koordinatalari topilsin. J: $M(-2; -0,5)$, $N(2; 1,5)$.

23. $A(6; -2)$ va $B(12; -6)$ nuqtalarni birlashtiruvchi kesma 5 ta teng bo'laklarga bo'lindi. Bo'linish nuqtalari koordinatalari topilsin. J: $C(7,2; -2,0)$, $D(8,4; -3,6)$, $E(9,6; -4,4)$, $F(10,8; -5,2)$.

24. $A(-2; 1)$ va $B(3; 6)$ nuqtalarni birlashtiruvchi AB kesmani $AN:NB = 3:2$ nisbatda bo'luvchi $N(x; y)$ nuqta topilsin. J: $N(1; 4)$.

25. $A(-2; 1)$ va $B(3; 6)$ nuqtalar berilgan. AB kesma N nuqta bilan $AN:NB = 3:2$ nisbatda bo'lingan bo'lsa, N nuqtaning koordinatalari topilsin. J: $N(13; 16)$.

26. Uchlari $A(2; -1)$, $B(4; 3)$ va $C(-2; 1)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak tomonlarining o'rtalari aniqlansin.

27. Uchlari $O(0; 0)$, $A(8; 0)$ va $B(0; 6)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning OC medianasi va OD bissektirissasi uzunligi topilsin. J: $OC = 5$, $OD = \frac{24\sqrt{2}}{7}$.

28. Uchlari $A(2; 0)$, $B(5; 3)$ va $C(2; 6)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning yuzi hisoblansin. J: 9 kv.b.

29. Uchlari $A(3; 1)$, $B(4; 6)$, $C(6; 3)$ va $D(5; -2)$ nuqtalarda bo'lgan to'rtburchakning yuzi hisoblansin. J: 13 kv.b.

30. Uchlari $A(3; 2)$, $B(-1; -1)$ va $C(1; -6)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning perimetri hisoblansin.

31. Uchlari $P(0; 0)$, $Q(3; 1)$ va $C(1; 7)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning to'g'ri burchakli ekanligini isbotlang.

32. y ning qanday qiymatlarida uchlari $A(1; 3)$, $B(2; -1)$, $C(4; y)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak teng yonli bo'ladi.

33. Muqtazam oltiburchakning ikkita $A_1(2; 0)$ va $A_2(5; 3)$ qo'shni uchlarni bilgan holda, uning markazini toping.

34. Berilgan uchta $A(2; 2)$, $B(-5; 1)$ va $C(3; -5)$ nuqtalardan barobar uzoqlikda bo'lgan nuqtani toping.

35. Uchlari $A(4; 2)$, $B(5; 7)$ va $C(-3; 4)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak har bir medianasining uzunligini toping.


36. Agar $A(-2; 2)$ va $B(1; -1)$ nuqtalar kvadrantning ikkita qo'shni uchi bo'lsa, qolgan uchlari koordinatalarini toping. J: $C_1(5; 1)$, $D_1(2; 5)$ va $C_2(-3; -5)$, $D_2(-6; -1)$.

37. Agar $A(3; 2)$ va $C(-2; 5)$ nuqtalar kvadratning qarama-qarshi uchlari bo'lsa, uning qolgan uchlari koordinatalari topilsin. J: $B(2; 6)$, $D(-1; 1)$.


2-§. Chiziq tenglamasi. To'g'ri chiziq va uning turli xil tenglamalari

Chiziq tenglamasi deb shunday $F(x, y) = 0$ (1) tenglamaga aytiladiki, uni shu chiziqda yotgan har qanday nuqtaning koordinatalari qanoqlantiradi, unda yotmagan nuqtaning koordinatalari esa qanoqlantirmaydi.

$y = kx + b$ (2) tenglamaga to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientli tenglamasi deyiladi. Bu yerdagi k parametr to'g'ri chiziqning Ox o'qi bilan hosil qilgan burchagining tangensiga teng bo'lib, uni to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientli deyiladi (1-chizma). Demak, $k = \operatorname{tg} \alpha$ (3), b esa to'g'ri chiziqning boshlang'ich ordinatasi deyiladi (2-chizma).



1-chizma



2-chizma

$Ax + By + C = 0$ (4) tenglamaga to'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi deyiladi. Bu yerda A va B koeffitsientlar, C ozod had deyiladi. Bunda quyidagi hollar bo'lishi mumkin.

1) $C = 0$ bo'lsa, $Ax + By = 0$ bo'lib, bu holda to'g'ri chiziq koordinata boshidan o'tadi.

2) $A = 0$ bo'lsa, $By + C = 0$ bo'lib, bu holda to'g'ri chiziq Ox o'qiga parallel bo'ladi.


3) $B = 0$ bo'lsa, $Ax + C = 0$ bo'lib, bu holda to'g'ri chiziq Oy o'qiga parallel bo'ladi.

4) $C = 0, B = 0$ bo'lsa, $Ax = 0$ bo'lib, ($x = 0$) bu holda to'g'ri chiziq Oy o'qi bilan ustma-ust tushadi.

5) $A = 0, C = 0$ bo'lsa, $By = 0$ bo'lib, ($y = 0$) bu holda to'g'ri chiziq Ox o'qi bilan ustma-ust tushadi.


$Ax + By + C = 0$ ($B \neq 0$) tenglamadan burchak koeffitsientli tenglamaga quyidagicha o'tiladi: $Ax + By + C = 0$, $By = -Ax - C$, $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$, $k = -\frac{A}{B}$, $b = \frac{C}{B}$, $y = kx + b$.

$Ax + By + C = 0$ tenglamada $A \neq 0, B \neq 0, C \neq 0$ bo'lsa, u holda undan $Ax + By = -C$, $\frac{Ax}{-C} + \frac{By}{-C} = 1$, $\frac{x}{\frac{-C}{A}} + \frac{y}{\frac{-C}{B}} = 1$, $-\frac{C}{A} = a$, $-\frac{C}{B} = b$ yoki $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (5) tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglamaga to'g'ri chiziqning kesmalar bo'yicha tenglamasi deyiladi. Bu yerda a va b lar to'g'ri chiziqning Ox va Oy o'qlardan ajratgan kesmalari (3-chizma).



$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$ (6) tenglamaga to'g'ri chiziqning normal tenglamasi deyiladi.

Bu yerda n birlik vektor va uning koordinatalari $\cos \alpha$ va $\sin \alpha$ bo'ladi, ya'ni $n(\cos \alpha; \sin \alpha)$. Bunday tashqari $|OP| = p$ (4-chizma).



Agar tenglama umumiy tenglama ko'rinishida berilgan bo'lsa, u holda uni

$$\mu = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad (7)$$

normallovchi ko'paytuvchiga ko'paytirib normal tenglamaga keltiriladi.

$M_0(x_0, y_0)$ nuqtadan o'tuvchi va yo'naltiruvchi vektori

$a = m\vec{i} + n\vec{j}$ ($m, n \neq 0$) bo'lgan to'g'ri chiziqning tenglamasi

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} \quad (8)$$

bo'lib, unga to'g'ri chiziqning kanonik tenglamasi deyiladi.

Bu tenglamada

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = t, \quad \begin{cases} y - y_0 = nt \\ x - x_0 = mt \end{cases}; \quad \begin{cases} y = y_0 + nt \\ x = x_0 + mt \end{cases}; \quad t \in (-\infty; +\infty) \quad (9)$$

40

ni hosil qilamiz. Bu tenglamaga to'g'ri chiziqning parametrik tenglamasi deyiladi.

$y - y_0 = k(x - x_0)$ (10) tenglamaga $M_0(x_0, y_0)$ nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar dastasining tenglamasi deyiladi.

Berilgan ikkita $M_1(x_1, y_1)$ va $M_2(x_2, y_2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$ (11) formuladan tuziladi.

Agar ikkita to'g'ri chiziq $y_1 = k_1x + b_1$ va $y_2 = k_2x + b_2$ tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, u holda ular orasidagi burchak

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \quad (12)$$

formuladan topiladi.

$k_2 = k_1$ (13) bo'lsa, to'g'ri chiziqlar parallel, $k_1 = -\frac{1}{k_2}$ (14) bo'lsa, to'g'ri chiziqlar perpendikulyar bo'ladi.

Agar to'g'ri chiziqlar $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ va $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ umumiy tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, u holda ular orasidagi burchak

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \quad (15)$$

formuladan topiladi.

$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$ (16) bo'lsa, to'g'ri chiziqlar parallel, $A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0$

(17) bo'lsa, to'g'ri chiziqlar perpendikulyar bo'ladi.

$M_0(x_0, y_0)$ nuqtadan $Ax + By + C = 0$ to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad (18) \quad (d = |x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha - p|) \quad (19)$$

41

formuladan topiladi.

1. $A(1; 3)$, $B(2; 2)$, $C(2; -2)$, $D(3; -3)$, $E(0; -5)$ nuqtalardan qaysikari $x - y = 0$ tenglama bilan berilgan chiziqda yotadi.

2. $2x^2 - y^2 + 3x - 4 = 0$ tenglama bilan aniqlanuvchi figuraga tegishli bir nechta nuqtani toping.

3. Quyidagi tenglamalar bilan qanday nuqtalar to'plami aniqlanadi? Ularni chizmada ko'rsating:

- 1) $x + 7 = 0$; 2) $x - 4 = 0$; 3) $y + 3 = 0$; 4) $x = 0$; 5) $y = 0$;
6) $x^2 - xy = 0$; 7) $x^2 - y^2 = 0$; 8) $xy = 0$; 9) $y^2 - 9 = 0$;
10) $x^2 - 8x + 15 = 0$; 11) $y^2 + 5y + 4 = 0$; 12) $y = |x|$.

4. Ushbu tenglamalarga mos chiziqlarni yasang.

- 1) $y = x^2$; 2) $x^2 + y^2 = 1$; 3) $y = x^3$; 4) $y = (x - 1)^2 + 2$.

5. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan figuralarning kesishish nuqtalari topilsin.

- 1) $x^2 + y^2 = 32$ va $x - y = 0$;
2) $x^2 - 2xy + 4x - 3 = 0$ va $5x - 4y - 1 = 0$;
3) $x^2 + y^2 - 12x + 16y = 0$ va $x = 0$;
4) $x^2 + y^2 - 2x + 8y + 7 = 0$ va $y = 0$;
5) $x^2 + y^2 - 8x + 10y + 40 = 0$ va $x^2 + y^2 = 4$;
6) $x^2 + y^2 = 36$ va $y - x = 0$;
7) $x^2 + y^2 = 64$ va $y + x = 0$.

6. Oy o'qidan $b = 3$ kesma ajratib, Ox o'q bilan 1) 45° ; 2) 135° burchak hosil qiluvchi to'g'ri chiziqlarning tenglamalari tuzilsin va ular yasalsin.

7. Oy o'qidan $b = -3$ kesma ajratib, Ox o'q bilan 1) 60° ; 2) 120° burchak hosil qiluvchi to'g'ri chiziqlarning tenglamalari tuzilsin va ular yasalsin.

8. Koordinatalar boshidan va $A(-2; 3)$ nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq yasalsin va tenglamasi tuzilsin. $J: y = -1,5x$.

9. 1) $2x - 3y = 6$; 2) $2x + 3y = 0$; 3) $y = -3$; 4) $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$;

5) $3x + 2y - 7 = 0$; 6) $2x - 3y + 6 = 0$ to'g'ri chiziqlarning har biri uchun k va b parametrlar aniqlansin.

10. 1) $3x + 4y - 12$; 2) $3x - 4y - 0$; 3) $2x - 5 - 0$; 4) $2y + 5 - 0$ to'g'ri chiziqlar yasalsin.

11. 1) $2x - 3y = 6$; 2) $3x - 2y + 4 = 0$; 3) $6x - 3y + 11 = 0$ to'g'ri chiziq tenglamalari kesmalar bo'yicha tenglama ko'rinishida yozilsin.

12. $A(3; 5)$, $B(2; 7)$, $C(-1; -3)$ va $D(-2; -6)$ nuqtalar $y = 2x - 1$ to'g'ri chiziqda yotadimi, yo o'sha to'g'ri chiziqdan "yuqoriroqda" yoki "quyiroqda" joylashganmi? J : A va C to'g'ri chiziqda yotadi. B undan "yuqorida" D esa "quyida" yotadi.

13. 1) $y > 3x + 1$; 2) $y < 3x + 1$; 3) $2x + y - 4 \geq 0$
4) $2x + y - 4 < 0$ tengsizliklar qanday ma'noga ega?

14. Nuqtalarining koordinatalari ushbu: 1) $y < 2 - x$, $x > -2$, $y > -2$; 2) $y > 2 - x$, $x < 4$, $y < 0$; 3) $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} < 1$, $y \geq x + 2$, $x \geq -4$ tengsizliklarni qanoatlantiruvchi shalar yasalsin.

15. $3x - 3y + 1 = 0$ to'g'ri chiziqni Ox o'qi bilan hosil qilgan burchagi topilsin. $J: \frac{\pi}{4}$.

16. $2x - y + 4 = 0$ to'g'ri chiziqning koordinata o'qlari bilan kesishish natijasida hosil bo'lgan uchburchakning yuzi topilsin. J: 4.

17. Quyidagi to'g'ri chiziqlar orasidagi burchaklar topilsin.

1) $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = \frac{1}{2}x + 1 \end{cases}$ 2) $\begin{cases} 5x - y + 7 = 0 \\ 2x - 3y + 1 = 0 \end{cases}$ 3) $\begin{cases} 2x + y = 0 \\ y = 3x - 4 \end{cases}$

4) $\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ 6x + 4y + 9 = 0 \end{cases}$ 5) $\begin{cases} 3x - 4y - 6 = 0 \\ 8x + 6y - 11 = 0 \end{cases}$ 6) $\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \\ \frac{x}{b} + \frac{y}{a} = 1 \end{cases}$

7) $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ x + 4y - 6 = 0 \end{cases}$ 8) $\begin{cases} y = -\sqrt{3}x + 1 \\ y = \sqrt{3}x - 5 \end{cases}$

18. $3x - 2y + 7 = 0$, $6x - 4y - 9 = 0$, $6x + 4y - 5 = 0$, $2x + 3y - 6 = 0$ to'g'ri chizqlardan parallel va perpendikulyar bo'ganlari ko'rsatilsin.

19. $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$ va $y = \frac{3}{2}x - 1$ to'g'ri chiziqlar o'zaro perpendikulyarini yo'qmi?

20. Koordinatalar boshidan o'tib, $y = 4 - 2x$ to'g'ri chiziq bilan 45° burchak tashkil qiluvchi to'g'ri chiziq tenglamasi yozilsin.

J: $y = 3x$ va $y = -\frac{2}{3}x$.

21. $A(-1; 1)$ nuqtadan o'tib, $2x + 3y = 6$ to'g'ri chiziq bilan 45° burchak hosil qiluvchi to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

J: $x - 5y + 6 = 0$; $5x + y = -4$.

22. Uchburchak tomonlari $x + 2y = 0$, $x + 4y - 6 = 0$, $x - 4y - 6$ tenglamalar bilan berilgan. Uning ichki burchaklari topilsin. J: 28° , $12^\circ 30'$ va $139^\circ 30'$.

23. Uchlari $A(-2; 0)$, $B(2; 6)$ va $C(4; 2)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning BD balandligi va BE medianasi o'tkazilgan. AC tomon, BE mediana va BD balandlikning tenglamasi tuzilsin. J: $x - 3y + 2 = 0$; $5x - y = 0$; $3x + y = 12$.

24. Quyidagi nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamalari tuzilsin.

1) $A(-1; 3)$ va $B(4; -2)$; 2) $A(2; 3)$ va $B(3; 5)$;

3) $A(-3; 2)$ va $B(4; -7)$; 4) $A(-2; -2)$ va $B(4; 4)$.

25. $A(2; 3)$ nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar dastasining tenglamasi yozilsin. Shu dastadan Ox o'q bilan: 1) 45° ; 2) 60° ; 3) 135° ; 4) 0° burchak tashkil etuvchi to'g'ri chiziqlar yasalsin va ularning tenglamalari tuzilsin.

26. $2x - 5y - 10 = 0$ to'g'ri chiziqning koordinata o'qlari bilan kesishgan nuqtalaridan bu to'g'ri chiziqqa perpendikulyarlar o'tkazilgan. Ularning tenglamalari tuzilsin. J: $5x + 2y + 4 = 0$; $5x + 2y = 25$.

27. Koordinatalar boshidan o'tib, $y = 4 - 2x$ to'g'ri chiziq bilan 45° burchak tashkil etuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi yozilsin. J: $y = 3x$ va $y = -\frac{1}{3}x$.

28. Uchburchak tomonlari $y = -\frac{4}{3}$, $x = 3$, $x - 2y + 3 = 0$ tenglamalar bilan berilgan. Uning uchlari va burchaklari topilsin.

J: $(3; -1)$, $(3; 3)$, $(-\frac{9}{5}; \frac{3}{5})$, 45° , $71^\circ 34'$, $63^\circ 26'$.

29. Tomonlari $x + y = 4$, $3x - y = 0$, $x - 3y - 8 = 0$ tenglamalar bilan berilgan uchburchak yasalsin, uning burchaklari va yuzi topilsin.

30. Uchlari $A(-4; 2)$, $B(2; -5)$ va $C(5; 0)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak medianalarining va balandliklarining kesishgan nuqtasi topilsin. J: $(1; -1)$, $(\frac{6}{5}; -2)$.

31. $(-4; 6)$ nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq koordinatalar burchagidan yuzi 6 kv birlikka teng uchburchak ajratadi. Bu to'g'ri chiziq tenglamasi yozilsin.

32. 1) $3x - 4y - 20 = 0$; 2) $x + y + 3 = 0$; 3) $y = kx + b$;
4) $2x - 5y + 7 = 0$ to'g'ri chiziqlarning tenglamalari normal ko'rinishga keltirilsin.

33. Normal uzunligi $p = 2$ va uning Ox o'qqa og'ish burchagi β : 1) 45° ; 2) 135° ; 3) 225° ; 4) 315° bo'lgan to'g'ri chiziqlar yasalsin. Bu to'g'ri chiziqlarning tenglamalari yozilsin.

34. $A(4; 3)$, $B(2; 1)$, $C(1; 0)$ nuqtalardan $3x + 4y - 10 = 0$ to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofalar topilsin. Nuqtalar va to'g'ri chiziqlar yasalsin.

35. Koordinatalar boshidan $12x - 5y + 39 = 0$ to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa topilsin.

36. $2x - 3y - 6 = 0$ va $4x - 6y - 25 = 0$ to'g'ri chiziqlar parallel ekanligi ko'rsatilsin va ular orasidagi masofa topilsin.

37. $y = kx + 5$ to'g'ri chiziq koordinatalar boshidan $d = \sqrt{5}$ masofada bo'lsa, k topilsin.

38. Uchlari $A(-3; 0)$, $B(2; 5)$ va $C(3; 2)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak BD balandligining uzunligi topilsin.

39. $A(-4; -3)$, $B(-5; 0)$, $C(5; 6)$ va $D(1; 0)$ nuqtalar trapetsiyaning uchlari bo'lishi tekshirilsin va uning balandligi topilsin.

40. $x + 2y - 5 = 0$ to'g'ri chiziqdan $\sqrt{5}$ ga teng uzoqlikda bo'lgan nuqtalar geometrik o'rningning tenglamasi tuzilsin.

41. $2x - 3y + 5 = 0$ va $3x + y - 7 = 0$ to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi $M(x, y)$ nuqtadan o'tuvchi va $y = 2x$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar to'g'ri chiziq tenglamasi yozilsin. J: $11x + 22y - 74 = 0$.

42. Uchburchak AB tomonining tenglamasi $x - 3y + 3 = 0$ va AC tomonining tenglamasi $x + 3y + 3 = 0$ hamda AD balandligining asosi $D(-1; 3)$ bo'lsa, uchburchak ichki burchaklarini toping. J: $36^\circ 52'$, $117^\circ 52'$.

43. Nuqtalarining koordinatalari:

1) $x - 2 < y < 0$ va $x > 0$; 2) $-2 \leq y \leq x \leq 2$;

3) $2 < 2x + y < 8$, $x > 0$ va $y > 0$ tengsizliklarni qanoatlantiruvchi sohalar yasalsin.

44. $A(5; 7)$ nuqta va $x + 2y - 4 = 0$ to'g'ri chiziq berilgan. A nuqtaning berilgan to'g'ri chiziqdagi proyeksiyasi B topilsin.

45. Chiziq $x = R \cos t$, $y = R \sin t$ parametrik tenglama bilan berilgan. Chiziq tenglamasini ikki o'zgaruvchili tenglama ko'rinishiga keltiring. J: $x^2 + y^2 = R^2$.

46. Chiziq $x = 2 \cos t$, $y = 3 \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) parametrik tenglama bilan berilgan. Chiziq tenglamasini ikki o'zgaruvchili tenglama ko'rinishiga keltiring. J: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.

47. Uchlari $A(-5; 3)$, $B(3; 7)$, $C(4; -1)$ nuqtalarda bo'lgan ABC uchburchak AD balandligining tenglamasi tuzilsin. $I: x - 8y + 29 = 0$.
48. Uchlari $A(2; 2)$, $B(3; 5)$, $C(4; 2)$, $D(3; -1)$ nuqtalarda bo'lgan romb diagonallarining tenglamalari tuzilsin. $I: x - 3 = 0$, $y - 2 = 0$.
49. Uchlari $A(1; 1)$, $B(4; 2)$, $C(5; -1)$, $D(2; -2)$ nuqtalarda bo'lgan kvadrat tomonlarining tenglamalari tuzilsin. $I: x - 3y - 2 = 0 (AB)$, $x - 3y - 8 = 0 (CD)$, $3x + y - 14 = 0 (BC)$, $3x + y - 4 = 0 (AD)$.
50. $A(2; 4)$ va $B(5; -7)$ nuqtalarni birlashtiruvchi kesmaning o'rta perpendikulyari tenglamasi tuzilsin. $I: 7x - 11y - 27 = 0$.
51. Uchlari $A(5; 2)$, $B(-1; -4)$ va $C(-5; -3)$ nuqtalarda bo'lgan ABC uchburchakning B uchidan AC tomoniga parallel qilib o'tkazilgan to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin. $I: x - 2y - 7 = 0$.
52. Uchlari $A(2; 1)$, $B(1; 4)$, $C(3; 6)$ va $D(6; 5)$ nuqtalarda bo'lgan trapetsiya o'rta chizig'i tenglamasi tuzilsin. $I: x - y + 1 = 0$.
53. Uchlari $A(-1; 2)$, $B(5; 3)$ va $C(4; -2)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak o'rta chizig'ining tenglamasi tuzilsin. $I: 10x - 2y - 15 = 0$.
54. $A(2; 3)$ nuqtadan o'tuvchi va $4x + 3y - 12 = 0$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin. $I: 3x - 4y + 6 = 0$.
55. $A(-1; 3)$ nuqtadan o'tuvchi va $5x - 3y + 7 = 0$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin. $I: 3x + 5y - 12 = 0$.

56. $M_1(4; 2)$ va $N_1(1; -7)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq bilan $M_2(-1; 3)$ va $N_2(0; 6)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak topilsin. $I: \varphi = \arccos 0,6$.

57. Tomonlarining tenglamalari $18x + 6y - 17 = 0$, $14x - 7y + 13 = 0$ va $5x + 10y - 9 = 0$ bo'lgan uchburchakning burchaklari topilsin. $I: 45^\circ, 90^\circ, 45^\circ$.

58. Uchlari $A(-6; -3)$, $B(6; 7)$ va $C(2; -1)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning burchaklari topilsin. $I: \arccos 0,006; \arccos 0,9162; \arccos(-0,6508)$.

3-§. Ikkinchi tartibli egri chiziqlar. Aylana

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 \quad (1)$$

tenglama bilan berilgan tekislikdagi chiziqlar ikkinchi tartibli egri chiziqlar deyiladi.

Bu yerda A, B, C koeffitsientlardan kamida bittasi noldan farqli, ya'ni $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ shart bajarilishi kerak.

Berilgan $C(a, b)$ nuqtadan bir hil R masofada joylashgan tekislikdagi nuqtalar toplami (geometrik o'rni) aylana deyiladi. Bunda $C(a, b)$ nuqta aylananing markazi, R soni aylananing radiusi deyiladi.

Markazi $C(a, b)$ nuqtada radiusi R bo'lgan aylananing tenglamasi

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2 \quad (2)$$

ko'rinishida bo'ladi.

Agar aylananing markazi $O(0; 0)$ nuqtada bo'lsa, u holda uning tenglamasi

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad (3)$$

ko'rinishida bo'ladi.

Agar (1) tenglamada $A = C = 1$, $B = 0$, $D = -2A$, $E = -2B$ va $F = A^2 + B^2 - R^2$ bo'lsa, u holda (1) tenglama aylanani ifodalaydi.

1. Markazi $C(a; b)$ nuqtada va radiusi R bo'lgan aylana tenglamasi tuzilsin:

- 1) $C(3; -2)$ va $R = 5$; 2) $C(-2; -5)$ va $R = \sqrt{3}$;
3) $C(-5; 0)$ va $R = 3$; 4) $C(0; -7)$ va $R = 2$.

2. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan aylanalarning markazlari va radiuslari topilsin.

- 1) $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 3 = 0$; 2) $x^2 + y^2 - 10x - 6y - 2 = 0$;
3) $x^2 + y^2 - 10x + 9 = 0$; 4) $x^2 + y^2 + 8x + 7 = 0$.

3. $A(-4; 6)$ nuqta berilgan. Diametri OA kesmadan iborat aylana tenglamasi tuzilsin. J: $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 0$.

4. $x^2 + y^2 + 5x = 0$ aylana va $x + y = 0$ to'g'ri chiziq yasalsin va ularning kesishish nuqtalari topilsin. J: $O(0; 0)$, $M(-25; 25)$.

5. $A(1; 2)$ nuqtadan o'tuvchi va koordinata o'qlariga uruvchi aylana tenglamasi tuzilsin.

J: $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ yoki $(x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 25$

6. Diametrining uchlari $A(3; 2)$ va $B(-1; 6)$ nuqtalarda joylashgan aylananing tenglamasi tuzilsin. J: $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 8$

7. Markazi $C(1; 2)$ nuqtada bo'lgan va $6x + 8y - 15 = 0$ to'g'ri chiziqqa urinadigan aylananing tenglamasi yasalsin.

J: $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = \frac{49}{100}$

8. Koordinatalari quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi nuqtalar to'plami tekislikda qanday figurani aniqlaydi?

- 1) $x^2 + y^2 \geq 4$; 2) $1 \leq x^2 + y^2 \leq 9$; 3) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 \leq 1$;

4) $\begin{cases} x^2 + y^2 - 4y \leq 0 \\ |x| \geq 1 \end{cases}$; 5) $\begin{cases} (x - 3)^2 + (y - 3)^2 < 4 \\ x > y \end{cases}$

9. $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 0$ aylanning Oy o'q bilan kesishgan nuqtalariga o'tkazilgan radiuslari orasidagi burchak topilsin.

J: $\alpha = -24$, $\alpha = 112^\circ 37'$.

10. $A(-1; 3)$, $B(0; 2)$ va $C(1; -1)$ nuqtalardan o'tuvchi aylana tenglamasi tuzilsin.

Ko'rsatma. Izlanayotgan aylana tenglamasini $x^2 + y^2 + mx + ny + p = 0$ ko'rinishda yozib, undagi x va y lar o'rniga qiymatlarini qo'yib, so'ngra m , n , p lar topiladi.

11. $A(4; 4)$ nuqtadan va $x^2 + y^2 + 4x - 4y = 0$ aylana bilan $y = -x$ to'g'ri chiziq kesishgan nuqtadan o'tuvchi aylana tenglamasi tuzilsin. J: $x^2 + y^2 - 8y = 0$.

12. $y = \sqrt{-x^2 - 4x^2}$ egri chiziqning joylashish sohasi aniqlanib, shakli chizilsin.


13. $A(1; -2)$, $B(0; -1)$ va $C(-3; 0)$ nuqtalardan o'tuvchi aylanaga koordinatalar boshidan o'tkazilgan urunmalar tenglamalari tuzilsin. J: $y = 0$, $15x + 8y = 0$.

14. $A(3; 0)$ nuqta $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1 = 0$ aylana ichida yotishi ko'rsatilsin va A nuqtada teng ikkiga bo'linuvchi vatar tenglamasi yozilsin.

Ko'rsatma. Izlanuvchi vatar CA ga perpendikulyardir, bunda C aylana markazi. J: $x + y = 3$.

4-§. Ellips

Fokuslar deb ataluvchi berilgan ikkita F_1 va F_2 nuqtalargacha masofalarning yig'indisi o'zgarmas $2a$ songa teng bo'lgan tekislikdagi nuqtalarning geometrik o'rniga ellips deb ataladi (1-chizma).



$$|F_1M| + |F_2M| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a \quad (1)$$

(1) tenglikni soddalashtirib va $a^2 - c^2 = b^2$ (2) belgilash qilib

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3)$$

ni hosil qilamiz. Bunga ellipsning kanonik tenglamasi deyiladi. Koordinatalari (3) tenglamani qanoqlantiruvchi nuqtalarning geometrik o'rnini 2-chizmada berilgan.

$AA_1 = 2a$ ga ellipsning katta o'qi, $BB_1 = 2b$ ga ellipsning kichik o'qi deyiladi. a -ellipsning katta yarim o'qi, b -ellipsning kichik yarim o'qi deyiladi. c -ga ellipsning fokusi deyiladi.


Ellipsning fokuslari orasidagi $2c$ masofani uning katta o'qi uzunligi $2a$ ga nisbati ellipsning eksentrisiteti deyiladi va uni ε bilan belgilanadi. Demak,

$$\varepsilon = \frac{2c}{2a} = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2} \quad (4)$$

Ellipsning ixtiyoriy $M(x, y)$ nuqtasidan uning F_1 va F_2 fokuslarigacha bo'lgan $|F_1M| = r_1$, $|F_2M| = r_2$ masofalar ellipsning fokal radiuslari deyiladi.

Fokal radiuslari uchun $r_1 = a + \varepsilon x$, $r_2 = a - \varepsilon x$ (5) formulalar bilan o'rinli.

$x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$ tenglamalar bilan berilgan tog'ri chiziqlar ellipsning direktisalari deyiladi (3-chizma).



1. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan ellipsning fokuslari, yarim o'qlari va eksentrisitetlari topilsin:

- 1) $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{25} = 1$; 2) $\frac{x^2}{121} + \frac{y^2}{81} = 1$; 3) $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$;
 4) $2x^2 + y^2 = 32$; 5) $16x^2 + 25y^2 = 400$; 6) $x^2 + 2y^2 = 18$.

2. Quyida berilganlarga asosan ellipsning tenglamasi tuzilsin:

- 1) $2c = 8$, $b = 3$; 2) $a = 6$, $\varepsilon = 0,5$;
 3) $a = 5$, $c = 4,8$; 4) $a = 5$, $c = 4$.

3. Koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik bo'lgan ellips $M(2; \sqrt{3})$ va $B(0; 2)$ nuqtalardan o'tadi. Uning tenglamasi yozilsin va M nuqtadan fokuslarga bo'lgan masofa topilsin. J: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{2}$,
 $r_1 = 4 - \sqrt{3}$, $r_2 = 4 + \sqrt{3}$.

4. Fokuslari Ox o'qda yotuvchi ellips koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik bo'lib $M(-4; -\sqrt{21})$ nuqtadan o'tadi va $\varepsilon = \frac{3}{4}$ eksentrisitetga ega. Ellips tenglamasi yozilsin va M nuqtaning fokal radiuslari topilsin.

$$J: \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{20} = 1, \quad r_1 = 11, \quad r_2 = 5.$$

5. $9x^2 + 25y^2 = 225$ ellipsda shunday $M(x, y)$ nuqta topilsinki undan o'ng fokusgacha bo'lgan masofa chap fokusgacha bo'lgan masofadan 4 marta katta bo'lsin. $J: \left(-\frac{15}{4}; \pm \frac{\sqrt{52}}{4}\right)$.


6. $x^2 + 2y^2 = 18$ ellipsning o'qlari orasidagi burchakni teng ikkiga bo'luvchi vatar uzunligi topilsin. $J: 4\sqrt{3}$.

7. Ellips fokuslarining biridan katta o'qining uchlari gacha bo'lgan masofalar 5 va 1 ga teng. Uning tenglamasi yozilsin. $J: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$, $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$.

8. Koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik ellips $M(2\sqrt{3}; \sqrt{6})$ va $A(6; 0)$ nuqtalardan o'tadi. Uning tenglamasi yozilsin, eksentrisiteti va M nuqtadan fokuslarga masofalar topilsin. $J: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad r_1 = 3, \quad r_2 = 9$.

5-§. Giperbola

Har bir nuqtasidan fokuslar deb ataluvchi berilgan ikkita F_1 va F_2 nuqtalargacha masofalarning ayirmasi o'zgarmas $2a$ songa teng bo'lgan nuqtalarning geometrik o'rniga **giperbola** deb ataladi (1-chizma).



Ta'rifga asosan

$$|F_1M| - |F_2M| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a \quad (1)$$

tenglikni yozamiz. Uni soddalashtirib va $c^2 - a^2 = b^2$ (2) almashtirish qilib

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3)$$

tenglamani hosil qilamiz. Bunga giperbolaning **kanonik** tenglamasi deyiladi. Giperbola koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik joylashgan bo'ladi (2-chizma).

Giperbolaning fokuslari orasidagi $2c$ masofani uning haqiqiy o'qi uzunligi $2a$ ga nisbati giperbolaning eksentrisiteti deyiladi. Uni ε bilan belgilanadi. Demak,

$$\varepsilon = \frac{2c}{2a} = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} \quad (4)$$

$A_1(-a, 0)$ va $A_2(a, 0)$ nuqtalar giperbolaning **uchlari** deyiladi. $|A_1A_2| = 2a$ masofa giperbolaning **haqiqiy o'qi** deyiladi. BB_1 masofa giperbolaning **maxhum o'qi** deyiladi.

$y = \pm \frac{b}{a}x$ tenglamalar bilan berilgan chiziqlar giperbolaning asimptotalari deyiladi.

Tenglamalari $x = \pm \frac{a}{c}$ bo'lgan ikkita b_1 va b_2 chiziqlar giperbolaning direktrisalari deyiladi.

Giperbolaning $M(x; y)$ nuqtasidan uning F_1 va F_2 fokuslarigacha bo'lgan $|F_1M|$ va $|F_2M|$ masofalar giperbolaning fokal radiuslari deyiladi.

Fokal radiuslar $r_1 = \pm(a + ex)$, $r_2 = \pm(a - ex)$ tenglamalar bilan ifodalanadi.

Agar (3) kanonik tenglamada $a = b$ bo'lsa, u holda giperbola teng yonli deyiladi.

1. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan giperbolaning fokuslari, yarim o'qlari va eksentrisitetlari topilsin.

$$1) \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{25} = 1; \quad 2) \frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{49} = 1; \quad 3) \frac{x^2}{225} - \frac{y^2}{91} = 1;$$

$$4) x^2 - 4y^2 = 1; \quad 5) x^2 - 4y^2 = 16; \quad 6) 9x^2 - 25y^2 = 225.$$

2. Quyida berilganlarga asosan giperbolaning tenglamasi tuzilsin.

$$1) 2c = 6; \quad \varepsilon = 1,5; \quad 2) 2a = 4\sqrt{5}, \quad \varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$3) 2c = 10, \quad 2a = 8; \quad 4) a = 2\sqrt{5}, \quad \varepsilon = \sqrt{1,2}.$$

3. $x^2 - 4y^2 = 16$ giperbola va uning asimptotlari yasalsin. Giperbolaning fokuslari, eksentrisitetlari va asimptotalari orasidagi burchak topilsin. J: $\varepsilon = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $53^\circ 08'$.

4. $x^2 - 4y^2 = 16$ giperbolada ordinatasi 1 ga teng M nuqta olingan undan fokuslarigacha bo'lgan masofalar topilsin. J: $r_1 = 1$; $r_2 = 9$.

5. Giperbola koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik bo'lib $M(6; -2\sqrt{3})$ nuqtadan o'tadi va $b = 2$ mavhum yarim o'qqa ega. Uning tenglamasi yozilsin hamda M nuqtadan fokuslarigacha bo'lgan masofa topilsin. J: $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$, $2\sqrt{3}$ va $6\sqrt{3}$.

6. Uchlari $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ellipsning fokuslarida, fokuslari esa uning uchlari bo'lgan giperbolaning tenglamasi yozilsin. J: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

7. $x^2 - 4y^2 = 16$ giperbolaga $A(0; -2)$ nuqtada o'tkazilgan urinmalarning tenglamalari yozilsin. J: $y + 2 = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$.

8. Biror uchidan fokuslarigacha masofalari 9 va 1 ga teng bo'lgan giperbolaning kanonik tenglamasi yozilsin. J: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

9. Markazi $x^2 - 3y^2 = 12$ giperbolaning o'ng fokusida bo'lgan va koordinatalar boshidan o'tuvchi aylana bilan shu giperbola asimptotalarining kesishgan nuqtalari topilsin. J: $(0; 0)$, $(6; 2\sqrt{3})$.

10. $M(6; \frac{3}{2}\sqrt{5})$ nuqtadan o'tuvchi va koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik bo'lgan giperbolaning haqiqiy yarim o'qi $a = 4$ ga teng. Giperbolaning chap fokusidan asimptotalariga tashirilgan perpendikulyarlarning tenglamalari yozilsin. J: $y = \pm \frac{4}{3}(x + 5)$.

11. Fokuslari Ox o'qida yotuvchi va oralaridagi masofa $10\sqrt{2}$ ga teng bo'lgan giperbola asimptotalarining tenglamalari $y = \pm \frac{3}{4}x$ dan iborat. Giperbolani kanonik tenglamasi yozilsin. J: $\frac{x^2}{37} - \frac{y^2}{16} = 1$.

12. Fokuslari Ox o'qida va $M(4; -2)$ nuqtadan o'tuvchi teng tomonli giperbolaning tenglamasi tuzilsin. J: $x^2 - y^2 = 12$.

13. Fokuslari Ox o'qida bo'lib $M(-10; 8)$ nuqtadan o'tuvchi teng tomonli giperbolaning tenglamasi tuzilsin. J: $x^2 - y^2 = 36$.

14. Fokuslari Oy o'qida bo'lgan va $C(1; -3)$ nuqtadan o'tuvchi teng tomonli giperbolaning tenglamasi tuzilsin. J: $y^2 - x^2 = 8$.

15. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan giperbolalarning markazi va yarim o'qlarini toping.

1) $9x^2 - 25y^2 - 18x - 100y - 316 = 0$; J: $C(1; -2)$, $a = 5$, $b = 3$.


2) $5x^2 - 6y^2 + 10x - 12y - 31 = 0$; J: $C(-1; -1)$, $a = \sqrt{6}$, $b = \sqrt{5}$.

3) $x^2 - 4y^2 + 2x + 16y - 7 = 0$; J: $C(-1; 2)$, $a = 2$, $b = \sqrt{8}$.

4) $3x^2 - y^2 + 12x - 4y - 7 = 0$; J: $C(-2; -2)$, $a = 2$, $b = 2\sqrt{3}$.

6-§. Parabola

Foküs deb ataluvchi berilgan F nuqta va direktrisa deb ataluvchi l to'g'ri chiziqqacha masofalari o'zaro teng bo'lgan tekislikdagi nuqtalarning geometrik o'rniga parabola deb aytiladi (1-chizma).



Ta'rifga asosan $|MC| = |MF|$ yoki

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = x + \frac{p}{2} \quad (1)$$

Bu tenglamani soddalashtirib $y^2 = 2px$ (2) ni hosil qilamiz. (2) ga parabolaning kanonik tenglamasi deyiladi. Bu tenglamani parametruvchi nuqtalarning geometrik o'rni parabola dan iborat (2-chizma).

$|MC| = d$ va $|MF| = r$ (fokal radius) deb belgilasak, ta'rifga asosan $r = d = x + \frac{p}{2}$ bo'ladi. Parabola uchun eksentrisitet $e = \frac{r}{d} = 1$ bo'ladi.

1. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan parabolalarning fokuslari topilsin va direktrisalarining tenglamalari tuzilsin.

1) $y^2 = 8x$; 2) $y^2 = 12x$; 3) $y^2 = 24x$; 4) $x^2 = -32y$;

5) $x^2 = 4y$; 6) $x^2 = -4y$.

2. 1) $(0; 0)$ va $(1; -3)$ nuqtalardan o'tuvchi va Ox o'qqa nisbatan simmetrik; 2) $(0; 0)$ va $(2; -4)$ nuqtalardan o'tuvchi va Oy o'qqa nisbatan simmetrik bo'lgan parabola tenglamasi tuzilsin. J: $y^2 = 9x$; $y = -x^2$.

3. $x^2 + y^2 + 4y = 0$ aylana va $x + y = 0$ to'g'ri chiziqning kesishgan nuqtalaridan o'tib, Oy o'qqa nisbatan simmetrik bo'lgan parabolaning tenglamasi yozilsin. J: $y = -\frac{x^2}{2}$.

4. $y^2 = 6x$ parabolada fokal radius-vektori 4,5 ga teng bo'lgan nuqta topilsin. J: $(3; 3\sqrt{2})$.

5. Koordinatalar boshidan va $x = 4$ to'g'ri chiziqdan teng uzoqlashgan nuqtalar geometrik o'rnining tenglamasi tuzilsin. Bu egri chiziqning koordinata o'qlari bilan kesishgan nuqtalari topilsin va egri chiziq yasalsin. J: $y^2 = 8(2 - x)$.

6. $y = x$ to'g'ri chiziq bilan $x^2 + y^2 + 6y = 0$ aylananing kesishgan nuqtalaridan o'tuvchi va Ox o'qqa nisbatan simmetrik bo'lgan parabolaning tenglamasi yozilsin. J: $y^2 = -3x$.

7. Uchi koordinatular boshida va direktrisasining tenglamasi $2y-7=0$ bo'ldan parabolaning tenglamasi tuzilsin. J: $x^2 = 14y$.

8. Uchi koordinatular boshida va direktrisasining tenglamasi $x+3=0$ bo'ldan parabolaning tenglamasi tuzilsin. J: $y^2 = 12x$.

9. Quyidagilarga asoslanib, parabolaning kanonik tenglamasi tuzilsin:

- 1) Fokusdan parabolaning uchigacha bo'lgan masofa 2 ga teng;
- 2) Fokusdan direktrisagacha bo'lgan masofa 6 ga teng;
- 3) Parabolaning uchidan direktrisagacha bo'lgan masofa 1 ga teng.

J: 1) $y^2 = 8x$, 2) $y^2 = 12x$, 3) $y^2 = 4x$.

10. Quyidagi parabolalarning tenglamalarini soddaroq ko'rinishga keltiring va uclarini toping.

1) $y^2 - 2y - 2x - 5 = 0$; 2) $y^2 + 2x + 2y - 1 = 0$;


3) $x^2 - 4x - 2y + 10 = 0$; 4) $x^2 + 4x - y + 4 = 0$

J: 1) $(y-1)^2 = 2(x+3)$, $A(-\frac{5}{2}; 0)$; 2) $(y+1)^2 = -2(x-1)$,

$C(1; -1)$; 3) $(x-2)^2 = 2(y-3)$, $C(2; 3)$; 4) $(x+2)^2 = y$, $C(-2; 0)$.

7-§. Qutb koordinatalar sistemasi

Tekislikda qutb deb ataluvchi O nuqta va qutb o'qi deb ataluvchi OP nur berilgan bo'lsin (1-chizma).



(1) holda tekislikdagi M nuqtaning o'ri

1) $\varphi = \angle MOP$ qutb burchagi;

2) $r = OM$ radius vektor bilan aniqlanadi. φ bilan r orasidagi bog'lanishni o'rganganda, qutb koordinatalari φ va r har qanday musbat va manfiy qiymatlar qabul qiladi deb qaraladi. Bunda manfiy φ burchak soat strekasiining harakati boyicha hisoblansa, manfiy r , nurning o'zi bo'yicha emas balki, qutbning ikkichi tomoniga ya'ni davomida joylashtiriladi. Agar qutbni Dekart koordinatalar sistemasining boshi, OP qutb o'qi esa, Ox o'qi deb qabul qilsak, u holda M nuqtaning Dekart koordinatalar sistemasidagi $(x; y)$ koordinatalari bilan uning $(\varphi; r)$ qutb koordinatalar sistemasi orasidagi bog'lanish

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi \quad (1)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x} \quad (2)$$

tenglamalar bilan ifodalanadi.

Agar ellips, giperbola, parabola fokusini qutb deb olib, qutb o'qi esa qutbga eng yaqin uchiga qaratilgan yo'nalishga teskari yo'naltirilgan fokal simmetriya o'qini olsak, u holda bu egri chizqilarning qutb koordinatalar sistemasidagi tenglamalari bir xil $r = \frac{p}{1 - e \cos \varphi}$ (3)

ko'ritishda bo'ladi. Bunda ε – eksentrisitet, p – parametr, Ellips va giperbola uchun $p = \frac{b^2}{a}$.

1. Qutb koordinatalar sistemasida $A(0; 3)$, $B(\frac{\pi}{6}; 2)$, $C(\frac{\pi}{2}; 3)$, $D(\pi; 2)$, $E(\frac{3\pi}{2}; 3)$ nuqtalar tasvirlansin.

2. Qutb koordinatalar sistemasida $A(\frac{\pi}{2}; -2)$, $B(-\frac{\pi}{2}; 3)$, $C(-\frac{\pi}{4}; -4)$, $D(\frac{2\pi}{3}; -3)$ nuqtalar aniqlansin.

3. $r = 2 + 2\cos\varphi$ chiziq yasalsin.

4. Ushbu 1) $x^2 - y^2 = a^2$; 2) $x^2 + y^2 = a^2$; 3) $y = x$; 4) $x\cos\alpha + y\sin\alpha - p = 0$; 5) $x^2 + y^2 = ax$; 6) $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ chiziqlarning tenglamalari qutb koordinatalaridagi tenglamalari bilan almashtirilsin.

Ko'rsatma: $x = \rho\cos\varphi$, $y = \rho\sin\varphi$ larni berilgan tenglamalarga qo'yib soddalashtirilsin.

5. Ushbu 1) $r\cos\varphi = a$; 2) $r = 2a\sin\varphi$; 3) $r^2\sin 2\varphi = 2a^2$; 4) $r\sin(\varphi + \frac{\pi}{4}) = a\sqrt{2}$; 5) $r = a(1 + \cos\varphi)$

chiziqlarning tenglamalari Dekart koordinatalaridagi tenglamalari bilan almashtirilsin.

Ko'rsatma. $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$; $\operatorname{tg}\varphi = \frac{y}{x}$ formulalardan foydalanilsin.

6. Quyidagi: 1) $r = \frac{9}{5-3\cos\varphi}$; 2) $r = \frac{9}{4-5\cos\varphi}$; 3) $r = \frac{3}{1-\cos\varphi}$ ikkinchi tartibli egri chiziqlarning kanonik tenglamalari yozilsin.

J: 1) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$; 2) $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$; 3) $y^2 = 6x$.

7. Ushbu 1) $r = \frac{9}{2-\sqrt{3}\cos\varphi}$; 2) $r = \frac{9}{2-\sqrt{5}\cos\varphi}$; 3) $r = \frac{3}{2-2\cos\varphi}$

ikkinchi tartibli egri chiziqlarning kanonik tenglamalari yozilsin.

J: 1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$; 2) $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$; 3) $y^2 = x$.

8. Dekart koordinatalar sistemasida berilgan quyidagi nuqtalarni qutb koordinatalarini toping: 1) $(-1; \sqrt{3})$, 2) $(2; \sqrt{2})$, 3) $(\sqrt{3}; \sqrt{5})$; 4) $(2; \sqrt{6})$.

9. Dekart koordinatalar sistemasida $M_1(-1; 1)$ va $M_2(1; \sqrt{3})$ nuqtalar berilgan. Ularni qutb koordinatalari aniqlansin.


10. Ellipsning tenglamasini $\begin{cases} x = a\cos\theta \\ y = b\sin\theta \end{cases} (-\infty < \theta < \infty)$ ko'rsatishda yozish mumkinligini isbotlang.

11. $r = 3 - 2\sin 2\varphi$; $r = 2 + \cos 3\varphi$; $r = 1 - \sin 3\varphi$ chiziqlar yasalsin.

Ko'rsatma. Oldin r_{\max} va r_{\min} larini beradigan burchaklar aniqlansin.

8-§. Fazodagi analitik geometriyaning asosiy tushunchalari va masalalari

Masshtab birligi bilan ta'minlangan o'zaro perpendikulyar hamda bitta O nuqtada kesishuvchi Ox, Oy, Oz to'g'ri chiziqlar bilan hosil qilingan sistema fazodagi to'g'ri burchakli Dekart koordinatalar sistemasi deyiladi (1-chizma).



O nuqta koordinatalar boshi, Ox - absissalar o'qi, Oy - ordinatalar o'qi, Oz - applikatalar o'qi deyiladi.

Fazodagi M nuqtaning holati uni Ox, Oy, Oz o'qlariga proyeksiyalari - (x, y, z) uchlik bilan aniqlanadi (2-chizma). (x, y, z) uchlik M nuqtaning koordinatalari deb ataladi va uni $M(x, y, z)$ kabi yoziladi.

Fazoda Dekart koordinatalar sistemasi va $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$ nuqtalar berilgan bo'lsa, u holda ular orasidagi masofa quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$M_1M_2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (1)$$

Fazodagi $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$ nuqtalarni tutashiruvchi M_1M_2 kesmani λ (biror son) nisbatda bo'luvchi N nuqtaning koordinatalari

$$N_x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad N_y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \quad N_z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} \quad (2)$$

formulalardan topiladi.

Agar $\lambda = 1$, ya'ni $\frac{M_1N}{NM_2} = 1$ bo'lsa, u holda

$$N_x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad N_y = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad N_z = \frac{z_1 + z_2}{2} \quad (3)$$

ya'ni, bu formulalarga kesma o'rtasining koordinatalarini topish formulalari deyiladi.

1. $M_1(2; 3; 4); M_2(-3; 4; 4); M_3(3; -4; 4); M_4(2; 3; -5); M_5(0; 2; 3); M_6(2; 0; 4); M_7(3; 4; -4)$ nuqtalarni tasvirlang.

2. Quyida berilgan nuqtalar orasidagi masofalar topilsin:

- 1) $M_1(2; 3; 4)$ va $M_2(6; 6; 4)$; J: 5.
- 2) $M_3(3; 6; -3)$ va $M_4(6; 9; 3)$; J: $3\sqrt{6}$.
- 3) $M_5(-3; -4; -6)$ va $M_6(6; -4; -6)$; J: 9.

3. Quyida berilgan nuqtalarni birlashtiruvchi kesmalar o'rtasining koordinatalari topilsin.

- 1) $M_1(6; 4; 8)$ va $M_2(8; 6; 10)$; J: $N_1(7; 5; 9)$;
- 2) $M_3(-4; -6; 0)$ va $M_4(6; 0; -10)$; J: $N_2(1; -3; -5)$;
- 3) $M_5(0; 0; 7)$ va $M_6(6; 10; -3)$; J: $N_3(3; 5; 2)$.

4. $A(2; 1; -3)$ va $B(6; -9; 3)$ nuqtalarni birlashtiruvchi kesmani $2:3$ nisbatda bo'luvchi C nuqtaning koordinatalari topilsin.

J: $C(3,6; -3; -0,6)$.

5. Uchlari $A(2; -1; 3), B(1; 1; 1)$ va $C(0; 0; 5)$ nuqtalarda bo'lgan ABC uchburchakning perimetri va yuzi topilsin. J: $6 + 3\sqrt{2}; 4,5$.

6. Parallelogrammning ketma-ket uchta $A(1; -2; 3), B(3; 2; 1)$ va $C(6; 4; 4)$ uchlari berilgan. Uning to'rtinchi uchi D topilsin. J: $D(4; 0; 6)$.



7. Uchlari $A(2; 3; 1), B(0; 0; 0)$ va $C(4; -1; 3)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak tomonlarining uzunliklari topilsin. J: $\sqrt{14}; \sqrt{26}; 2\sqrt{6}$.

8. ZOX tekisligida shunday nuqta topilsinki, undan $A(0; 0; 4), B(2; 2; 2)$ va $C(0; 2; 1)$ nuqtalargacha bo'lgan masofalar teng bo'lsin.

$$J: D \left(\frac{8}{3}; 0; \frac{11}{6} \right).$$

9-§. Tekislikda va fazoda vektorlar

Yo'naltirilgan kesma vektor deyiladi va u \overline{AB} yoki \vec{a}, \vec{b} kabi belgilanadi (1- chizma).



Yo'naltirilgan \overline{AB} kesmaning A nuqtasi vektorning boshi, B esa oxiri deyiladi. \overline{AB} kesmaning uzunligiga vektorning uzunligi deyiladi.

Boshlang'ich va oxirgi nuqtalari ustma-ust tushgan vektor uol vektor deyiladi va u $\vec{0}$ kabi belgilanadi.

Bitta to'g'ri chiziqda yoki parallel to'g'ri chiziqlarda yutgan vektorlar kollinear vektorlar deyiladi.

Yo'nalishlari bir xil va uzunliklari teng bo'lgan ikkita \vec{a} va \vec{b} vektorlar teng vektorlar deyiladi va $\vec{a} = \vec{b}$ kabi yoziladi.

2- chizmada $\vec{a} = \vec{b}$, $\vec{a} \neq \vec{c}$, $\vec{b} \neq \vec{c}$.

Bitta yoki parallel tekisliklarda joylashgan uch va undan ortiq vektorlar komplanar vektorlar deyiladi.

\vec{a} vektorni λ songa ko'paytmasi deb, quyidagi uchta shartni qanoatlantiruvchi yangi bir \vec{c} vektorga aytiladi:

$$1. |\vec{c}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}|;$$

$$2. \vec{c} \parallel \vec{a};$$


1. $\lambda > 0$ bo'lganda \vec{a} va \vec{c} vektorlar bir hil yo'nalgan, $\lambda < 0$ da esa \vec{a} va \vec{c} vektorlar qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi.

Vektorni songa ko'paytmasi $\lambda \vec{a}$ kabi yoziladi va u quyidagi xossalarga ega:

$$1. \lambda(\beta \vec{a}) = \beta(\lambda \vec{a}). \quad 2. (\lambda \pm \beta)\vec{a} = \lambda \vec{a} \pm \beta \vec{a}. \quad 3. 0 \cdot \vec{a} = \vec{0}.$$

$(-1)\vec{a}$ vektor \vec{a} vektorga qarama-qarshi vektor deyiladi va $-\vec{a}$ kabi belgilanadi.


\vec{a} va \vec{b} vektorlarning yig'indisi deb $ABCD$ parallelogrammning A uchidan chiquvchi diagonalidan hosil qilingan \overline{AC} vektorga aytiladi va $\vec{a} + \vec{b}$ kabi belgilanadi (3- chizma).



Vektorlar yig'indisini bu usulda aniqlash parallelogramm qoidasi deyiladi. Bu yig'indini uchburchak qoidasi deb ataluvchi quyidagi usul bilan ham topish mumkin. Bunda dastlab parallel ko'chirish orqali \vec{b} vektorning boshi \vec{a} vektorning uchi ustiga keltiriladi (4- chizma). So'ngra \vec{a} boshidan chiqib, \vec{b} ni uchida tugaydigan vektor hosil qilinadi va u $\vec{a} + \vec{b}$ yig'indisini ifodalaydi.

Ikki \vec{a} va \vec{b} vektorlarning yig'indisini topishda har ikkala usuldan foydalanish mumkin.





5-chizma

a_1, a_2, a_3 vektorlarning yig'indisi parallelogramm qoidasini ketma-ket uch marta yoki ko'pburchak qoidasi bilan aniqlanadi (5 - chizma).




6-chizma

Vektorlarni qo'shish amali quyidagi hossalarga ega:

1. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.
2. $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.
3. $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$.
4. $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$.


\vec{a} va \vec{b} vektorlarning ayirmasi deb \vec{a} va $-\vec{b}$ vektorlarning yig'indisiga aytiladi.

\vec{a} va \vec{b} vektorlarning ayirmasi $\vec{a} - \vec{b}$ kabi belgilanadi va u bu vektorlardan hosil qilingan $ABCD$ parallelogramning B uchidan chiquvchi \overline{BD} diagonalidan iborat bo'ladi (6 - chizma).



6-chizma

Tekislikda \vec{a} vektor hamda Ox va Oy koordinata o'qlarida musbat yo'nalishga ega va uzunliklari birga teng \vec{i} va \vec{j} (ortlar) vektorlarni ko'rib chiqamiz (7 - chizma).



7-chizma


a_x va a_y vektorlar \vec{a} vektorning Ox va Oy o'qlardagi proyeksiyalari deyiladi. a_x va a_y proyeksiyalarni $a_x = \pm|a_x|\vec{i}$ va $a_y = \pm|a_y|\vec{j}$ deb yozish mumkin. Bunda $\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y = (\pm|a_x|)\vec{i} + (\pm|a_y|)\vec{j} = x\vec{i} + y\vec{j}$ (1)

(1) tenglik \vec{a} vektorning ortlar bo'yicha yo'qilmasi, x va y sonlar esa uning koordinatalari deyiladi.

Fazoda to'g'ri burchakli Dekart koordinatalar sistemasi va unda M nuqtani qaraymiz. Bu nuqtaning radius vektori $\overline{OM} = r$ ning o'qlardagi

$OM_1 = x$, $OM_2 = y$ va $OM_3 = z$ proyeksiyalari nuqtaning yoki $\vec{OM} = r$ vektorning koordinatalari deyiladi (8- chizma).

Demak, $r(x, y, z)$ deb yozish mumkin.



8-chizma

$|\vec{OM}| = r$ radius vektorning modali (uzunligi)

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (2)$$

formula bilan aniqlanadi. Koordinata oqlaridagi $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ birlik vektorlar ortlar deyiladi. Radius-vektor ortlar orqali quyidagicha aniqlanadi.

$$r = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad (3)$$

Boshi $A(x_1, y_1, z_1)$ va oxiri $B(x_2, y_2, z_2)$ nuqtaarda bo'lgan $u = \vec{AB}$ vektor koordinata o'qlaridagi proyeksiyalari bo'yicha quyidagicha ifodalanadi.

$$\vec{u} = \vec{AB}(x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \quad (4)$$

Agar $\vec{u} = \vec{AB}$ vektor koordinata o'qlari bilan α, β va γ burchaklar tashkil etsa, u holda

$$\cos \alpha = \frac{x}{r}, \quad \cos \beta = \frac{y}{r}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{r} \quad (5)$$

bu shu bilan birga

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \quad (6)$$

bu isbi. Bu yerda $\cos \alpha, \cos \beta$ va $\cos \gamma$ lar yo'naltiruvchi kosinuslar deyiladi.

Ikki \vec{a} va \vec{b} vektorlarning skalyar ko'paytmasi deb shu vektorlar o'rtasidagi burchak kosinusi bilan ko'paytmasiga deyiladi.


Skalyar ko'paytma $\vec{a} \cdot \vec{b}$ kabi belgilanadi. Demak, ta'rifga asosan

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cdot \cos \varphi \quad (7)$$

skalyar ko'paytmani boshqacha

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a \cdot n_{p_a b} = b \cdot n_{p_b a} \quad (8)$$

ko'rinishida ham yozish mumkin (9 - chizma).



9-chizma

Skalyar ko'paytma quyidagi xossalarga ega:

$$1. \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}. \quad 2. \vec{a}(\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}.$$

$$3. \text{Agar } a \parallel b \text{ bo'lsa, } \vec{a} \cdot \vec{b} = \pm |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|. \text{ Xususiy holda } \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2.$$

$$4. \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}). \quad 5. \text{Agar } \vec{a} \perp \vec{b} \text{ bo'lsa, } \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

$$6. \vec{i} \cdot \vec{j} = 0, \quad \vec{j} \cdot \vec{k} = 0, \quad \vec{i} \cdot \vec{k} = 0, \quad \vec{i} \cdot \vec{i} = 1, \quad \vec{j} \cdot \vec{j} = 1, \quad \vec{k} \cdot \vec{k} = 1.$$

($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ - birlik vektorlar va $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$).

7. Agar $\vec{a}(a_x, a_y, a_z)$ va $\vec{b}(b_x, b_y, b_z)$ bo'lsa, u holda

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (9)$$

Ikki \vec{a} va \vec{b} vektor orasidagi burchak:

$$\cos\varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

Ikki vektorning parallellik sharti:


$$\vec{b} = m\vec{a} \text{ yoki } \frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z} = m \quad (11)$$

Ikki vektorning perpendikulyarlik sharti:

$$\vec{a}\vec{b} = 0 \text{ yoki } a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0 \quad (12)$$

\vec{a} va \vec{b} vektorlarning vektor ko'paytmasi deb quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi uchinchi \vec{c} vektorga aytiladi:

1) \vec{c} vektorning uzunligi \vec{a} va \vec{b} vektorlarga qurilgan parallelogramning yuziga teng bo'lib, $|\vec{c}| = |\vec{a}||\vec{b}| \cdot \sin\varphi$ formula bilan topiladi (10 - chizma).



10-chizma

2) \vec{c} vektor \vec{a} va \vec{b} vektorlar yotgan parallelogram tekisligiga perpendikulyar, ya'ni $\vec{c} \perp \vec{a}$, $\vec{c} \perp \vec{b}$.

3) \vec{c} vektor shunday yo'nalganki uning uchidan qaralganda \vec{a} vektordan \vec{b} vektorga eng qisqa burilish soat mili harakatiga teskari bo'ladi.

Vektor ko'paytma $\vec{a} \times \vec{b}$ kabi yoziladi.

Vektor ko'paytma quyidagi xossalarga ega:

$$1. \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}, \quad 2. \vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}.$$

$$3. \text{Agar } \vec{a} \parallel \vec{b} \text{ bo'lsa, } \vec{a} \times \vec{b} = 0. \quad \text{Xususiy holda } \vec{a} \times \vec{a} = 0.$$

i, j, k o'rlarning vektorial ko'paytmalari quyidagicha:

$$i \times j = k, \quad j \times k = i, \quad i \times k = -j, \quad j \times i = -k, \quad k \times j = -i.$$

Agar $\vec{a}(a_x, a_y, a_z)$ va $\vec{b}(b_x, b_y, b_z)$ bo'lsa, u holda

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \quad (13)$$

\vec{a} va \vec{b} vektorlarda yasalgan parallelogramning yuzi:

$$S = |\vec{a} \times \vec{b}|$$

\vec{a} va \vec{b} vektorlarda yasalgan uchburchakning yuzi:

$$S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$

\vec{a} , \vec{b} va \vec{c} vektorlarning aralash ko'paytmasi deb dastlabki ikkita vektorlarning vektor ko'paytmasini uchinchi \vec{c} vektorga skalyar ko'paytmasiga, ya'ni $[\vec{a} \times \vec{b}] \times \vec{c}$ ga aytiladi.

Aralash ko'paytma $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$ kabi belgilanadi. Demak, $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = [\vec{a} \times \vec{b}]\vec{c}$

Aralash ho'paytma quyidagi xossalarga ega:

1. Aralash ko'paytmaning istalgan ikkita ko'paytuvchisining o'rinlari o'zaro almashtirilsa, ko'paytmaning ishorasi o'zgaradi:

$$(\vec{a} \times \vec{b})\vec{c} = -(\vec{a} \times \vec{c})\vec{b} = -(\vec{c} \times \vec{b})\vec{a}.$$

2. Aralash berilgan uchta vektordan ikkitasi o'zaro teng yoki parallel bo'lsa, aralash ko'paytma nolga teng bo'ladi.

3. Aralash ko'paytmada vektorial va skalyar ko'paytma amallari o'rnini almashtirish mumkin, ya'ni $(\vec{a} \times \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \times \vec{c})$.

4. Aralash ko'paytmada ko'paytuvchilar o'rnini soat miliga teskari yunalish bo'yicha doiraviy ravishda almashtirilsa, uning qiymati o'zgarmaydi, ya'ni

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \vec{c}\vec{a}\vec{b} = \vec{b}\vec{c}\vec{a} = \vec{a}\vec{b}\vec{c}$$

Agar $\vec{a}\{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b}\{b_x, b_y, b_z\}$ va $\vec{c}\{c_x, c_y, c_z\}$ bo'lsa,

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \quad (14)$$

\vec{a} , \vec{b} va \vec{c} vektorlarda yasalgan parallelepipedning hajmi:

$$V = |\vec{a}\vec{b}\vec{c}| = \pm \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \quad (15)$$

\vec{a} , \vec{b} , \vec{c} vektorda yasalgan piramidaning hajmi:

$$V_{\text{pir}} = \pm \frac{1}{6} \vec{a}\vec{b}\vec{c} = \pm \frac{1}{6} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \quad (16)$$


1.  Chizmada berilgan \vec{a} va \vec{b} vektorlar yig'indisi topilsin:



Chizmada berilgan \vec{a} va \vec{b} vektorlar yig'indisi

topilsin:


1. Chizmada berilgan vektorlar uchun:



1) $\vec{a} - \vec{b}$; 2) $\vec{b} - \vec{a}$; 3) $\vec{a} \cdot \vec{b}$ lar topilsin.

4.  Berilgan \vec{c} vektor asosida $4\vec{c}$, $-4\vec{c}$, $1,5\vec{c}$ vektorlar yasalsin.

5.  Berilgan \vec{a} va \vec{b} vektorlar bo'yicha $3\vec{a} + 2\vec{b}$ vektor yasalsin.

6.  Chizmada berilgan vektorlarga asosan $\vec{d} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 5\vec{c}$ vektor yasalsin.

7. $A(3; 2)$, $B(-1; 5)$ va $C(0; 3)$ nuqtalar berilgan \overline{AB} , \overline{AC} , \overline{BC} vektorlarning koordinatalari topilsin.

8. $\vec{a}\{3; 5\}$, $\vec{b}\{2; -7\}$ bo'lsa, $\vec{a} + \vec{b}$; $\vec{a} - \vec{b}$; $4\vec{a}$; $-0,5\vec{b}$ lar topilsin.

9. $\vec{a}_1\{-2; 4\}$, $\vec{a}_2\{3; 1\}$ bo'lsa, $\vec{a}_1 + \vec{a}_2$, $\vec{a}_1 - \vec{a}_2$, $3\vec{a}_1$ va $5\vec{a}_2$ lar topilsin.

10. $A(4; 0)$, $B(-1; 3)$, $C(5; 7)$ lar berilgan \overline{AC} , \overline{AB} , \overline{BC} , $\overline{AB} + \overline{BC}$, $\overline{AB} - \overline{BC}$, $m = -3\overline{AB} + 2\overline{BC} - 5\overline{AC}$ lar topilsin.

11. Quyidagi vektorlarning uzunliklari topilsin.

1) $\vec{a}\{5; 2\sqrt{6}\}$; 2) $\vec{b}\{-3; 7\}$; 3) $\vec{c}\{-6; 0\}$; 4) $\vec{d}\{7; -7\}$.

12. \overline{AB} vektorning uzunligi topilsin: 1) $A(5; 2)$, $B(8; -2)$; 2) $A(3; 5)$, $B(-3; 3)$; 3) $A(6; 8)$, $B(4; 9)$; 4) $A(2\sqrt{2}; 3\sqrt{2})$, $B(6\sqrt{2}; 0\sqrt{2})$.

13. $A(3; 5)$, $B(-3; 3)$, $C(5; -8)$ nuqtalar berilgan. \overline{AB} , \overline{BC} , \overline{AC} vektorlarning uzunliklari topilsin.

14. $\vec{a}\{1; -3; -2\}$, $\vec{b}\{3; 6; -1\}$ bo'lsa, $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$, $3\vec{a} + 5\vec{b}$ lar topilsin.

15. Boshli $A(3; 5; 7)$ va oxiri $B(2; 3; -1)$ nuqtada bo'lgan \overline{AB} vektor berilgan. $3\overline{AB}$; $-0,5\overline{AB}$ lar topilsin.

16. $A(3; 5; 7)$, $B(-1; 4; 2)$, $C(0; -3; 5)$, $D(6; -7; 8)$ nuqtalar berilgan. $\overline{AB} + \overline{BC}$; $\overline{AC} - \overline{DC}$; $2\overline{AB}$; $-3\overline{CD}$; $3\overline{AB} + 2\overline{BC} - 4\overline{AD}$ lar topilsin.

17. $\vec{a}\{5; -3; \sqrt{2}\}$, $\vec{b}\{-2; 3; 1\}$, $\vec{c}\{0; 12; 5\}$, $\vec{d}\{-5; 7; 2\}$ vektorlarning uzunliklari topilsin.

18. Tomoni 6 ga teng bo'lgan ABC teng tomonli uchburchak berilgan: a) \overline{AB} va \overline{AC} ; b) \overline{AB} va \overline{BC} vektorlarning skalyar ko'paytmalari topilsin. J: 18; -0,5.

19. Katetlari 5 ga teng bo'lgan teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Agar $\angle C = 90^\circ$ bo'lsa, \overline{AC} va \overline{AB} , \overline{CA} va \overline{CB} vektorlarning skalyar ko'paytmasi topilsin. J: 25; 0.

20. Uzunliklari 2 va 7 ga teng bo'lgan \vec{a} va \vec{b} vektorlar orasidagi burchak α ga teng. $(3 - \vec{b})(\vec{a} + 3\vec{b})$ topilsin. J: $34 + 15\sqrt{2}$.

21. Uzunliklari 5 va 3 ga teng bo'lgan \vec{a} va \vec{b} vektorlar orasidagi burchak α ga teng. $(\vec{a} - \vec{b})^2$ topilsin. J: 37; -6.

22. Uzunliklari 3 va 4 ga teng bo'lgan \vec{a} va \vec{b} vektorlar orasidagi burchak α ga teng. $(\vec{a} - \vec{b})^2$, $(3 - 2\vec{b})$ topilsin.

23. Quyida berilgan \vec{a} va \vec{b} vektorlarning skalyar ko'paytmasi topilsin:

1) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 2) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 3) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 4) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 5) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 6) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$

7) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 8) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 9) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 10) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$

24. Quyida berilgan \vec{a} va \vec{b} vektorlar orasidagi burchak topilsin:

1) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 2) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 3) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 4) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$

5) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 6) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 7) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$ 8) $\vec{a}\{ \quad \}$ $\vec{b}\{ \quad \}$

25. $\overline{AB}\{-3; 2; 6\}$ vektorning boshli $A(-1; 0; 4)$ nuqtada joylashgan. Uning oxiri bo'lgan B nuqtaning koordinatalari topilsin.

26. $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j}$ va $\vec{b} = -2\vec{j} + \vec{k}$ vektorlarda yasalgan parallelogramm diagonallari orasidagi burchak topilsin. J: 90° .

27. $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ va $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k}$ vektorlar berilgan. $\cos \alpha$ va $\sin \alpha$ lar topilsin.

28. 1) m va n o'zaro 30° burchak tashkil etuvchi birlik vektorlar bo'lsa, $(m + n)^2$ hisoblaunsin; 2) agar $a = 2\sqrt{2}$, $b = 4$ va ular orasidagi burchak 135° bo'lsa, $(a - b)^2$ hisoblaunsin. J: 1) $2 + \sqrt{3}$, 2) 40.

29. 1) $(\vec{a} + \vec{b})^2$; 2) $(\vec{a} + \vec{b})^2 + (\vec{a} - \vec{b})^2$ ifodalardagi qavslar ochilsin va hosil bo'lgan ifodalarning geometrik ma'nosi aniqlansin.
 J: $(\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + \vec{b}^2 + 2\vec{a}\vec{b} \cos \varphi$ -kosinuslar teoremasi, $(\vec{a} + \vec{b})^2 + (\vec{a} - \vec{b})^2 = 2\vec{a}^2 + 2\vec{b}^2$ -parallelogramm diagonallarining xossasi.

30. m va n lar o'zaro 120° burchak tashkil etuvchi birlik vektorlar bo'lsa, $a = 2m + 4n$, $b = m - n$ vektorlar orasidagi burchak topilsin.
 J: 120° .

31. $\vec{a} = -6\vec{i} + 3\sqrt{3}\vec{j} + \vec{k}$ vektor yo'nalishidagi birlik vektor koordinatalari topilsin. J: $\vec{a}_0 = \left\{ -\frac{3}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{8}, \frac{1}{6} \right\}$.

32. $\vec{a}\{6; 1; -4\}$, $\vec{b}\{3; 2; -1\}$ va $\vec{c}\{5; 5; 0\}$ bo'lsa, $2\vec{a}^2 - 3\vec{a}\vec{b} + 4|\vec{c}|^2$ ifodaning qiymati topilsin. J: 234.

33. $\vec{a}\{1; -3; z\}$ va $\vec{b}\{5; 4; -3\}$ vektorlarning skalyar ko'paytmasi 6 ga teng bo'lsa, z ni toping. J: $-\frac{11}{3}$.

34. Quyidagi vektorlar orasidagi burchakni hisoblang:

1) $\vec{a}\{1; -4; 3\}$ va $\vec{b}\{-3; -1; 4\}$. J: 60° .

1) $\vec{p}\{1; 4; -2\}$ va $\vec{q}\{2; -3; 5\}$. J: $\cos \alpha = -\frac{20}{\sqrt{798}}$.

2) $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ va $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$. J: 60° .

35. Uchlari $A(-9; -3; 0)$, $B(-4; 2; 1)$, $C(-2; 8; -1)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning BC tomoni bilan AD medianasi orasidagi burchakni toping. J: $\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{11}}$.

36. $ABCDEF$ tomoni 2ga teng bo'lgan muntazam oltiburchak \vec{AB} va \vec{CD} vektorlarning skalyar ko'paytmasi topilsin. J: -2

37. $\vec{p} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$ va $\vec{q} = \vec{a} + 5\vec{b}$ vektorlar orasidagi burchak topilsin. Bu yerda \vec{a} va \vec{b} o'zaro perpendikulyar birlik vektorlar. J: $\frac{\pi}{4}$.

38. $\vec{a}\{4; -2; -4\}$ va $\vec{b}\{6; -3; 2\}$ vektorlar berilgan. $2\vec{a} - 3\vec{b}$ va $\vec{a} + 2\vec{b}$ vektorlarning skalyar ko'paytmasi topilsin. J: -200.

39. $\vec{a}\{2; -3; \alpha\}$ va $\vec{b}\{\beta; 1; 2\}$ vektorlar α va β ning qanday qiymatlarida kolleniya bo'ladi? J: $\alpha = -6, \beta = \frac{2}{3}$.

40. Uchlari $A(1; -2; 8)$, $B(0; 0; 4)$ va $C(6; 2; 0)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak yasalsin. Uning yuzi va BD balandligi hisoblansin. J: $7\sqrt{5}$ kv b, $BD = \frac{2\sqrt{21}}{3}$.

41. $\vec{AB} = \vec{m} + 2\vec{n}$ va $\vec{AD} = \vec{m} - 3\vec{n}$ vektorlarda yasalgan parallelogrammning yuzi topilsin. Bu yerda $|\vec{m}| = 5$, $|\vec{n}| = 3$ va $\vec{m} \wedge \vec{n} = \frac{\pi}{6}$. J: $\frac{75}{2}$.

42. $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k}$ va $\vec{b} = 5\vec{j} - 7\vec{k}$ vektorlardan yasalgan uchburchakning yuzi topilsin. J: $S = \frac{\sqrt{195}}{2}$.

43. $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{k}$ va $\vec{c} = \vec{j} - \vec{k}$ vektorlar berilgan. $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ topilsin. J: $-\vec{i} - \vec{j}$.

44. $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 2$, $(\vec{a} \wedge \vec{b}) = \frac{\pi}{6}$ bo'lsa, $|\vec{a} \times \vec{b}|$ ni toping. J: 4

45. Quyidagi vektorlar vektor ko'paytmasining koordinatalarini va modulini toping:

1) 1) $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ va $\vec{b}\{1; 0; 5\}$. J: $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{P}_1\{10; -6; -2\}$, $|\vec{P}_1| = \sqrt{140}$.

2) $\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ va $\vec{b} = \vec{j} + \vec{k}$. J: $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{P}_2\{-3; -3; 3\}$, $|\vec{P}_2| = 3\sqrt{3}$.

46. Agar 1) $\vec{a} = 3\vec{i}$ va $\vec{b} = 2\vec{k}$; 2) $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j}$ va $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j}$; 3) $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ va $\vec{b} = 3\vec{j} + 2\vec{k}$ bo'lsa, $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ vektor aniqlansin va yasalsin. Har bir hol uchun berilgan vektorlarda yasalgan parallelogramning yuzi topilsin. J: 1) $-6\vec{j}$, $S_1 = 6$; 2) $-2\vec{k}$, $S_2 = 6$; 3) $6\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k}$, $S_3 = 2\sqrt{22}$.

47. Uchlari $A(7; 3; 4)$, $B(1; 0; 6)$ va $C(4; 5; -2)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning yuzi topilsin. J: 24,5.

48. $\vec{a} = 2\vec{j} + \vec{k}$ va $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{k}$ vektorlarda parallelogram yasalsin hamda uning yuzi va balandligi aniqlansin. J: $\sqrt{21}$ kv.b, $h = \sqrt{4,2}$.

49. Ushbu ifodalarni soddalashtirilsin.

1) $\vec{i} \times (\vec{j} + \vec{k}) - \vec{j} \times (\vec{i} + \vec{k}) + \vec{k} \times (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$. J: $2(\vec{k} - \vec{i})$.

2) $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \times \vec{c} + (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \times \vec{b} + (\vec{b} - \vec{c}) \times \vec{a}$. J: $2\vec{a} \times \vec{c}$.

3) $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{c} - \vec{a}) + (\vec{b} + \vec{c}) \times (\vec{a} + \vec{b})$. J: $\vec{a} \times \vec{c}$.

4) $2\vec{i} \cdot (\vec{j} \times \vec{k}) + 3\vec{j} \cdot (\vec{i} \times \vec{k}) + 4\vec{k} \cdot (\vec{i} \times \vec{j})$. J: 3.

50. $\vec{a} = 3\vec{k} - 2\vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ va $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ vektorlar yasalsin. \vec{c} vektorning moduli hamda \vec{a} va \vec{b} vektorlarda yasalgan uchburchak yuzi hisoblansin. J: $3\sqrt{17}$, $S = \frac{2\sqrt{17}}{2}$ kv.b.

51. $\vec{a} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, $\vec{b} = -3\vec{j} + \vec{k}$ va $\vec{c} = 2\vec{j} + 5\vec{k}$ vektorlarda parallelepiped yasalsin hamda uning hajmi hisoblansin. J: $V = 51$ kub b.

52. Uchlari $O(0; 0; 0)$, $A(5; 2; 0)$, $B(2; 5; 0)$ va $C(1; 2; 4)$ nuqtalarda bo'lgan piramida yasalsin hamda uning hajmi, ABC yog'ining yuzi va shu yuqqa tushirilgan balandligi topilsin. J: $V = 14$, $H = \frac{7\sqrt{3}}{3}$.

53. $A(2; -1; -2)$, $B(1; 2; 1)$, $C(2; 3; 0)$ va $D(5; 0; -6)$ nuqtalarning bir tekislikda yotishi ko'rsatilsin.

54. $\vec{a} = -\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 4\vec{k}$ va $\vec{c} = -3\vec{i} + 12\vec{j} + 6\vec{k}$ vektorlarning o'zaro komplanar ekanligi ko'rsatilsin.

55. Uchlari $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 6)$ va $D(2; 3; 0)$ nuqtalarda bo'lgan piramida yasalsin hamda uning hajmi va ABC yog'iga tushirilgan balandligi hisoblansin. J: $V = 14$, $H = \sqrt{14}$.

56. $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j}$ va $\vec{c} = 3\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$ vektorlarning o'zaro komplanar ekanligi isbotlansin.

57. Quyidagi vektorlarning aralash ko'paytmasi topilsin.

1) $\vec{a}(1; 0; 3)$, $\vec{b}(1; -3; 4)$, $\vec{c}(-2; 1; 0)$. J: -19.

2) $\vec{a}(5; -1; 0)$, $\vec{b}(-2; 3; 1)$, $\vec{c}(1; 0; 3)$. J: 40.

58. $\vec{a}(-2; 1; 5)$, $\vec{b}(3; 0; 2)$ va $\vec{c}(x; 4; 2)$ vektorlarning aralash ko'paytmasi 68 ga teng bo'lsa, x ning qiymati topilsin. J: -1.

59. $\vec{a}(4; -34; -3)$, $\vec{b}(3; -6; b_3)$ va $\vec{c}(4; -4; 2)$ vektorlar b_3 ning qanday qiymatida komplanar bo'ladi?

60. $A(1; -2; 0)$, $B(3; -1; 5)$, $C(0; 1; 1)$, $D(2; 1; 5)$ nuqtalarning bir tekislikda yotishini isbotlang.

Ko'rsatma: $\vec{AB} \vec{AC} \vec{AD} = 0$ ekanligi ko'rsatiladi.

61. Qirralari quyidagi vektorlardan iborat bo'lgan parallelepiped hajmini toping:

1) $\vec{a}_1(5; 3; -2)$, $\vec{b}_1(1; -4; 2)$, $\vec{c}_1(3; 1; 4)$ J: $V = 110$.


2) $\vec{a}_2(4; 3; -1)$, $\vec{b}_2(2; 1; 2)$, $\vec{c}_2(-3; -2; 5)$ J: $V = 11$.

62. Uchlari $O(0; 0; 0)$, $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$ nuqtalarda bo'lgan tetraedr hajmi va OH balandligi topilsin. $J: V = \frac{1}{6}, OH = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

63. Uchlari $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 6)$ va $D(2; 3; 8)$ nuqtalarda bo'lgan piramida yasalsin. hamda uning hajmi va ABC yog'iga tushirilgan balandligi hisoblansin.

10-§. Fazoda tekislik va uning tenglamasi

$M_1(x_1, y_1, z_1)$ nuqtadan o'tuvchi va $N(A, B, C)$ vektorga perpendikulyar bo'lgan tekislik tenglamasi quyidagicha (1-chizma):



$$A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) = 0 \quad (1).$$

Agar bu tenglamadagi qavslarni ochib va $-Ax_1 - By_1 - Cz_1 = D$ belgilash qilsak, u holda tekislikning umumiy tenglamasi deb ataluvchi quyidagi tenglama hosil qilinadi:

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (2)$$

Bu yerda $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ (3) shart bajarilishi kerak.

A, B, C, D larning qiymatlariga qarab tekislik turlicha holatda bo'lishi mumkin:

1. $D = 0$ bo'lsa, $Ax + By + Cz = 0$ bo'lib, bu tenglama bilan belgilangan tekislik koordinata boshidan o'tadi.

2. $A = 0$ bo'lsa, $By + Cz + D = 0$ bo'lib, bu holda tekislik OX o'qiga parallel bo'ladi.

3. $B = 0$ bo'lsa, $Ax + Cz + D = 0$ bo'lib, bu holda tekislik OY o'qiga parallel bo'ladi.

4. $C = 0$ bo'lsa, $Ax + By + D = 0$ bo'lib, bu holda tekislik OZ o'qiga parallel bo'ladi.

5. $A = 0, D = 0$ bo'lsa, $By + Cz = 0$ bo'lib, bu holda tekislik OX o'qidan o'tadi.

6. $B = 0, D = 0$ bo'lsa, $Ax + Cz = 0$ bo'lib, bu holda tekislik OY o'qidan o'tadi.

7. $C = 0, D = 0$ bo'lsa, $Ax + By = 0$ bo'lib, bu holda tekislik OZ o'qidan o'tadi.

8. $A = 0, B = 0$ bo'lsa, $Cz + D = 0$ bo'lib, bu holda tekislik XOY tekisligiga parallel bo'ladi.

9. $A = 0, C = 0$ bo'lsa, $By + D = 0$ bo'lib, bu holda tekislik XOZ tekisligiga parallel bo'ladi.

10. $B = 0, C = 0$ bo'lsa, $Ax + D = 0$ bo'lib, bu holda tekislik YOZ tekisligiga parallel bo'ladi.

11. $A = 0, B = 0, D = 0$ bo'lsa, $Cz = 0$ ($z = 0$) bo'lib, bu holda tekislik XOY tekisligi bilan ustma-ust tushadi.


12. $B = 0, C = 0, D = 0$ bo'lsa, $Ax = 0$ ($x = 0$) bo'lib, bu holda tekislik YOZ tekisligi bilan ustma-ust tushadi.

13. $A = 0, C = 0, D = 0$ bo'lsa, $Bx = 0$ ($y = 0$) bo'lib, bu holda tekislik XOZ tekisligi bilan ustma-ust tushadi.

Agar (2) umumiy tenglamada $A \neq 0, B \neq 0, C \neq 0, D \neq 0$ bo'lsa, u holda (2) tenglamani

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (3)$$

ko'rinishga keltirish mumkin. Bu yerda, $a = -\frac{A}{D}, b = -\frac{B}{D}, c = -\frac{C}{D}$ (3) tenglamani tekislikning kesmalar bo'yicha tenglamasi deyiladi (2-chizma).



Agar $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ va $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ tekisliklar berilgan bo'lib, ular uchun

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \quad (4)$$

bo'lsa, tekisliklar parallel

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0 \quad (5)$$

bo'lsa, tekisliklar perpendikulyar bo'ladi.

Ikki tekislik orasidagi burchak

$$\cos \varphi = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \quad (6)$$

formuladan topiladi.

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan $Ax + By + Cz + D = 0$ tekislikkacha bo'lgan masofa

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (7)$$

formuladan topiladi.

Berilgan uchta $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$ va $M_3(x_3, y_3, z_3)$ nuqtalardan o'tuvchi tekislik tenglamasi

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0 \quad (8)$$


formula yordamida tuziladi.

$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$ (9) tenglamaga tekislikning normal tenglamasi deyiladi. Bu yerda α, β, γ lar tekislikka normal vektorning koordinata o'qiari bilan hosil qilgan burchaklari p normal vektorning tekislikkacha bo'lgan qismi uzunligi (3-chizma).

Agar tekislik tenglamasi normal bo'lmasa, u holda tenglamani normallovchi ko'paytuvchi deb ataluvchi

$$\mu = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

ga ko'paytiriladi.



1. Quyidagi tekisliklar yasalsin:

1) $5x - 2y + 3z - 10 = 0$; 2) $2x + y - z + 6 = 0$;

3) $3x + 2y - z = 0$; 4) $3x + 2z = 0$; 5) $2z - 7 = 0$;

6) $2x - 5 = 0$; 7) $x + z = 1$; 8) $x + z = 1$.

2. $2x + 3y + 6z - 12 = 0$ tekislik yasalsin va unga normal vektoring koordinata o'qlari bilan tashkil etgan burchaklari topilsin. J: $\cos\alpha = \frac{2}{7}$, $\cos\beta = \frac{3}{7}$, $\cos\gamma = \frac{6}{7}$.

3. $M_1(0; -1; 3)$ va $M_2(1; 3; 5)$ nuqtalar berilgan. M_1 nuqtadan o'tuvchi va $N = \overline{M_1M_2}$ vektorga perpendikulyar tekislik tenglamasi yuzilsin.

J: $x + 4y - 2z - 2 = 0$.

4. $M(a; a; 0)$ nuqtadan o'tuvchi va \overline{OM} vektorga perpendikulyar tekislik tenglamasi yuzilsin. J: $x + y - 2a = 0$

5. $2x - 2y + z - 6 = 0$ tekislik yasalsin va unga normal vektoring koordinata o'qlari bilan tashkil etgan burchaklar topilsin. J: $\cos\alpha = \frac{2}{3}$, $\cos\beta = -\frac{2}{3}$, $\cos\gamma = \frac{1}{3}$.

6. $M(2; -1; 3)$ nuqtadan o'tuvchi va koordinata o'qlaridan teng kesmalar ajratuvchi tekislik tenglamasi yuzilsin. J: $x + y + z - 4 = 0$.

7. $M_1(-4; 0; 4)$ nuqtadan o'tib, OX va OY o'qlardan $a=4$ va $b=3$ kesmalar ajratuvchi tekislikning tenglamasi yuzilsin.

J: $3x + 4y + 6z + 2 = 0$.

8. $M(1; -3; 5)$ nuqtadan o'tib, OY va OZ o'qlardan OX o'qdagidan ikki marta katta kesma ajratuvchi tekislik tenglamasi tuzilsin.

J: $2x + y + z - 4 = 0$.

9. Quyida berilgan tekisliklar orasidagi burchaklar topilsin:

1) $x - 2y + 2z - 8 = 0$ va $x + z - 6 = 0$. J: 45° .

2) $x + 2z - 6 = 0$ va $x + 2y - 4 = 0$. J: $78^\circ 30'$.

3) $x + y - 3 = 0$ va $2x - 2z + 1 = 0$. J: 60° .

4) $2x - y + 3z = 0$ va $x + 4y - 6z = 0$. J: $\cos\varphi = -\frac{10\sqrt{722}}{371}$.

10. $(5; 1; -1)$ nuqtadan $x - 2y - 2z + 4 = 0$ tekislikkacha bo'lgan masofa topilsin. J: 3.

11. $M_1(1; -1; 2)$, $M_2(2; 1; 2)$ va $M_3(1; 1; 4)$ nuqtalardan o'tuvchi tekislikning tenglamasi tuzilsin. J: $2x - y + z - 5 = 0$.

12. $4x + 3y - 5z - 8 = 0$ va $4x + 3y - 5z + 12 = 0$ parallel tekisliklar orasidagi masofa topilsin. J: $2\sqrt{2}$.

13. $(2; 2; -2)$ nuqtadan o'tuvchi va $x - 2y - 3z = 0$ tekislikka parallel bo'lgan tekislik tenglamasi tuzilsin. J: $x - 2y - 3z - 4 = 0$.

14. $2x - y + z - 4 = 0$, $x + y - z - 2 = 0$, $2x - y + 3z - 6 = 0$ tekisliklarning bir nuqtada kesishishini ko'rsating. J: $M_0(2; 2; 1)$.

15. 1) $M_0(3; -2; 5)$ nuqtadan o'tib, $2x - y - z + 3 = 0$ tekislikka;

2) koordinatalar boshidan o'tib, $x - y + 3z - 5 = 0$ tekislikka;

3) $M_0(1; -1; 3)$ nuqtadan o'tib, $2x - y + z + 5 = 0$ tekislikka parallel bo'lgan tekisliklarning tenglamalari tuzilsin. J: 1) $2x - y - z - 3 = 0$; 2) $x - y + 3z = 0$

16. $x - y = 0$, $x + y - 2z + 1 = 0$, $2x + z - 4 = 0$ tekisliklarning kesishgan nuqtasi hamda $M(2; 1; 7)$ va $O(0; 0; 0)$ nuqtalardan o'tgan tekislik tenglamasi tuzilsin. J: $39x - 29y - 7z = 0$.

17. Koordinata boshidan tekislikka tushirilgan perpendikulyarning asosi $M(-1; 2; -3)$ nuqtada. Shu tekislik tenglamasi tuzilsin. J: $x - 2y + 3z + 14 = 0$

18. $M(1; 2; -1)$ nuqtadan o'tuvchi va $N(1; 1; 2)$ vektorga perpendikulyar bo'lgan tekislik tenglamasi tuzilsin. J: $x + y - 2z - 1 = 0$.

19. $4x + 3y - 5z - 8 = 0$ va $4x + 3y - 5z - 12 = 0$ parallel tekisliklar orasidagi masofa topilsin.

20. $kx - 2y + 5z + 10 = 0$ va $6x - (1 + k)y + 10z - 2 = 0$ tekisliklar k ning qanday qiymatida parallel bo'ladi.

21. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y + \frac{5}{3}z - 3 = 0$ tenglama normal tenglama ko'rinishiga keltirilsin. J: $\frac{2}{\sqrt{6}}x - \frac{1}{\sqrt{6}}y + \frac{5}{\sqrt{6}}z - \frac{9}{\sqrt{6}} = 0$.

22. $x - 4y - 8z + 5 = 0$ tekislikdan 4 birlik masofada yotuvchi va unga parallel bo'lgan tekislik tenglamasi tuzilsin. J: $x - 4y - 8z - 31 = 0$, $x - 4y - 8z + 41 = 0$.

23. $6x - 3y + 2z - 14 = 0$ tekislikdan 3 birlik masofada yotuvchi nuqtalar to'plamining tenglamasi tuzilsin. J: $6x - 3y + 2z - 35 = 0$, $6x - 3y + 2z + 7 = 0$


24. $2x - y + 3z - 9 = 0$, $x + 2y + 2z - 3 = 0$ va $3x + y - 4z + 6 = 0$ tekisliklarning kesishgan nuqtasi topilsin. J: $(1; -1; 2)$.

11-§. Fazoda to'g'ri chiziq va uning tenglamasi

Fazodagi $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan o'tuvchi va $P\{m, n, p\}$ vektorga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} \quad (1)$$

bu iborat. Bu tenglamani fazodagi to'g'ri chiziqning kanonik tenglamasi deyiladi. $P\{m, n, p\}$ vektor to'g'ri chiziqning yo'naltiruvchi vektori deyiladi (1-chizma).



1-chizma

(1) tenglamadagi har bir nisbatni biror t parametrga tenglab, ulardan x , y va z larni topib quyidagi tengliklarni hosil qilamiz:

$$\begin{cases} x = mt + x_0 \\ y = nt + y_0 \\ z = pt + z_0 \end{cases} \quad (2)$$

Bu tenglamaga to'g'ri chiziqning parametrik tenglamasi deyiladi.

Fazodagi ikkita $M_1(x_1, y_1, z_1)$ va $M_2(x_2, y_2, z_2)$ nuqtalar orqali o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \quad (3)$$

formula yordamida tuziladi.

Fazodagi to'g'ri chiziqni ikkita tekislikning kesishish chizig'i (agar ular parallel bo'lmasa) deb qarash mumkin. Bu to'g'ri chiziqni ushbu

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

sistemaning yechimlari to'plumidan iborat deb qarash mumkin.

(4) sistema bilan aniqlangan tenglamaga fazodagi to'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi deyiladi.

$$\frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1} \text{ yoki } \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$$

tenglamalar bilan berilgan fazodagi to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak

$$\cos \varphi = \frac{m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}} \quad (5)$$

formuladan topiladi.

Agar to'g'ri chiziqlar o'zaro perpendikulyar bo'lsa, u holda

$$m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 = 0 \quad (6)$$

bo'ladi.

Agar to'g'ri chiziqlar parallel bo'lsa, u holda

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2} \quad (7)$$

bo'ladi.

1. $M_0(-2; 1; -1)$ nuqtadan o'tuvchi $\vec{N}(1; -1; 2)$ vektorga parallel bo'lgan to'g'ri chiziqning kanonik va parametrik tenglamasi tuzilsin.

2. $M_0(-1; 3; 1)$ nuqtadan o'tib, $\vec{U}(3; 1; -2)$ vektorga parallel bo'lgan to'g'ri chiziqning kanonik va parametrik tenglamasi tuzilsin.

$$J: \frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{-2}, \quad \begin{cases} x = 3t - 1 \\ y = -t + 3 \\ z = -2t + 1 \end{cases}$$

3. $A(4; 3; 0)$ nuqtadan o'tuvchi va $P\{-1; 1; 1\}$ vektorga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin. J: $\frac{x-4}{-1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{1}$.

4. Quyidagi berilgan nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamalari tuzilsin.

1) $A(-1; 2; 3)$ va $B(2; 6; -2)$;

2) $A(2; -1; 3)$ va $B(2; 3; 3)$;

3) $A(3; 4; 5)$ va $B(-6; -2; -10)$.

5. Quyida berilgan to'g'ri chiziq tenglamalarini: 1) proyeksiyalar bo'yicha; 2) kanonik ko'rinishda yozilsin:

$$1) \begin{cases} x + 2y + 3z - 13 = 0 \\ 3x + y + 4z - 14 = 0 \end{cases}; \quad 2) \begin{cases} 2x + y + 8z - 16 = 0 \\ x - 2y - z + 2 = 0 \end{cases};$$

$$3) \begin{cases} x - y + 2z + 4 = 0 \\ 3x + y - 5z - 8 = 0 \end{cases}$$

6. $M_0(-2; 1; -1)$ nuqtadan o'tuvchi va $P\{1; -2; 3\}$ vektorga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi yozilsin.

7. Fazodagi to'g'ri chiziq quyidagi umumiy tenglamalar bilan berilgan. Ularning kanonik tenglamalari yozilsin.

$$1) \begin{cases} x - y + 2z + 4 = 0 \\ 3x + y - 5z - 8 = 0 \end{cases}; \quad 2) \begin{cases} x - 2y + 3z - 4 = 0 \\ 3x + 2y - 5z - 4 = 0 \end{cases};$$

$$3) \begin{cases} x + 2y + z - 1 = 0 \\ x + y + 1 = 0 \end{cases}$$

8. Quyidagi nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqning tenglamalari yozilsin:

1) $M_1(-3; 5; 1)$ va $M_2(1; 0; -2)$; 2) $M_1(4; 6; 8)$ va $M_2(2; 4; 6)$;

3) $M_1(-2; -4; -6)$ va $M_2(2; 4; 6)$; 4) $M_1(3; 5; 7)$ va $M_2(5; 7; 9)$.

9. Quyida berilgan to'g'ri chiziq orasidagi burchak topilsin:

$$1) \begin{cases} x - y + z - 4 = 0 \\ 2x + y - 2z + 5 = 0 \end{cases} \text{ va } \begin{cases} x + y + z - 4 = 0 \\ 2x + 3y - z - 6 = 0 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 2x - y + 7 = 0 \\ 2x - z + 5 = 0 \end{cases} \text{ va } \begin{cases} 3x - 2y + 8 = 0 \\ z = 3x \end{cases}$$

10. Uchlari $M_1(3; 6; -7)$, $M_2(-5; 2; 3)$ va $M_3(4; -7; -2)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning M_3 nuqtasidan o'tkazilgan medianasining

parametrik tenglamasi tuzilsin. J: $\begin{cases} x = 5t + 4 \\ y = -11t - 7 \\ z = -2 \end{cases}$

$$11. \begin{cases} x - y - 4z - 5 = 0 \\ 2x + y - 2z - 4 = 0 \end{cases} \text{ va } \begin{cases} x - 6y - 6z + 2 = 0 \\ 2x + 2y + 9z - 1 = 0 \end{cases} \text{ to'g'ri chiziqlar}$$

orasidagi φ burchak kosinusi topilsin. J: $\cos \alpha = \pm \frac{4}{21}$.

$$12. 1) \begin{cases} x = z + 5 \\ y = 4 - 2z \end{cases} \text{ va } 2) \frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{1} \text{ to'g'ri chiziqlarning } XOY$$

va XOZ tekisliklardagi izlari topilsin.

Ko'rsatma. To'g'ri chiziqning tenglamalarida 1) $z = 0$; 2) $y = 0$ deb faraz qilish kerak. J: 1) $(5; 4; 0)$ va $(7; 0; 2)$ 2) $(0; -4; 0)$ va $(2; 0; 2)$.

13. $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{1}$ to'g'ri chiziqning $x = z + 1, y = 1 - z$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar ekanligi ko'rsatilsin.

14. $(-4; 3; 0)$ nuqtadan o'tuvchi va $\begin{cases} x - 2y + z = 4 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$ to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi yozilsin. J: $\frac{x+4}{1} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-0}{5}$.

15. $M_0(1; -3; 4)$ nuqtadan o'tib, $\begin{cases} 2x - y + z - 3 = 0 \\ x + 3y - z - 1 = 0 \end{cases}$ to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan to'g'ri chiziqning parametrik tenglamasi tuzilsin.

$$J: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3t - 3 \\ z = 7t + 4 \end{cases}$$

16. $2x - y + z + 1 = 0$ tekislik bilan $M_1(3; 2; 0)$, $M_2(1; -1; 1)$ va $M_3(1; -3; 2)$ nuqtalardan o'tuvchi tekislikning kesishishidan hosil bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi yozilsin. J: $\begin{cases} 2x - y + z + 1 = 0 \\ x - 2y - 4z + 1 = 0 \end{cases}$

12-§. Fazodagi to'g'ri chiziq va tekislik

Fazodagi $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$ to'g'ri chiziq va $Ax + By + Cz + D = 0$ tekislik orasidagi burchak quyidagi formuladan topiladi:

$$\sin \alpha = \frac{Am + Bn + Cp}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} \quad (1)$$

Agar to'g'ri chiziq va tekislik o'zaro parallel bo'lsa, u holda $Am + Bn + Cp = 0$ (2) tenglik o'rinli bo'ladi.

Agar to'g'ri chiziq va tekislik o'zaro perpendikulyar bo'lsa, u holda

$$\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p} \quad (3)$$

tenglik o'rinli bo'ladi.

Berilgan $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan o'tuvchi va l_1 hamda l_2 to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan tekislik tenglamasi quyidagicha:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (4)$$

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan o'tuvchi l chiziqqa perpendikulyar bo'lgan tekislik tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$m(x - x_0) + n(y - y_0) + p(z - z_0) = 0 \quad (5)$$

Berilgan l to'g'ri chiziq va p tekislikning kesishish nuqtasi

$$\begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases} \quad (6)$$

sistemadan topiladi.

$$\frac{x-x_0}{m_1} = \frac{y-y_0}{n_1} = \frac{z-z_0}{p_1} \quad \text{va} \quad \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$$

to'g'ri chiziqlarni bir tekislikda yotish sharti quyidagicha:

$$\begin{vmatrix} x_1 - x_2 & y_1 - y_2 & z_1 - z_2 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (7)$$

1. $3x + 2y - 5z - 1 = 0$ tekislik bilan $\begin{cases} x = 4t + 2 \\ y = -3t + 2 \\ z = 2t + 1 \end{cases}$ to'g'ri

chiziqning kesishish nuqtasini toping. J: (6; -1; 3).

2. $\frac{x-6}{-2} = \frac{y-1}{3} = z-1$ to'g'ri chiziq bilan $2x - 5y + 6z - 1 = 0$ tekislikning kesishish nuqtasi topilsin.

3. $y = 3x - 1$, $2z = -3x + 2$ to'g'ri chiziq bilan $2x + y + z - t = 0$ tekislik orasidagi burchak topilsin. J: $\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}$

4. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{3}$ to'g'ri chiziq $2x + y - z = 0$ tekislikka parallel ekanligini isbotlang.

5. $x-2t-1$, $y-t+2$, $z-1-t$ to'g'ri chiziqning $3x-2y-z-3=0$ tekislik bilan kesishgan nuqtasi topilsin. J: (5; 5; -2).

6. $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$ to'g'ri chiziqning $x + 2y + 3z - 29 = 0$ tekislik bilan kesishish nuqtasi topilsin. J: (6; 4; 5).

7. $\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 3t - 2 \\ z = -6t + 1 \end{cases}$ va $\begin{cases} 2x + y - 4z + 2 = 0 \\ 4x - y - 5z + 4 = 0 \end{cases}$ to'g'ri chiziqlarning

perpendikulyarligi isbotlansin.

8. $\frac{x+7}{1} = \frac{y+4}{4} = \frac{z+3}{-2}$ va $\frac{x-21}{6} = \frac{y+5}{-5} = \frac{z-2}{-1}$ to'g'ri chiziqlar orasidagi eng qisqa masofani toping. J: 13.

9. $\frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{4}$ va $\frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-7}{2}$ to'g'ri chiziqlar l ning qanday qiymatlarida kesishadi? J: 3.

10. $\begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t + 2 \\ z = 1 - t \end{cases}$ to'g'ri chiziqning $3x - 2y + z - 3 = 0$ tekislik bilan kesishgan nuqtasi topilsin. J: (5; 5; -2).

11. $\frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{1}$ va $\begin{cases} x = 3z - 4 \\ y = z + 2 \end{cases}$ to'g'ri chiziqlarning kesishuvchi ekanligi ko'rsatilsin va kesishish nuqtasi topilsin.

12. Kanonik tenglamalari $\frac{x-1}{a} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z+4}{\sqrt{2}}$ va $\frac{x+2}{2} = \frac{y-13}{a} = \frac{z-6}{\sqrt{2}}$ bo'lgan to'g'ri chiziqlar a parametring qanday qiymatlarida o'zaro perpendikulyar bo'ladi? J: 2.

13. Kanonik tenglamalari $\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{\sqrt{2}}$ va $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+5}{\sqrt{2}}$ bo'lgan to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak topilsin. J: 60° .

14. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{\sqrt{2}} = \frac{z-1}{1}$ to'g'ri chiziq bilan $x + y\sqrt{2} - z + 1 = 0$ tekislik orasidagi burchak topilsin. J: 30° .

15. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{a} = \frac{z+3}{-2}$ to'g'ri chiziq n ning qanday qiymatida $x - 3y + 6z + 7 = 0$ tekislikka parallel bo'ladi.

16. $\frac{x-2}{m} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{-3}$ to'g'ri chiziq va $3x - 2y + Cz + 1 = 0$ tekislik o'zaro perpendikulyar bo'lishi uchun m va C qanday qiymatlarni qabul qilishi kerak? J: $m = -6, C = \frac{3}{2}$.

17. $\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+3}{\sqrt{2}}$ to'g'ri chiziq bilan $x + y + z\sqrt{2} - 4 = 0$ tekislik orasidagi burchak topilsin.

18. $\frac{x-2}{m} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{-3}$ to'g'ri chiziq bilan $3x + 2y + Cz + 4 = 0$ tekislik m va C parametrlarning qanday qiymatida o'zaro perpendikulyar bo'ladi?

19. $\frac{x-3}{2} = \frac{y-5}{-3} = \frac{z+2}{-2}$ to'g'ri chiziq bilan $Ax + By + 3z - 5 = 0$ tekislik A va B parametrlarning qanday qiymatida o'zaro perpendikulyar bo'ladi?

20. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{n} = \frac{z+3}{-2}$ to'g'ri chiziq bilan $x - 3y + 6z + 2 = 0$ tekislik n parametrlarning qanday qiymatida o'zaro perpendikulyar bo'ladi?

13-§. Ikkinchi tartibli sirtlar

$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Kz + L = 0$ (1) tenglamaga ikkinchi tartibli sirtlarning umumiy tenglamasi deyiladi. Bu yerda $A, B, C, D, E, F, G, H, K, L$ lar qandaydir berilgan sonlar va


$$A^2 + B^2 + C^2 + D^2 + E^2 + F^2 \neq 0,$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 \quad (2)$$

tenglama markazi $C(a; b; c)$ nuqtada va radiusi R ga teng bo'lgan sfera tenglamasidir (1-chizma).

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \quad (3)$$

tenglama esa markazi $O(0; 0; 0)$ nuqtada va radiusi R ga teng bo'lgan sfera tenglamasidir (2-chizma).



Sferani o'zaro perpendikulyar uchta yo'nalish bo'yicha tekis deformatsiyalash (cho'zish va siqish) natijasida hosil bo'lgan sirt ellipsoid deyiladi (3-chizma).

Ellipsoidning kanonik tenglamasi


$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (4)$$

ko'rinishda bo'ladi. a, b, c sonlar ellipsoidning yarim o'qari deyiladi.

1°. Ellipsoid koordinata o'qlariga nisbatan simmetrikdir.

2°. Ellipsoid koordinata o'qlarini $A_1(a; 0; 0), A_2(-a; 0; 0), B_1(0; b; 0), B_2(0; -b; 0), C_1(0; 0; c)$ va $C_2(0; 0; -c)$ nuqtalarda kesib o'tadi.

3°. Ellipsoidning $z = h$ tekislik bilan kesimi ellips bo'lib, uning tenglamasi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}$ (5) bo'ladi.



3-chizma


Quyidagi

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (6)$$


tenglama bilan aniqlangan sirt bir o'rtali giperboloid deb ataladi (4-chizma). Quyidagi

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (7)$$

tenglama bilan aniqlangan sirt ikki o'rtali giperboloid deb ataladi (5-chizma).




4-chizma



5-chizma

Oxz tekislikda $x^2 = 2pz, y = 0$ (8) tenglama bilan berilgan parabola Oz o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan sirt paraboloid deb ataladi (6-chizma). U quyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$x^2 + y^2 = 2pz \quad (9)$$



6-chizma

$$2z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \quad (10) \text{ tenglama bilan aniqlangan sirt } \underline{\text{elliptik}}$$

paraboloid deyiladi.

$$2z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \quad (11) \text{ tenglama bilan aniqlangan sirt } \underline{\text{giperbolik}}$$

paraboloid deyiladi.

$x^2 + y^2 = 2pz$ tenglama bilan berilgan aylantma paraboloid Oz o'qiga nisbatan simmetrik bo'ladi.

$2z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ tenglama bilan berilgan elliptik paraboloidni $|z = h > 0|$ tekislik bilan kesish natijasida


$$2h = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

ellips hosil bo'ladi.

$2z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ giperbolik paraboloidni $|z = h|$ tekislik bilan kesilsa,

kesimda $2h = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ giperbola hosil bo'ladi.

Quyidagi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ (12) tenglama bilan aniqlangan sirtga **konus** dehlataladi (7-chizma).



1. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan sferalarning markazi va radiusini toping.

- 1) $x^2 + y^2 + z^2 = 4$; 2) $x^2 + (y-2)^2 + z^2 = 1$;
- 3) $x^2 + (y-2)^2 + (z+2)^2 = \frac{1}{4}$; 4) $2x^2 + 2y^2 + 2(z-3)^2 = 1$;
- 5) $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 1$.

2. Quyidagi sfera tenglamalarini kanonik ko'rinishga keltiring.

- 1) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y - 2z + 13 = 0$;
- 2) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6y + 8z + 10 = 0$;
- 3) $x^2 + y^2 + z^2 - 12x - 6y + 37 = 0$;
- 4) $x^2 + y^2 + z^2 - 3y = 0$;
- 5) $4x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 16x - 4y - 8z + 17 = 0$;
- 6) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 12y - 2z + 41 = 0$;
- 7) $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 10 = 0$;
- 8) $x^2 + y^2 + z^2 - 5x + \frac{4}{3}y - \frac{\sqrt{35}}{3}z = 0$.

1) Markazi $C(-1; 3; \sqrt{2})$ nuqtada va radiusi $r = 5$ bo'lgan sferaning tenglamasi tuzilsin.

1) Markazi $C(2; 0; -0.5)$ nuqtada va $4x - 4y + 2z + 17 = 0$ tekislikka urinuvchi sfera tenglamasi yozilsin. J: $(x-2)^2 + y^2 + (z+\frac{1}{2})^2 = 16$.

1) Quyidagi: 1) $2x - 6y + 3z - 49 = 0$; 2) $4x - 3y + 101 = 0$; 3) $3x - 2y + z + 6 = 0$ tekisliklarning har biri $x^2 + y^2 + z^2 = 49$ sferaga nisbatan qanday joylashganini aniqlang.

Ko'rsatma: Sfera markazidan tekislikkacha masofani sfera radiusi bilan solishtiring. J: 1) urinadi; 2) kosmaydi; 3) kesadi.

6) 1) $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ sferaga $A(2; -1; 2)$ nuqtada urinuvchi; 2) $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+2)^2 = 49$ sferaga $A(5; 5; -4)$ nuqtada urinuvchi tekislik tenglamasini yozing.

Ko'rsatma: Sfera radiusi CA urinma tekislikka A nuqtada perpendikulyar. J: 1) $2x - y + 2z - 9 = 0$; 2) $6x + 3y + z - 53 = 0$.

7. Quyida berilgan tenglamalar qanday sirtni ifodalashini aniqlang.

- 1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + z^2 = 1$; 2) $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{16} = 1$;
- 3) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1$; 4) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = -1$;
- 5) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 0$; 6) $4(x^2 + y^2) - z^2 = 16$;
- 7) $y^2 - 16(x^2 + z^2) + 16 = 0$; 8) $4(y^2 - x^2) - z^2 + 16 = 0$
- 9) $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = z$; 10) $z = x^2 + y^2$.

8. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} - \frac{z^2}{9} = -1$ sirtga $(-6; 2; 6)$ nuqtada urinuvchi tekislik tenglamasini tuzing.

Ko'rsatma: Urinma tekislik tenglamasi $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} \pm \frac{zz_0}{c^2} = \pm 1$ dan iborat. J: $4x - 12y + 9z - 6 = 0$.

9) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} - z^2 = 0$ konusning $(4; -6; 4)$ nuqtasiga urinuvchi urinma tekislik tenglamasini tuzing. J: $x - 2y - 4z = 0$.

Ko'rsatma: urinma tekislik tenglamasi $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} \pm \frac{zz_0}{c^2} = 0$ bo'ladi.

IV BOB. MATEMATIK ANALIZGA KIRISH

1-§. O'zgaruvchi va o'zgarmas miqdorlar, funksiya tushunchasi

Faqat bitta sonli qiymat qabul qiladigan kattaliklar o'zgarmas miqdorlar deyiladi.

Turli sonli qiymatlar qabul qiladigan kattaliklar o'zgaruvchi miqdorlar deyiladi.

O'zgaruvchi miqdorning qabul qiladigan qiymatlari to'plami o'zgaruvchi miqdorning o'zgarish sohasi deyiladi.

Agar x o'zgaruvchi miqdor biror a sonidan b sonigacha ($a < b$) qiymatlarini qabul qilsa, u holda uni $a \leq x \leq b$ yoki $x \in [a, b]$ kabi yoziladi va uni kesma deyiladi.

$a < x < b$ tengsizlikni qanoqlantiradigan x sonlar to'plami interval (oraliq) deb ataladi va uni (a, b) kabi yoziladi.

$a < x \leq b$ va $a \leq x < b$ lar yarim yopiq oraliqlar deyiladi va $(a, b]$ va $[a, b)$ kabi yoziladi.

$-\infty < x < a$ va $a < x < +\infty$ lar cheksiz yarim intervallar (oraliqlar) deyiladi.

$-\infty < x < +\infty$ cheksiz interval (oraliq) deyiladi.

Agar x o'zgaruvchining biror sonli D to'plamga tegishli har bir qiymatiga ma'lum bir qonun qoida asosida y o'zgaruvchining biror E to'plamga tegishli yagona bir qiymati mos qo'yilgan bo'lsa, unda y o'zgaruvchi x o'zgaruvchining funksiyasi deyiladi.

y o'zgaruvchi x o'zgaruvchining funksiyasi ekanligi $y = f(x)$, $y = F(x)$, $y = \varphi(x)$, $y = g(x)$, $y = h(x)$ va hokazolardan biri bilan belgilanadi. Bu yerda x erkin o'zgaruvchi yoki argument, y esa erkin o'zgaruvchi yoki funksiya deyiladi. D - funksiyaning aniqlanish

sohasi $E =$ o'zgarish yoki qiymatlar sohasi deyiladi. Aniqlanish sohasi $D(f)$, qiymatlar sohasi $E\{f\}$ bilan belgilanadi.

XOY koordinata tekisligidagi $(x, y) = (x, f(x))$, $x \in D(f)$ koordinatali nuqtalarning geometrik o'rni $y = f(x)$ funksiyaning grafigi deyiladi.

Funksiya analitik, jadval, grafik va ta'rif usullarida beriladi.

Agar x argument bo'yicha bajariladigan matematik amallarni formulalar orqali berilsa, u holda funksiyani analitik usulda berilgan deyiladi.

Agar x va y o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish jadval ko'rinishida berilgan bo'lsa, u holda funksiyani jadval usulida berilgan deyiladi.

Agar x va y o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish tekislikdagi biror egri chiziq orqali berilsa, u holda funksiyani grafik usulda berilgan deyiladi.

Ta'rif usulida funksiya qiymatini aniqlash qonuni uni ta'riflash orqali beriladi. Masalan: Dirixle funksiyasi deb ataluvchi va $[0, 1]$ kesmada aniqlangan $D(x)$ funksiyani analitik, jadval yoki grafik ko'rinishlarda ifodalab bo'lmaydi. Bu funksiya qiymatlari ta'rif bo'yicha quyidagicha aniqlanadi:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{agar } x \text{ ratsional son bo'lsa} \\ 0, & \text{agar } x \text{ irratsional son bo'lsa} \end{cases}$$

Berilgan $y = f(x)$ funksiya biror $D \subset D(f)$ sohaga tegishli ixtiyoriy $x_1, x_2 \in D$ va $x_1 < x_2$ nuqtalar uchun $f(x_1) < f(x_2)$ [$f(x_1) \leq f(x_2)$] shartni qanoqlantirsa, u holda funksiyani D sohada o'suvchi (kamaymovchi) deyiladi.

Berilgan $y = f(x)$ funksiya biror $D \subset D(f)$ sohaga tegishli ixtiyoriy $x_1, x_2 \in D$ va $x_1 < x_2$ nuqtalar uchun $f(x_1) > f(x_2)$ [$f(x_1) \geq f(x_2)$] shartni qanoatlantirsa, u holda funksiyani shu sohada **kamayuvchi (o'smayvchi)** funksiya deyiladi.

O'suvchi yoki kamaymovchi, kamayuvchi yoki o'smovchi funksiyalarni **monoton funksiyalar** deyiladi.

Aniqlanish sohasi $D\{f\}$ nol nuqtaga nisbatan simmetrik bo'lgan sohadagi ixtiyoriy x uchun $f(-x) = f(x)$ [$f(-x) = -f(x)$] shart bajarilsa, u holda funksiyani **juft (toq)** deyiladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya uchun yuqoridagi shartlar bajarilmasa, u holda funksiyani **juft ham, toq ham** emas deyiladi.

Agar $f(x)$ va $g(x)$ juft funksiyalar bo'lsa ularning umumiy aniqlanish sohasi D da $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ va $g(x) \neq 0$ bo'lganda $\frac{f(x)}{g(x)}$ funksiyalar ham juft bo'ladi.

Agar $f(x)$ va $g(x)$ toq funksiyalar bo'lsa, u holda $f(x) \pm g(x)$ toq $f(x) \cdot g(x)$ va $\frac{f(x)}{g(x)}$ funksiyalar juft bo'ladi.

Agar $f(x)$ juft va $g(x)$ toq funksiya bo'lsa, u holda $f(x) \cdot g(x)$ va $\frac{f(x)}{g(x)}$ toq funksiyalar bo'ladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya uchun shunday $T > 0$ son mavjud bo'lsaki, $\forall x \in D\{f\}$ uchun $x \pm T \in D\{f\}$ bo'lganda $f(x \pm T) = f(x)$ shart bajarilsa, u holda funksiyani **davriy funksiya** deyiladi. Bu shartni qanoatlantiruvchi eng kichik musbat T soni **funksiyani davri** deyiladi.

Berilgan $y = f(x)$ funksiya uchun shunday $M > 0$ soni topilsaki, ixtiyoriy $x \in D$ uchun $|f(x)| \leq M$ shart bajarilsa, u holda funksiyani

D sohada chegaralangan funksiya deyiladi. Aks holda $y = f(x)$ funksiyani chegaralanmagan deyiladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya biror D sohaning har bir x nuqtasida y qiymat C songa teng bo'lsa, u holda funksiyani D sohada **o'zgarmas funksiya** deyiladi.

$y = f(u)$ bo'lib, o'z vaqtida $u = \varphi(x)$ bo'lsa, u holda $y = f[\varphi(x)]$ bo'lib, bu funksiyani **murakkab funksiya** yoki **funksiyani funksiyasi** deyiladi.

$y = f(u)$ bo'lib, $u = \varphi(x)$ va $x = \psi(t)$ bo'lsa, u holda $f[\varphi(\psi(t))]$ bo'lib, bu funksiya ham murakkab funksiya bo'ladi.

Aniqlanish sohasi $D\{f\}$ va qiymatlar sohasi $E\{f\}$ bo'lgan $y = f(x)$ funksiya uchun har bir $y \in E\{f\}$ soniga $f(x) = y$ shartni qanoatlantiradigan yagona $x \in D\{f\}$ sonini mas qayadigan $x = \varphi(y)$ funksiya mavjud bo'lsa, u berilgan f funksiyaga **teskari funksiya** deyiladi.

f funksiyaga teskari funksiya f^{-1} kabi belgilanadi ($f^{-1} = \frac{1}{f}$ degan ma'nomi bildirmaydi).

Odatda argument x , funksiya y orqali belgilangani uchun, $y = f(x)$ funksiyaga teskari $x = \varphi(y)$ funksiya $y = \varphi(x)$ kabi yoziladi.

Quyidagi funksiyalar **asosiy elementar funksiyalar** deyiladi:

- 1) $y = x^a$, $a \in \mathbb{R}$ darajali funksiya;
- 2) $y = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$ ko'rsatkichli funksiya;
- 3) $y = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$ logarifmik funksiya;
- 4) $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$, $y = \operatorname{sec} x$, $y = \operatorname{cosec} x$ lar trigonometrik funksiyalar;

5) $y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \operatorname{arctg} x$, $y = \operatorname{arccot} x$,
 $y = \operatorname{arcsec} x$, $y = \operatorname{arccosec} x$ lar teskari trigonometrik funksiyalar.

Asosiy elementar funksiyalardan chokli sondagi arifmetik amallar yordamida tuzilgan murakkab funksiyalarga elementar funksiyalar deb ataladi.

1. Matematik mayatnikning kichik tebranishlar davri $T = -\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

formula bilan hisoblanadi, bu yerda l — mayatnikning uzunligi, g — erkin tushish tezlanishi. Bu formulaga kiruvchi miqdorlardan qaysilari absolyut o'zgarmas miqdor, qaysilari parametr va qaysilari o'zgaruvchi miqdor?

2. Izotermik jarayonda Boyl—Mariyot qonuni $PV = C$ formula bilan ifodalinishi ma'lum, bu yerda P —gazning bosimi, V —u egallab turgan hajm. Bu formuladagi o'zgarmas va o'zgaruvchi miqdorlarni ko'rsating.

3. Bo'shliqda erkin tushayotgan jismning bosib o'tgan S yo'll $S = \frac{gt^2}{2}$ formula bo'yicha hisoblanadi. Bu formulaga kiruvchi miqdorlarning qaysilari absolyut o'zgarmas miqdor, parametr yoki o'zgaruvchi bo'ladi?

4. Kesilgan konusning hajmi

$$V = \frac{\pi R}{3} (R^2 + Rr + r^2)$$

formula bo'yicha hisoblanadi. Bu formuladagi miqdorlardan qaysilari absolyut o'zgarmas miqdor, qaysilari o'zgaruvchi miqdor va qaysilari parametr bo'ladi?

5. 1) $|x| < 4$; 2) $x^2 < 9$; 3) $|x - 4| < 2$;
 4) $-1 < x - 3 \leq 2$; 5) $x^2 > 9$; 6) $(x - 2)^2 \leq 4$.

miqdorliklarni qanoatlantiruvchi x ning o'zgarish oraliqlari yasalsin.

6. O'zgaruvchilarning $[-1; 3]$; $(0; 5)$; $[-2; 3]$ o'zgarish oraliqlari miqdorliklar orqali yozilsin va yasalsin.

J: $-1 \leq x \leq 3$; $0 < x < 5$; $-2 \leq x \leq 3$.

7. $x = 1 - \frac{1}{t}$ o'zgaruvchining o'zgarish oralig'i aniqlansin, bundagi t dan kichik bo'lmagan har qanday qiymatni qabul qiladi. J: $0 \leq x < 1$.

8. $x = 2 + \frac{1}{t}$ o'zgaruvchining ixtiyoriy $t \geq 1$ qiymalar qabul qiladigan o'zgarish oralig'i aniqlansin. J: $2 < x \leq 3$.

9. $f(x) = 3x^2 - 2x - 1$ funksiya berilgan. $f(2)$, $f(-2)$, $f(1)$, $f(0)$, $f(a+2)$ va $f(-x)$ lar topilsin.

J: $f(2) = 7$; $f(-2) = 15$; $f(1) = 0$; $f(0) = -1$; $f(a+2) = 3a^2 + 10a + 7$; $f(-x) = 3x^2 + 2x - 1$.

10. $f(x) = 2x^2 - x^2 + x - 1$ funksiya berilgan. $f(\frac{1}{2})$, $f(2)$, $f(-1)$, $f(\frac{a}{2})$, va $f(\frac{a-1}{a+1})$ lar topilsin.

J: $f(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}$; $f(2) = 13$; $f(-1) = -5$; $f(\frac{a}{2}) = \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{4} + \frac{a}{4} - \frac{1}{2}$;
 $f(\frac{a-1}{a+1}) = \frac{a^2 - 7a^2 + 2a - 5}{(a+1)^2}$

11. $f(x) = \frac{4x^2 - 7x + 2}{3x^2 + 5}$ funksiya berilgan. $f(a)$, $f(\frac{1}{a^2})$, $f(2)$ va $f(0)$ lar topilsin.

J: $f(a) = \frac{4a^2 - 7a + 2}{3a^2 + 5}$; $f(\frac{1}{a^2}) = \frac{4 - 7a^2 + 2a^4}{5a^4 + 3}$; $f(2) = \frac{1}{17}$; $f(0) = \frac{2}{5}$.

12. $f(x) = \frac{1}{5x-1}$ funksiya berilgan. $f(2)$ va $f(-3)$ lar topilsin.

J: $f(2) = \frac{1}{9}$; $f(-3) = \frac{1}{16}$.

13. $f(x) = \frac{5x+1}{2-x}$ funksiya berilgan. $f(3x)$, $f(x^3)$, $3f(x)$ va $[f(x)]^3$ lar topilsin.

$$I: f(3x) = \frac{15x+1}{2-3x}, \quad f(x^3) = \frac{5x^3+1}{2-x^3}, \quad 3f(x) = \frac{15x+3}{2-x}$$

$$[f(x)]^3 = \frac{125x^3 + 75x^2 + 15x + 1}{8 - 12x + 6x^2 - x^3}$$

14. $f(x) = 4x - x^2$ bo'lsa, $f(a+1) - f(a-1)$ ni toping.

$$15. f(x) = \begin{cases} 2+x, & x > 0 \\ 5, & x = 0 \\ 2^x, & x < 0 \end{cases} \text{ funksiya berilgan. } f(-2), f(0), f(1)$$

va $f(3)$ lar topilsin.

$$I: f(-2) = \frac{1}{4}; f(0) = 5; f(1) = 3; f(3) = 5,$$

$$16. f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 \leq x < 0 \\ -2x+1, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ \cos \pi x, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \end{cases}$$

funksiya berilgan. $f(-\frac{1}{3})$; $f(0)$; $f(\frac{1}{2})$; $f(\frac{4}{5})$ lar topilsin.

$$I: f(-\frac{1}{3}) = \frac{1}{9}; f(0) = 1; f(\frac{1}{2}) = 0; f(\frac{4}{5}) = \cos \frac{4\pi}{5}$$

17. $f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$ funksiya berilgan. $f(-1)$, $f(a+1)$, $f(a)+1$ lar topilsin.

$$I: f(-1) = 0, \quad f(a+1) = \frac{a+2}{a^2+3a^2+3a}, \quad f(a)+1 = \frac{a^2+a}{a^2-1}$$

$$18. f(x) = \begin{cases} 3^{-x} - 1, & -1 \leq x < 0 \\ \lg \frac{x}{2}, & 0 \leq x < \pi \\ \frac{x}{x^2-2}, & \pi \leq x \leq 6 \end{cases}$$

funksiya berilgan. $f(-1)$, $f(\frac{\pi}{2})$, $f(\frac{2\pi}{3})$, $f(4)$, $f(6)$ lar topilsin.

$$I: f(-1) = 2, \quad f(\frac{\pi}{2}) = 1, \quad f(\frac{2\pi}{3}) = \sqrt{3}, \quad f(4) = \frac{2}{7}, \quad f(6) = \frac{3}{17}$$

$$19. f(x) = \begin{cases} 2x^3 + 1, & x \leq 2 \\ \frac{1}{x-2}, & 2 < x \leq 3 \\ 2x - 5, & x > 3 \end{cases}$$

funksiya berilgan. $f(\sqrt{2})$, $f(\sqrt{8})$, $f(\sqrt{\log_2 1024})$ lar topilsin.

$$I: f(\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} + 1, \quad f(\sqrt{8}) = \frac{1}{\sqrt{8}-1}, \quad f(\sqrt{\log_2 1024}) = 15.$$

20. Agar $f(-4) = 6$ va $f(4) = 4$ bo'lsa, $f(x)$ chiziqli funksiyani yozing.

21. Agar $f(-2) = 10$ va $f(1) = -5$ bo'lsa, $f(x)$ chiziqli funksiyani yozing.

22. Agar $f(-3) = 3$ va $f(6) = 0$ bo'lsa, $f(x)$ chiziqli funksiyani yozing.

23. Agar $f(0) = 15$; $f(2) = 30$; $f(4) = 90$ bo'lsa, $f(x) = a + bx^c$ ($c > 0$) funksiyani yozing.

24. Agar $f(0) = 5$, $f(-1) = 10$, $f(1) = 6$ bo'lsa, $f(x) = ax^2 + bx + c$ kvadrat funksiyani yozing.

$$I: f(x) = 3x^2 - 2x + 5.$$

25. Agar $f(1) = 3$, $f(-1) = 1$, $f(0) = 1$ bo'lsa, $f(x) = ax^2 + bx + c$ kvadrat funksiyani yozing.

$$I: f(x) = x^2 + x + 1.$$

26. Quyidagi funksiyalarni aniqlanish sohalari topilsin.

$$1) f(x) = \frac{1}{3x-2}; \quad 2) f(x) = \sqrt{4-x^2}; \quad 3) f(x) = \frac{x}{x^2-1};$$

$$4) f(x) = \sqrt{x^2-9}; \quad 5) f(x) = \frac{1}{3x-4} + \frac{1}{2x-5};$$

$$6) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}; \quad 7) f(x) = \sqrt{x^2+4x-5};$$

$$8) f(x) = \frac{2x}{x^2+3x-10}; \quad 9) f(x) = \frac{\lg(x-1)}{x^2-x-2};$$

$$10) f(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{1-x}; \quad 11) f(x) = \sqrt{x^2-1} + \frac{1}{\sqrt{3-x}}$$

$$12) f(x) = \sqrt{x-4} - \sqrt{8-x^2}; \quad 13) f(x) = \frac{1}{\ln(2-x-x^2)}$$

$$14) f(x) = \arcsin \frac{x-1}{3} + \arccos \frac{2x-1}{2}$$

$$J: 1) \left(-\infty; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{2}{3}; +\infty\right); \quad 2) [-2; 2]; \quad 3) f(x) = (-\infty; -1) \cup$$

$$\cup (-1; 1) \cup (1; +\infty); \quad 4) (-\infty; -3] \cup [3; +\infty); \quad 5) \left(-\infty; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{2}{3}; \frac{3}{2}\right) \cup$$

$$\cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right); \quad 6) [1; +\infty); \quad 7) (-\infty; -5] \cup [1; +\infty); \quad 8) (-\infty; -5) \cup$$

$$\cup (-5; 2) \cup (2; +\infty); \quad 9) (1; +\infty); \quad 10) [-2; 1]; \quad 11) (-\infty; -1) \cup$$

$$\cup (1; 4); \quad 12) \emptyset; \quad 13) \left(-2; \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}; 1\right); \quad 14) \left[-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$$

27. Quyidagi funksiyalardan qaysilari juft, qaysilari toq, qaysilari juft ham emas, toq ham emas?

$$1) f(x) = \frac{x^2}{\sin 2x} \text{ (toq);} \quad 2) f(x) = 4 - 2x^2 + \sin^2 x \text{ (juft);}$$

$$3) f(x) = x^3 + 2x - 1 \text{ (juft ham toq ham emas);}$$

$$4) f(x) = \frac{1+e^{kx}}{1-e^{kx}} \text{ (toq);} \quad 5) f(x) = \frac{2^x+2^{-x}}{2^x-2^{-x}} \text{ (toq);}$$

$$6) f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x} \text{ (toq);} \quad 7) f(x) = \frac{x^2+3^{-x}}{2} \text{ (toq);}$$

$$8) f(x) = \log_2 \frac{1+\sin x}{1-\sin x} \text{ (toq);} \quad 9) f(x) = \sqrt{x^4 - |x|} \log_2 x^2 \text{ (juft).}$$

$$10) f(x) = \sqrt{x^2(x-2)} \text{ (juft ham toq ham emas);}$$

$$11) f(x) = \arcsin \frac{2x}{1+x^2} \text{ (toq);} \quad 12) f(x) = \frac{1-\sin x}{\sin x} \text{ (juft ham, toq}$$

ham emas).

28. Quyidagi funksiyalarni chegaralangan yoki chegaralanmaganligi aniqlansin.

$$1) y = 5\cos 3x + 2\sin 3x \text{ (chegaralangan);}$$

$$2) y = \frac{x^2+x+6}{x^2+x-1} \text{ (chegaralangan);}$$

$$3) y = x \sin x \text{ (chegaralanmagan);}$$

$$4) y = 2\cos^2 x + 3\sin x \text{ (chegaralangan);}$$

$$5) y = 2\sin x + \cos x \text{ (chegaralanmagan);}$$

$$6) y = \frac{x^2-x+1}{x^2+1} \text{ (chegaralangan);}$$

$$7) y = \frac{x^3-1}{x^2+x} \text{ (chegaralanmagan).}$$

29. Quyidagi funksiyalarning davrlari topilsin.

$$1) f(x) = \operatorname{tg} 2x \left(\frac{\pi}{2}\right); \quad 2) f(x) = \operatorname{ctg} \frac{x}{2} (2\pi);$$

$$3) f(x) = \sin 2\pi x (1); \quad 4) f(x) = \sin^4 x + \cos^4 x \left(\frac{\pi}{2}\right);$$

$$5) f(x) = |\cos x| (\pi); \quad 6) f(x) = \sin x + \cos 2x + \operatorname{tg} 3x (2\pi);$$

$$7) f(x) = 2\sin 3x + 3\sin 2x (2\pi); \quad 8) f(x) = \sin x + \cos 2x (2\pi);$$

$$9) f(x) = |\sin x| + |\cos x| (\pi); \quad 10) f(x) = \operatorname{tg} \frac{2x}{3} + \operatorname{ctg} \frac{3x}{2} (6\pi);$$

$$11) f(x) = \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{3x}{2} + \operatorname{tg} 2x (4\pi);$$

$$12) f(x) = \sin \frac{3x}{2} - \cos \frac{x}{2} (8\pi).$$

30. Quyidagi funksiyalarning grafiklari yozalsin.

$$1) y = x^2; \quad 2) y = x^3; \quad 3) y = |x|; \quad 4) y = |x-2|;$$

$$5) y = \frac{1}{x-2}; \quad 6) y = \frac{x}{x-2}; \quad 7) f(x) = [x]; \quad 8) f(x) = \{x\}$$

$$9) y = \frac{1}{x+2}; \quad 10) f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{agar } x \geq 0 \text{ bo'lsa,} \\ 2x+1, & \text{agar } x < 0 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

$$11) y = \begin{cases} x^2, & \text{agar } x \leq 0 \text{ bo'lsa,} \\ x, & \text{agar } x \geq 0 \text{ bo'lsa;} \end{cases} \quad 12) y = \begin{cases} 2, & \text{agar } x > 0 \text{ bo'lsa,} \\ -2, & \text{agar } x < 0 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

$$13) y = \begin{cases} 2x + 2, & \text{agar } 0 \leq x \leq 3 \text{ bo'lsa,} \\ 8, & \text{agar } 3 \leq x \leq 6 \text{ bo'lsa,} \\ x + 2, & \text{agar } x \geq 6 \text{ bo'lsa;} \end{cases}$$

$$14) y = \begin{cases} -2x - 2, & \text{agar } x < -1 \text{ bo'lsa,} \\ -\sqrt{1-x^2}, & \text{agar } -1 \leq x \leq 1 \text{ bo'lsa;} \\ 2x - 2, & \text{agar } x > 1 \text{ bo'lsa;} \end{cases}$$

$$15) y = \begin{cases} 2, & \text{agar } x \leq -1 \text{ bo'lsa,} \\ x + 3, & \text{agar } -1 \leq x \leq 0 \text{ bo'lsa,} \\ -x + 3, & \text{agar } 0 \leq x \leq 1 \text{ bo'lsa,} \\ 2, & \text{agar } x \geq 1 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

31. Quyidagi funksiyalarga teskari funksiyalar yozilsin.

$$1) y = 3x - 1; \quad 2) y = \frac{x-1}{2} + 3; \quad 3) y = \lg \frac{x}{5} \quad (x > 0);$$

$$4) y = \arcsin \frac{x}{3} \quad (-3 \leq x \leq 3); \quad 5) y = 5 \arctg x \quad (-\infty < x < +\infty);$$

$$6) y = \frac{x-1}{2-3x^2}; \quad 7) y = 5^{\lg x}; \quad 8) y = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

$$J: 1) y = \frac{x+1}{3}; \quad 2) y = 2x - 5; \quad 3) y = 5 \cdot 10^x; \quad 4) y = 3 \sin x;$$

$$5) y = \lg \frac{x}{2}; \quad 6) y = \frac{2x+1}{3x+1}; \quad 7) y = 10^{\frac{\lg x}{9}} \quad (0 < x < +\infty);$$

$$8) y = \frac{1}{2} \arccos x \quad (-1 \leq x \leq 1).$$

32. Murakkab funksiyalarga misollar keltiring.

33. $y = \ln \sin x$ bo'lsa, oraliq o'zgaruvchini yozing ($v = \sin x$).

34. $y = \lg \sqrt{x}$ bo'lsa, oraliq o'zgaruvchini yozing ($u = \sqrt{x}$).

35. Quyidagi funksiyalarning o'zgarish sohasini toping.

$$1) y = \sqrt{16-x^2} \quad J: [0;4]; \quad 2) y = 3 \cos x - 1 \quad J: [-4;2];$$

$$3) y = 3^{-x^2} \quad J: (0;1).$$

2-§. Ketma-ketlik va uning limiti

Agar har bir $n \in \mathbb{N}$ natural songa hiror qonun qoida asosida ma'lum bir $x_n \in \mathbb{R}$ haqiqiy son mos qo'yilgan bo'lsa, u holda $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$ sonli ketma-ketlik deb ataladi. x_n sonli ketma-ketlikning umumiy hadi deyiladi. Sonli ketma-ketlikni qisqacha $\{x_n\}$ kabi yoziladi.

Agar shunday M (yoki m) soni mavjud bo'lsaki, $\{x_n\}$ ketma-ketlikning barcha hadlari uchun $x_n \leq M$ (yoki $x_n \geq m$) shart bajarilsa, u holda bu ketma-ketlik yuqoridan (quvidan) chegaralangan deyiladi.

Ham quvidan, ham yuqoridan chegaralangan ketma-ketlik chegaralangan ketma-ketlik deyiladi.

Istiyoriy $M > 0$ son uchun $\{x_n\}$ ketma-ketlikning kamida bitta hadi $x_n > M$ tengsizlikni qanoatlantirsa, bu ketma-ketlik chegaralanmagan deyiladi.

Agar har qanday $n \in \mathbb{N}$ natural son uchun $x_{n+1} > x_n$ ($x_{n+1} < x_n$) tengsizlik bajarilsa, $\{x_n\}$ ketma-ketlik o'suvchi (kamayuvchi) deyiladi. Faqat o'suvchi yoki kamayuvchi ketma-ketlik monoton ketma-ketlik deyiladi.

Hamma hadlari bir xil a soniga teng bo'lgan ketma-ketlik o'zgarmas ketma-ketlik deyiladi.

Agar istalgan $\varepsilon > 0$ son uchun shunday $N = N(\varepsilon) > 0$ son mavjud bo'lsaki, barcha $n > N$ lar uchun $|x_n - a| < \varepsilon$ tengsizlik bajarilsa, o'zgarmas a son $\{x_n\}$ ketma-ketlikning limiti deyiladi va u quyidagicha yoziladi: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Agar $\{x_n\}$ ketma-ketlik limitga ega bo'lsa, u vaqinfashuvchi, aks holda uzoqlashuvchi deyiladi.

Har qanday chegaralangan va monoton ketma-ketlik limitga ega.

Ixtiyoriy $M > 0$ son uchun bu songa bog'liq shunday N_M son topilsaki, $\{x_n\}$ ketma-ketlikning $n > N_M$ shartni qanoatlantiruvchi barcha hadlari uchun $|x_n| > M$ tengsizlik bajarilsa, u holda bu ketma-ketlik chehsiz limitga ega deyiladi va u $\lim x_n = \pm\infty$ kabi yoziladi.

Agar $\{x_n\}$ va $\{y_n\}$ ketma-ketliklarning ikkalasi ham yaqinlashuvchi va $\lim x_n = A$, $\lim y_n = B$ bo'lsa, u holda quyidagi tengliklar o'rinli bo'ladi:

$$\lim(x_n \pm y_n) = \lim x_n \pm \lim y_n = A \pm B;$$

$$\lim(x_n \cdot y_n) = \lim x_n \cdot \lim y_n = A \cdot B;$$

$$\lim \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim x_n}{\lim y_n} = \frac{A}{B} \quad (\lim y_n = B \neq 0).$$

Ketma-ketliklarni limitini hisoblashda ajoyib limit deb ataluvchi quyidagi tenglik muhimdir:

$$\lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

bu yerdagi e soni $e \approx 2,718281\dots$ irratsional son bo'lib u matematikada juda ko'p qo'llaniladi. Masalan, usosi e bo'lgan logarifim natural logarifim deb ataladi va \ln bilan belgilanadi.

1. Umumiy hadi bilan berilgan quyidagi ketma-ketliklarning dastlabki bir nechta hadlari yozilsin:

$$1) x_n = n; \quad 2) x_n = \frac{n}{n+2}; \quad 3) x_n = \frac{2n}{3n-2}; \quad 4) x_n = \frac{1}{n^2}$$

$$5) x_n = -2^n; \quad 6) x_n = n!; \quad 7) x_n = \frac{1}{2^n}; \quad 8) x_n = \frac{n^2-1}{n^2+1};$$

$$9) x_n = \frac{1}{(3n-2)(3n+2)}; \quad 10) x_n = \sin \frac{n\pi}{n}; \quad 11) x_n = \frac{1+(-1)^n}{2}.$$

$$J: 1) 1, 2, 3, 4, 5, \dots; \quad 2) \frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{5}, \frac{4}{6}, \dots; \quad 3) \frac{2}{1}, \frac{3}{4}, \frac{6}{7}, \frac{6}{10}, \dots;$$

$$4) 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots; \quad 5) -2, -4, -8, -16, \dots; \quad 6) 1!, 2!, 3!, 4!, \dots;$$

$$7) \frac{1}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \dots; \quad 8) 0, \frac{3}{8}, \frac{9}{16}, \frac{15}{17}, \dots; \quad 9) \frac{1}{2 \cdot 4}, \frac{1}{5 \cdot 7}, \frac{1}{8 \cdot 10}, \frac{1}{11 \cdot 13}, \dots;$$

$$10) 1, 0, -\frac{1}{3}, 0, -\frac{1}{5}, \dots; \quad 11) 0, 1, 0, 1, \dots;$$

2. Dastlabki bir nechta hadlari bilan berilgan quyidagi ketma-ketliklarning umumiy hadi yozilsin:

$$1) \frac{1}{1}, \frac{4}{10}, \frac{14}{15}, \frac{21}{22}, \frac{30}{31}, \dots; \quad J: x_n = \frac{n^2+5}{n^2+6};$$

$$2) \frac{1}{1}, \frac{1}{6}, \frac{1}{9}, \frac{1}{12}, \frac{1}{15}, \dots; \quad J: x_n = \frac{1}{3n};$$

$$3) \frac{1}{1 \cdot 4}, \frac{1}{5 \cdot 6}, \frac{1}{7 \cdot 8}, \frac{1}{9 \cdot 10}, \dots; \quad J: x_n = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)};$$

$$4) \frac{1}{1}, \frac{4}{11}, \frac{7}{16}, \frac{10}{21}, \frac{13}{26}, \dots; \quad J: x_n = \frac{3n-2}{5n+1};$$

$$5) \frac{1}{1}, \frac{7}{8}, \frac{11}{11}, \frac{15}{14}, \frac{19}{17}, \dots; \quad J: x_n = \frac{4n-1}{3n+2};$$

$$6) \frac{1}{1}, \frac{1}{6}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \frac{1}{243}, \dots; \quad J: x_n = \frac{1}{3^n};$$

$$7) 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{4}, \frac{3}{5}, \frac{4}{6}, \frac{5}{7}, \dots; \quad J: x_n = \frac{n-1}{n+1};$$

$$8) \frac{1}{1}, \frac{13}{17}, \frac{27}{37}, \frac{46}{65}, \frac{75}{101}, \dots; \quad J: x_n = \frac{3n^2}{4n^2-1};$$

$$9) \frac{2}{1}, \frac{5}{8}, \frac{10}{17}, \frac{17}{23}, \dots; \quad J: x_n = \frac{n^2+1}{5n-2};$$

$$10) 1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \frac{1}{5}, \dots; \quad J: x_n = \begin{cases} k, & \text{agar } n = 2k-1 \\ \frac{1}{k+1}, & \text{agar } n = 2k. \end{cases}$$

3. Quyida berilgan ketma-ketliklardan qaysilari monoton, qaysilari o'zgarmas va qaysilari chegaralangan ketma-ketliklar bo'ladi?

$$1) 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots; \quad J: \text{Monoton kamayuvchi va chegaralangan};$$

$$2) 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots; \quad J: \text{Chegaralangan};$$

$$3) -1, 1, -1, 1, \dots, (-1)^n, \dots; \quad J: \text{Chegaralangan};$$

$$4) 3, 3, 3, 3, \dots, 3, \dots; \quad J: \text{O'zgarmas};$$

5) $-1, -4, -9, -16, \dots, -n^2, \dots$ J: Monoton kamayuvchi;

6) $2, 4, 8, 16, \dots, 2^n, \dots$ J: Monoton o'suvchi

7) $1, 2, \frac{5}{3}, 4, \frac{1}{5}, \dots, n^{(-1)^n}, \dots$

8) $-1, 2, -3, 4, -5, 6, \dots, (-1)^n \cdot n, \dots$

4. $a_n = \frac{n}{n+1}$ sonli ketma-ketlikning quyi va yuqori chegaralarini ko'rsating. J: 0; 1.

5. Quyidagi ketma-ketliklardan qaysilari chegaralangan?

$\{n^2 + 3\}$; $\{(-1)^n \cdot n\}$; $\{(n)^{(-1)^n}\}$; $\{\frac{n^2-1}{n^2}\}$; $\{\frac{(-1)^n}{2}\}$. J: $\{\frac{n^2-1}{n^2}\}$.

6. $x_n = \frac{n}{2n+1}$ ketma-ketlikni o'suvchi ekanligini isbotlang.

7. Umumiy hadi $x_n = \frac{n}{4n-3}$ bo'lgan ketma-ketlikni monoton kamayuvchi ekanligini isbotlang.

8. Umumiy hadi $x_n = \frac{n-1}{n}$ ketma-ketlikni monoton o'suvchi ekanligini isbotlang.

9. Umumiy hadi $x_n = \frac{3n}{n+1}$ bo'lgan ketma-ketlikni chegaralangan va monoton o'suvchi ekanligi isbotlansin.

10. Umumiy hadi $x_n = \frac{2^n+1}{2^n}$ bo'lgan ketma-ketlikni chegaralangan va monoton kamayuvchi ekanligini isbotlang.

11. Umumiy hadi $x_n = \frac{2n-1}{3n-1}$ bo'lgan ketma-ketlikni o'suvchi ekanligi isbotlansin.

12. Ketma-ketlikning limiti ta'rifidan foydalanib quyidagilarni isbot qiling:

1) Umumiy hadi $x_n = \frac{n}{n+1}$ bo'lgan ketma-ketlikning limiti 1 ga tengligini;

2) Umumiy hadi $x_n = \frac{4n}{2n+1}$ bo'lgan ketma-ketlikning limiti 2 ga tengligini;

3) Umumiy hadi $x_n = \frac{2n-1}{2n-1}$ bo'lgan ketma-ketlikning limiti 1 ga tengligini;

4) Umumiy hadi $x_n = \frac{3n^2+1}{5n^2-1}$ bo'lgan ketma-ketlikning limiti $\frac{3}{5}$ ga tengligini;

13. Umumiy hadi $x_n = \frac{n^2-2}{2n^2-9}$ bo'lgan ketma-ketlikning limiti 0 ga teng emasligini isbotlang.

14. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{5}, \frac{3}{4}, \frac{1}{7}, \frac{4}{5}, \dots$ ketma-ketlikning limitga ega emasligi isbotlansin.

15. Umumiy hadi bilan berilgan quyidagi ketma-ketliklarni cheksiz kichik ekanligini isbotlang.

1) $x_n = \frac{1}{n^k} (k > 0)$; 2) $x_n = \frac{1-(-1)^n}{n}$; 3) $x_n = \frac{1}{n} \sin \left[(2n-1) \frac{\pi}{2} \right]$

Ko'rsatma: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ekanligi ko'rsatiladi.

16. Umumiy hadi bilan berilgan quyidagi ketma-ketliklarni $n \rightarrow \infty$ ga cheksiz katta ekanligi isbotlansin.

1) $x_n = 3^{\sqrt{n}}$; 2) $x_n = 7^n$.

17. $\lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{3}{x-2}$ va $\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{3}{x-2}$ lar topilsin va jadvallar bilan tushuntirilsin. J: $+\infty$ va $-\infty$.

18. $\lim_{x \rightarrow 0+0} 2^x$ va $\lim_{x \rightarrow 0-0} 2^x$ lar topilsin va jadvallar bilan tushuntirilsin. J: $+\infty$ va 0.

19. Quyidagi 1) $\frac{2}{\infty} = 0$; 2) $\frac{2}{0} = \pm\infty$; 3) $3^{\infty} = \infty$; 4) $3^{-\infty} = 0$; 5) $\lg 0 = -\infty$ va 6) $\operatorname{tg} 90^\circ = \pm\infty$ "shartli" yozuvlarining aniq ma'nolarini tushuntirilsin.

20. Quyidagi limitlarni hisoblang.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+5n+2n^2}{1-n}$; 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^2+2n-3}{5n^2-4n+1}$; 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3+n^2-1}{5n^3-4n+1}$

4)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2-4n+3}{n^3-4n+1}$; 5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2+2^2+3^2+\dots+n^2}{3n^2+n+1}$; 6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+7}{3-4n}$

7)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n^2-1}$; 8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+5}{n^2+n-1}$; 9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2+n-1}{5n^2-7n+12} \right)^2$

10) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n} \right) \left(2 - \frac{5}{n} \right)^2 \left(\frac{5}{n^2} - 1 \right)$; 11) $\lim_{n \rightarrow \infty} 3^{\frac{6n+1}{n-4}}$

12) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{n}{n-1}}$; 13) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n})$

14) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2n+3} - \sqrt{n-1})$; 15) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

16) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1}}{n+1}$; 17) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+4n}}{\sqrt{n^2-3n^2}}$; 18)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\sqrt{n^2-n+1}}{\sqrt{4n^2+n+3}}$

19) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{5n}{4n+3}} \right)^{\frac{1}{2}}$; 20) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-2+3-4+5-6+\dots-2n}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{4n^2-1}}$

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2+5n}}{3n+2}$; 22) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-n^3} + n)$; 23)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(n+1)}$

24) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2n+3} - \sqrt{n-1})$; 25) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$; 26)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+4n}}{\sqrt{n^2-3n^2}}$

1) 1; 2) $\frac{7}{5}$; 3) $\frac{3}{5}$; 4) 0; 5) $\frac{5}{9}$; 6) $-\frac{5}{4}$; 7) ∞ ; 8) 0;

9) $\frac{4}{11}$; 10) -4; 11) 9; 12) $\frac{1}{2}$; 13) 0; 14) ∞ ; 15) $\frac{1}{2}$; 16) 1;

17) 1; 18) $\frac{1}{2}$; 19) $\left(\frac{4}{5} \right)^{\frac{1}{5}}$; 20) $-\frac{1}{2}$; 21) 0; 22) 0; 23) 1;

24) 0; 25) $\frac{1}{2}$; 26) 1.

3-§. Funksiyaning limiti

Agar oldindan berilgan ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun unga bog'liq shunday $\delta > 0$ son topilsaki, $|x - a| < \delta$ shartni qanoatlantiruvchi har qanday $x \in D(f)$ va biror A son uchun $|f(x) - A| < \varepsilon$ tengsizlik bajarilsa, A soni $y = f(x)$ funksiyaning $x \rightarrow a$ ho'lgandagi limiti deyiladi.

Ta'rifdagi tasdiq

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

ko'rinishida yoziladi.

Agar har qanday katta $N > 0$ son uchun shunday $\delta = \delta(N) > 0$ son mavjud bo'lsaki, $|x - a| < \delta$ shartni qanoatlantiruvchi $\forall x \in D(f)$ uchun $|f(x)| > N$ tengsizlik bajarilsa, u holda $y = f(x)$ funksiya $x \rightarrow a$ bo'lganda cheksiz limitga ($+\infty$ yoki $-\infty$) ega deyiladi va u quyidagicha yoziladi:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$$

Agar har qanday kichik $\varepsilon > 0$ son uchun shunday katta $M = M(\varepsilon)$ son mavjud bo'lsaki, $|x| > M$ shartni qanoatlantiruvchi barcha $x \in D(f)$ va biror chekli A soni uchun $|f(x) - A| < \varepsilon$ tengsizlik bajarilsa, u holda $y = f(x)$ funksiya $x \rightarrow \pm\infty$ bo'lganda chekli limitga ega deyiladi va u quyidagicha yoziladi:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = A$$

Agar har qanday katta $N > 0$ soni uchun shunday $M = M(N)$ son mavjud bo'lsaki, $|x| > M$ shartni qanoatlantiruvchi barcha $x \in D(f)$ uchun $|f(x)| > N$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda $y = f(x)$ funksiya $x \rightarrow \pm\infty$ bo'lganda cheksiz limitga ega deyiladi va $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ ko'rinishida yoziladi.

Agar $x \rightarrow a$ bo'lganda $y = f(x)$ funksiya limitga ega bo'lsa, u holda bu limit yagona bo'ladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya argumenti x chekli a soniga faqat chap ($x < a$) yoki faqat o'ng ($x > a$) tomoldan yaqinlashib borganida ($x \rightarrow a - 0$ yoki $x \rightarrow a + 0$ kabi belgilanadi) funksiya limiti biror A_1 yoki A_2 songa teng bo'lsa, bu songa funksiyaning a nuqtadagi chap yoki o'ng limiti deyiladi.

Ular $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a-0) = A_1$ yoki $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a+0) = A_2$ ko'rinishida yoziladi.

Biror a nuqtada $y = f(x)$ funksiya $x \rightarrow a$ bo'lganda chekli A limitga ega bo'lishi uchun uning shu a nuqtadagi chap va o'ng limitlari o'zaro teng va $f(a-0) = f(a+0) = A$ shart bajarilishi zarur va yetarli.

Agar $\alpha(x)$ funksiya uchun $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$ shart bajarilsa, u holda bu funksiya $x \rightarrow a$ bo'lganda cheksiz kichik funksiya deyiladi.

Agar $x \rightarrow a$ bo'lganda $\alpha(x)$ va $\beta(x)$ cheksiz kichik funksiyalar bo'lib, $f(x)$ esa ixtiyoriy chegaralangan funksiya bo'lsa, u holda $x \rightarrow a$ bo'lganda $\alpha(x) \pm \beta(x)$, $\alpha(x) \cdot \beta(x)$, $f(x) \cdot \alpha(x)$, $c\alpha(x)$ (c — o'zgarmas son) funksiyalar ham cheksiz kichik funksiyalar bo'ladi.

$x \rightarrow a$ bo'lganda $\alpha(x)$ va $\beta(x)$ cheksiz kichik miqdorlar va $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = A = 0$ bo'lsa, u holda $\alpha(x)$ funksiya $x \rightarrow a$ bo'lganda $\beta(x)$ ga nisbatan yuqori tartibli cheksiz kichik funksiya deyiladi va $\alpha(x) = o(\beta(x))$ kabi yoziladi. Agar $A \neq 0$ chekli son bo'lsa, u holda $\alpha(x)$ va $\beta(x)$ lar bir xil tartibli cheksiz kichik funksiyalar deyiladi. Agar $A = 1$ bo'lsa, u holda $\alpha(x)$ va $\beta(x)$ lar ekvivalent cheksiz kichik funksiyalar deyiladi va $\alpha(x) \sim \beta(x)$ kabi yoziladi. Agar $A = \pm\infty$ bo'lsa, u holda $\alpha(x)$, $x \rightarrow a$ bo'lganda $\beta(x)$ ga nisbatan quyi tartibli cheksiz kichik funksiya deyiladi.

Agar $f(x)$ funksiya uchun

$$\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = \pm\infty$$

bo'lsa, u holda bu $\alpha(x)$ funksiya $x \rightarrow a$ bo'lganda cheksiz katta funksiya deyiladi.

Agar $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar $x \rightarrow a$ bo'lganda cheksiz katta funksiyalar bo'lsa, u holda $x \rightarrow a$ da quyidagilar o'rinlidir:

1. $|f(x)| + |g(x)|$ va $f(x) \cdot g(x)$ cheksiz katta bo'ladi.
2. Agar $\lim_{x \rightarrow a} h(x) \neq 0$ bo'lsa, u holda $f(x) \cdot h(x)$ va $\frac{f(x)}{h(x)}$ cheksiz katta bo'ladi.

3. Ixtiyoriy c o'zgarmas son va chegaralangan $f(x)$ funksiya uchun $cf(x)$ va $a(x) \cdot f(x)$ funksiyalar cheksiz katta bo'ladi.

Agar $f(x)$ funksiya $x \rightarrow a$ bo'lganda cheksiz katta funksiya bo'lsa, u holda $\frac{1}{f(x)}$ cheksiz kichik funksiya bo'ladi va aksincha, $f(x)$ funksiya $x \rightarrow a$ bo'lganda cheksiz kichik funksiya bo'lsa, u holda $\frac{1}{f(x)}$ cheksiz katta funksiya bo'ladi.

$y = f(x)$ funksiya $x \rightarrow a$ bo'lganda chekli A limitga ega bo'lishi uchun u $f(x) = A + \alpha(x)$ ko'rinishda bo'lishi zarur va yetarli.

Limitlarni hisoblashda quyidagilar o'rinlidir:

Agar $x \rightarrow a$ bo'lganda $f(x)$ va $\varphi(x)$ funksiyalar chekli A va B limitlarga ega bo'lsa, u holda:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm \varphi(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = A \pm B;$$

$$\lim_{x \rightarrow a} Cf(x) = C \lim_{x \rightarrow a} f(x) = CA;$$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = AB$ va agar $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) \neq 0$ bo'lsa, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)} = \frac{A}{B}$ tengliklar o'rinlidir.

Agar $x = a$ nuqtaning biror atrofida $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$ qo'sh tengsizlik o'rinli bo'lib, $x \rightarrow a$ da $\varphi(x)$ va $g(x)$ funksiyalarning chekli limitlari mavjud va

$$\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$$

shart o'rinli bo'lsa, u holda $x \rightarrow a$ da $f(x)$ funksiya uchun ham chekli limit mavjud, ya'ni $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ bo'ladi.

Agar $x = a$ nuqtaning biror atrofida $y = f(x)$ funksiya o'suvechi (kamayuvchi) bo'lib yuqoridan (quyidan) biror M (m) soni bilan

chegaralangan bo'lsa, u holda bu funksiya $x \rightarrow a$ limitga ega va uning limiti $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq M$ ($\lim_{x \rightarrow a} f(x) \geq m$) tengsizlik o'rinli bo'ladi.

Yechil funksiyalarning limitini hisoblashda muhim limitlar deb ataluvchi quyidagi tengliklardan foydalaniladi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2,718281 \dots;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax)}{x} = a;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} \ln a;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a.$$

Funksiya limitining " $\varepsilon - \delta$ " niidagi ta'rifidan foydalanib quyidagilar isbotlansin.

$$1. \lim_{x \rightarrow -1} (3x - 8) = -5;$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x+1}{3x+3} = \frac{5}{3};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(1-x)^2} = \infty;$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = \infty \quad (a > 1);$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} \arctg x = \frac{\pi}{2};$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x = \frac{1}{2};$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} (3x - 2) = 1;$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x+1} = 2;$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0;$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1;$$

2. $y = \begin{cases} 3x - 1, & x < 1 \\ 2x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$ funksiyaning $x = 1$ nuqtadagi chap va o'ng limitlarini toping. J: chap limit 2, o'ng limit 3.

3. $y = \begin{cases} 3x^2 + 2x - 1, & x \leq 0 \\ 2x^2 + 1, & x > 0 \end{cases}$ funksiyaning $x = 0$ nuqtadagi chap va o'ng limitini toping. J: chap limit -1, o'ng limit 1.

4. $f(x) = \begin{cases} \pi - \sin x, & x < 0 \\ \pi - e^{\pi x}, & x \geq 0 \end{cases}$ funksiyaning $x = 0$ nuqtadagi o'ng limitini toping.

5. Quyidagi funksiyalarni ko'rsatilgan nuqtalardagi bir tomonlama limitlarini toping.

$$1) f(x) = \begin{cases} -2x+3 & \text{agar } x \leq 1 \text{ bo'lsa} \\ 3x-5 & \text{agar } x > 1 \text{ bo'lsa} \end{cases} \text{ ni } x=1 \text{ nuqtadagi}$$

J: chap limit 1, o'ng limit -2.

$$2) f(x) = \frac{x^2-1}{|x-1|} \text{ ni } x=1 \text{ nuqtadagi};$$

$$3) f(x) = \frac{\sqrt{1-\cos 2x}}{x} \text{ ni } x=0 \text{ nuqtadagi};$$

J: chap limit $-\sqrt{2}$; o'ng limit $\sqrt{2}$.

$$4) f(x) = \frac{5}{(x-2)^3} \text{ ni } x=2 \text{ nuqtadagi};$$

$$5) f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{agar } 0 \leq x < 1 \text{ bo'lsa} \\ 3x+2, & \text{agar } 1 < x < 3 \text{ bo'lsa} \end{cases} \text{ ni } x=1 \text{ nuqtadagi.}$$

J: chap limit 2, o'ng limit 5.

6. Quyidagi limitlar hisoblansin.

$$1) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 7x + 4); \quad 2) \lim_{x \rightarrow 2} (2x^3 - 7x^2 + 4x + 2);$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 4} (\frac{1}{2}x^3 - x + 2); \quad 4) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-x+2}{x^2+2x+8}; \quad 5)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-x+1}{2x^2-x^3+x+2};$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^5-8}{x-2}; \quad 7) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+x-12}{2x^2-9x+9}; \quad 8) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-x^2-x+1}{x^2-3x+2};$$

$$9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^3-6x^2}{4x^3+2x^2+x^2}; \quad 10) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2+5x^2+3x-9}{x^3-3x^2-15x-9};$$

$$11) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1+\sqrt[3]{x}}{1+\sqrt{x}};$$

$$12) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}}; \quad 13) \lim_{x \rightarrow 2} (\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x^2-4}); \quad 14) \lim_{x \rightarrow 1} (\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^2});$$

$$15) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}; \quad 16) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2-5}-3}{x-2}; \quad 17) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{x-3};$$

$$18) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{6+x}-2}{x+2}; \quad 19) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+21}-5}{x-2}; \quad 20) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5-x^2}-2}{1-x};$$

$$21) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{8x+5}}{\sqrt{5-x}-\sqrt{7x-3}}; \quad 22) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x-2} - \sqrt{x});$$

$$23) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+1} - x); \quad 24) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x-2};$$

$$25) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x+1} - \sqrt{x^2-x+1}); \quad 26) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2} - x).$$

$$1) 1; 2) -2; 3) 30; 4) \frac{14}{23}; 5) -\frac{3}{2}; 6) 12; 7) \frac{14}{3}; 8) \frac{2}{3}; 9) -6;$$

$$10) \frac{1}{3}; 11) \frac{5}{7}; 12) \frac{3}{2}; 13) \infty; 14) -1; 15) \frac{1}{2}; 16) \frac{2}{3}; 17) \frac{1}{6}; 18) \frac{1}{4}; 19) \frac{2}{5};$$

$$20) \frac{1}{3}; 21) \frac{7}{12}; 22) 0; 23) \frac{1}{2}; 24) 1; 25) 1; 26) 0.$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ limitni qo'llashga doir misollar.

7. Quyidagi limitlar hisoblansin.

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}; \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 27x}{6x}; \quad 3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x}{\sin 2x};$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 5x};$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos 6x}{4x^2};$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 2x}{x};$$

$$7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos 9x}{2x^2};$$

$$8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2};$$

$$9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \operatorname{tg} x}{x};$$

$$10) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin x}{\cos^2 x};$$

$$11) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3};$$

$$12) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos^2 x}{x \sin x};$$

$$13) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sqrt{x^2-2}-\sqrt{2}};$$

$$14) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arcsin(1-2x)}{x^2-1}; \quad 15)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1}-1};$$

$$16) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-\cos 2x}}{x};$$

$$17) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x}{\sec x + 1}$$

$$18) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$$

$$1) 1) 2; 2) \frac{17}{8}; 3) 3; 4) \frac{3}{5}; 5) \frac{9}{2}; 6) 2; 7) 16; 8) \frac{1}{2}; 9) 3; 10) \frac{1}{2};$$

$$11) \frac{1}{2}; 12) 2; 13) 6\sqrt{2}; 14) -\frac{1}{2}; 15) 8; 16) -\sqrt{2}; 17) 4; 18) \frac{\pi^2}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e \quad \text{limitga doir misollar.}$$

8. Quyidagi limitlar hisoblangin.

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^x; \quad 2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{3x}\right)^x; \quad 3)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+1}\right)^x;$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{1}{x}}; \quad 5) \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 4x)^{\frac{2-x}{x}}; \quad 6)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)^{2x};$$

$$7) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\sin^2 x}} \quad (\sin x = \alpha \text{ deb oling}); \quad 8) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{3x};$$

$$9) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-3}{x}\right)^{\frac{1}{x}}; \quad 10) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-2}{3x+1}\right)^{2x}; \quad 11) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3tg^2 x)^{\frac{1}{ctg^2 x}};$$

$$12) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 5(tg^2 x)^{3ctg^2 x}); \quad 13) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{3x-7}\right)^{\frac{2x-1}{x+2}};$$

$$14) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x-1}{2x+4}\right)^x;$$

$$15) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+7}{x+5}\right)^{2x+4};$$

$$16) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{ctg^2 x};$$

$$17) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-4}{3x+2}\right)^{\frac{x-1}{x}};$$

$$\text{javoblar: } 1) e^5; 2) e^{-\frac{1}{3}}; 3) e^{-1}; 4) e^2; 5) e^{-4}; 6) e^{-2}; 7) \frac{1}{\sqrt{e}};$$

$$8) e^6; 9) \frac{1}{e\sqrt{e}}; 10) \frac{1}{e^3}; 11) e^3; 12) e^{15}; 13) \frac{4}{15}; 14) e^2\sqrt{e}; 15) e^4;$$

$$16) e^{-1}; 17) e^{-\frac{2}{3}}.$$

4-§. Funksiyaning uzluksizligi

Agar $y = f(x)$ funksiya $x = a$ nuqtaning biror atrofida aniqlangan

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

bo'lsa, u holda funktsiyani $x = a$ nuqtada uzluksiz deyiladi. Bu ta'rif quyidagi 4 ta uzluksizlik shartini o'z ichiga oladi:

1) $f(x)$ funksiya a nuqtaning qandaydir atrofida aniqlangan bo'lishi kerak.

2) Chekli $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ va $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ limitlar mavjud bo'lishi kerak.

3) Bu chap va o'ng limitlar bir hil bo'lishi kerak;

4) Bu limitlar $f(a)$ ga teng bo'lishi kerak;

Agar funksiya $[a, b]$ kesmaning har bir ichki nuqtasida uzluksiz bo'lib, uning chegaralarida esa $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$ va $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = f(b)$ bo'lsa, u holda funktsiyani shu kesmada uzluksiz deyiladi.

Agar x nuqta x_0 nuqta atrofidan olingan bo'lsa, $x - x_0$ ayirma argument ortirmasi deyiladi va Δx bilan belgilanadi. Bu holda $f(x) - f(x_0)$ ayirma funksiya ortirmasi deyiladi va u Δf yoki Δy orqali belgilanadi.

Agar $x \rightarrow x_0$ bo'lsa, u holda $\Delta x \rightarrow 0$ bo'ladi. Bundan $x = x_0 + \Delta x$ ni yozish mumkin. Bundan foydalanib uzluksizlik shartini

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$$

ko'rinishida yozish mumkin. Bundan $\Delta f = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ekanligidan foydalanib,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$$

ni yozish mumkin. Demak, $f(x)$ funksiya uzluksiz bo'lishi uchun argumentning "kichik" Δx orttirilishiga funksiyaning "kichik" Δy orttirilishi mos kelishi kerak ekan.

Barcha asosiy elementar funksiyalar o'zlarining aniqlanish sohasidagi har bir x_0 nuqtada uzluksizdir.

Agar $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar x_0 nuqtada uzluksiz bo'lsa, u holda $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ va $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(x) \neq 0$) lar ham bu nuqtada uzluksiz bo'ladi.

Agar $y = \varphi(x)$ funksiya x_0 nuqtada uzluksiz, $y = f(u)$ funksiya $U_0 = \varphi(x_0)$ nuqtada uzluksiz bo'lsa, u holda $y = f[\varphi(x)]$ murakkab funksiya ham x_0 nuqtada uzluksiz bo'ladi.

$y = f(x)$ funksiya biror $x = a$ nuqtada aniqlangan bo'lib, bu nuqtada uning o'ng (chap) limiti mavjud va

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a+0) = f(a) \quad (\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a-0) = f(a))$$

tenglik o'rinli bo'lsa, u holda $f(x)$ funksiya a nuqtada o'ngdan (chapdan) uzluksiz deyiladi.

$y = f(x)$ funksiya $x = a$ nuqtada uzluksiz bo'lishi uchun bu nuqtada u ham chapdan, ham o'ngdan uzluksiz bo'lishi zarur va zarurligi.

$[a, b]$ kesmada uzluksiz $y = f(x)$ funksiya shu kesmada o'zining eng katta M va eng kichik m qiymatiga erishadi, ya'ni bu kesmada kesmada bittadan x_1 va x_2 nuqtalar topiladiki, ularda $f(x_1) = M$ va $f(x_2) = m$ tengliklar o'rinli bo'ladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya $[a, b]$ kesmada uzluksiz va uning chegaralarida turli ishoralari qiymatlarini qabul qilsa, ya'ni $f(a) \cdot f(b) < 0$ bo'lsa, u holda kesmada bitta shunday $c \in (a, b)$ nuqta mavjud bo'ladiki, unda $f(c) = 0$ bo'ladi.

Berilgan $y = f(x)$ funksiya uchun ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ soni bo'yicha shunday $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ soni topilseki, biror $D \subset D\{f\}$ sohadagi $|x_1 - x_2| < \delta$ shartni qanoatlantiruvchi ixtiyoriy x_1 va x_2 nuqtalar uchun $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ tengsizlik bajarilsa, u holda $y = f(x)$ funksiya D sohada tekis uzluksiz deyiladi.

Agar funksiya a nuqtadan chapda va o'ngda aniqlangan bo'lsa, ammo a nuqtada uzluksizlikning 4 ta shartidan aqalli bittasi bajarilmasa, u holda $f(x)$ funksiya $x = a$ bo'lganda uzilishga ega bo'ladi. Uzilishlar ikki turga ajraladi.

x_0 nuqtada $y = f(x)$ funksiya aniqlanmagan, biroq shu nuqtadagi bir tomonlama limitlar mavjud va o'zaro teng, ya'ni $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$ bo'lsa, x_0 nuqta funksiyaning yo'qotiladigan uzilish nuqtasi deyiladi.

Agar $x = a$ nuqta $y = f(x)$ funksiyaning uzilish nuqtasi bo'lib, bu nuqtada funksiyaning chap $f(a - 0)$ va o'ng $f(a + 0)$ limitlari mavjud hamda chekli sonlardan iborat bo'lsa, u holda $x = a$ nuqta funksiyaning 1-tur uzilish nuqtasi deyiladi. Bunda $\Delta = f(a + 0) - f(a - 0)$ soni funksiyaning a uzilish nuqtasidagi sakrashi deyiladi.

Agar $y = f(x)$ funksiyaning $x = a$ uzilish nuqtasida uning chap va o'ng limitlaridan kamida bittasi cheksiz yoki mavjud bo'lmasa, u holda $x = a$ nuqta funksiyaning 2-tur uzilish nuqtasi deyiladi.

1. $f(x) = 3x^3 - 4x + 5$ funksiyaning $(-\infty; +\infty)$ oralig'ndagi har qanday nuqtada uzluksizligi isbotlansin.

2. $f(x) = 3x^4 + 5x^3 + 2x^2 + 3x + 4$ funksiya x ning har qanday qiymatida uzluksiz bo'lishi isbotlansin.

3. $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq 1 \\ x^2 - 1, & x > 1 \end{cases}$ funksiyani $x = 1$ nuqtada chapdan uzluksiz, o'ngdan esa uzluksiz emasligini ko'rsating.

4. $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x \geq 3 \\ 2x - 1, & x < 3 \end{cases}$ funksiyani $x = 3$ nuqtada o'ngdan uzluksiz, chapdan esa uzluksiz emasligini ko'rsating.

5. $\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ funksiyani $x = 0$ nuqtada o'ngdan ham, chapdan ham uzluksiz emasligini ko'rsating.

6. $y = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ funksiya o'ngdan ham, chapdan ham uzluksiz emasligini ko'rsating.

7. $f(x) = \frac{3x^2 + x - 5}{x^2 - 6x - 8}$ funksiya x ning qanday qiymatlarida uzluksiz bo'lishi aniqlansin. J: $(-\infty; 2) \cup (2; 4) \cup (4; +\infty)$.

8. Funksiya uzluksizligining ortirmalar tilidagi ta'rifidan foydalanib quyidagi funksiyalarni uzluksizlikka tekshiring.

1) $f(x) = 5x^2 - 6x + 2$ funksiyani ixtiyoriy x nuqtada;

2) $f(x) = \frac{1+x^2}{1-x^2}$ funksiyani $x = 3$ nuqtada;

3) $f(x) = \sin x$ funksiyani ixtiyoriy x nuqtada;

4) $f(x) = \cos x$ funksiyani ixtiyoriy x nuqtada;

9. Quyidagi funksiyalarni uzluksizlikka tekshiring.

1) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & \text{agar } x \neq 0 \text{ bo'lsa,} \\ 1, & \text{agar } x = 0 \text{ bo'lsa,} \end{cases}$

2) $f(x) = \sin \frac{1}{x}$.

3) $f(x) = \begin{cases} 4 \cdot 3^x, & \text{agar } x < 0 \text{ bo'lsa,} \\ 2a + x, & \text{agar } x \geq 0 \text{ bo'lsa,} \end{cases}$

4) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$

J: 1) x ning barcha qiymatlarida uzluksiz; 2) $x \neq 0$ da uzluksiz va $x = 0$ da 2-tur uzilishga ega; 3) funksiya $x = 0$ nuqtada uzilishga ega; 4) funksiya $x = -1$ da uzilishga ega.

10. Quyidagi funksiyalarni uzilish nuqtalari mavjud bo'lsa, ular topilsin va har bir uzilish nuqtasidagi funksiyaning sakrashi topilsin.

1) $f_1(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$, 2) $f_2(x) = \frac{3x - 5}{x^2 + 2x + 10}$, 3) $f_3(x) = \text{arctg} \frac{1}{x}$

4) $f_4(x) = \frac{|x - 3|}{x - 3}$, 5) $f_5(x) = \lg(x^2 + 3x)$.

11. Quyidagi funksiyalarni uzilish nuqtalari mavjud bo'lsa, ular topilsin va har bir uzilish nuqtasidagi funksiyaning sakrashi topilib funksiya grafigi yasalsin.

$$1) f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2, & \text{agar } x \leq 2 \text{ bo'lsa,} \\ x, & \text{agar } x > 2 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

$$2) \varphi(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & \text{agar } 0 \leq x \leq 1 \text{ bo'lsa,} \\ 4-2x, & \text{agar } 1 < x < 2 \text{ bo'lsa,} \\ 2x-7, & \text{agar } 2,5 \leq x < +\infty. \end{cases}$$

$$3) f(x) = \begin{cases} 2x+5, & \text{agar } -\infty < x < -1 \text{ bo'lsa,} \\ \frac{1}{x}, & \text{agar } -1 \leq x < +\infty \text{ bo'lsa,} \end{cases}$$

12. Quyidagi funksiyalarning uzluksizlik va aniqlanish sohalari ustma-ust tushishi yoki tushmasligi aniqlansin.

$$1) y = x^5 - 2x; \quad 2) y = \sqrt{x}; \quad 3) y = \frac{1}{x^2-9}; \quad 4) y = \cos 2x.$$

13. $\sin x - x + 1 = 0$ tenglama yechimga ega yoki yechimga ega emasligi aniqlansin. J: Yechimga ega.

$$14. x^5 - 18x + 2 = 0 \text{ tenglama } [-1;1] \text{ kesmada yechimga egami?}$$

J: Yechimga ega.

$$15. [-2;2] \text{ kesmada } f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & \text{agar } -2 \leq x < 0 \text{ bo'lsa,} \\ -(x^2 + 2), & \text{agar } 0 \leq x \leq 2 \text{ bo'lsa,} \end{cases}$$

funksiya berilgan. Bu kesmada $f(x) = 0$ bo'ladigan nuqta mavjudmi?

J: Yo'q, $x = 0$ nuqtada uzilishga ega.

16. $f(x) = \frac{x^2}{4} - \sin \pi x + 3$ funksiya $[-2;2]$ kesma ichida $2\frac{2}{3}$ ga teng qiymatni qabul qiladimi? J: Xa.

$$17. f(x) = \begin{cases} 2^x + 1, & \text{agar } -1 \leq x < 0 \text{ bo'lsa,} \\ 2^x, & \text{agar } x = 0 \text{ bo'lsa,} \\ 2^x - 1, & \text{agar } 0 < x \leq 1 \text{ bo'lsa,} \end{cases} \quad \text{funksiya}$$

$[-1;1]$ kesmada aniqlangan va chegaralangan. Funksiya bu kesmada eng katta qiymatga ham, eng kichik qiymatga ham ega bo'lmasligini ko'rsating.

18. $y = \frac{x}{x+2}$ funksiyaning uzilish nuqtasi ko'rsatilsin, $\lim_{x \rightarrow -2-0} y$,

$\lim_{x \rightarrow -2+0} y$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y$ lar topilsin va $x = -6, -4, -3, -1, 0, 2$ nuqtalar bo'yicha grafigi yasalsin.

J: $x = -2$ da 2-tur uzilish $\lim_{x \rightarrow -2-0} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -2+0} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1$.

$$19. y = \begin{cases} 2, & x = 0 \text{ va } x = \pm 2 \text{ bo'lsa,} \\ 4 - x^2, & 0 < |x| < 2 \text{ bo'lsa,} \\ 4, & |x| > 2 \text{ bo'lsa,} \end{cases} \quad \text{funksiyaning grafigi}$$

yasalsin va uzilish nuqtalari ko'rsatilsin. Uzilish nuqtalarida uzluksizlik shartlaridan qaysilari bajariladi va qaysilari bajarilmaydi.

J: $x = 0$ bo'lganda uzluksizlikning faqat to'rtinchi sharti bajarilmaydi. $x = \pm 2$ bo'lganda uchinchi va to'rtinchi shartlar bajarilmaydi.

20. Quyidagi funksiyalarning uzilish nuqtalari va ularning turlari aniqlansin.

$$1) y = \frac{2}{x-3} \quad \text{J: } x = 3 \text{ ikkinchi tur uzilish nuqta;}$$

$$2) y = \frac{x+1}{x(x-1)(x^2-9)} \quad \text{J: } x = 0; 1; -3; 3 \text{ lar ikkinchi tur uzilish nuqtalari;}$$

$$3) y = \begin{cases} x^2, & \text{agar } x \geq 0 \text{ bo'lsa,} \\ -1, & \text{agar } x < 0 \text{ bo'lsa,} \end{cases} \quad \text{J: } x = 0 \text{ birinchi tur uzilish}$$

nuqta;

$$4) y = \frac{\sin 3x}{x} \quad \text{J: } x = 0 \text{ yo'qotiladigan uzilish nuqta;}$$

$$5) y = \sin \frac{1}{x} \quad \text{J: } x = 0 \text{ ikkinchi tur uzilish nuqta;}$$

$$6) y = \frac{x^3-27}{x-2} \quad \text{J: } x = 3 \text{ yo'qotiladigan uzilish nuqta.}$$

V BOB. HOSILA VA DIFFERENSIAL

I-§. Argument va funksiya o'ttirmasi. Hosila va uni hisoblash

x nuqta tayinlangan x_0 nuqtaning biror atrofida yotuvchi istiyon nuqta bo'lsa, u holda $x - x_0$ ayirma argumentning x_0 nuqtasiga o'ttirmasi deyiladi va Δx bilan belgilanadi. Demak, $\Delta x = x - x_0$ yoki $x = x_0 + \Delta x$.

$f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ayirmaga funksiya o'ttirmasi deyiladi va uni Δy yoki Δf bilan belgilanadi. Demak, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

$y = f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi o'ttirmasi Δy ning argument o'ttirmasi Δx ga nisbatini Δx nolga intilgandagi limiti mavjud bo'lsa, uni $y = f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi deyiladi.

$y = f(x)$ funksiyaning hosilasi y' , $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{df}{dx}$ lardan biri bilan belgilanadi.

$y = f(x)$ funksiyaning hosilasi uning o'zgarish tezligini ifodalaydi va bu hosilaning mexanik ma'nosi deyiladi.

$y = f(x)$ funksiyaning hosilasi uning grafisini $M_0(x_0, y_0) = M_0(x_0, f(x_0))$ nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsientini ifodalaydi va uni hosilaning geometrik ma'nosi deyiladi.

$y = f(x)$ funksiyaning hosilasini topish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi.

1. $y = f(x)$ funksiyaning x argumentiga Δx o'ttirma beriladi. Bunda y funksiya Δy o'ttirma oladi.

2. Funksiya o'ttirmasi $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ topiladi.

3. Funksiya o'ttirmasi Δy ning argument o'ttirmasi Δx ga nisbatini $\frac{\Delta y}{\Delta x}$

topiladi.

4. Funksiya o'ttirmasi Δy ni argument o'ttirmasi Δx ga nisbatining nolga intilgandagi limiti topiladi.

Bu ketma-ketlikka hosilani hisoblash algoritmi deyiladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya x nuqtada chekli $f'(x)$ hosilaga ega bo'lsa, y shu nuqtada differensiallanuvchi deyiladi.

$y = f(x)$ funksiyaning hosilasini topish amali differensiallash amali deyiladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya x nuqtada differensiallanuvchi bo'lsa, y shu nuqtada uzluksiz bo'ladi.

$y = f(x)$ funksiya (a, b) oraliqning har bir x nuqtasida differensiallanuvchi bo'lsa, u holda uni shu oraliqda differensiallanuvchi deyiladi.

$y = f(x)$ funksiyaning hosilasini differensiallash qoidalari ochiklanuvchi quyidagi qoidalar yordamida hisoblanadi:

I. $(C)' = 0$ (C - o'zgarmas son). II. $(Cf)' = C(f)'$.

III. $(f \pm g)' = f' \pm g'$. IV. $(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f$.

V. $(\frac{f}{g})' = \frac{f' \cdot g - g' \cdot f}{g^2}$ ($g \neq 0$).

Berilgan $y = f(x)$ funksiya x nuqtaning biror atrofida qat'iy monoton va uzluksiz bo'lsin. Bundan tashqari $y = f(x)$ funksiya bu x nuqtada differensiallanuvchi va $y' = f'(x) \neq 0$ bo'lsin. Bu shartlarda $x = f^{-1}(y)$ teskari funksiya mavjud va differensiallanuvchi bo'lib, uning hosilasi uchun

$$\{f^{-1}(y)\}' = \frac{1}{f'(x)} \quad \text{yoki} \quad x'_y = \frac{1}{y'_x}$$

formula o'rinli bo'ladi.

Berilgan $y = f(u)$ murakkab funksiyada tashqi $f(u)$ va ichki $u(x)$ funksiyalar argumentlari bo'yicha differentsiallanuvchi bo'lsin. Bu holda $f(u)$ murakkab funksiya x bo'yicha differentsiallanuvchi bo'lib, uning hosilasi $f'_x(u) = f'_u(u) \cdot u'_x$ formuladan topiladi.

Agar $y = u(x) > 0$, $v = v(x)$ esa ixtiyoriy funksiya bo'lsa, u holda $y = u(x)^{v(x)} = u^v$ ko'rimisdagi murakkab funksiya darajali ko'rsatkichli funksiya deyiladi.

Agar $y = u(x)$ va $v = v(x)$ funksiyalar differentsiallanuvchi bo'lsa, u holda $y = u^v$ darajali ko'rsatkichli funksiya ham differentsiallanuvchi bo'ladi va uning hosilasi quyidagicha topiladi:

$$y = u^v, \ln y = v \ln u, \frac{1}{y} \cdot y' = v' \ln u + \frac{vu'}{u}, y' = y \left(v' \ln u + \frac{v}{u} u' \right) = u^v \left(v' \ln u + \frac{v}{u} u' \right) = u^v \ln u \cdot v' + vu^{v-1} \cdot u'$$

Demak, $y = u^v \ln u \cdot v' + vu^{v-1} \cdot u'$.

Barcha elementar funksiyalar o'zlarining aniqlanish sohasida differentsiallanuvchi bo'ladi. Ularni hosilalarini quyidagi jadvalda keltiramiz.

1	$(x^a)' = ax^{a-1}, a \in (-\infty, +\infty)$	2	$(u^a)' = au^{a-1} \cdot u', u = u(x)$
3	$(x^2)' = 1, (x^2)' = 2x, (x^3)' = 3x^2,$ $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}, (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	4	$(u^2)' = 2uu', (u^3)' = 3u^2 u',$ $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{1}{u^2} \cdot u', (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$
	5		$(a^x)' = a^x \ln a, a > 0, a \neq 1$
7	$(e^x)' = e^x, (10^x)' = 10^x \ln 10$	8	$(e^u)' = e^u \cdot u'$
9	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} = \frac{\log_a x}{x}$	10	$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a} = \frac{u' \log_a e}{u}$

11	$(\sin x)' = \frac{1}{x}, (1/x)' = \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2}$	12	$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$
13	$(\cos x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$	14	$(\sin u)' = \cos u \cdot u', (\cos u)' = -\sin u \cdot u'$
15	$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	16	$(\operatorname{tg} u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}, (\operatorname{ctg} u)' = -\frac{u'}{\sin^2 u}$
17	$(\arcsin x)' = -(\arccos x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	18	$(\arcsin u)' = -(\arccos u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
19	$(\operatorname{arctg} x)' = -(\operatorname{arccot} x)' = \frac{1}{1+x^2}$	20	$(\operatorname{arctg} u)' = -(\operatorname{arccot} u)' = \frac{u'}{1+u^2}$

$\frac{e^x - e^{-x}}{2}, \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ifodalar va ularning nisbatlari mos ravishda giperbolik sinus, giperbolik kosinus, giperbolik tangens va giperbolik kotangenslar deyiladi va ular mos ravishda $\operatorname{sh}x, \operatorname{ch}x, \operatorname{th}x$ va $\operatorname{cth}x$ lar bilan belgilanadi. Demak,

$$\operatorname{sh}x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{ch}x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{th}x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad \operatorname{cth}x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

Giperbolik funksiyalar uchun quyidagilar o'rinlidir:

- 1) $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$; 2) $\operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch} 2x$; 3) $\operatorname{ch} 2x = 2 \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{ch} x$;
4) $\operatorname{sh} 0 = 0$; 5) $\operatorname{ch} 0 = 1$; 6) $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$; 7) $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$;
8) $(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$; 9) $(\operatorname{cth} x)' = \frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$.

1. Agar $x = 2$, $\Delta x = 0,1$ bo'lsa, $y = x^2$ funksiyaning o'ttirmasi topilsin. J: 0,41.

2. Agar $x = 3$, $\Delta x = 0,01$ bo'lsa, $y = \frac{1}{2}x^2$ funksiyaning o'ttirmasi topilsin. J: 0,03005.

3. Agar $x = 1$, $\Delta x = 0,1$ bo'lsa, $y = 3x^3 + x - 1$ funksiyaning o'ttirmasi topilsin. J: 1,093.

4. Agar $x = 5$, $\Delta x = 0,1$ bo'lsa, $y = x^3 - 7x^2 + 8$ funksiyaning o'ttirmasi topilsin. J: 0,05.

5. Agar $x = 2$, $\Delta x = -0,02$ bo'lsa, $y = 3x^2 + 5x - 4$ funksiyaning o'ttirmasini topilsin. J: -0,3388.

6. To'g'ri chiziq bo'ylab $S = r^3$ qonuniyat bo'yicha harakatlanayotgan moddiy nuqtaning $t = 2$ sekunddagi tezligi topilsin.

7. $S = \frac{gt^2}{2}$ qonuniyat bo'yicha tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqtaning ibtiroiy t paytdagi va $t = 3$ sekund paytdagi tezligi topilsin. J: $29,4 \frac{m}{c}$.

8. Nuqta $S = \frac{1}{2}t^2 - 3t + 2$ qonuniyat bo'yicha to'g'ri chiziq bo'ylab harakat qilmoqda. Vaqtning $t = 3$ sekunddagi tezligi topilsin. J: 0.

9. Hosilaning ta'rifidan foydalanib, quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin.

1) $y = x^3$; 2) $y = x^6$; 3) $y = \sqrt{x}$; 4) $y = \sin x$;

5) $y = \frac{1}{x}$; 6) $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$; 7) $y = \frac{1}{x^2}$; 8) $y = \lg x$; 9) $y = \frac{1}{x^3}$;

10) $y = 4x^2 - 2$; 11) $y = \sqrt{2x+1}$; 12) $y = \frac{1}{2x+2}$;

13) $y = \sqrt{1+x^2}$; 14) $y = \sin 2x$.

10. Hosilani hisoblash qoidalari va hosilalar jadvalidan foydalanib quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin.

1) $y = \frac{x^4}{3} - 2x^2 + 4x - 5$; 2) $y = -x^3 + 9x^2 - x + 2$;

3) $y = \frac{x^5}{5} - \frac{2x^2}{3} + x$; 4) $y = \left(1 - \frac{x^2}{2}\right)^2$;

1) $y = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + 10$;

7) $y = 6\sqrt[3]{x} - 4\sqrt[3]{x}$;

9) $y = \frac{8}{\sqrt{x}} - \frac{6}{\sqrt{x}} + 7$;

11) $y = x - 3 \sin x + 4 \cos x$;

13) $y = x^2 \cos x + x \sin x$;

15) $y = \frac{x}{1-x}$;

17) $y = \frac{2x^2+x+5}{x^2-x+1}$;

19) $y = \frac{x^2-1}{x^2+1}$;

21) $y = \frac{\cos x}{1-\sin x}$;

23) $y = \frac{\sqrt{x}}{x^3\sqrt{x}}$;

25) $f(x) = \frac{x^2}{3} - x^2 + x$ funksiya berilgan: $f'(0)$, $f'(1)$ va $f'(-1)$ lar hisoblansin.

26) $f(x) = x^2 - \frac{1}{2x^2}$ funksiya berilgan: $f'(2)$, $-f'(-2)$ hisoblansin.

27) $f(x) = \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{x}$ funksiya berilgan: $0,01 \cdot f'(0,01)$ hisoblansin.

28) $f(x) = \frac{x}{2x-1}$ funksiya berilgan: $f'(0)$, $f'(2)$ va $f'(-2)$ hisoblansin.

29) $f(x) = \frac{\cos x}{1-\sin x}$ funksiya berilgan: $f'\left(\frac{\pi}{6}\right)$ hisoblansin.

Javoblar: 1) $y' = x^2 - 4x + 4$; 2) $y' = -3x^2 + 18x - 1$;

$$3) y' = x^4 - 2x^2 + 1; \quad 4) y' = x^3 - 2x; \quad 5) y' = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3}$$

$$6) y' = 1 - \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4} + \frac{1}{2\sqrt{x}}; \quad 7) y' = \frac{2}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x^3}}; \quad 8) y' = 1 - \sqrt{\frac{6}{x}}$$

$$9) y' = \frac{2}{x} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \right); \quad 10) y' = \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \right);$$

$$11) y' = 1 - 3 \cos x - 4 \sin x; \quad 12) y' = 1 - \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$13) y' = 3x \cos x - x^2 \sin x + \sin x; \quad 14) y' = \frac{\cos x - 2x \sin x}{2\sqrt{x}}$$

$$15) y' = \frac{2}{(1-4x)^2}; \quad 16) y' = \frac{2x}{(x^2+1)^2}; \quad 17) y' = \frac{-2x^2+2x+2}{(x^2-x-1)^2};$$

$$18) y' = \frac{1}{2\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)^2}; \quad 19) y' = \frac{4x}{(x^2+1)^2}; \quad 20) y' = \frac{2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)^2};$$

$$21) y' = \frac{1}{1-\sin^2 x}; \quad 22) y' = -\frac{2+\sin x}{(1+2\sin x)^2}; \quad 23) y' = -\frac{5}{6x^2\sqrt{x^3}};$$

$$24) y' = \frac{10x^4}{(1+x^3)^2}; \quad 25) 1, 0, 4; \quad 26) 8, 25; \quad 27) -90;$$

$$28) -1; -\frac{1}{9}; -\frac{1}{25}; \quad 29) 2.$$

11. Quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin.

$$1) y = x \ln x; \quad 2) y = \frac{1+\ln x}{x}; \quad 3) y = \lg 5x; \quad 4) y = \ln x - \frac{2}{x} - \frac{1}{2x^3}$$

$$5) y = x^3 \ln x; \quad 6) y = x^2 + 3^x; \quad 7) y = x^2 \cdot e^x; \quad 8) y = \frac{1+e^x}{1-e^x}$$

$$9) y = e^x (\sin x + \cos x).$$

$$\text{Javoblar: } 1) \ln x + 1; \quad 2) -\frac{\ln x}{x^2}; \quad 3) \frac{1}{x \ln 10}; \quad 4) \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{2x^3}; \quad 5) x^2 (3 \ln x + 1);$$

$$6) 2x + 3^x \ln 3; \quad 7) x e^x (x + 2); \quad 8) \frac{2e^x}{(1-e^x)^2}; \quad 9) 2e^x \cos x.$$

12. Quyidagi berilgan murakkab funksiyalarning hosilalari topilsin.

$$1) y = \sin 6x + \cos 6x; \quad 2) y = \cos(a - bx); \quad 3) y = \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2};$$

$$4) y = (1 - 5x)^4; \quad 5) y = 3\sqrt{(4 + 3x)^2}; \quad 6) y = \frac{1}{(1-x^2)^2};$$

$$7) y = \sqrt{1-x^2}; \quad 8) y = \sqrt{\cos 4x}; \quad 9) y = \sqrt{2x - \sin 2x};$$

$$10) y = \sin^4 x + \cos^4 x; \quad 11) y = \sin^2 x + \cos^3 x;$$

$$12) y = \lg^3 x - 3 \lg x + 3x; \quad 13) y = \sqrt[4]{1 + \cos^2 x};$$

$$14) y = \sqrt{1 + \sin 2x} - \sqrt{1 - \sin 2x}; \quad 15) y = \sin \sqrt{x};$$

$$16) y = \frac{1}{(1+\cos 4x)^2}; \quad 17) y = \operatorname{ctg}^3 \frac{x}{2}; \quad 18) y = \frac{\sin^2 x}{\cos x}; \quad 19) y = \frac{1+\sin 2x}{1-\sin 2x};$$

$$20) y = \sqrt{\frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}}; \quad 21) y = \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right);$$

$$22) y = \sqrt{x + 2\sqrt{x}} \text{ funksiya berilgan. } y'(1) \text{ topilsin.}$$

$$23) y = \sqrt{1 + \cos^2 x^2} \text{ funksiya berilgan. } y' \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) \text{ topilsin.}$$

Javoblar: 1) $6(\cos 6x - \sin 6x)$; 2) $-b \sin(a - bx)$;

$$3) \frac{1}{2} \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right); \quad 4) -20(1 - 5x)^3; \quad 5) \frac{2}{\sqrt{4+3x}}; \quad 6) \frac{10x}{(1-x^2)^2}; \quad 7) -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$8) -2 \lg 4x \sqrt{\cos 4x}; \quad 9) \frac{2 \sin^2 x}{\sqrt{2x - \sin 2x}}; \quad 10) -\sin 4x; \quad 11) \frac{3}{\sqrt{2}} \sin 2x \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right);$$

$$12) 3 \lg^2 x; \quad 13) \frac{-\sin 2x}{4\sqrt[4]{(1+\cos x)^3}}; \quad 14) \pm (\sqrt{1 + \sin 2x} - \sqrt{1 - \sin 2x})$$

"+" ishora $\cos 2x > 0$ bo'lganda, "-" ishora $\cos 2x < 0$ da,

$\cos 2x = 0$ bo'lganda y' hosila mavjud emas; 15) $\frac{\cos \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$;

$$16) \frac{20 \sin 4x}{(1+\cos 4x)^3}; \quad 17) \frac{\operatorname{ctg}^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2}}; \quad 18) \sin x (1 + \sec^2 x);$$

$$19) \frac{4 \cos 2x}{(1-\sin 2x)^2}; \quad 20) \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{2\sqrt{\frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}}}; \quad 21) \frac{1}{2} \cos x; \quad 22) \frac{1}{\sqrt{3}}; \quad 23) -\sqrt{\frac{\pi}{6}}.$$

13. Quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin:

$$1) y = \ln(x^2 + 2x); \quad 2) y = \ln(1 + \cos x); \quad 3) y = \ln \frac{x^2}{1-x^2};$$

$$4) y = \ln \frac{a^2 - y^2}{a^2 - x^2}; \quad 5) y = \operatorname{Intg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right); \quad 6) y = \ln \sqrt{\frac{1+2x}{1-2x}}$$

$$7) y = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}); \quad 8) y = \ln \frac{\cos x}{\sin^2 x} + \operatorname{Intg} \frac{x}{7}; \quad 9) y = a^{\sin x}$$

$$10) y = x^2 e^{-2x}; \quad 11) y = \sqrt{x} \cdot e^{\sqrt{x}}; \quad 12) y = e^{-x}(\sin x + \cos x)$$

$$13) y = \ln \sqrt{\frac{\sin 2x}{1 - \sin 2x}}; \quad 14) y = \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1}}; \quad 15) y = x^x$$

$$16) y = \sqrt{1 - x^2} + \arcsin x; \quad 17) y = \arcsin \sqrt{1 - 4x}$$

$$18) y = \arccos(1 - 2x); \quad 19) y = \operatorname{arctg} \frac{1+x}{1-x}; \quad 20) y = \operatorname{arctg} \sqrt{6x-1}$$

$$21) y = \arccos \frac{2}{\sqrt{x}}$$

22) $f(x) = \arcsin \frac{x-1}{x}$ funksiya berilgan: $f'(5)$ topilsin.

Javoblar: 1) $\frac{2(x+1)}{x(x+2)}$; 2) $-\operatorname{tg} \frac{x}{2}$; 3) $\frac{2}{x(1-x^2)}$; 4) $\frac{4a^4 x}{a^4 - x^4}$

5) $\frac{1}{\cos x^2}$; 6) $\frac{2}{1-4x^2}$; 7) $\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}$; 8) $-\frac{2ctg^2 x}{\sin^2 x}$; 9) $a^{\sin x} \cos x \ln a$

10) $2x(1-x)e^{-2x}$; 11) $\frac{1}{2} e^{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$; 12) $-2e^{-x} \sin x$; 13) $\frac{ctg 2x}{1 - \sin 2x}$

14) $\frac{2}{e^{4x} + 1}$; 15) $x^{\frac{1}{4}} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2}$; 16) $\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}$; 17) $-\frac{1}{\sqrt{x-4x^2}}$; 18) $\frac{1}{\sqrt{x-y}}$

19) $-\frac{1}{1+x^2}$; 20) $\frac{1}{2x\sqrt{6x-1}}$; 21) $\frac{1}{2x\sqrt{x-1}}$; 22) $\frac{1}{15}$

14. Quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin.

1) $y = \operatorname{sh}^2 x$; 2) $y = x - \operatorname{th} x$; 3) $y = 2\sqrt{\operatorname{Ch} x - 1}$;

4) $y = \operatorname{th} x + \operatorname{cth} x$; 5) $y = x - \operatorname{cth} x$; 6) $y = \frac{\operatorname{sh} 5x}{\operatorname{ch} \frac{x}{2}}$;

7) $y = \operatorname{cth}(\operatorname{tg} x) - \operatorname{th}(\operatorname{ctg} x)$; 8) $y = \operatorname{sh}^2 x + \operatorname{ch}^3 x^2$;

9) $y = \operatorname{sh} \frac{x}{2} + \operatorname{ch} \frac{x}{2}$; 10) $y = \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 4x}$;

11) $y = e^{\operatorname{ar}(\operatorname{ch} bx + \operatorname{sh} bx)}$; 12) $y = \operatorname{Intg} \frac{x}{2} + \operatorname{lnsh} \frac{x}{2}$

Javoblar: 1) $\operatorname{sh} 2x$; 2) $\operatorname{th}^2 x$; 3) $\sqrt{\operatorname{Ch} x + 1}$; 4) $-\frac{c}{\operatorname{sh}^2 2x}$;

5) $\operatorname{th}^2 x$; 6) $5\operatorname{ch} 5x \cdot \operatorname{ch} \frac{x}{3} + \frac{1}{3} \operatorname{sh} 5x \cdot \operatorname{sh} \frac{x}{3}$; 7) $-\frac{\sec^2 x}{\operatorname{sh}^2(\operatorname{tg} x)} + \frac{\operatorname{cosec}^2 x}{\operatorname{ch}^2(\operatorname{ctg} x)}$;

8) $3x(\operatorname{ch} 2x^3 + \operatorname{ch} x^2 \cdot \operatorname{sh} 2x^3)$; 9) $\frac{1}{2}(\operatorname{ch} \frac{x}{2} + \operatorname{sh} \frac{x}{2})$; 10) $4\operatorname{sh} 4x$;

11) $(a+b)e^{(a-b)x}$; 12) $\frac{1}{\sin x} + 2\operatorname{cth} \frac{x}{2}$

15. Quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin.

1) $y = x^x (x > 0)$; 2) $y = (\sin x)^{\cos x}$; 3) $y = (\cos x)^{\sin x}$;

4) $y = x^{\sin x}$; 5) $y = x^{\cos x}$; 6) $y = (\cos x)^{\sin 2x}$;

7) $y = \sqrt{x}$; 8) $y = x^{x^x}$.

Javoblar: 1) $x^x(\ln x + 1)$; 2) $(\sin x)^{\cos x} \cdot (-\sin x \cdot \ln \cos x + \frac{\cos^2 x}{\sin x})$;

3) $(\cos x)^{\sin x} \cdot (\cos x \ln \cos x - \operatorname{tg} x \sin x)$; 4) $x^{\sin x} \cdot (\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x})$;

5) $-x^{\cos x} \cdot (-\sin x \ln x + \frac{\cos x}{x})$; 6) $2\cos 2x \ln \cos x - 2\sin^2 x$;

7) $\sqrt{x} \cdot \ln \frac{x}{x}$; 8) $x^{x^x} \cdot x^x \left(\frac{1}{x} + \ln x + \ln^2 x \right)$.

2-§. Oshkormas funksiya va uning hosilasi. Parametrik shaklda berilgan funksiya va uning hosilasi

x o'zgaruvchining y funksiyasi oshkormas shaklda $F(x, y) = 0$ tenglama bilan berilgan bo'lsa, u holda y' hosilani topish uchun $F(x, y) = 0$ tenglikni ikkala qismini x bo'yicha differensiallab so'ngra y' ga nisbatan hosil bo'lgan chiziqli tenglamadan hosilani topish kerak. Ikkinchi va undan yuqoriroq tartibli hosilalar ham shu tartibda topiladi.

Agar y funksiyaning x argumentga bog'liqligi

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = f(t) \end{cases}$$

tenglama bilan berilgan bo'lsa, u holda funktsiyani parametrik shaklda berilgan deyiladi. Bu funktsiyaning hosilasi

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

formuladan topiladi.

1. Oshkoronas shaklda berilgan quyidagi funktsiyalarning hosilalari topilsin:

1) $x^2 + y^2 = 64$; 2) $y^2 = 2px$; 3) $x^2 + xy + y^2 = 6$;

4) $x^2 + y^2 - xy = 0$; 5) $x^3 + y^3 - 3axy = 0$;

6) $5x^2 + 3xy - 2y^2 + 2 = 0$.

J: 1) $-\frac{x}{y}$; 2) $\frac{p}{y}$; 3) $-\frac{2x+y}{x+2y}$; 4) $\frac{2x-y}{x-2y}$; 5) $\frac{x^2-xy}{ax-y^2}$; 6) $\frac{10x-3y}{2y-3x}$

2. $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ funktsiya berilgan. $y'(a)$ topilsin. J: $-\frac{3}{2}\sqrt{\frac{y}{x}}$

3. $e^y + xy = e$ funktsiya berilgan. y'_x ni, 0,1 nuqtadagi qiymati topilsin. J: $-\frac{1}{2}$

4. $x^2 \sin y - \cos y + \cos 2y = 0$ funktsiya berilgan $x = \frac{\pi}{2}$ bo'lganda y' hisoblansin. J: ± 2 .

5. Parametrik shaklda berilgan quyidagi funktsiyalarning hosilalari topilsin:

1) $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$; 2) $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$; 3) $\begin{cases} x = \frac{1-t}{1+t} \\ y = \frac{2t}{1+t} \end{cases}$

4) $\begin{cases} x = \frac{a \sin t}{1+b \cos t} \\ y = \frac{c \cos t}{1+b \cos t} \end{cases}$; 5) $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$; 6) $\begin{cases} x = \frac{3at}{1+t^2} \\ y = \frac{3at^2}{1+t^2} \end{cases}$

J: 1) $-\frac{b}{a} \operatorname{ctg} t$; 2) $\operatorname{ctg} \frac{t}{2}$; 3) -1 ; 4) $-\frac{a \sin t}{a(b + \cos t)}$; 5) $\frac{3}{2}t$; 6) $\frac{2t-t^4}{1-2t^2}$

6. $\begin{cases} x = k \sin t + \sin kt \\ y = k \cos t + \cos kt \end{cases}$ funktsiya berilgan y'_x ni $t=0$ da

hisoblang. J: 0.

7. $\begin{cases} x = \sin 2t \\ y = \sin^2 t \end{cases}$ funktsiya berilgan y'_x ni $t = \frac{\pi}{6}$ da hisoblang. J: $\frac{1}{2}$.

8. $\begin{cases} x = \frac{2}{3}\sqrt{2t^3} \\ y = \frac{1}{2}t^2 \end{cases}$ funktsiya berilgan y'_x ni $t = \frac{\pi}{6}$ da hisoblang.

J: 0,833.

3-§. Yuqori tartibli hosilalar

$y = f(x)$ funktsiyaning ikkinchi tartibli hosilasi deb uning birinchi tartibli hosilasidan olingan hosilaga, ya'ni (y') ga aytiladi.

Ikkinchi tartibli hosila quyidagilardan biri bilan belgilanadi:

$$y'', f''(x), \frac{d^2y}{dx^2}$$

Uchinchi tartibli hosila deb uning ikkinchi tartibli hosilasidan olingan hosilaga, ya'ni (y'') ga aytiladi.

Uchinchi tartibli hosila quyidagilardan biri bilan belgilanadi:

$$y''', f'''(x), \frac{d^3y}{dx^3}$$

$y = f(x)$ funktsiyaning n -tartibli hosilasi deb uning $(n-1)$ -tartibli hosilasidan olingan hosilaga aytiladi va u quyidagilardan biri bilan belgilanadi:

$$y^{(n)}, f^{(n)}(x), \frac{d^ny}{dx^n}$$

$F(x, y)$ ko'rinishidagi oshkormas funktsiyani ikkinchi tartibli hosilasini topish uchun birinchi tartibli hosila y' ni x bo'yicha differensiallaymiz.

$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = f(t) \end{cases}$ tenglamalar bilan berilgan funktsiyaning ikkinchi tartibli

hosilasini topish uchun y'_x hosiladan, ya'ni $\frac{y'_t}{x'_t}$ dan yana t bo'yicha hosila olamiz:

$$y''_{xx} = \left(\frac{y'_t}{x'_t}\right)' \frac{1}{x'_t} = \frac{y''_t x'_t - x''_t y'_t}{(x'_t)^3}$$

1. Quyidagi funktsiyalarning ikkinchi tartibli hosilalari topilsin:

1) $y = \sin^2 x$; 2) $y = \cos^2 x$; 3) $y = \lg x$; 4) $y = \sqrt{1+x^2}$.

J: 1) $2 \cos 2x$; 2) $-4 \sin 2x$; 3) $2 \lg x \sec^2 x$; 4) $\frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}$

2. Quyidagi funktsiyalarning uchinchi tartibli hosilalari topilsin:

1) $y = \cos^2 x$; 2) $y = \frac{1}{x^2}$; 3) $y = x \sin x$; 4) $y = x \ln x$;

5) $y = \arctg \frac{x}{a}$; 6) $y = \sqrt{x}$; 7) $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$; 8) $y = xe^{-x}$.

J: 1) $4 \sin 2x$; 2) $-\frac{24}{x^3}$; 3) $-(x \cos x + 3 \sin x)$; 4) $-\frac{1}{x^2}$;

5) $\frac{2a(3x^2-a^2)}{(x^2+a^2)^3}$; 6) $\frac{3\sqrt{x}}{8x^3}$; 7) $-\frac{1-3-5}{2^2 x^2 \sqrt{x}}$; 8) $e^{-x}(3-x)$.

3. Quyidagi funktsiyalarning n - tartibli hosilalari topilsin:

1) $y = \frac{1}{x}$; 2) $y = \cos x$; 3) $y = \sin x$;

4) $y = \ln x$; 5) $y = e^x$; 6) $y = a^x$.

J: 1) $(-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$; 2) $\cos(x + \frac{n\pi}{2})$; 3) $\sin(x + \frac{n\pi}{2})$;

4) $\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$; 5) e^x ; 6) $a^x \ln^n a$.

4. Leybnits formulasidan foydalanib quyidagi funktsiyalarning ikkinchi tartibli hosilalari topilsin:

1) $y = e^x \cos x$; 2) $y = a^x x^3$; 3) $y = x^2 \sin x$.

J: 1) $-2e^x \sin x$; 2) $xa^x(x^2 \ln^2 a + 6x \ln a + 6)$; 3) $3 \sin x + 4x \cos x - x^2 \sin x$.

5. Leybnits formulasidan foydalanib quyidagi funktsiyalarning uchinchi tartibli hosilalari topilsin:

1) $y = e^{-x} \cos x$; 2) $y = x^2 \ln x$; 3) $y = x \cos x$; 4) $y = x^2 \sin \frac{x}{a}$.

J: 1) $2e^{-x}(\sin x + \cos x)$; 2) $\frac{2}{x}$; 3) $x \sin x - 3 \cos x$.

6. $f(x) = \arcsin \frac{1}{x}$ funktsiya berilgan. $f(2)$, $f'(2)$ va $f''(2)$ lar

topilsin: J: $\frac{\pi}{6}$; $-\frac{\sqrt{3}}{6}$; $\frac{2\sqrt{3}}{36}$.

7. $y = e^x \cos x$ funktsiya $y''' + 4y = 0$ ni qanoatlantirishi isbotlansin.

8. $y = xe^{-\frac{1}{x}}$ funktsiya $x^3 y'' - xy' + y = 0$ ni qanoatlantirishi ko'rsatilsin.

9. Oshkormas holda berilgan quyidagi funktsiyalarning ikkinchi tartibli hosilalari topilsin:

1) $x^2 + y^2 = a^2$; 2) $ax + by - xy = c$; 3) $x^m y^n = 1$;

4) $\arctg y = x + y$; 5) $x^2 + xy + y^2 = a^2$; 6) $x^3 + y^3 - 3axy = 0$.

J: 1) $-\frac{a^2}{y^2}$; 2) $\frac{2(y-a)}{(x-b)^2}$; 3) $\frac{n(m+n)y}{n^2 x^2}$; 4) $-\frac{2(1-y^2)}{y^2}$; 5) $-\frac{6a^2}{(x+2y)^2}$;

6) $\frac{2a^2 xy}{(ax-y^2)^2}$

10. Parametrik shaklda berilgan quyidagi funktsiyalarning ikkinchi tartibli hosilalari topilsin:

$$1) \begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}; \quad 2) \begin{cases} x = t^2 \\ y = \frac{t^3}{3} - t \end{cases}; \quad 3) \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = \sin t \end{cases}; \quad 5) \begin{cases} x = t^2 \\ y = t + t^3 \end{cases}; \quad 6) \begin{cases} x = e^{2t} \\ y = e^{3t} \end{cases}; \quad 7)$$

$$\begin{cases} x = \arcsin t \\ y = \sqrt{1-t^2} \end{cases}$$

$$J: 1) -\frac{1}{a \sin^2 t}; \quad 2) \frac{t^2-1}{4t^3}; \quad 3) -\frac{1}{4a \sin^2 \frac{t}{2}}; \quad 4) -\frac{1}{4 \sin^2 t}; \quad 5) \frac{2t^2-1}{4t^3}$$

$$6) \frac{2}{3e^t}; \quad 7) -\sqrt{1-t^2}$$

4-§. Hosilaning geometrik ma'nosi

$y = f(x)$ egri chiziqning $(x_0; y_0)$ nuqtasida o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsienti $f(x)$ funksiya hosilasining $(x_0; y_0)$ nuqtadagi qiymatiga teng, ya'ni

$$k = \operatorname{tg} \varphi = f'(x_0) = y'|_{x=x_0} \quad (1)$$


Bu k son bahzan chiziqning $(x_0; y_0)$ nuqtadagi og'maligi xam deyiladi. Egri chiziqning $(x_0; y_0)$ nuqtasida o'tkazilgan urinmaning (1-chizma) tenglamasi:

$$y - y_0 = k(x - x_0) \quad (2)$$

normalning tenglamasi

$$y - y_0 = -\frac{1}{k}(x - x_0) \quad (3)$$

$TA = y_0 \operatorname{ctg} \varphi$, $AN = y_0 \operatorname{tg} \varphi$ kesmalar mos ravishda urinma osti va normal osti deyiladi. MT va MN kesmalarining uzunliklari esa - urinma va normal uzunliklari deyiladi.



1-chizma

1. $y = 2x^2 - 2$ parabolaning absissalari mos ravishda $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ va $x_3 = 0$ bo'lgan nuqtalariga o'tkazilgan urinmalarning burchak koeffitsientlari topilsin. ($k_1 = 4$; $k_2 = -8$; $k_3 = 0$).

2. $y = x^2$ parabolaning absissasi $x = -1$ bo'lgan nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsienti topilsin. (-2).

3. $y = x^2 + 5x - 2$ egri chiziqning $(1; 4)$ nuqtasiga o'tkazilgan urinma og'ish burchagining tangensini toping. ($\operatorname{tg} \alpha = 7$).

4. $y = x^2$ parabolaning $A(1; 1)$, $B(-1; 1)$ va $D(0; 0)$ nuqtalariga o'tkazilgan urinmalarning tenglamalari yozilsin. ($y_1 = 2x - 1$; $y_2 = -2x - 1$; $y_3 = 0$)

5. Quyidagi egri chiziq'larga ko'rsatilgan nuqtalarda o'tkazilgan urinmalarning tenglamalari yozilsin.

1) $y = x^2 + 1$ ga absissasi $x = -1$ bo'lgan nuqtada; ($J: y = -2x$);

2) $y = x - x^3$ ga $O(0; 0)$ nuqtada; ($J: y = x$);

3) $y = \sin x$ ga $A_1(\frac{\pi}{2}; 1)$ nuqtada; ($J: y = 1$);

4) $y = x^2 - 3x + 4$ ga $A(3; 4)$ nuqtada; ($J: y = 3x - 5$);

5) $y = \frac{x^2}{3}$ ga $x = -1$ nuqtada; (J: $y = x + \frac{2}{3}$);

6) $y^2 = x^3$ ga $x_1 = 0, x_2 = 1$ nuqtada; (J: $y=0, y = \pm \frac{1}{2}(3x-1)$);

7) $y = \sin x$ ga $x = \pi$ nuqtada; (J: $y = \pi - x$).

6. Quyidagi egri chiziq'larga o'tkazilgan urinma va normal tenglamalari tuzilsin:

1) $y = x^3 - 3x + 2$ egri chiziqqa $A(2; 4)$ nuqtada;

J: $9x - y - 14 = 0$ va $x + 9y - 38 = 0$;

2) $y = x^4 + 3x^2 - 16$ egri chiziqqa uning $y = 3x^2$ parabola bilan kesishgan nuqtalarida;

J: $y = -44x - 76, y = 44x - 76; y = \frac{1}{44}(x+2) + 12,$

$y = -\frac{1}{44}(x-2) + 12.$

3) $y = x^2 - 4x$ parabola ga absissasi $x = 1$ bo'lgan nuqtada

J: $2x + y + 1 = 0$ va $x - 2y - 7 = 0$

7. $y = x^3 - 3x + 5$ egri chiziqda shunday nuqta topingki, u nuqtada o'tkazilgan urinma: a) $y = -2x$ to'g'ri chiziqqa parallel;

b) $y = -\frac{x}{3}$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lsin.

J: a) $M_1\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}; 5 + \frac{8\sqrt{3}}{9}\right), M_2\left(\frac{1}{\sqrt{3}}; 5 - \frac{8\sqrt{3}}{9}\right);$ b) $M_1(-2; 3), M_2(2; 7).$

8. $y = (x+1)\sqrt[3]{3-x}$ egri chiziqqa absissasi $x_0 = -1$ bo'lgan nuqtada o'tkazilgan urinma va normal tenglamasini tuzing.

J: $y = \sqrt[3]{4}(x+1)$ va $y = -\frac{1}{\sqrt[3]{4}}(x+1).$

9. $y = \frac{0}{4+x^2}$ egri chiziqqa absissasi $x_0 = 2$ bo'lgan nuqtada o'tkazilgan urinma va normal tenglamasi tuzilsin.

J: $y = -\frac{x}{2} + 2$ va $y = 2x - 3.$

10. Quyidagi chiziq'larning kesishish burchaklari topilsin:

1) $y = 4 - x$ to'g'ri chiziq bilan $y = -\frac{x^2}{2}$ parabola;

2) $y = \sin x$ sinusoida bilan $y = \cos x$ k sinusoidani;

3) $x^2 + 4y^2 = 4$ ellips bilan $4y = 4 - 5x^2$ parabola;

4) $y = 8 - x^2$ va $y = x^2$ parabolalarni;

5) $2y = x^2$ va $2y = 8 - x^2$ parabolalarni.

J: 1) $\varphi_1 = 45^\circ$ va $\varphi_2 \approx 18,5^\circ$; 2) $\varphi = \arctg 2\sqrt{2}$; 3) $\varphi \approx 92^\circ$;

4) $\varphi_1 = \arctg\left(-\frac{8}{15}\right)$ va $\varphi_2 = \arctg \frac{8}{15}$; 5) $\varphi = \arctg \frac{4}{3}$.

11. $\begin{cases} x = t^2 + 3t - 8 \\ y = 2t^2 - 2t - 5 \end{cases}$ egri chiziqning $M(2; -1)$ nuqtasiga

o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsienti topilsin. J: $k = \frac{6}{7}$

12. $\begin{cases} x = t - 1 \\ y = t^2 - 12t + 1 \end{cases}$ egri chiziqning qaysi nuqtalariga

o'tkazilgan urinmalar: 1) OX o'qiga; 2) $9x + y + 3 = 0$ to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi? J: 1) $(1; -15), (-3; 17)$; 2) $(0; -10), (-2; 12).$

13. $\begin{cases} x = 2\sqrt{3} \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$ ellipsning $t = \frac{\pi}{6}$ bo'lgan nuqtasiga o'tkazilgan

urinma va normal tenglamasi topilsin. J: $x + y = 4; x - y = 2.$

14. $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ astroidaning $t = \frac{\pi}{4}$ bo'lgan nuqtasiga o'tkazilgan

urinma va normal tenglamasi topilsin. J: $\sqrt{2}(x+y) = a; y = x.$

15. $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ sikloidaga $t = \frac{3\pi}{2}$ nuqtada o'tkazilgan urinma

tenglamasi yozilsin.

16. $4x^3 - 3xy^2 + 6x^2 - 5xy - 8y^2 + 9x + 14 = 0$ egri chiziqni $M(-2; 3)$ nuqtada o'tkazilgan urinma va normal tenglamasi topilsin.

$$J: y = -\frac{9}{2}(x+2) + 3 \text{ va } y = \frac{2}{9}(x+2) + 3.$$

17. $x^5 + y^5 - 2xy = 0$ egri chiziqqa $M(1; 1)$ nuqtada o'tkazilgan urinma va normal tenglamasi topilsin. $J: x + y - 2 = 0$ va $y = x$.

5-§. Hosilaning fizik tathbiqlari

Nuqta OX o'q bo'yicha harakat qilib, vaqtning t paytida $S = f(t)$ koordinataga ega bo'lsin, u holda vaqtning t paytidagi tezlik:

$$V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt} \text{ va tezlanish: } a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt} = \frac{d^2 S}{dt^2}$$
 bo'ladi.

1. Jism $S = t^2 - t + 3$ qonun bo'yicha to'g'ri chiziqli harakat qiladi. Harakat boshlangandan 2 sek. keyingi tezlik topilsin. $J: v = 3$.

2. Jism $S = 3t^2 - 2t + 4$ qonun bo'yicha harakatlanmoqda beshinchi sekund oxirida jismning harakat tezligi qancha? $J: 28$.

3. Nuqta $S = 2t^3 + t^2 - 4$ qonuniyat bo'yicha to'g'ri chiziqli harakat qiladi. Nuqtaning $t = 4$ sek. dagi tezligi topilsin. $J: 104$.

4. $S = 6t - t^2$ qonun bo'yicha harakatlanayotgan nuqtaning tezligi qachon nolga teng bo'ladi? $J: t = 3$.

5. $S = t^3 + t^2 - 27t$ va $S = t^2 + 1$ qonuniyat bo'yicha harakatlanayotgan jismlarning tezliklari qachon teng bo'ladi? $J: t = 3$ s.

6. Massasi 8 kg bo'lgan jism $S = 2t^2 + 3t - 1$ qonun bo'yicha to'g'ri chiziqli harakat qiladi. Jismning harakat boshlangandan so'ng uchinchi sekund o'tgandagi kinetik energiyasi topilsin. $J: 900$ Dj.

7. Material nuqta $S = 2t^3 - 6t^2 + 4t$ qonun bo'yicha harakat qiladi. Nuqtaning 3-sekund oxiridagi tezlanishni toping. $J: 24 \frac{m}{s^2}$.

8. $S = t^3 + 2t^2$ qonun bo'yicha harakatlanayotgan material nuqtaning 3 sekund oxiridagi tezlanishi topilsin. $J: 22 \frac{m}{s^2}$.

9. Jism $x = \frac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t$ qonunga asosan to'g'ri chiziq bo'yicha harakat qiladi. Harakat tezligi va tezlanishi aniqlansin. $J: v = t^2 - 4t + 3; a = 2t - 4$.

10. Qandaydir kimyoviy reaksiya natijasida hosil qilinadigan jism miqdori x bilan t vaqt orasidagi bog'lanish $x = A(1 - e^{-kt})$ tenglama bilan ifodalanadi. Reaksiya tezligi topilsin. $J: \frac{dx}{dt} = Ake^{-kt}$.

6-§. Aniqmasliklar va Lopital qoidalari

Agar $x \rightarrow a$ (a - chekli yoki cheksiz son) bo'lganda $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar cheksiz kichik funksiyalar, ya'ni

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

bo'lsa, ularning $\frac{f(x)}{g(x)}$ nisbati $x \rightarrow a$ bo'lganda $\frac{0}{0}$ ko'rinishdagi aniqmaslik deyiladi.

Agar $x \rightarrow a$ (a -chekli yoki cheksiz son) bo'lganda $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar cheksiz katta funksiyalar bo'lsa, ya'ni

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$$

bo'lsa, ularning $\frac{f(x)}{g(x)}$ nisbati $x \rightarrow a$ bo'lganda $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi aniqmaslik deyiladi.

$\frac{0}{0}$ yoki $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi $\frac{f(x)}{g(x)}$ aniqmaslikning $x \rightarrow a$ dagi limitini topish aniqmaslikni ochish deyiladi.

Lopitalning I-qoidasi: $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar $x = a$ nuqta atrofida aniqlangan, differensiallanuvchi va $g'(x) \neq 0$ bo'lsin. Bundan tashqari $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar $x \rightarrow a$ shartida cheksiz kichik miqdorlar bo'lsin, ya'ni

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

bo'lsin. Bu holda, agar

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

mavjud bolsa (chekli yoki cheksiz), u holda

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

ham mavjud bo'ladi va quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Lopitalning II-qoidasi: $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar $x = a$ nuqta atrofida aniqlangan, differensiallanuvchi va $g'(x) \neq 0$ bo'lsin. Bundan tashqari $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar $x \rightarrow a$ da cheksiz katta miqdorlar bo'lsin, ya'ni

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$$

bo'lsin. Bu holda, agar

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

mavjud bo'lsa (chekli yoki cheksiz), u holda

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

ham mavjud bo'ladi va quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Agar $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ bo'lsa, $f(x) \cdot g(x)$ ko'rinishi $x \rightarrow a$ bo'lganda $0 \cdot \infty$ ko'rinishdagi aniqlanmaslik deyiladi.

Agar $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ bo'lsa, $f(x)^{g(x)}$ ($f(x) > 0$) ifoda $x \rightarrow a$ bo'lganda 1^∞ ko'rinishdagi aniqlanmaslik deyiladi.

Agar $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar uchun $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ va $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ yoki $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ va $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ bo'lsa, u holda $f(x)^{g(x)}$ ($f(x) > 0$) ifoda $x \rightarrow a$ da 0^0 yoki ∞^∞ ko'rinishdagi aniqlanmaslik deyiladi.

Agar $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar uchun $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ bo'lsa, unda $f(x) - g(x)$ ayirma $x \rightarrow a$ da $\infty - \infty$ ko'rinishdagi aniqlanmaslik deyiladi.

$0 \cdot \infty$, 1^∞ , 0^0 , ∞^∞ , $\infty - \infty$ ko'rinishdagi aniqlanmasliklar ham Lopital qoidalariga keltirish orqali ochiladi (Fransua Lopital 1661-1704 yillarda yashagan fransuz matematigi).

Aniqlanmasliklarni ochish uchun Lopital qoidasini bir necha marta qo'llash mumkin, ya'ni

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'''(x)}{g'''(x)}$$

1. Quyidagi limitlar topilsin:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}; \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{\sin 2x}; \quad 3) \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \ln x; \quad 4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 7x^2 + 4x + 2}{x^2 - 3x + 4}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x - \sin x}, \quad 6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\sin 3x}, \quad 7) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x-a}{x^n - a^n} \quad 8)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

$$9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\operatorname{ctg} x}, \quad 10) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}, \quad 11) \lim_{x \rightarrow \pi} (p - x) \operatorname{tg} \frac{x}{2} \quad 12)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{ctg} 3x}$$

$$13) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{arctg} x}{x^3}, \quad 14) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2 \sin x}{\cos 3x}, \quad 15) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \operatorname{tg} x}{\cos 2x}$$

$$16) \lim_{x \rightarrow 0} (1 - e^{2x}) \operatorname{ctg} x, \quad 17) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1 - x^2} \quad 18)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n e^{-x}$$

$$19) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x, \quad 20) \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^x.$$

1) $\frac{1}{6}$; 2) $\frac{1}{2}$; 3) 0; 4) $\frac{7}{2}$; 5) 3; 6) $\frac{5}{3}$; 7) $\frac{1}{\cos^2 \pi}$; 8) $\frac{1}{2}$; 9) 0; 10) 0; 11) 2; 12) 3; 13) $\frac{1}{3}$; 14) $\frac{1}{\sqrt{3}}$; 15) 1; 16) -2; 17) $-\frac{1}{2}$; 18) 0; 19) e^3 ; 20) 1.

7-§. Funksiyaning o'sish va kamayishi

Agar $y = f(x)$ funksiya biror (a, b) oraliqda aniqlangan va bu oraliqqa tegishli ixtiyoriy ikkita $x_1 < x_2$ nuqtalarda $f(x_1) < f(x_2)$ ($f(x_1) > f(x_2)$) tengsizlik bajarilsa, u holda y shu oraliqda o'suvchi (kamayuvchi) deyiladi.

Funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlarini birgalikda monotonlik oraliqlari deyiladi.

Differensiallanuvchi $y = f(x)$ funksiya biror (a, b) oraliqda kamayuvchi (o'suvchi) bo'lsa, u holda bu oraliqda uning hosilasi $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$) shartni qanoqlantiradi.

1. Quyidagi funksiyalarning monotonlik oraliqlarini toping:

$$1) f(x) = 2x^2 - \ln x; \quad 2) f(x) = 2x^3 - 9x^2 - 24x + 7;$$

$$3) f(x) = 4x^3 - 21x^2 + 18x + 20; \quad 4) f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x;$$

$$5) f(x) = \sqrt{(x^2 - 9)^2}; \quad 6) f(x) = \cos x - x;$$

$$7) f(x) = x^2 e^{-x}; \quad 8) f(x) = e^x + 5x;$$

$$9) f(x) = \ln(1 - x^2); \quad 10) f(x) = x(1 + 2\sqrt{x});$$

$$11) f(x) = x - 2\sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi;$$

$$12) f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1.$$

1) $(0; \frac{1}{2})$ da kamayadi, $(\frac{1}{2}; \infty)$ da o'sadi; 2) $(-\infty; -1) \cup (4; +\infty)$ da o'sadi, $(-1; 4)$ da kamayadi; 3) $(-\infty; \frac{2}{3}) \cup (3; +\infty)$ da o'sadi, $(\frac{2}{3}; 3)$ da kamayadi; 4) $(-\infty; +\infty)$ da o'sadi; 5) $(-\infty; -3]$ da kamayadi, $[-3; +\infty)$ da o'sadi; 6) $(-\infty; +\infty)$ da kamayadi; 7) $(-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$ da kamayadi, $(0; 2)$ da o'sadi; 8) $(-\infty; +\infty)$ da o'sadi; 9) $(-1; 0)$ da o'sadi, $(0; 1)$ da kamayadi; 10) $[0; +\infty)$ da o'sadi; 11) $(\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3})$ da o'sadi, $[0; \frac{\pi}{3}] \cup (\frac{5\pi}{3}; 2\pi]$ da kamayadi; 12) $(-\infty; 0) \cup (0; 1) \cup (3; +\infty)$ da o'sadi, $(1; 3)$ da kamayadi.

8-§. Funksiyaning ekstremumlari

Berilgan $y = f(x)$ funksiya x_0 nuqta va uning biror atrofida aniqlangan bo'lib, u bu atrofda ixtiyoriy x nuqtada $f(x_0) \geq f(x)$ ($f(x_0) \leq f(x)$) shartni qanoqlantirsa, y shu x_0 nuqtada lokal maksimumga (minimumga) ega deyiladi.

Funksiyaning lokal maksimum va minimum nuqtalari birgalikda uning lokal ekstremumlari deyiladi.

Ferma teoremasi: Agar $y = f(x)$ funksiya x_0 nuqtada differentsiallanuvchi va lokal ekstremumga ega bo'lsa, u holda bu nuqtada funksiyaning hosilasi $f'(x_0) = 0$ shartni qanoatlantiradi.

Funksiyaning hosilasini nolga aylantiradigan yoki mavjud qilmaydigan nuqtalar shu funksiyaning **kritik nuqtalari** deyiladi.

Lokal ekstremumning birinchi yetarli sharti: Agar $y = f(x)$ funksiya x_0 kritik nuqtaning biron atrofida differentsiallanuvchi bo'lib, bu kritik nuqtani chapdan o'unga qarab bosib o'tishda $f'(x)$ hosila o'z ishorasini musbatdan (manfiydan) manfiyga (musbatga) o'zgartirsa, u holda funksiya x_0 nuqtada maksimumga (minimumga) ega bo'ladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya hosilasi x_0 kritik nuqtaning chap va o'ng atrofida ishorasini o'zgartirmasa, bu nuqtada funksiya ekstremumga ega bo'lmaydi.

Lokal ekstremumning ikkinchi yetarli sharti: Agar x_0 kritik nuqtada $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$ va chekli bo'lsa, unda bu nuqtada $y = f(x)$ funksiya lokal ekstremumga ega bo'ladi. Jumladan, $f''(x_0) < 0$ ($f''(x_0) > 0$) bo'lsa, $f(x_0)$ funksiyaning lokal maksimumi (lokal minimumi) bo'ladi.

1. Quyidagi funksiyalarning ekstremumlari topilsin:

- 1) $y = 4x - x^2$; 2) $y = x^2 + 2x - 3$; 3) $y = \frac{x^4}{3} + x^2$;
 4) $y = x^3 + 6x^2 + 9x$; 5) $y = \frac{x^2}{x-2}$; 6) $y = x^3 + \frac{x^4}{4}$;
 7) $y = \frac{x^2}{4} - 2x^3$; 8) $y = 2x - 3\sqrt[3]{x^2}$; 9) $y = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}$;
 10) $y = xe^{-\frac{x}{2}}$; 11) $y = x - 2 \ln x$; 12) $y = x^{\frac{x}{2}}(x-5)$;

13) $y = \sin 2x - x$ ni $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ oraliqda;

14) $y = 2x + \operatorname{ctg} x$ ni $(0; \pi)$ oraliqda;

15) $y = x + \operatorname{arccotg} 2x$; 16) $y = 2 \operatorname{tg} x - \operatorname{tg}^2 x$;

17) $y = \frac{3-x^2}{x+2}$; 18) $y = \frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$;

19) $y = \sqrt{1 - \cos x}$; 20) $y = (1-x^2)(1-x^3)$.

1) $y_{\max}(2) = 4$; 2) $y_{\min}(-1) = -4$; 3) $y_{\max}(-2) = \frac{4}{3}$;

4) $y_{\min}(-1) = -4$, $y_{\max}(-3) = 0$; 5) $y_{\max}(0) = 0$, $x = 2$ da

$y = \frac{1}{2}$, $y_{\min}(4) = 8$; 6) $y_{\min}(-3) = -6,75$; 7) $y_{\min}(\pm 2) = -4$,

$y_{\max}(0) = 0$; 8) $y_{\max}(0) = 0$, $y_{\min}(1) = -1$; 9) $y_{\max}(-1) = 2$,

$y_{\min}(1) = 0$; 10) $y_{\min}(-1) = -\frac{1}{\sqrt{e}}$, $y_{\max}(1) \approx 0,6$;

11) $y_{\min}(2) = (1 - \ln 2)$; 12) $y_{\max}(2) = 0$, $y_{\min}(5) = -4,8$;

13) $y_{\max}(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}$, $y_{\min}(-\frac{\pi}{6}) = -0,34$; 14) $y_{\min}(\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2} + 1$,

$y_{\max}(\frac{3\pi}{4}) = 3,73$; 15) $y_{\min}(\frac{\pi}{4}) = 2,57$, $y_{\max}(\frac{3\pi}{4}) = 3,7$;

17) $y_{\min}(-3) = 6$, $y_{\max}(-1) = 2$; 18) $y_{\min}(-1) = \frac{1}{3}$, $y_{\max}(1) = 3$;

19) $y_{\min}(2\pi) = 0$, $y_{\max}[(2n+1)\pi] = \sqrt{2}$; 20) $y_{\max}(0) = 1$,
 $y_{\min}(1) = 0$.

2. Quyidagi funksiyalarni 2-tartibli hosila yordamida ekstremumga tekshirilsin.

1) $y = 4x - x^2$; 2) $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x$; 3) $y = x^5$;

4) $y = x^4 - 8x^2$; 5) $y = x + \cos 2x$, $(0; \frac{\pi}{4})$; 6) $y = x^2 e^{-x}$;

7) $y = 2x^3 + 6x^2 - 18x + 120$; 8) $y = 3x^4 - 4x^3$.

J: 1) $y_{\max}(2) = 4$; 2) $y_{\max}(2) = \frac{5}{2}$, $y_{\min}(3) = \frac{9}{2}$; 3) ekstremum mavjud emas; 4) $y_{\min}(-2) = -16$, $y_{\max}(0) = 0$, $y_{\min}(2) = -16$; 5) $y_{\max}\left(\frac{\pi}{12}\right) = 1,13$; 6) $y_{\min}(0) = 0$, $y_{\max}(2) = 4e^{-2}$; 7) $y_{\min}(1) = 110$, $y_{\max}(-3) = 174$; 8) $y_{\min}(1) = -1$, $y_{\max}(0) = 0$.

9-§. Funksiyaning kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari
 $[a, b]$ kesmada uzluksiz bo'lgan funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini topish uchun quyidagi ishlar bajariladi:

1. $f(x)$ funksiyaning $[a, b]$ kesma ichida yotuvchi barcha kritik nuqtalari va hosilani mavjud qilmaydigan nuqtalari topiladi.

2. Bu nuqtalarda funksiyaning qiymatlari topiladi.

3. $[a, b]$ kesmaning chetki nuqtalaridagi funksiyaning qiymatlari topiladi.

4. Topilgan barcha qiymatlardan eng kattasi va eng kichigi ajratiladi.

Eslatma. Agar $f(x)$ funksiyaning kritik nuqtalari $[a, b]$ kesmaga tegishli bo'lmasa, u holda $f(a)$ va $f(b)$ lar topiladi.

1. Quyidagi funksiyalarning ko'rsatilgan kesmalardagi eng katta va eng kichik qiymatlari topilsin.

- 1) $y = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2$ ni $[-2; 4]$ kesmadagi;
- 2) $y = x^2 - 3x^2 + 3x + 2$ ni $[2; 5]$ kesmadagi;
- 3) $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 7x^2 + 24x + 1$ ni $[-5; 2]$ kesmadagi;
- 4) $y = x^4 + 8x^3 + 16x^2$ ni $[-3; 1]$ kesmadagi;
- 5) $y = \frac{x-1}{x+1}$ ni $[0; 4]$ kesmadagi;
- 6) $y = \arctg \frac{1-x}{1+x}$ ni $[0; 1]$ kesmadagi;

7) $y = \frac{1-x+x^2}{1+x-x^2}$ ni $[0; 1]$ kesmadagi;

8) $y = \sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1}$ ni $[0; 1]$ kesmadagi;

9) $y = x + 2\sqrt{x}$ ni $[0; 4]$ kesmadagi;

10) $y = x - 2 \ln x$ ni $[1; e]$ kesmadagi;

11) $y = 2 \sin x + \cos 2x$ ni $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ kesmadagi;

1) $f(-2) = \frac{16}{3}$ eng katta, $f(3) = -\frac{37}{4}$ eng kichik; 2) $f(2) = 4$

eng kichik, $f(5) = 67$ eng katta; 3) $y(2) = \frac{67}{3}$ eng katta,

$f(-4) = -\frac{365}{3}$ eng kichik; 4) $y(0) = 0$ eng kichik, $y(1) = 25$ eng

katta; 5) 0,6 eng katta, -1 eng kichik; 6) $\frac{\pi}{4}$ eng katta, 0 eng kichik;

7) 1 eng katta, 0,6 eng kichik; 8) 2 eng katta, $\sqrt[3]{2}$ eng kichik; 9) 8 eng

katta, 0 eng kichik; 10) $f(2) = 2(1 - \ln 2)$ eng kichik, $f(1) = 1$ eng

katta; 11) $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{2}$ eng katta, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ eng kichik.

Eng katta va eng kichik qiymatlarini topishga olib keluvchi masalalar

1. 20 soni shunday ikkita qo'shiluvchiga ajratilsinki, ularning ko'paytmasi eng katta bo'lsin. J: 10 va 10.

2. a soni shunday ikkita qo'shiluvchiga ajratilsinki, ularning ko'paytmasi eng katta bo'lsin. J: $\frac{a}{3}$ va $\frac{a}{2}$.

3. Uzunligi 120 metrlik panjara bilan bir tomondan uy bilan chegaralangan eng katta yuzaga ega to'g'ri to'rtburchak shaklidagi maydon o'rab olinishi kerak. Bu maydonning o'lchovlari aniqlansin.

J: 30×60 .

4. Asos 60 sm va balandligi 20 sm bo'lgan uchburchakka eng katta yuzli to'g'ri to'rtburchak ichki chizilgan. To'g'ri to'rtburchak yuzi topilsin. J: 30sm^2 .

5. Perimetri $2p$ bo'lgan to'g'ri to'rtburchaklar ichidan yuzi eng katta bo'lganini toping. J: Tomoni $\frac{p}{2}$ bo'lgan kvadrat.

6. Jism $S(t) = -t^3 + 9t^2 + 24t$ qonun bo'yicha to'g'ri chiziqli harakat qiladi. Vaqtning qanday paytida jism harakatining tezligi eng katta bo'ladi va tezlikning miqdori qancha bo'ladi?

$$J: t = 3, V(3) = 51 \frac{\text{m}}{\text{sek}}$$

7. Yuqoriga tik otilgan jismining harakat qonuni $S(t) = 19,6t - 4,9t^2$ tenglama bilan berilgan. Vaqtning qanday paytida jism eng yuqori balandlikda bo'ladi va bu balandlik necha metr bo'ladi?

$$J: t = 2, S(2) = 19,6$$

8. Berilgan S yuzga ega bo'lgan barcha to'g'ri to'rtburchaklar ichida eng kichik perimetrga ega bo'lganini toping. J: Kvadrat.

9. Berilgan V hajmga ega bo'lgan barcha silindrlar ichidan to'la sirti eng kichik bo'lganini toping. J: $R_S = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$; $H = 2R$.

10. Tunnelning kesimi bir tomoni yarim aylanadan iborat to'g'ri to'rtburchak shakliga ega. Kesim perimetri 18m. Yarim aylana radiusi qanday bo'lsa, kesim yuzi eng katta bo'ladi? J: $\frac{18}{\pi+4} \approx 2,5$.

11. Tomoni 60sm bo'lgan kvadrat shaklidagi tikning to'rtala uchidan kattaligi bir xil kvadratlar kesib olinib, qolgan qismidan ushbu ochiq quti yasalgan. Quti hajmi eng katta bo'lishi uchun kesib tashlangan kvadratning tomoni qanday bo'lishi kerak? J: 10 sm.

12. Tubi kvadrat shaklida, hajmi 32 m^3 ga teng ochiq xovuzning devorlari qanday bo'lganda, uning devorlari bilan tagini qoplash uchun eng kam material sarflanadi? J: $4 \times 4 \times 2$.

13. Anosning radiusi 4 dm, balandligi 6 dm bo'lgan konusga xajmi eng katta bo'lgan silindr ichki chizilgan. O'sha silindrning xajmi topilsin. J: $V = \frac{128\pi}{9} \text{ dm}^3$.

14. $A(0; 3)$ va $B(4; 5)$ nuqtalar berilgan. Ox o'qida shunday P nuqta topilsinki, $S = AP + PB$ masofa eng kichik bo'lsin. J: $x = 1,5$.

10-§. Funksiya grafigining qavariqlik va botiqlik oraliqlari.

Bukilish nuqtalar. Assimptotalar

$y = f(x)$ funksiyuning grafigi (a, b) oraliqning istalgan nuqtasida o'tkazilgan urinmadan pastda (yuqorida) yotsa, u holda funksiya grafigi shu oraliqda qavariq (botiq) deyiladi.

Funksiya grafigining qavariq qismini botiq qismidan ajratuvchi $M_0(x_0; f(x_0))$ nuqta grafigning bukilish nuqtasi deyiladi.

Funksiya grafigining qavariq yoki botiq bo'lishini yetarlilik shartlari: Agar (a, b) oraliqda differensiallanuvchi $f(x)$ funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi manfiy (musbat), ya'ni $f''(x) < 0$ ($f''(x) > 0$) bo'lsa, u holda funksiya grafigi shu oraliqda qavariq (botiq) bo'ladi.

$f''(x) = 0$ yoki $f''(x)$ majud bo'lmaydigan nuqtalar ikkinchi tur kritik nuqtalar deyiladi.

Bukilish nuqtalari mavjud bo'lishining yetarlilik shartlari: Agar x_0 nuqta $y = f(x)$ funksiya uchun ikkinchi tur kritik nuqta bo'lsa va $f''(x)$ ikkinchi tartibli hosila bu nuqtadan o'tishida ishorasini o'zgartirsa,

u holda bu funksiya grafigining x_0 absissali nuqtasi bukilish nuqta bo'ladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya grafigidagi nuqta shu grafik bo'ylab cheksiz uzoqlashganda undan biror to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa nolga intilsa, u holda bu to'g'ri chiziq funksiya grafigining asimptotasi deb ataladi.

Agar $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ bo'lsa, $x = a$ to'g'ri chiziq $y = f(x)$ funksiya grafigining vertikal asimptotasi deyiladi.

Agar $k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ va $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx]$ limitlar mavjud bo'lsa, u holda $y = kx + b$ to'g'ri chiziq $y = f(x)$ funksiyaning og'ma asimptotasi deyiladi.

Agar $k = 0$ bo'lsa, u holda gorizantal asimptotaga ega bo'lamiz.

1. Quyidagi funksiyalar grafiklarining bukilish nuqtalari topilsin:

1) $y = \frac{x^2}{6} - x^2$; 2) $y = e^{-x^2}$; 3) $y = \frac{2x}{1+x^2}$; 4) $y = 2x^{\frac{1}{2}}$

J: 1) $(2; -\frac{8}{3})$; 2) $(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}; e^{-\frac{1}{2}})$; 3) $(\pm \sqrt{3}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2})$ va $(0; 0)$;

4) $(-\frac{\ln 2}{2}; e^{-\frac{1}{\ln 2}})$.

2. Quyidagi funksiyalarning qavariqlik, botiqlik oraliqlari va bukilish nuqtalarini toping:

1) $y = x^5 + 5x - 6$; 2) $y = (x - 4)^5 + 4x + 4$;

3) $y = e^{-\frac{x^2}{x}}$; 4) $y = xe^{x^2}$;

5) $y = \ln(1 + x^2)$; 6) $y = \arctg x - x$.

J: 1) $(-\infty; 0)$ da qavariq, $(0; +\infty)$ da botiq, $M_0(0; 6)$ bukilish nuqta; 2) $(-\infty; 4)$ da botiq, $(4; +\infty)$ da qavariq, $M_0(4; 20)$ bukilish

nuqta; 3) $(-\infty; -1)$ va $(1; +\infty)$ da botiq, $(-1; 1)$ da qavariq, $M_1(-1; e^{-1})$ va $M_2(1; e^{-1})$ bukilish nuqtalar; 4) $(-\infty; -2)$ da qavariq, $(-2; +\infty)$ da botiq, $(-2; -2e^{-2})$ bukilish nuqta; 5) $(-\infty; -1)$ va $(1; +\infty)$ da qavariq, $(-1; 1)$ da botiq, $M_1(1; \ln 2)$ va $M_2(-1; \ln 2)$ bukilish nuqtalar; 6) $(-\infty; 0)$ da qavariq, $(0; +\infty)$ da botiq, $0(0; 0)$ bukilish nuqta;

1. Quyidagi funksiyalar grafiklarining asimptotalari topilsin.

1) $y = \sqrt{\frac{x}{x-2}}$; 2) $y = 3x + \arctg 5x$; 3) $y = \frac{\ln(x+1)}{x^2} + 2x$;

4) $y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-2}}$; 5) $y = \frac{x^x}{2(x+1)^2}$; 6) $y = \frac{1}{x^2}$;

7) $y = \frac{x-2}{x+4}$; 8) $y = \frac{x}{1+x^2}$; 9) $y = \frac{2x^2+x+3}{x+6}$;

10) $y = \frac{2x^2+3x\sqrt{x+2}}{2x+4}$; 11) $y = \frac{x^2+2}{2x+3}$; 12) $y = \frac{5x}{x-3}$.

J: 1) $x = 2$ va $y = 1$; 2) $x \rightarrow +\infty$ da $y = 3x + \frac{\pi}{2}$ va $x \rightarrow -\infty$ da $y = 3x - \frac{\pi}{2}$; 3) $x = 0$, $y = 2x$ va $x \rightarrow -1+0$ da $x = -1$;
4) $x = \pm 1$, $y = \pm x$; 5) $x = -1$, $y = \frac{1}{2}x + 1$; 6) $x = 0$;
7) $x = -4$, $y = 1$; 8) $y = 0$; 9) $x = -6$, $y = 2x - 11$;
10) $x = -2$; 11) $x = -\frac{3}{2}$, $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$; 12) $x = 3$, $y = 3x + 3$.

4. Quyida berilgan funksiyalarni to'la tekshiring va grafigini yasang.

1) $y = 3(\frac{x^4}{2} - x^2)$; 2) $y = -4x + x^3$;

3) $y = x^3 - 9x^2 + 24x - 15$; 4) $y = x^5 - \frac{5}{2}x^3$;

5) $y = x^4 - 8x^3 + 16x^2$; 6) $y = x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{x^4}{4}$;

$$7) y = x^4 - 2x^2 + 3;$$

$$8) y = \frac{x-1}{x^2-2x}$$

$$9) y = \frac{2x^2}{4x^2-1}$$

$$10) y = \frac{3x}{1+x^2}$$

11-§. Funksiyaning differensiali


$y = f(x)$ funksiyaning differensiali deb, funksiya o'ttirmasini ekkli o'zgaruvchi x ning o'ttirmasiga nisbatan chiziqli bo'lgan bosh qismiga aytiladi.

$y = f(x)$ funksiyaning differensial dy yoki df bilan belgilanadi.

Demak, $dy = df = f'(x)dx$ yoki $dy = y'dx$

Differensial geometrik jihatdan $y = f(x)$ funksiya grafigiga $M(x; y)$ nuqtadan o'tkazilgan urinma ordinatasining o'ttirmasiga teng (1-chizma).

Funksiyaning differensial dy o'zining Δy o'ttirmasidan Δx ga nisbatan yuqori tartibli cheksiz kichik miqdorga farq qiladi.



1-chizma

Agar $u(x)$ va $v(x)$ funksiyalar differensiallanuvchi bo'lsa, u holda differensialning ta'rif va differensiallash qoidalaridan bevosita differensialning asosiy xossalari ega bo'lamiz:

1. $d(c) = 0$ (c - o'zgarmas son)

2. $d(cu) = cdu$.

3. $d(u \pm v) = du \pm dv$.

4. $d(u \cdot v) = u'v + v'du$.

5. $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v'u - u'v}{v^2}$, $v \neq 0$

6. $df(u) = f'_u u' dx = f'(u) du$.

$y = f(x)$ funksiyaning ikkinchi tartibli differensial deb birinchi tartibli differensialdan olingan differensialga aytiladi va u

$$d^2y = d(dy)$$

tabii yoziladi.

$y = f(x)$ funksiyaning n -tartibli differensial deb $(n-1)$ -tartibli differensialdan olingan differensialga aytiladi, ya'ni

$$d^n y = d(d^{n-1}y)$$

Shunday qilib biz quyidagiga ega bo'lamiz:

$$d^2y = y'' dx^2; \quad d^3y = y''' dx^3; \quad \dots; \quad d^n y = y^{(n)} dx^n.$$

Funksiyaning dy differensiali uning Δy o'ttirmasidagi $\Delta x = dx$ ga nisbatan yuqori tartibli cheksiz miqdorga farq qiladi, shu sababli $\Delta y \approx dy$ yoki

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x)\Delta x$$

deb yozish mumkin. Undan

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

formulani hosil qilamiz. Bu formuladan taqribiy hisoblashlarda foydalanish mumkin.

1. Quyidagi funksiyalarning differensiallari topilsin:

1) $y = x^4;$

2) $y = x^3 - 3x^2 + 3x;$

3) $y = \sqrt{1+x^2};$

4) $S = \frac{\theta^2}{2};$

5) $r = 2\varphi - \sin 2\varphi;$

6) $y = \cos \frac{x}{2};$

$$7) y = \arcsin \frac{1}{x}; \quad 8) y = \ln \sin 2x; \quad 9) y = \frac{x-x^2}{1+x^2}$$

$$10) y = \ln(x + \sqrt{1+x^2}); \quad 11) y = \ln \operatorname{tg} 2x; \quad 12) y = e^{\sin 2x}$$

$$J: 1) dy = 4x^3 dx; \quad 2) dy = (3x^2 - 6x + 3) dx; \quad 3) dy = \frac{x dx}{\sqrt{1+x}}$$

$$4) ds = g dt; \quad 5) dr = 2(1 - \cos 2\varphi) d\varphi; \quad 6) dy = -\frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} dx$$

$$7) dy = -\frac{dx}{x\sqrt{x^2-2}}; \quad 8) dy = 2 \operatorname{ctg} 2x dx; \quad 9) dy = -\frac{4x dx}{(1+x^2)^2}$$

$$10) dy = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}; \quad 11) dy = \frac{dx}{\sin 4x}; \quad 12) dy = 2e^{\sin 2x} \cdot \cos 2x dx$$

2. Quyidagi funksiyalarning differensiallari hisoblansin:

1) $x = 0$, $\Delta x = 0,1$ bo'lganda $y = \ln(1 + e^{10x}) + \operatorname{arctg} x$ funksiyaning differensiali topilsin. J: $dy = 0,25$.

2) $x = -10$ va $\Delta x = 0,1$ bo'lganda $y = x(1+x)(1-x)$ funksiyaning differensiali topilsin. J: $-29,9$.

3) $\varphi = -\frac{\pi}{3}$, $d\varphi = 0,2$ bo'lganda $r = \varphi + (\varphi^2 + 1) \operatorname{arctg} \varphi$ funksiyaning differensiali topilsin. J: $-0,31$.

3. Quyidagi funksiyalarning ko'rsatilgan tartibli differensiallari topilsin:

$$1) y = 4x^5 - 7x^2 + 3, \quad d^2y \text{ topilsin. J: } (80x^3 - 14) dx^2.$$

$$2) y = 4^{-x^2}, \quad d^2y \text{ topilsin. J: } d^2y = 2^{-2x^2+1} \ln 4(2x^3 \ln 4 - 1) dx^2.$$

$$3) y = \sqrt{\ln^2 x - 4}, \quad d^2y \text{ topilsin. J: } d^2y = \frac{4 \ln x - 4 - \ln^2 x}{x^2 \sqrt{(\ln^2 x - 4)^3}}$$

$$4) y = \sin^2 x, \quad d^3y \text{ topilsin. J: } d^3y = -4 \sin 2x dx^2.$$

4. Quyidagi funksiyalarning taqribiy qiymatlarini verguldan keyingi ikki xonasigacha aniqlikda hisoblang:

$$1) y = x^2 - 4x^3 + 5x + 3 \text{ ni } x = 1,03 \text{ da;}$$

$$2) y = \sqrt{1+x} \text{ ni } x = 0,2 \text{ da;}$$

$$1) y = \sqrt[3]{\frac{1-x}{1+x}} \text{ ni } x = 0,1 \text{ da;}$$

$$4) y = \sqrt{x^2 - 7x + 10} \text{ ni } x = 0,98 \text{ da.}$$

$$J: 1) 5,00; \quad 2) 1,10; \quad 3) 1,03; \quad 4) 2,09.$$

5. Quyidagilarni taqribiy qiymatlari topilsin:

$$1) \cos 31^\circ; \quad 2) \sqrt[5]{33}; \quad 3) \sqrt[4]{17}; \quad 4) \operatorname{arctg} 0,98; \quad 5) \sin 29^\circ.$$

$$J: 1) 0,851; \quad 2) 2,0125; \quad 3) 2,031; \quad 4) 0,7754; \quad 5) 0,4848.$$

12-§. Teylor va Makloren formulalari

Agar $y = f(x)$ funksiya x_0 nuqtaning biror atrofida $(n+1)$ -tartibgacha hosilalarga ega bo'lsa ($(n+1)$ -tartibli hosila ham kiradi), u holda bu atrofning har qanday x nuqtasi uchun Teylor formulasi deb ataluvchi quyidagi formula o'rinlidir:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + R_n(x)$$

bu yerda $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ ga Teylor formulasining Lagranj shaklidagi qoldiq hadi deyiladi. Bu yerdagi ξ nuqta x va x_0 nuqtalar orasida yotadi, ya'ni

$$\xi = x_0 + \theta(x - x_0) \text{ va } 0 < \theta < 1.$$

Agar Teylor formulasida $x_0 = 0$ deb olinsa, u holda Makloren formulasi deb ataluvchi quyidagi formulaga ega bo'lamiz:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + R_n(x)$$

bu yerda $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x)^{n+1}$ — qoldiq xad, ξ nuqta x va 0 nuqtalar orasida yotadi, ya'ni $\xi = \theta x$, $0 < \theta < 1$.

Quyida ko'p uchrab turadigan funksiyalarning Makloren qatorini keltiramiz:

$$1. e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1};$$

$$2. \sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots - (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + (-1)^n \cos \theta x \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!};$$

$$3. \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots - (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + (-1)^{n+1} \cos \theta x \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!};$$

$$4. \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + R_n(x);$$

$$5. (1+x)^m - 1 = mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!} x^3 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-k+1)}{k!} x^k + R_k(x).$$

1. Teylor formulasiidan foydalanib $P(x) = x^5 - 2x^3 + x^3 - x^2 + 2x - 1$ ko'phadni $x - 1$ ning darajalari bo'yicha yoying.

2. Teylor formulasiidan foydalanib $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 5$ ko'phadni $x - 2$ zikkhadning darajalari bo'yicha yoying. J: $(x-2)^3 + 4(x-2)^2 + 7(x-2) + 11$

3. $x_0 = -1$ da $f(x) = e^x$ funksiya uchun uchinchi tartibli Teylor formulasini yozing. J: $e^x = \frac{1}{e} + \frac{1}{e} \cdot \frac{x+1}{1!} + \frac{1}{e} \cdot \frac{(x+1)^2}{2!} + \frac{1}{e} \cdot \frac{(x+1)^3}{3!} + R_3(x)$.

4. e^x , $\sin x$, $\cos x$ va $(1+x)^m$ larning Makloren formulasi bo'yicha yoyilmalaridan foydalanib quyidagi funksiyalarni Makloren formulasi bo'yicha yoyilmalari yozilsin:

- | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1) $y = e^x$; | 2) $y = e^{\frac{x}{2}}$; | 3) $y = e^{-x^2}$ |
| 4) $y = \sin 2x$; | 5) $y = \sin 3x$; | 6) $y = \sin \frac{x}{2}$; |

$$7) y = \cos 2x \quad 8) y = \cos 3x \quad 9) y = \cos \frac{x}{2}$$

$$10) y = (1+x)^{10}; \quad 11) y = (1+x)^5; \quad 12) y = (1+x)^{2m};$$

3. e sonini 0,0001 gacha aniqlikda hisoblang. J: 2,718.

6. $\sqrt[3]{29}$ ning qiymatini 0,001 gacha aniqlikda hisoblang. J: 3,072.

7. $\cos 41^\circ$ va $\sqrt[3]{121}$ larning qiymatlarini 0,001 gacha aniqlikda hisoblang.

J: 1) 0,754; 2) 4,946.

VI BOB. ANIQMAS INTEGRAL

1.1. Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral. Aniqmas integralni bevosita hisoblash

Biror chekli yoki cheksiz oraliqdagi har bir x nuqtada differensiallanuvchi va hosilasi

$$F'(x) = f(x) \quad (1)$$

shartni qanoatlantiruvchi $F(x)$ funksiya berilgan $f(x)$ funksiya uchun boshlang'ich funksiya deyiladi.

Agar $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiya uchun boshlang'ich funksiya bo'lsa, u holda ixtiyoriy c o'zgarmas son uchun $f(x) + c$ funksiya ham $f(x)$ funksiya uchun boshlang'ich funksiya bo'ladi. Chunki,

$$(F(x) + c)' = F'(x) + (c)' = f(x) + 0 = f(x)$$

Agar $f(x)$ funksiya biror (a, b) oraliqda $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lsa u holda $F(x) + c$ funksiyalar to'plami $f(x)$ funksiyaning aniqmas integrali deyiladi.

$f(x)$ funksiyaning aniqmas integrali $\int f(x) dx$ kabi yoziladi. Demak, ta'rifga asosan,

$$\int f(x) dx = F(x) + c \quad (2)$$

bu yerda \int - aniqmas integral belgisi, $f(x)$ - aniqmas integral ostidagi funksiya $f(x) dx$ - aniqmas integral ostidagi ifoda, x - integrallash o'zgaruvchisi deyiladi. Berilgan $f(x)$ funksiyaning $\int f(x) dx$ aniqmas integralini to'pish amali bu funksiyani integrallash deyiladi.

Aniqmas integral bir qator xossalarga ega:

$$1. (\int f(x) dx)' = f(x), \quad 2. d(\int f(x) dx) = f(x) dx.$$

$$3. \int F'(x) dx = F(x) + c, \quad 4. \int dF(x) = F(x) + c,$$

$$5. \int kf(x) dx = k \int f(x) dx,$$

$$6. \int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$$

$$7. \int f(x) dx = F(x) + c \text{ bo'lsa, } \int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + c.$$

Aniqmas integrallarni hisoblashda quyidagi jadvallardan foydalaniladi:

$$1. \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \quad (\alpha \neq -1), \quad 2. \int dx = x + c.$$

$$3. \int x dx = \frac{x^2}{2} + c, \quad 4. \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + c.$$

$$5. \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + c, \quad 6. \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c.$$

$$7. \int e^x dx = e^x + c, \quad 8. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c.$$

$$9. \int \sin x dx = -\cos x + c, \quad 10. \int \cos x dx = \sin x + c.$$

$$11. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + c \quad \left(x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right).$$

$$12. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + c \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}).$$

$$13. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + c \quad \left(x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right).$$

$$14. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + c \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}).$$

$$15. \int \frac{dx}{1+x^2} = \begin{cases} \operatorname{arctg} x + c \\ -\operatorname{arccot} x + c \end{cases}, \quad 16. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} \arcsin x + c \\ -\arccos x + c \end{cases}.$$

$$17. \int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c, \quad 18. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+a^2} \right| + c.$$

$$19. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + c, \quad 20. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \operatorname{arcsin} \frac{x}{a} + c.$$

Bu yerda keltirilgan integrallarning to'g'riligini tenglikning o'ng tomonidan hosila olish orqali tekshiriladi.

Berilgan funksiyaning integralini integralning xossalari va jadvallari yordamida topilsa, u holda bunga bevosita hisoblash deyiladi.

Ba'zi aniqmas integrallarni hisoblashda differensial belgisi ostiga kiritish usulidan ham foydalanish mumkin.

Masalan, $dx = \frac{1}{k} d(kx + a)$ (a va k - o'zgarmas sonlar), $\cos x dx = d(\sin x)$, $\frac{dx}{x} = d(\ln|x|)$, $\frac{dx}{\cos^2 x} = d(\operatorname{tg} x)$, $\frac{dx}{1+x^2} = d(\operatorname{arctg} x)$ va hokazo.

1. Hosilasi $y' = 4x - 3$ bo'lgan va $x = 2$ da $y = 6$ qiymat qabul qiladigan funksiyani toping. J: $y = 2x^2 - 3x + 4$.

2. Hosilasi $y' = \sin x + \cos x$ bo'lgan va $x = \frac{\pi}{2}$ da $y = 4$ qiymat qabul qiladigan funksiyani toping. J: $y = \sin x - \cos x + 3$.

3. Agar $M(2; -4)$ nuqtadan o'tuvchi egri chiziqqa o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsienti uning har bir nuqtasida $2x - 6$ ga teng bo'lsa, shu egri chiziqning tenglamasini toping. J: $y = x^2 - 6x + 4$.

4. Moddiy nuqtaning harakat tezligi $v = 3t^2 + 2$. Agar bu nuqta $t = 2$ sekund vaqt ichida 40 m yo'l bosib o'tgan bo'lsa, uning harakat qonunini toping. J: $s = t^3 + 2t + 20$.

5. To'g'ri chiziqli harakat qilayotgan nuqtaning tezligi $v = 2\cos t$ formula bilan berilgan. Agar bu nuqta $t = \frac{\pi}{6}$ sekund momentda sanoq boshidan $S = 6$ m masofada turgan bo'lsa, uning harakat qonunini toping. J: $S = 2\sin t + 5$.

6. Jism v_0 boshlang'ich tezlik bilan yuqoriga tik otilgan. Bu jismining harakat qonunini toping. J: $S = v_0 t - \frac{gt^2}{2}$.

7. Nuqta $a = 6t + 12$ tezlanish bilan to'g'ri chiziqli harakat qilyapdi. Vaqtning $t = 0$ momentida boshlang'ich tezlik $v_0 = 6 \frac{m}{s}$, sanoq boshigacha bo'lgan masofa $s_0 = 8m$; 1) nuqtaning harakat tezligi va qonuniyatini toping; 2) $t = 2c$ momentdagi tezlanish, tezlik, va yo'lini toping. J: 1) $s = t^3 + 6t^2 + 6t + 8$; 2) $a = 24 \frac{m}{s^2}$, $v = 42 \frac{m}{s}$, $s = 52 m$.

8. Ushbu

1) $d() = 3x^2 dx$; 2) $d() = x^4 dx$; 3) $d() = -\sin x dx$;

4) $d() = -\frac{dx}{x^2}$; 5) $d() = \frac{dx}{\sin^2 x}$; 6) $d() = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

tengliklardagi bo'sh joylar mulohazalar yordamida to'ldirilsin.

J: 1) x^3 ; 2) $\frac{x^5}{5}$; 3) $\cos x$; 4) $\frac{1}{x}$; 5) $-ctgx$; 6) $\arcsin x$.

9. Bevosita hisoblashga doir quyidagi integrallar hisoblansin:

1) $\int (x^2 + 2x + \frac{1}{x}) dx$; 2) $\int (3x^4 + 4x^3 + 5\sqrt{x} + \frac{4}{x^2} + 7) dx$;

3) $\int \frac{11x^3 + 3}{x^4} dx$; 4) $\int \frac{x-2}{x^3} dx$; 5) $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx$;

6) $\int (\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}) dx$; 7) $\int \frac{(x^2+1)^2}{x^3} dx$; 8) $\int e^x (1 - \frac{e^{-x}}{x^2}) dx$;

9) $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x - \sin^2 x} dx$; 10) $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$; 11) $\int tg^2 x dx$;

12) $\int ctg^2 x dx$; 13) $\int \frac{3-2ctg^2 x}{\cos^2 x} dx$; 14) $\int \sin^2 \frac{x}{2} dx$;

13) $\int \cos^2 \frac{x}{2} dx$; 16) $\int (\frac{2}{1+x^2} - \frac{3}{\sqrt{2-x^2}}) dx$; 17) $\int \frac{x^4 dx}{1+x^2}$;

18) $\int (\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}) dx$; 19) $\int (\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2})^2 dx$; 20) $\int \frac{1-\sin^3 x}{\sin^2 x} dx$;

21) $\int \frac{x^2+3x-1}{\sqrt{x}} dx$; 22) $\int (x^2+5)^3 dx$; 23) $\int (\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{1}{x\sqrt{x}}) dx$;

24) $\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx$; 25) $\int a^x (1 + \frac{a^{-x}}{x^2}) dx$.

1) $\frac{x^5}{5} + x^2 + \ln x + c$; 2) $\frac{2x^2}{5} + x^4 + \frac{10}{3} x\sqrt{x} - \frac{4}{x} + 7x + c$;

3) $2x^5 - \frac{1}{x^2} + c$; 4) $\frac{1-x}{x^2} + c$; 5) $x(\frac{2}{3}\sqrt{x} + \frac{3}{5}\sqrt[3]{x}) + c$;

6) $2\sqrt{x} - 4\sqrt[3]{x} + c$; 7) $\frac{x^2}{2} + 2\ln x - \frac{1}{2x^2} + c$; 8) $e^x + \frac{1}{x} + c$;

9) $-ctgx - tg x + c$; 10) $tgx - ctgx + c$; 11) $tgx - x + c$;

12) $-ctgx - x + c$; 13) $3tgx + 2ctgx + c$; 14) $\frac{x}{2} - \frac{\sin x}{2} + c$;

15) $\frac{x}{2} + \frac{\sin x}{2} + c$; 16) $2 \arctg x - 3 \arcsin x + c$;

17) $\frac{x^3}{3} - x + \arctg x + c$; 18) $\ln x - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + c$;

19) $x + \sin x + c$; 20) $\cos x - ctgx + c$;

21) $\frac{2}{5} x^2 \sqrt{x} + \frac{10}{3} x\sqrt{x} - 2\sqrt{x} + c$; 22) $\frac{x^7}{7} + 3x^5 + 25x^3 + 125x + c$;

23) $3\sqrt[3]{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} + c$; 24) $-\frac{1}{x} + \arctg x + c$; 25) $\frac{a^x}{\ln a} - \frac{1}{4x^4} + c$.

10. Quyidagi integrallarni differensial belgisi ostiga kiritish usulidan foydalanib hisoblang.

1) $\int \frac{dx}{\sqrt{3x-5}}$; 2) $\int \frac{3x^2-4x}{x^3-2x^2+4} dx$;

3) $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1+x^2}}$; 4) $\int e^{-x^2} x dx$;

5) $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$; 6) $\int e^{x^2} x^2 dx$;

$$7) \int \frac{3x^2 dx}{\sqrt{1+x^2}}; \quad 8) \int \frac{x dx}{\sqrt{2-x^2}};$$

$$9) \int \frac{\sin x dx}{\sqrt{1+2\cos x}}; \quad 10) \int \sqrt{x^2-8} \cdot x^2 dx;$$

$$11) \int \frac{x - \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx; \quad 12) \int \sqrt{x^2+1} x dx.$$

J: 1) $\frac{2}{3}\sqrt{3x-5} + c$; 2) $\ln|x^2-2x^2+4| + c$; 3) $\frac{1}{2}(\sqrt{1-x})^2 + c$;
 4) $-\frac{1}{2}e^{-x^2} + c$; 5) $2e^{\sqrt{x}} + c$; 6) $\frac{1}{3}e^{x^3} + c$; 7) $\frac{3}{2}\sqrt{(1+x^3)^2} + c$;
 8) $-\sqrt{1-x^2} + c$; 9) $-\sqrt{1+2\cos x} + c$; 10) $\frac{1}{4}\sqrt{(1+x^3)^4} + c$;
 11) $-\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2}\arcsin^2 x + c$; 12) $\frac{1}{3}\sqrt{(x^2+1)^3} + c$.

2-§. Aniqmas integralda o'zgaruvchini almashtirish. Bo'laklab integrallash

Aniqmas integralda o'zgaruvchini almashtirish quyidagicha amalga oshiriladi:

1) $x = \varphi(t)$, bunda $\varphi(t)$ — yangi o'zgaruvchi t ning differensiallanuvchi funksiyasi. Bu holda o'zgaruvchini almashtirish formulasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

2) $\varphi(x) = t$, bunda t — yangi o'zgaruvchi. Bu holda o'zgaruvchini almashtirish formulasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int f(t) dt.$$

3) Har ikkala holda ham integrallashdan so'ng eski o'zgaruvchi x ga qaytish kerak bo'ladi.

Bo'laklab integrallash usuli.

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

formulaga asoslanadi. Bu yerda u va v lar x ning integrallanuvchi funksiyalari. Bu usuldan

$$\int P_n(x) e^{ax} dx; \int P_n(x) \cos ax dx; \int P_n(x) \sin ax dx; \int P_n(x) \arcsin x dx;$$

$$\int P_n(x) \arccos x dx; \int P_n(x) \operatorname{arctg} x dx; \int P_n(x) \operatorname{arccotg} x dx;$$

$$\int P_n(x) \cos x dx; \int P_n(x) \sin x dx; \int P_n(x) \ln x dx;$$

$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx$, $\int e^{\alpha x} \sin \beta x dx$ va hokazo ko'rinishdagi integrallarni hisoblashda foydalaniladi.

1. Quyidagi integrallar hisoblansin:

O'zgaruvchini almashtirish (o'rniga qo'yish) usuli bilan hisoblanadigan integrallar.

$$1) \int \cos 3x dx; \quad 2) \int \sin \frac{x}{2} dx; \quad 3) \int e^{-3x} dx;$$

$$4) \int \frac{dx}{\cos^2 5x}; \quad 5) \int (e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}) dx; \quad 6) \int \sqrt{4x-1} dx;$$

$$7) \int \sqrt{5-6x} dx; \quad 8) \int \frac{dx}{\sqrt{3-2x}}; \quad 9) \int \frac{2x-5}{x^2-5x+7} dx;$$

$$10) \int \frac{x dx}{x^2+1}; \quad 11) \int \frac{e^{2x} dx}{1-3e^{2x}}; \quad 12) \int \frac{\sin x dx}{1+3\cos x};$$

$$13) \int \sin^2 x \cos x dx; \quad 14) \int \cos^3 x \sin x dx; \quad 15) \int \frac{\sin x}{\cos^5 x} dx;$$

$$16) \int \frac{1-2\cos x}{\sin^2 x} dx; \quad 17) \int e^{\cos x} \sin x dx; \quad 18) \int e^{x^2} x^2 dx;$$

$$19) \int e^{-x^2} x dx; \quad 20) \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx; \quad 21) \int \sqrt{x^2+1} x dx;$$

$$22) \int \sqrt{x^2-8} x^2 dx; \quad 23) \int \frac{\sin x dx}{\sqrt{1+2\cos x}}; \quad 24) \int \sqrt{1+4\sin x \cos x} dx;$$

J: 1) $\frac{1}{3} \sin 3x + c$; 2) $2\cos \frac{x}{2} + c$; 3) $-\frac{1}{3} e^{-3x} + c$; 4) $\frac{2}{5} \lg 5x + c$;

5) $2(e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}}) + c$; 6) $\frac{1}{6} (4x-1)^{\frac{3}{2}} + c$; 7) $-\frac{1}{6} (5-6x)^{\frac{3}{2}} + c$;

- 8) $-\sqrt{3-2x} + c$; 9) $\ln(x^2 - 5x + 7) + c$; 10) $\frac{1}{2}\ln(x^2 + 1) + c$
 11) $-\frac{1}{6}\ln|1 - 3e^{2x}| + c$; 12) $-\frac{1}{3}\ln|1 + 3\cos x| + c$; 13) $\frac{\sin^3 x + 1}{3} + c$
 14) $-\frac{\cos^4 x}{4} + c$; 15) $\frac{1}{2\cos^2 x} + c$; 16) $\frac{2 - \cos x}{\sin x} + c$; 17) $-e^{-\cos x} + c$
 18) $\frac{1}{2}e^{x^2} + c$; 19) $-\frac{1}{2}e^{-x^2} + c$; 20) $2e^{\sqrt{x}} + c$; 21) $\frac{1}{3}\sqrt{(x^2 + 1)^3} + c$
 22) $\frac{1}{4}\sqrt{(x^2 - 8)^4} + c$; 23) $-\sqrt{1 + 2\cos x} + c$; 24) $\frac{1}{6}(1 + 4\sin x)^{\frac{1}{3}} + c$

Quyidagi integrallar bo'laklab integrallash formulasiidan foydalanib

hisoblasin:

- 1) $\int \ln x dx$; 2) $\int \arcsin x dx$; 3) $\int \arctg x dx$;
 4) $\int x \cos x dx$; 4) $\int x \sin x dx$; 6) $\int \arccos x dx$;
 7) $\int x e^{-5x} dx$; 8) $\int \operatorname{arccot} x dx$; 9) $\int x e^{2x} dx$;
 10) $\int x^2 \cos x dx$; 11) $\int x \ln(x-1) dx$; 12) $\int x \arctg x dx$;
 13) $\int (x^2 + 1) \cos x dx$; 14) $\int \frac{x dx}{\sin^2 x}$; 15) $\int \frac{\ln x dx}{x^2}$;
 16) $\int \ln(x^2 + 1) dx$; 17) $\int \frac{x dx}{\cos^2 x}$; 18) $\int x^3 e^{-x} dx$;
 19) $\int e^x \sin x dx$; 20) $\int e^x \cos x dx$; 21) $\int x \operatorname{arccot} x dx$;
 22) $\int \frac{\arcsin x dx}{\sqrt{1+x}}$; 23) $\int \arctg \sqrt{2x-1} dx$; 24) $\int \frac{\arcsin^2 x}{\sqrt{2-x}} dx$;
 25) $\int (x^2 + 3x + 5) \cos 2x dx$; 26) $\int (x^3 + 1) \cos x dx$;
 27) $\int (3x^3 - 17)e^{2x} dx$; 28) $\int x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) dx$.

- Javoblar: 1) $x \ln|x| - x + c$; 2) $x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + c$;
 3) $x \arctg x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + c$; 4) $x \sin x + \cos x + c$;
 5) $-x \cos x + \sin x + c$; 6) $x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + c$;
 7) $-\frac{x}{5} e^{-5x} - \frac{1}{25} e^{-5x} + c$; 8) $x \operatorname{arccot} x + \frac{3}{2} \ln(1+x^2) + c$;

- 9) $\frac{1}{3} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2}\right) + c$; 10) $x^2 \sin x + 2 \cos x - 2 \sin x + c$;

11) $\frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} + x + \ln|x-1|\right) + c$;

12) $\frac{x^2+1}{2} \arctg x - \frac{x}{2} + c$; 13) $2x \cos x + (x^2 - 1) \sin x + c$;

14) $-x \operatorname{ctg} x + \ln|\sin x| + c$; 15) $-\frac{\ln|x+1|}{x} + c$;

16) $x \ln(x^2 + 1) - 2x + 2 \arctg x + c$; 17) $x \operatorname{tg} x + \ln|\cos x| + c$;

18) $-e^{-x}(x^3 + 3x^2 + 6x + 6) + c$; 19) $\frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + c$;

20) $\frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + c$; 21) $\frac{x^2}{2} \operatorname{arccot} x + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \operatorname{arccot} x + c$;

22) $2\sqrt{1+x} \arcsin x + 4\sqrt{1-x} + c$; 23) $x \arctg \sqrt{2x-1} - \frac{\sqrt{2x-1}}{2} + c$;

24) $4\sqrt{2+x} - 2\sqrt{2-x} \arcsin \frac{x}{2} + c$;

25) $\left(\frac{x}{2} + \frac{3}{4}\right) \cos 2x + \left(\frac{1}{2} x^2 + \frac{3}{2} x + \frac{9}{4}\right) \sin 2x + c$;

26) $(x^3 - 6x + 1) \sin x + (3x^2 - 6) \cos x + c$;

27) $\left(\frac{3}{2} x^3 - \frac{9}{4} x^2 + \frac{9}{4} x - \frac{77}{8}\right) e^{2x} + c$;

28) $\frac{1}{2} (x^2 - 1) \ln|x+1| - \frac{x^2}{2} \ln x + \frac{x}{2} + c$.

3-§. Trigonometrik funksiyalarni integrallash

$\int R(\sin x, \cos x) dx$ ko'rinishdagi integrallar $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ ulmashtirish bilan integrallanadi. Bu yerda

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}, \quad \cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}$$

formulalardan foydalaniladi va t ga nisbatan ratsional funksiyani integrallashga keltiriladi. Ya'ni:

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \cdot \frac{2dt}{1+t^2}$$

$\int R(\sin x) \cos x dx$, $\int R(\cos x) \sin x dx$ ko'rinishdagi integrallar mos ravishda $\sin x = t$, $\cos x dx = dt$ va $\cos x = t$, $\sin x dx = -dt$ o'rniga qo'yishlar orqali ratsional funksiyalardan olingan integrallarga keltiriladi.

$\int \sin^m x \cdot \cos^n x dx$ ko'rinishdagi integrallar m va n ning qiymatlariga qarab turlicha integrallanadi.

1) Agar n musbat va toq bo'lsa, $\cos x = t$, $\sin x = -dt$ o'rniga qo'yish bilan integrallanadi;

2) Agar m musbat va toq bo'lsa, n holda $\sin x = t$, $\cos x dx = dt$ o'rniga qo'yish bilan integrallanadi;

3) Agar $m, n \geq 0$ va musbat sonlar bo'lsa, u holda $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{1}{2} \sin 2\alpha$, $\sin^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\alpha)$, $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha)$ formulalardan foydalanib integrallanadi;

4) Agar $m, n \leq 0$ va ulardan biri toq bo'lsa, u holda surat va maxrajni $\sin x$ yoki $\cos x$ ga qo'shimcha ko'paytirish usulidan foydalanib integrallanadi (m va n larning qaysinisini toq darajadiligiga qarab);

5) Agar $m + n < 0$ va juft bo'lsa, u holda $\lg x = t$ yoki $ctgx = t$ o'rniga qo'yishdan foydalaniladi. Agar $m < 0$, $n < 0$ bo'lsa u holda sur'iy usuldan, ya'ni suratsdagi 1 ni $(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^k$ bilan almashtirilib integrallanadi. Bu yerda;

$$k = \frac{|m+n|}{2} - 1.$$

$\int tg^n x dx$ va $\int ctg^n x dx$ shakldagi integrallar ($n > 0$ — butun son) ni hisoblashda $tg^2 x$ yoki $ctg^2 x$ ko'paytuvchilarga ajratiladi va

$$tg^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 \quad \text{va} \quad ctg^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} - 1$$

formulalardan foydalaniladi. Bu integrallarni $tg x = t$ yoki $ctg x = t$ almashtirishlar bilan ham hisoblash mumkin:

$\int sec^n x dx$ va $\int cosec^n x dx$ ko'rinishdagi integrallarni hisoblashda ikki holni qarash mumkin:

a) Agar n toq bo'lsa, u holda $tg \frac{x}{2} = t$ almashtirishdan foydalaniladi;

b) Agar n juft bo'lsa, u holda $tg x = t$ o'rniga qo'yishdan foydalaniladi. Bu holatlarda $sec^2 x$ yoki $cosec^2 x$ ko'paytuvchi ajratilib $sec^2 x dx = d(tg x)$ yoki $cosec^2 x dx = d(ctg x)$ deb olinib qolgan darajalar $sec^2 x = 1 + tg^2 x$ yoki $cosec^2 x = 1 + ctg^2 x$ formulalar bo'yicha almashtiriladi.

a) $\int \sin \alpha x \cdot \cos \beta x dx$, $\int \cos \alpha x \cdot \cos \beta x dx$, $\int \sin \alpha x \cdot \sin \beta x dx$ ko'rinishidagi integrallar

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)];$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)];$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

formulalardan foydalanib hisoblanadi.

Trigonometrik funksiyalarni integrallashga doir masalalar

1. Quyidagi integrallar hisoblansin;

1) $\int \sin^3 3x dx$; 2) $\int (1 + 2 \cos x)^2 dx$; 3) $\int (1 - \sin 2x)^2 dx$;

4) $\int \cos^4 x dx$; 5) $\int \sin^4 x dx$; 6) $\int \sin^2 x \cdot \cos^2 x dx$;

7) $\int \sin^4 x \cdot \cos^4 x dx$; 8) $\int \sin^2 x \cdot \cos^4 x dx$; 9) $\int \sin^5 x dx$;

10) $\int \sin^2 x \cdot \cos^3 x dx$; 11) $\int \sin^3 x \cdot \cos^2 x dx$; 12) $\int \cos^7 x dx$;

$$13) \int (1 + 2\cos x)^3 dx; \quad 14) \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx; \quad 15) \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx;$$

$$16) \int \frac{dx}{\sin 2x}; \quad 17) \int \frac{dx}{\cos x}; \quad 18) \int \operatorname{tg}^2 x dx;$$

$$19) \int \operatorname{ctg}^3 x dx; \quad 20) \int \sin 3x \cdot \sin 5x dx; \quad 21) \int \sin 4x \cdot \cos 6x dx;$$

$$22) \int \cos 3x \cdot \cos 5x dx; \quad 23) \int \frac{\sin^2 x + 1}{\cos^2 x} dx; \quad 24) \int \frac{(\sin x - \cos x)^2}{\sin 2x} dx;$$

$$\text{Javoblar: } 1) \frac{1}{2}x - \frac{1}{12}\sin 6x + c; \quad 2) 3x + 4\sin x + \sin 2x + c;$$

$$3) \frac{3x}{2} + \cos 2x - \frac{\sin 4x}{8} + c; \quad 4) \frac{3x}{9} + \frac{\sin 2x}{4} - \frac{\sin 4x}{32} + c; \quad 5) \frac{3x}{6} - \frac{\sin 12x}{4} +$$

$$+ \frac{\sin 4x}{32} + c; \quad 6) \frac{x}{6} - \frac{\sin 4x}{32} + c; \quad 7) \frac{3x}{120} - \frac{\sin 4x}{120} + \frac{\sin 8x}{1024} + c;$$

$$8) \frac{x}{16} - \frac{\sin 4x}{64} - \frac{\sin^2 2x}{48} + c; \quad 9) -\cos x + \frac{2\cos^2 x}{3} - \frac{\cos^4 x}{5} + c;$$

$$10) \frac{\sin^2 x}{3} - \frac{\sin^4 x}{5} + c; \quad 11) -\frac{\cos^2 x}{3} + \frac{\cos^4 x}{5} + c; \quad 12) \sin x - \sin^3 x +$$

$$+ \frac{3\sin^5 x}{5} - \frac{\sin^7 x}{7} + c; \quad 13) 7x + 14\sin x + 3\sin 2x - \frac{6\sin^3 x}{3} + c;$$

$$14) -\sin x - \frac{1}{\sin x} + c; \quad 15) \cos x + \frac{1}{\cos x} + c; \quad 16) \frac{1}{2} \ln|\operatorname{tg} x| + c;$$

$$17) \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right| + c; \quad 18) \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} + \ln|\cos x| + c;$$

$$19) -\frac{\operatorname{ctg}^2 x}{2} - \ln|\sin x| + c; \quad 20) \frac{\sin 2x}{4} - \frac{\sin 6x}{16} + c;$$

$$21) -\frac{\cos 16x}{20} + \frac{\cos 2x}{3} + c; \quad 22) \frac{\sin 8x}{16} + \frac{\sin 2x}{3} + c;$$

$$23) \frac{1}{\cos x} + \cos x + \operatorname{tg} x + c; \quad 24) \frac{1}{2} \ln|\operatorname{tg} x| - x + c.$$

4-§. Giperbolik funksiyalarni integrallash

Giperbolik funksiyalarni integrallash trigonometrik funksiyalarni integrallash kabi bajariladi. Bunda quyidagi jadvaldan foydalaniladi:

$$\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + c; \quad \int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + c;$$

$$\int \frac{1}{\operatorname{sh}^2 x} dx = -\operatorname{cth} x + c; \quad \int \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} dx = \operatorname{th} x + c.$$

Bu esa hollarda $\int R(x, \sqrt{x^2 - a^2}) dx$ va $\int R(x, \sqrt{x^2 + a^2}) dx$ ko'rinishdagi integrallarni $x = a\operatorname{ch} t$ va $x = a\operatorname{sh} t$ almashtirishlar yordamida integrallanadi: bunda:

$$\text{agar } x = a\operatorname{ch} t \text{ bo'lsa, } t = \ln \left| \frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right|$$

$$\text{agar } x = a\operatorname{sh} t \text{ bo'lsa, } t = \operatorname{tg} \left| \frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{a} \right|$$

Bundan tashqari quyidagi o'rniga qo'yishdan ham foydalaniladi:

$$\text{agar } x = \operatorname{th} t \text{ bo'lsa, } t = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

1. Quyidagi integrallar hisoblan sin:

$$1) \int \operatorname{sh}^2 x dx; \quad 2) \int \operatorname{sh}^3 x dx; \quad 3) \int \operatorname{ch}^4 x dx; \quad 4) \int \operatorname{th}^2 x dx;$$

$$5) \int \operatorname{ch}^3 x \cdot \operatorname{sh} x dx; \quad 6) \int \operatorname{sh}^5 x \cdot \operatorname{ch}^3 x dx; \quad 7) \int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x \cdot \operatorname{sh} x};$$

$$8) \int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x}; \quad 9) \int \frac{dx}{\operatorname{th} x - 1}; \quad 10) \int \frac{\operatorname{sh} x dx}{\sqrt{\operatorname{ch} 2x}}; \quad 11) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 - 3}};$$

$$12) \int \operatorname{cth}^3 x dx; \quad 13) \int \operatorname{sh}^5 x \cdot \operatorname{ch}^2 x dx; \quad 14) \int \frac{\sqrt{x^2 + 4} dx}{x^2}.$$

$$J: 1) \frac{1}{4} \operatorname{sh} 2x - \frac{1}{2} x + c; \quad 2) \frac{1}{3} \operatorname{ch}^3 x - \operatorname{ch} x + c; \quad 3) \frac{5}{8} x + \frac{1}{4} \operatorname{sh} 2x +$$

$$+ \frac{1}{12} \operatorname{sh} 4x + c; \quad 4) \ln|\operatorname{ch} x| + \frac{1}{2\operatorname{ch}^2 x} + c; \quad 5) \frac{1}{4} \operatorname{ch}^4 x + c;$$

$$6) \frac{1}{64} \left(\frac{2}{3} x - \frac{1}{2} \operatorname{sh} 4x + \frac{1}{16} \operatorname{sh} 8x \right) + c; \quad 7) \ln \left| \operatorname{th} \frac{x}{2} \right| + \frac{1}{\operatorname{ch} x} + c;$$

$$8) \operatorname{arctg}(\operatorname{th} x) + c; \quad 9) -\frac{1}{2} \operatorname{sh}^2 x - \frac{1}{4} \operatorname{sh} 2x - \frac{x}{2} + c;$$

$$10) \frac{1}{\sqrt{2}} \ln|\sqrt{2} \operatorname{ch} x - \sqrt{\operatorname{ch} 2x}| + c; \quad 11) \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 - 3} + \frac{3}{2} \ln|x + \sqrt{x^2 - 3}| + c;$$

$$12) \ln|\operatorname{sh} x| - \frac{1}{2\operatorname{sh}^2 x} + c; \quad 13) \operatorname{ch}^3 x \left(\frac{1}{3} \operatorname{ch}^4 x - \frac{2}{5} \operatorname{ch} x + \frac{1}{3} \right) + c;$$

$$14) \ln|x + \sqrt{x^2 + 4}| - \frac{\sqrt{4 + x^2}}{x^2} + c.$$

5-§. Kvadrat uchhad qatnashgan integrallarni hisoblash

Kvadrat uchbad qatnashgan integrallarni quyidagi to'rtta turda bo'lamiz:

$$I. \int \frac{dx}{ax^2+bx+c}; \quad II. \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}; \quad III. \int \frac{Ax+B}{ax^2+bx+c} dx; \quad IV. \int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$$

$$I. \quad I_1 = \int \frac{dx}{ax^2+bx+c} = \int \frac{dx}{a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a}} = \int \frac{dx}{a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a^2}\right]} = \int \frac{dx}{a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - k^2\right]}$$

$$= \frac{1}{a} \int \frac{dx}{\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - k^2}$$

Oxirgi integralni usungina jadval integrallariga keltirish mumkin.

$$II. \quad I_2 = \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a}}} = \left[x + \frac{b}{2a} = t \right] = \frac{1}{\sqrt{a}} \int \frac{dx}{\sqrt{t^2 - k^2}}$$

$$III. \quad I_3 = \int \frac{Ax+B}{ax^2+bx+c} dx = \int \frac{\frac{A}{2a}(2ax+b) - \left(\frac{b-cA}{2a}\right)}{ax^2+bx+c} dx = \frac{A}{2a} \int \frac{2ax+b}{ax^2+bx+c} dx + \left(B - \frac{Ab}{2a}\right) \int \frac{dx}{ax^2+bx+c} = \frac{A}{2a} \ln|ax^2+bx+c| + \left(B - \frac{Ab}{2a}\right) \cdot I_1$$

$$IV. \quad I_4 = \int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = \frac{A}{2a} \int \frac{d(ax^2+bx+c)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} + \left(B - \frac{A}{2a}\right) \cdot I_2$$

1. Quyidagi integrallar hisoblansin.

I. $\int \frac{dx}{ax^2+bx+c}$ ko'rinishdagi integrallar.

$$1) \int \frac{dx}{x^2+2x+5}; \quad 2) \int \frac{dx}{x^2-6x-7}; \quad 3) \int \frac{dx}{x^2+x+5}; \quad 4) \int \frac{dx}{x^2+4x+10}$$

$$5) \int \frac{dx}{x^2-x-6}; \quad 6) \int \frac{dx}{x^2+3x+29}; \quad 7) \int \frac{dx}{4x^2-4x^2}; \quad 8) \int \frac{dx}{2x^2-6x+9}$$

$$J: 1) \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + c; \quad 2) \frac{1}{9} \ln \left| \frac{x-7}{x+1} \right| + c; \quad 3) \operatorname{arctg}(x+2) + c;$$

$$4) \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{2} + c; \quad 5) \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-3}{x+2} \right| + c; \quad 6) \frac{1}{5} \operatorname{arctg} \frac{x+7}{5} + c;$$

$$7) \frac{1}{4x-2} + c; \quad 8) \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{2x-3}{3} + c.$$

2. Quyidagi integrallar hisoblansin.

II. $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ ko'rinishdagi integrallar.

$$1) \int \frac{dx}{\sqrt{2x^2-8x+9}}; \quad 2) \int \frac{(5x+3)dx}{\sqrt{x^2+4x+10}}; \quad 3) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4x+5}};$$

$$4) \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-6x+5}}; \quad 5) \int \frac{dx}{\sqrt{20x-16x^2-5}}; \quad 6) \int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}};$$

$$7) \int \frac{dx}{\sqrt{2+x-x^2}}; \quad 8) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x}}; \quad 9) \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2-2x-1}}$$

$$J: 1) \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| x-2 + \sqrt{x^2-4x+\frac{9}{2}} \right| + c; \quad 2) 5\sqrt{x^2+4x+10} - 7 \ln|x+2 + \sqrt{x^2+4x+10}| + c; \quad 3) \ln|x+2 + \sqrt{x^2+4x+5}| + c;$$

$$4) \frac{1}{2} \ln|4x-3 + 2\sqrt{4x^2-6x+5}| + c; \quad 5) \frac{3}{4} \arcsin \frac{8x-5}{\sqrt{3}} + c;$$

$$6) \arcsin(x-1) + c; \quad 7) \arcsin \frac{2x-1}{3} + c; \quad 8) \ln|x-1 + \sqrt{x^2-2x}| + c;$$

$$9) \frac{1}{\sqrt{3}} \ln|3x-1 + \sqrt{9x^2-6x+3}| + c.$$

3. Quyidagi integrallar hisoblansin.

III. $\int \frac{Ax+B}{ax^2+bx+c} dx$ ko'rinishdagi integrallar.

$$1) \int \frac{x}{x^2+5x+7} dx; \quad J: \frac{1}{2} \ln(x^2+5x+7) - \frac{5}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x+5}{\sqrt{3}} + c;$$

$$2) \int \frac{x-2}{x^2-4x+9} dx; \quad J: \frac{1}{2} \ln(x^2-4x+9) - \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{\sqrt{5}} + c;$$

$$3) \int \frac{2x+1}{2x^2+x-7} dx; \quad J: \frac{1}{30} \ln \left| \frac{(3x+7)^{23}}{(x-1)^6} \right| + c;$$

$$4) \int \frac{4x-2}{x^2+2x+4} dx; \quad J: 2 \ln(x^2+3x+4) - \frac{19}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2x+3}{\sqrt{7}} + c;$$

$$5) \int \frac{3x+4}{x^2+5x} dx; \quad J: \frac{4}{5} \ln|x| + \frac{11}{5} \ln|x+5| + c;$$

$$6) \int \frac{x}{x^2+x-1} dx; \quad J: \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + c.$$

4. Quyidagi integrallar hisoblansin.

IV. $\int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ ko'rinishdagi integrallar.

$$1) \int \frac{3x-1}{\sqrt{x^2+2x+2}} dx; \quad 2) \int \frac{2-5x}{\sqrt{15^2+9x+1}} dx;$$

$$J_k = \frac{t}{2a^2(k-1)(t^2+a^2)^{k-1}} + \frac{2k-3}{2a^2(k-1)} J_{k-1}$$

Quyidagi integrallar hisoblansin:

1. $\int \frac{A}{x-a} dx$ ko'rinishdagi integrallar:

1) $\int \frac{dx}{x-7}$ $J: \ln|x-7| + C;$

2) $\int \frac{5dx}{x-4}$ $J: 5\ln|x-4| + C;$

3) $\int \frac{7dx}{2x-6}$ $J: \frac{7}{2}(\ln|x-3|) + C;$

4) $\int \frac{x^2}{x-2} dx$ $J: \frac{x^2}{3} + x^2 + 4x + 8\ln|x-2| + C;$

5) $\int \frac{x^2}{x^2-a^2} dx$ $J: \frac{x^2}{3} + \frac{a^2}{3}\ln|x^3-a^3| + C.$

2. $\int \frac{Ax}{(x-a)^k} dx$ ko'rinishdagi integrallar:

1) $\int \frac{4dx}{(x-2)^2}$ $J: -\frac{1}{x-2} + C;$

2) $\int \frac{6dx}{(x-3)^2}$ $J: -\frac{3}{(x-3)^2} + C;$

3) $\int \frac{7dx}{(x-4)^2}$ $J: -\frac{7}{3(x-4)^2} + C;$

4) $\int \frac{3dx}{(x-9)^2}$ $J: -\frac{3}{(x-9)^2} + C.$

3. $\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx$ ko'rinishdagi integrallar:

1) $\int \frac{3x-1}{x^2-4x+8} dx$ $J: \frac{3}{2}\ln|x^2-4x+8| + \frac{5}{2}\arctg \frac{x-2}{2} + C;$

2) $\int \frac{2x+7}{x^2+x-2} dx$ $J: \ln \left| \frac{(x-1)^2}{x+2} \right| + C;$

3) $\int \frac{3x+2}{2x^2+x-3} dx$ $J: \ln C(x-1)\sqrt{2x+3};$

4) $\int \frac{x-1}{x^2-5x+6} dx$ $J: \ln \frac{C(x-2)^2}{x-3};$

1) $\int \frac{4x-24}{x^2-0,2x+0,17} dx$ $J: 2\ln(x^2-0,2x+0,17) - 5\arctg \frac{10x-1}{4} + C.$

2. $\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx$ ko'rinishdagi integrallar:

1) $\int \frac{3x+2}{(x^2+2x+10)^2} dx$ $J: -\frac{3}{2(x^2+2x+10)} - \frac{x+1}{10(x^2+2x+10)} - \frac{1}{54}\arctg \frac{x+1}{3} + C;$

2) $\int \frac{x dx}{(x^2+2x+2)^2}$ $J: -\frac{1}{2} \left[\frac{x+2}{x^2+2x+2} + \arctg(x+1) \right] + C;$

3) $\int \frac{3x+5}{(x^2+2x+2)^2} dx$ $J: \frac{2x-1}{2(x^2+2x+2)} + \arctg(x+1) + C;$

4) $\int \frac{2x-3}{(x^2-4x+8)^2} dx$ $J: \frac{3x^2-18x^2+56x-128}{128(x^2-4x+8)^2} + \frac{3}{256}\arctg \frac{x-2}{2} + C.$

7-§. Ratsional kasrlarni integrallash

$R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ kasrni ratsional kasr deb ataladi. Bu yerda

$P_n(x)$ va $Q_m(x)$ lar mos ravishda n va m darajali ko'phadlar. Agar $n \leq m$ bo'lsa, kasr to'g'ri, $n > m$ bo'lsa, kasr noto'g'ri kasr bo'ladi. Bu holda bo'lish orqali uning butun qismi ajratilib so'ngra integrallanadi.

Agar $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ kasr to'g'ri bo'lsa, u holda quyidagicha ish tutiladi:

$Q_m(x)$ ko'phadni ko'paytuvchilarga ajratiladi.

$$Q_m(x) = a_0(x-\alpha_1)^{k_1} \dots (x-\alpha_p)^{k_p} (x^2+p_1x+q_1)^{s_1} \dots (x^2+p_rx+q_r)^{s_r}$$

bunda $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ lar $Q_m(x)$ ko'phadning mos ravishda k_1, k_2, \dots, k_p karrafi haqiqiy ildizlari, hammasi kvadrat uchhadlar uchun $D_i < 0$;

$k_1 + k_2 + \dots + k_p + 2s_1 + 2s_2 + \dots + 2s_r = m$; $k_1, \dots, k_p, s_1, \dots, s_r \in \mathbb{N}$ ya'ni natural sonlar; $a_0 = Q_m(x)$ ko'phaddagi x^m ning oldidagi koefitsient.

Agar $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ to'g'ri ratsional kasr maxraji $Q_m(x)$ yuqorida ko'rsatilgandek ifodalangan bo'lsa, u holda bunday kasrni I-IV

ko'rinishdagi eng sodda ratsional kasrlar yig'indisi sifatida yoyish mumkin. Bu yoyilmada $Q_m(x)$ ko'phadning har bir k karrali α ildiziga, ya'ni $(x-\alpha)^k$ ko'rinishdagi ko'paytuvchiga ushbu k ta kasrlar yig'indisi mos keladi:

$$\frac{A_1}{x-\alpha} + \frac{A_2}{(x-\alpha)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-\alpha)^k}$$

$Q_m(x)$ ko'phadning s karrali kompleks qo'shma ildizining har bir juftida, ya'ni $(x^2+px+q)^s$ ko'rinishdagi ko'paytuvchiga ushbu S ta kasrdan iborat yig'indi mos keladi:

$$\frac{M_1x+N_1}{x^2+px+q} + \frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^2} + \dots + \frac{M_sx+N_s}{(x^2+px+q)^s}$$

Bu yerda $A_1, A_2, \dots, A_k, M_1, M_2, \dots, M_s, N_1, N_2, \dots, N_s$ vaqtincha noma'lum koeffitsientlar.

Agar $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ kasrning maxraji haqiqiy va har xil ildizlarga ega bo'lsa u holda berilgan kasr faqat I-turdagi kasrlarga ajraydi.

Agar $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ kasr maxrajining ildizlari haqiqiy va ba'zilari karrali bo'lsa, u holda u I va II-turdagi sodda kasrlarga ajraladi.

Agar $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ kasr maxrajining ildizlari kompleks sonlar va turlicha bo'lsa, u holda berilgan kasr III turdagi eng sodda kasrlarga ajraladi.

Agar $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ kasr maxrajining ildizlari kompleks va karrali bo'lsa, u holda berilgan kasr III va IV turdagi kasrlarga ajraladi.

Quyidagi integrallar hisoblansin:

1. $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ kasr maxrajining ildizlari haqiqiy va har xil:

1) $\int \frac{2x^2+41x-91}{(x-1)(x-2)(x-9)} dx$ $J: \ln \left| \frac{(x-1)^4(x-9)^2}{(x+3)^7} \right| + C;$

2) $\int \frac{(5x^2+2)dx}{x^3-5x^2+4x}$ $J: \frac{1}{2} \ln|x| - \frac{7}{2} \ln|x-1| + \frac{16}{6} \ln|x-4| + C;$

3) $\int \frac{32x dx}{(2x-1)(4x^2-16x+15)}$ $J: \ln \left| \frac{(2x-1)2x-5)^2}{(2x-2)^6} \right| + C;$

4) $\int \frac{x-1}{(x-2)(x-3)} dx$ $J: \ln \frac{C(x-2)^2}{x-3};$

5) $\int \frac{2x+7}{x^2+x-2} dx$ $J: \ln \left| \frac{(x-1)^4}{x+2} \right| + C;$

6) $\int \frac{3x^2+2x-3}{x^2-x} dx$ $J: \ln \left| \frac{Cx^2(x-1)}{x+1} \right|.$

2. $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ maxrajining ildizlari haqiqiy va ba'zilari karrali

1) $\int \frac{x+2}{x^3-2x^2} dx$ $J: \frac{1}{2} + \ln \left| \frac{x-2}{x} \right| + C;$

2) $\int \frac{2x^2-5x+1}{x^3-2x^2+x} dx$ $J: \ln Cx(x-1) + \frac{2}{x-1};$

3) $\int \frac{dx}{x^4-x^2}$ $J: \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C;$

4) $\int \frac{5x-9}{x^3-4x^2+4x} dx$ $J: 2 \ln \left| \frac{C(x-2)}{x} \right| - \frac{1}{x-2};$

5) $\int \frac{(x^3-6x^2+9x+7) dx}{(x-2)^2(x-5)}$ $J: \frac{3}{2(x-2)^2} + \ln|x-5| + C;$

6) $\int \frac{x^2-2x^2+4}{x^2(x-2)^2} dx$ $J: \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x}{x-2} \right| - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2x} \right) - \frac{1}{2(x-2)} + C.$

3. $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ kasr maxrajining ildizlari kompleks va turlicha

1) $\int \frac{dx}{x^2+9}$ $J: \frac{1}{24} \ln \frac{(x+2)^2}{x^2-2x+4} + \frac{1}{4\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C;$

2) $\int \frac{3x^2+2x+1}{(x+1)^2(x^2+1)} dx$ $J: \ln \frac{\sqrt{x^2+1}}{|x+1|} - \frac{1}{x+1} + \operatorname{arctg} x + C;$

3) $\int \frac{dx}{(x^2-3)(x^2+2)}$ $J: \frac{1}{10\sqrt{3}} \ln \left| \frac{x-\sqrt{3}}{x+\sqrt{3}} \right| - \frac{1}{5\sqrt{2}} + C;$

$$4) \int \frac{dx}{x^2+4x} \quad J: \frac{1}{2} \ln \frac{|x|}{\sqrt{4+x^2}} + C;$$

$$5) \int \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2x+5)} \quad J: \frac{1}{10} \ln \frac{x^2+1}{x^2+2x+5} + \frac{1}{20} (2 \operatorname{arctg} x - 3 \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2}) + C;$$

$$6) \int \frac{x^3-6}{x^2+6x+8} dx \quad J: \ln \frac{x^2+4}{\sqrt{x^2+2}} + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} - \frac{3}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} + C;$$

4. $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ kasr maxrajining ildizlari kom'leks va kamali:

$$1) \int \frac{(2x+1)dx}{(x^2+2x+5)^2} \quad J: -\frac{x+9}{8(x^2+2x+5)} - \frac{1}{16} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C;$$

$$2) \int \frac{dx}{(x^2-6x+10)^2} \quad J: \frac{1}{8} \left[\frac{(x-3)(3x^2-20x+32)}{(x^2-6x+10)^2} + 3 \operatorname{arctg}(x-3) \right] + C;$$

$$3) \int \frac{x+1}{x^2+4x^2+2} dx \quad J: \frac{x-2}{2(x^2+2)} + \frac{\sqrt{2}}{6} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} + C;$$

$$4) \int \frac{4x dx}{(x+1)(1+x^2)^2} \quad J: \ln \frac{\sqrt{x^2+1}}{|x+1|} + \frac{x-1}{x^2+1} + C;$$

$$5) \int \frac{5x^2-12}{(x^2-6x+13)^2} dx \quad J: \frac{53}{16} \operatorname{arctg} \frac{x-3}{2} + \frac{13x-159}{8(x^2-6x+13)} + C.$$

8-§. Irratsional funksiyalarni integrallash

Quyida ba'zi bir irratsional funksiyalarni integrallash bilan tanishamiz:

1. $\int R(x, x^{\frac{m_1}{n_1}}, x^{\frac{m_2}{n_2}}, \dots, x^{\frac{m_k}{n_k}}) dx$ ko'rinishdagi integral $x = t^s$, $dx = st^{s-1} dt$ almashtirish bilan ratsional funksiyani integrallashga keltiriladi. Bu yerda s soni $\frac{m_1}{n_1}, \frac{m_2}{n_2}, \dots, \frac{m_k}{n_k}$ kasrlarning umumiy maxrajidan iborat.

2. $\int R(x, \sqrt{ax+b}) dx$ ko'rinishdagi integral $ax+b = t^n$ almashtirish bilan ratsional funksiyalarni integrallashga keltiriladi.

$$3. \int R \left[x, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{m_1}{n_1}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{m_2}{n_2}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{m_k}{n_k}} \right] dx$$

ko'rinishdagi integral $\frac{ax+b}{cx+d} = t^s$ almashtirish bilan ratsional funksiyani integrallashga keltiriladi.

4. $\int R(x, \sqrt{a^2-x^2}) dx$ ko'rinishdagi integral $x = a \sin t$ almashtirish natijasida ratsional funksiyani integrallashga keltiriladi.

5. $\int R(x, \sqrt{u^2+x^2}) dx$ ko'rinishdagi integral $x = a \operatorname{tg} t$ almashtirish yordamida ratsional funksiyani integrallashga keltiriladi.

6. $\int x^m (a+bx^n)^p dx$ ko'rinishdagi integrallar (m, n, p - ratsional sonlar) differensial binomlari integrallari deb atalib u quyidagi 3 ta holdagina elementer funksiyalar orqali ifodalanadi:

a) agar p -butun son bo'lsa, u holda integral $x = t^s$ o'rniga qo'yish yordamida (hunda s -kasrlar maxrajlari m va n ning eng kichik umumiy kasrali) ratsional funksiya integraliga keltiriladi;

b) agar $\frac{m+1}{n}$ - butun son bo'lsa, u holda integral $a+bx^n = t^s$ o'rniga qo'yish orqali ratsionallashtiriladi. Bunda s - soni p kasrning maxraji;

c) $\frac{m+1}{n} + p$ - butun son bo'lsa, u holda $a+bx^n = t^s x^n$ deb olamiz. Bunda s - soni p kasrning maxraji.

7. $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$ ko'rinishdagi integrallar Eylerni almashtirishlari (L.Eyler shveysariyalik buyuk matematik (1707-1783)) deb ataluvchi almashtirishlar yordamida integrallanadi. Bunda quyidagi uch hol bo'lishi mumkin:

1-hol, $a > 0$ bo'lganda $\sqrt{ax^2+bx+c} = x\sqrt{a} - t$ almashtirish orqali ratsional kasrni integrallashga keltiriladi.

2-hol. $c > 0$ bo'lganda $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$ almashtirish yordamida ratsional funktsiyani integrallasga keltiriladi.

3-hol. $ax^2 + bx + c$ uchhad α va β haqiqiy ildizlarga ega bo'lsa, u holda $\sqrt{ax^2 + bx + c} = (x - \alpha)t$ almashtirish yordamida ratsional funktsiyani integrallasga keltiriladi.

Quyidagi integrallar hisoblansin:

1. Birinchi ko'rinishdagi integrallar.

$$1) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x-x^2}}; \quad J: 6 \left[\frac{\sqrt{x}}{3} - \frac{\sqrt[3]{x}}{2} + \sqrt[3]{x} - \ln(1 + \sqrt[3]{x}) \right] + C;$$

$$2) \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} dx; \quad J: x - 2\sqrt{x} + 2 \ln(\sqrt{x} + 1) + C;$$

$$3) \int \frac{1 + \sqrt[3]{x}}{x + \sqrt{x}} dx; \quad J: 4\sqrt[3]{x} + 2 \ln(1 + \sqrt{x}) - 4 \operatorname{arctg} \sqrt[3]{x} + C;$$

$$4) \int \frac{dx}{(1 + \sqrt[3]{x})\sqrt{x}}; \quad J: 6\sqrt[3]{x} - 6 \operatorname{arctg} \sqrt[3]{x} + C;$$

2. Ikkinchi ko'rinishdagi integrallar.

$$1) \int \frac{x+1}{\sqrt[3]{3x+1}} dx; \quad J: \frac{x+2}{5} \sqrt[3]{(3x+1)^2} + C;$$

$$2) \int \frac{x dx}{\sqrt{2x+1}-1}; \quad J: \frac{2x+1}{12} (2\sqrt{2x+1} - 3) + C;$$

$$3) \int \frac{x^3 dx}{1 + \sqrt[3]{x^4-1}}; \quad J: \frac{3}{4} \left[\frac{\sqrt[3]{(x^4+2)^2}}{2} - \sqrt{x^4+1} + \ln(\sqrt[3]{x^4+1}) \right] + C;$$

$$4) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{2x+1}-\sqrt{2x+1}}; \quad J: \frac{3}{2} (\sqrt[3]{2x+1} + 1)^2 + \ln|\sqrt[3]{2x+1} - 1| + C.$$

3. Uchinchi ko'rinishdagi integrallar.

$$1) \int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1+x}{x}} dx; \quad J: -\frac{2}{3} \sqrt{\left(\frac{1+x}{x}\right)^3} + C;$$

$$2) \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x-2}{x}} dx; \quad J: -2 \sqrt{\frac{x-2}{x}} - \ln \left| x \left(1 - \sqrt{\frac{x-2}{x}} \right)^2 \right| + C;$$

$$1) \int \sqrt{\frac{x}{2-x}} dx; \quad J: 2 \operatorname{arcsin} \sqrt{\frac{x}{2}} - \sqrt{2x-x^2} + C;$$

$$4) \int (x-2) \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx; \quad J: (1-0.5x)\sqrt{1-x^2} - \operatorname{arcsin} x + C.$$

4. To'rtinchi ko'rinishdagi integrallar.

$$1) \int \sqrt{a^2-x^2} dx; \quad J: 0.5 \left[x\sqrt{a^2-x^2} + a^2 \operatorname{arcsin} \frac{x}{a} \right] + C;$$

$$2) \int x^2 \sqrt{4-x^2} dx; \quad J: 2 \operatorname{arcsin} \frac{x}{2} - \frac{x}{4} (2-x^2) \sqrt{4-x^2} + C;$$

$$3) \int \sqrt{3+2x-x^2} dx; \quad J: 2 \operatorname{arcsin} \frac{x-1}{2} - \frac{(x-1)\sqrt{3+2x-x^2}}{2} + C;$$

Ko'rsatma: $3+2x-x^2 = 4 - (x-1)^2$ bo'lgani uchun $x-1 = 2 \sin t$ almashtirish qilinadi.

$$4) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(2-x^2)^3}}; \quad J: \frac{x}{\sqrt{2-x^2}} - \operatorname{arcsin} \frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

5. Beshinchi ko'rinishdagi integrallar.

$$1) \int \frac{dx}{\sqrt{(6+x^2)^3}}; \quad J: \frac{x}{4\sqrt{4+x^2}} + C;$$

$$2) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(a^2+x^2)^3}}; \quad J: \frac{x^3}{3a^2\sqrt{(a^2+x^2)^3}} + C;$$

$$3) \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x+2}}; \quad J: -\frac{\sqrt{x^2+2x+2}}{x+1} + C;$$

$$4) \int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+5}}; \quad J: \frac{\sqrt{x^2-4x+5}}{2-x} + C.$$

6. $\int x^m (a + bx^n)^p dx$ ko'rinishdagi integrallar. (1-hol: p -butun son)

$$1) \int x^{\frac{1}{2}} (1-2x^{\frac{1}{2}})^3 dx; \quad J: \frac{2}{4} \sqrt[3]{x^4} - \frac{36}{11} x^{\frac{11}{4}} - \frac{72}{7} \sqrt{x^7} - \frac{48}{17} x^{\frac{17}{4}} + C;$$

$$2) \int \sqrt[3]{x} (2+x^{\frac{1}{2}})^2 dx; \quad J: 3\sqrt[3]{x^7} + \frac{24}{11} \sqrt[3]{x^{\frac{11}{2}}} + \frac{3}{7} \sqrt[3]{x^7} + C;$$

$$3) \int x^{\frac{2}{3}} (\sqrt{x}-2)^3 dx; \quad J: \frac{6}{19} x^{\frac{19}{6}} - \frac{9}{4} \sqrt[3]{x^8} + \frac{72}{13} x^{\frac{13}{6}} - \frac{24}{5} \sqrt[3]{x^5} + C;$$

7. Quyidagi integrallar hisoblansin:

$$1) \int x^{-\frac{1}{2}}(1+x^{\frac{1}{3}})^{0.5} dx. \quad f: 2(1 + \sqrt[3]{x})^{\frac{2}{3}} + C;$$

$$2) \int x^3(1+x^2)^{0.5} dx. \quad f: \sqrt{(1+x^2)^3} \frac{(2x^2-2)}{15} + C;$$

$$3) \int \sqrt[3]{x} \sqrt{2 + \sqrt[3]{x^2}} dx. \quad f: \frac{2}{5} (\sqrt[3]{2 + \sqrt[3]{x^2}})^{\frac{5}{2}} - \frac{22}{5} (\sqrt[3]{2 + \sqrt[3]{x^2}})^{\frac{3}{2}} + C;$$

8. Quyidagi integrallar hisoblansin:

$$1) \int \frac{dx}{x^{11}\sqrt{1+x^2}}. \quad f: -\frac{\sqrt{(1+x^2)^2}}{10x^{10}} + \frac{\sqrt{(1+x^2)^2}}{3x^8} - \frac{\sqrt{1+x^2}}{2x^2} + C;$$

$$2) \int \frac{dx}{x^4\sqrt{1+x^2}}. \quad f: \frac{\sqrt{1+x^2}(2x^2-1)}{3x^3} + C;$$

$$3) \int \frac{dx}{x^2\sqrt{(1-x^2)^2}}. \quad f: -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C.$$

9. Eylerning birinchi almashtirishidan foydalanib quyidagi integrallar hisoblansin:

$$1) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+4}}. \quad f: \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+\sqrt{x^2+4}-2}{x-\sqrt{x^2+4}+2} \right| + C;$$

$$2) \int \frac{dx}{1+\sqrt{x^2+2x+2}}. \quad f: \ln(x+1+\sqrt{x^2+2x+2}) + \frac{2}{x+2+\sqrt{x^2+2x+2}} + C;$$

$$3) \int \frac{dx}{x-\sqrt{x^2+2x+4}}. \quad f: 2 \ln |\sqrt{x^2+2x+4}-x| - \frac{3}{2(\sqrt{x^2+2x+4}-x)} - \frac{3}{2} \ln |\sqrt{x^2+2x+4}-x-1| + C.$$

10. Eylerning ikkinchi almashtirishidan foydalanib quyidagi integrallar hisoblansin:

$$1) \int \frac{dx}{x-\sqrt{x^2-x+1}}. \quad f: 2 \ln |t| - \frac{1}{2} \ln |t-1| + \frac{3}{t+2} - \frac{3}{2} \ln |t+1| + C$$

(bu yerda $t = \frac{\sqrt{x^2-x+1}+1}{x}$);

$$2) \int \frac{1-\sqrt{2+\sqrt{1+x^2}}}{x\sqrt{1+x^2}} dx. \quad f: \ln \left| \frac{2\sqrt{1+x^2}-\sqrt{2}-2}{x^2} \right| + C;$$

$$1) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^3-4x+8}}. \quad f: \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x}{4-x+\sqrt{2x^3-8x+16}} \right| + C.$$

11. Eylerning uchinchi almashtirishidan foydalanib quyidagi integrallar hisoblansin:

$$1) \int \frac{dx}{\sqrt{x^3-2x-8}}. \quad f: \ln |x-1+\sqrt{x^3-2x-8}| + C;$$

$$2) \int \frac{dx}{\sqrt{1-2x-x^2}}. \quad f: 2 \arctg \sqrt{\frac{2-x}{1-x}} + C;$$

$$3) \int \frac{x dx}{(\sqrt{7x-10-x^2})^3}. \quad f: -\frac{2}{5} \left(-\frac{2}{1} + 2t \right) + C \quad (\text{bu yerda } t = \frac{\sqrt{7x-10-x^2}}{x-2}).$$

VII BOB. ANIQ INTEGRAL

1-§. Aniq integral va uni hisoblash

$y = f(x)$ funksiya $[a;b]$ kesmada aniqlangan va uzluksiz bo'lsin.

$[a, b]$ kesmani ixtiyoriy usulda

$$a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, \dots, x_{n-2}, x_{n-1}, x_n = b$$

nuqtalar yordamida n ta bo'lakka bo'lamiz. Bu bo'laklarning har birini uzunligi Δx_i ($i=1, 2, \dots, n$) orqali belgilaymiz, ya'ni

$$\Delta x_1 = x_1 - x_0, \Delta x_2 = x_2 - x_1, \Delta x_3 = x_3 - x_2, \dots, \Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \dots, \Delta x_n = x_n - x_{n-1}$$

Bu bo'laklarning har birida ixtiyoriy $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_i, \dots, \xi_n$ nuqtalarni olamiz

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad (1)$$

yig'indini tuzamiz.


S_n yig'indi $f(x)$ funksiyaning $[a; b]$ kesmadagi integral yig'indisi deyiladi.

S_n integral yig'indining Δx_i kesmalarning eng kattasi nolga intilgandagi limiti $f(x)$ funksiyadan $[a; b]$ kesmada olingan aniq integral deyiladi.

Demak,

$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx \quad (2)$$

Agar $[a; b]$ da $f(x) \geq 0$ bo'lsa, u holda (2) aniq integral $x = a, x = b, y = 0$ va $y = f(x)$ chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzidan iborat bo'ladi (1-rasm).



(2) da \int - integral belgisi, $f(x)$ - integral ostidagi funksiya, x - integrallash o'zgaruvchisi, $f(x)dx$ - integral ostidagi ifoda, $[a; b]$ kesma integrallash kesmasi, "a" va "b" sonlari integralning quyi va yuqori chegaralari deyiladi.

Aniq integral bir qator xossalarga ega:

1. $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$ (bu yerda k - o'zgarmas son).

3. $\int_a^b [f(x) \pm \varphi(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b \varphi(x)dx.$

3. Agar $[a; b]$ ($a < b$) da $f(x) \leq \varphi(x)$ bo'lsa, u holda $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b \varphi(x)dx.$

4. Agar $f(x)$ funksiyaning $[a; b]$ dagi eng kichik va eng katta qiymatlari mos ravishda m va M bo'lsa, u holda quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

5. Agar $y = f(x)$ funksiya $[a; b]$ da uzluksiz bo'lsa, u holda bu kesmada hech bo'lmaganda shunday birinchi ξ nuqta topiladiki, unda quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi:

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$

6. Agar $a < c < b$ bo'lsa, u holda quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

7. $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$

8. $\int_a^a f(x)dx = 0.$

Agar $F(x)$ funksiya $[a; b]$ da uzluksiz bo'lgan $f(x)$ funksiyaning boshlang'ichi bo'lsa, u holda quyidagi formula o'rinlidir:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

bu formulani Nyuton-Leybnits formulasi deyiladi.

Agar aniq integralni hisoblashda $f(x)$ boshlang'ich funksiyani bevosita topib bo'lmasa, u holda uni $x = \varphi(t)$ almashtirish yordamida yangi t o'zgaruvchiga o'tib integrallanadi. Bu holda quyidagi formula o'rinli bo'ladi:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt$$

bu yerda $\varphi(t)$ va $\varphi'(t)$ lar $[\alpha; \beta]$ kesmadagi uzluksiz funksiyalar, $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$.

Bu'zi hollarda $f(x)$ boshlang'ich funksiyani topishda bo'laklab integrallash formulasi deb ataluvchi quyidagi formuladan ham foydalaniladi:

$$\int_a^b u dv - uv \Big|_a^b + \int_a^b v du$$

bu yerda $u(x)$ va $v(x)$ lar $[a; b]$ kesmada differentsiallanuvchi funksiyalar.

Quyidagi integrallar hisoblansin:

- | | |
|--|---|
| 1) $\int_1^2 (x^2 + 3x - 2) dx$, $f: \frac{29}{6}$; | 2) $\int_1^2 (x^2 + \frac{1}{x^2}) dx$, $f: 2\frac{5}{6}$; |
| 3) $\int_0^a (x^2 - ax) dx$, $f: -\frac{a^3}{3}$; | 4) $\int_0^a (\sqrt[3]{x} - \sqrt{2x}) dx$, $f: -\frac{28}{3}$; |
| 5) $\int_0^1 (\sqrt{x} - \sqrt[3]{x^2}) dx$, $f: \frac{19}{15}$; | 6) $\int_1^2 \frac{dx}{2x-1}$, $f: \frac{1}{2} \ln 3$; |
| 7) $\int_2^4 \frac{dx}{(11-5x)^2}$, $f: \frac{7}{72}$; | 8) $\int_0^1 \frac{x dx}{(x^2+1)^2}$, $f: \frac{1}{4}$; |

$$9) \int \frac{dx}{\sqrt{x+9} - \sqrt{x}}, \quad f: 14.$$

Ko'rsatma: Kasning surat va maxrajini $\sqrt{x+9} + \sqrt{x}$ ga ko'paytirib.

- | | |
|--|---|
| 10) $\int_1^2 \frac{dx}{x^2-1}$, $f: \frac{1}{2} \ln \frac{2}{3}$; | 11) $\int_0^2 \frac{dx}{x^2+4x+5}$, $f: \arctg \frac{1}{7}$; |
| 12) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$, $f: \frac{\pi}{6}$; | 13) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 4x dx$, $f: \frac{1}{2}$; |
| 14) $\int_0^1 \frac{dx}{\cos^2 2x}$, $f: \frac{\sqrt{3}-1}{2}$; | 15) $\int_{-1}^1 \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$, $f: \arctg \frac{e^2-1}{2e}$; |
| 16) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t dt$, $f: \frac{5\sqrt{3}}{12}$; | 17) $\int_1^2 \frac{dx}{3x-2}$, $f: \frac{\ln 13}{3}$; |
| 18) $\int_0^1 \frac{dx}{(2x+1)^3}$, $f: \frac{2}{9}$; | 19) $\int_0^2 \frac{x+3}{x^2+4} dx$, $f: \frac{3\pi}{8} + \frac{\ln 2}{2}$; |
| 20) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} dx$, $f: 0$; | 21) $\int_0^1 \frac{x dx}{x^2+3x+2}$, $f: \ln \frac{9}{8}$; |
| 22) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin 2x dx$, $f: \frac{2}{7}$; | 23) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$, $f: \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}$; |
| 24) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(\frac{\pi}{4}-x) dx$, $f: \frac{\pi+2}{8}$; | 25) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} \cos x \cos 3x dx$, $f: 0$; |
| 26) $\int_1^2 \frac{dx}{25-x^2}$, $f: \frac{1}{5} \ln \frac{3}{2}$; | 27) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt$, $f: \frac{1}{12}(8-5\sqrt{2})$; |

$$28) \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^2 x \, dx, \quad J: 0; \quad 29) \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{64-x^2}}, \quad J: \frac{\pi}{6};$$

$$30) \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{cosec}^2 x \, dx, \quad J: 1.$$

Quyidagi integrallarni o'zgaruvchini almashtirish usulidan foydalanib hisoblang:

$$1. \int_0^{\sqrt{2}} \frac{x^2 dx}{(1+x^2)^2}, \quad J: \frac{2}{45}; \quad 2. \int_3^8 \frac{x dx}{\sqrt{1+x}}, \quad J: \frac{32}{3};$$

$$3. \int_0^5 \frac{x dx}{\sqrt{1+3x}}, \quad J: 4; \quad 4. \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{dx}{e^x - e^{-x}}, \quad J: \ln \frac{3}{2};$$

$$5. \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx, \quad J: 1 - \frac{\pi}{4}; \quad 6. \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2 dx}{(x+1)^4}, \quad J: \frac{1}{24};$$

$$7. \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx, \quad J: \frac{4 - \pi}{2}; \quad 8. \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{7}} \frac{x^2 dx}{\sqrt[4]{(x^2+1)^2}}, \quad J: 3;$$

$$9. \int_{-3}^3 x^2 \sqrt{9-x^2} dx, \quad J: \frac{81\pi}{8}; \quad 10. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x^4} dx, \quad J: \sqrt{2} - \frac{4}{9}\sqrt{3};$$

$$11. \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{5+4\cos x}, \quad J: \frac{2}{3} \operatorname{arctg} \frac{1}{3}; \quad 12. \int_{\ln 3}^{\ln 7} \frac{e^x \sqrt{e^x - 3}}{e^x + 1} dx, \quad J: 4 - \pi;$$

$$13. \int_1^7 \frac{dx}{x\sqrt{1+3x+x^2}} \left(x = \frac{1}{t}\right), \quad J: \ln \frac{5+2\sqrt{5}}{4+\sqrt{11}};$$

$$14. \int_0^3 \sqrt{\frac{x}{6-x}} dx, \quad (x = 6 \sin^2 t) \quad J: \frac{3}{2}(\pi - 2);$$

$$15. \int_0^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx, \quad J: 1 - \frac{\pi}{4}; \quad 16. \int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{(16+x^2)^3}}, \quad J: \frac{3}{80};$$

$$17. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1-x}}{x} dx, \quad J: \pi - 2; \quad 18. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{3+2\cos x}, \quad J: \frac{2}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Quyidagi integrallarni bo'laklab integrallash formulasidan foydalanib hisoblang:

$$1. \int_0^{\frac{\pi}{2}} x e^{-x} dx, \quad J: 1 - \frac{3}{e^2}; \quad 2. \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx, \quad J: \frac{\pi}{2} - 1;$$

$$3. \int_0^1 \ln(x+1) dx, \quad J: 1; \quad 4. \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x dx}{\sin^2 x}, \quad J: \frac{\pi}{30} (9 - 4\sqrt{3}) + \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2};$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x dx, \quad J: \frac{e^x - 2}{5}; \quad 6. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x dx}{\cos^2 x}, \quad J: \frac{\pi}{3} - \ln 2;$$

$$7. \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \ln x dx, \quad J: \frac{e+1}{4}; \quad 8. \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin 2x dx, \quad J: \frac{1}{5} (e^{\frac{\pi}{2}} + 2);$$

$$9. \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin \frac{x}{2} dx, \quad J: 4; \quad 10. \int_1^e \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)}, \quad J: \frac{\pi}{4}.$$

2-§. Xosmas integrallar

Berilgan $y = f(x)$ funksiya $[a; +\infty)$ cheksiz yarim oraliqda aniqlangan va ixtiyoriy chekli $b \geq a$ uchun $[a; b]$ kesmada integrallanuvchi, ya'ni

$$F(b) = \int_a^b f(x) dx$$

integral mavjud bo'lsin.

$y = f(x)$ funksiyaning $[a; +\infty)$ cheksiz yarim oraliq bo'yicha birinchi tur xosmas integrali deb yuqori chegarasi n'zgaruvchi b integralning $b \rightarrow +\infty$ bo'lgandagi limitiga aytiladi.

$y = f(x)$ funksiyaning $[a; +\infty)$ cheksiz yarim oraliq bo'yicha birinchi tur xosmas integrali

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad (1)$$

ko'rinishda yoziladi va ta'rifga asosan,

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx \quad (2)$$

kabi aniqlanadi.

Agar (2) limit mavjud va chekli bo'lsa, u holda (1) xosmas integral yaqinlashuvchi, aks holda uzoqlashuvchi deyiladi.

Agar $a \leq x < \infty$ cheksiz yarim oraliqda $0 \leq f(x) \leq g(x)$ va $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ xosmas integral yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ xosmas integral ham yaqinlashuvchi va quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \leq \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

Agar $a \leq x < \infty$ cheksiz yarim oraliqda $0 \leq g(x) \leq f(x)$ va $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ xosmas integral uzoqlashuvchi bo'lsa, u holda $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ xosmas integral ham uzoqlashuvchi bo'ladi.

Agar $x \geq a$ bo'lganda $|f(x)| \leq g(x)$ va $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ xosmas integral yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ xosmas integral ham yaqinlashuvchi va

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \leq \int_a^{+\infty} |f(x)| dx \leq \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

tengsizlik o'rinli bo'ladi.

Agar $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ xosmas integral yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ xosmas integral absolyut yaqinlashuvchi deyiladi. Agar ikkinchi integral yaqinlashuvchi, birinchi integral esa uzoqlashuvchi bo'lsa, u holda ikkinchi xosmas integral shartli yaqinlashuvchi deyiladi.

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ ham xosmas integral bo'lib, u $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ ko'rinishda aniqlanadi.

Agar $y = f(x)$ funksiya $(-\infty; +\infty)$ cheksiz oraliqda aniqlangan bo'lsa, u holda uning bu oraliq bo'yicha xosmas integrali quyidagicha aniqlanadi:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx$$

Agar $y = f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmaning biror ichki $x = c$ nuqtasida chegaralanmagan bo'lsa, u holda xosmas integral

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

kabi aniqlanadi.

Quyidagi integrallar hisoblansin:

$$1) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}; \quad 2) \int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}}; \quad 3) \int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2};$$

$$4) \int_0^{\infty} e^{-x} dx; \quad 5) \int_0^{\infty} xe^{-x^2} dx; \quad 6) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{4+x^2};$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2}; \quad 8) \int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^3+1}; \quad 9) \int_0^{+\infty} \frac{\arctg \frac{x}{2}}{4+x^2} dx;$$

$$10) \int_1^{+\infty} \frac{x dx}{\sqrt{(1+x^2)^2}}; \quad 11) \int_1^+ \frac{dx}{x^2-7x+10}; \quad 12) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x};$$

$$13) \int_1^{+\infty} \frac{\arctg x dx}{x^2}; \quad 14) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^2}; \quad 15) \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^2}.$$

J: 1) 1; 2) uzoqlashuvchi; 3) $\frac{\pi}{4}$; 4) 1; 5) $\frac{1}{2}$; 6) $\frac{\pi}{4}$; 7) π ; 8)

uzoqlashadi; 9) $\frac{3\pi^2}{64}$; 10) uzoqlashadi; 11) uzoqlashadi; 12) $\ln 2$;


13) $\frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}$; 14) $\frac{\pi-2}{8}$; 15) uzoqlashadi.

3-§. Aniq integralning geometrik tadbirlari


$y = f(x)$ funksiya grafigi, $x = a, x = b$ to'g'ri chiziqlar va OX o'qi bilan chegaralangan figura egri chiziqli trapetsiya deyiladi. Bunday egri chiziqni trapetsiyaning yuzi $f(x) \geq 0$ bo'lsa,

$$S = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b y dx$$

formula bilan hisoblanadi (1-chizma).



1-chizma



2-chizma

$y_1 = f_1(x)$ va $y_2 = f_2(x)$ ($f_2(x) \geq f_1(x)$) egri chiziqlar, hamda $x = a$ va $x = b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzi

$$S = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$$

formula bilan hisoblanadi (2-chizma).

$x_1 = \varphi_1(y)$ va $x_2 = \varphi_2(y)$ ($\varphi_2(y) \geq \varphi_1(y)$) egri chiziqlar, hamda $y = c$ va $y = d$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzi



$$S = \int_c^d [\varphi_2(y) - \varphi_1(y)] dy$$

formula bilan hisoblanadi (3-chizma).

Agar egri chiziqli trapetsiya $x = f(y)$ funksiya grafigi, $y = c$, $y = d$ to'g'ri chiziqlar va OY o'q bilan chegaralangan bo'lsa, u holda uning yuzi ($f(y) \geq 0$ uchun)

$$S = \int_c^d f(y) dy = \int_c^d x dy$$

formula bilan hisoblanadi (4-chizma).



Agar egri chiziq $x = x(t)$, $y = y(t)$ parametrik tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, u holda shu egri chiziq, $x = a$, $x = b$ to'g'ri chiziqlar va OX o'qi bilan chegaralangan egri chizikli trapetsiyaning yuzi



$$S = \int_{t_1}^{t_2} y(t)x'(t)dt = \int_{t_1}^{t_2} y(t)dx(t)$$

formula bilan hisoblanadi, bunda t_1 va t_2 lar $a = x(t_1)$, $b = x(t_2)$ ($y(t) \geq 0$) tenglamalardan topiladi.

$r = r(\varphi)$ funksiya grafigi va $\varphi = \alpha$, $\varphi = \beta$ nuqtalar bilan chegaralangan egri chizikli sektorning yuzi

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\varphi$$

formula bilan hisoblanadi (5-chizma).



Agar $y = y(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada silliq (ya'ni $y' = f'(x)$ holda uzluksiz) bo'lsa, u holda AB qismi yoyining uzunligi

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

formula bilan hisoblanadi (6-chizma).

Agar egri chiziq $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ parametrik tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, u holda egri chiziq $t \in [t_1; t_2]$ qismi yoyining uzunligi

$$l = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

formula bilan hisoblanadi.

Agar egri chiziq qutb koordinatalarida $r = r(\varphi)$ ($\alpha \leq \varphi \leq \beta$) tenglama bilan berilgan bo'lsa, u holda yoy uzunligi

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi$$

formula bilan hisoblanadi.

Agar $S(x)$ yuz binoir jismining OX o'qiga perpendikulyar tekislik bilan kesishishidan hosil bo'lgan kesimi bo'lib, u $[a; b]$ kesmada uzluksiz funksiya bo'lsa, u holda shu jismining hajmi


$$V = \int_a^b S(x) dx$$

formula bilan hisoblanadi.

$y = f(x)$ egri chiziq va $x = a, x = b, y = 0$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan egri chizikli trapetsiya OX o'qi atrofida aylantirilsa, u holda aylanish jismining hajmi

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_a^b y^2 dx$$

formula bilan hisoblanadi (7-chizma).



7-chizma

Agar $y_1 = f_1(x)$ va $y_2 = f_2(x)$ ($f_2(x) \geq f_1(x)$) egri chiziqlar hamda $x = a, x = b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan figura OX o'qi atrofida aylansa, aylanish jismining hajmi

$$V = \pi \int_a^b (y_2^2 - y_1^2) dx$$

formula bo'yicha hisoblanadi.

Agar egri chizikli trapetsiya $x = f(y)$ funksiya grafigi $y = c, y = d$ to'g'ri chiziqlar va OY o'qi bilan chegaralangan bo'lsa, u holda bu figuraning OY o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismining hajmi

$$V = \pi \int_c^d x^2 dy$$

formula bo'yicha hisoblanadi.

Agar $x_1 = \varphi_1(y)$ va $x_2 = \varphi_2(y)$ ($x_2 \geq x_1 \geq 0$) egri chiziqlar va $y = c, y = d$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan figura OY o'qi atrofida aylansa, u holda aylanish jismining hajmi

$$V = \pi \int_c^d (x_2^2 - x_1^2) dy$$

formula bilan hisoblanadi.

$y = f(x)$ egri chiziq yoyi \overline{AB} ning OX o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan sirtning yuzi

$$P_x = 2\pi \int_{\overline{AB}} y ds \quad (ds = \sqrt{dx^2 + dy^2})$$

formula bilan hisoblanadi.

$x = \varphi(y)$ egri chiziq yoyi \overline{AB} ning OY o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan sirt yuzi

$$P_y = 2\pi \int_{\overline{AB}} x ds \quad (ds = \sqrt{dx^2 + dy^2})$$

formula bilan hisoblanadi

Quyidagi chiziqlar bilan chegaralangan yuzalar hisoblansin:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1) $y = 4 - x^2, y = 0;$ | 2) $y = 3 - 2x - x^2, y = 0;$ |
| 3) $y = 6x - x^2, y = 0;$ | 4) $y = x^2 + 4x + 5, x = 0, y = 0;$ |
| 5) $y^2 = 2px, x = h;$ | 6) $xy = 4, x = 1, x = 4, y = 0;$ |
| 7) $y^2 = 2x + 4, x = 0;$ | 8) $y^2 = x^3, y = 8, x = 0;$ |
| 9) $y = x^2, y = 2 - x^2;$ | 10) $y = x^2 + 4x, y = x + 4;$ |
| 11) $y = 6x - x^2, y = 0;$ | 12) $y^2 = 1 - x, x = -3;$ |

$$13) \frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{25} = 1;$$

$$15) 4y = x^2, y^2 = 4x;$$

$$J: 1) \frac{22}{3}; 2) \frac{32}{3}; 3) 36; 4) \frac{13}{3}; 5) 2\sqrt{2\rho h}; 6) 8\ln 2; 7) \frac{16}{3}; 8) 19,1$$

$$9) \frac{9}{3}; 10) 20\frac{5}{6}; 11) 36; 12) \frac{32}{3}; 13) 35\pi; 14) 1; 15) \frac{25}{3}; 16) 17,5 - 6\ln 6.$$

Qutb koordinatalar sistemasida berilgan egri chiziqlar bilan chegaralangan yuzalar topilsin:

$$1) r^2 = a^2 \cos 2\varphi \text{ lemniskata};$$

$$2) r = a(1 - \cos \varphi) \text{ kardioida};$$

$$3) r = a \cos 2\varphi;$$

$$4) r = a \sin 3\varphi;$$

$$5) r = a(\sin \varphi + \cos \varphi);$$

$$6) r = a \sin 2\varphi;$$

$$7) r = a \cos 3\varphi.$$

$$J: 1) a^2; 2) \frac{3\pi a^2}{2}; 3) \frac{\pi a^2}{2}; 4) \frac{\pi a^2}{4}; 5) \frac{\pi a^2}{2}; 6) \frac{\pi a^2}{2}; 7) \frac{\pi a^2}{4}.$$

Parametrik tenglamalar bilan berilgan quyidagi chiziqlar bilan chegaralangan yuzalar topilsin:

$$1) x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) \text{ sikloidaning bir davri (arkasi) va OX o'qi};$$

$$2) x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t \text{ astroida};$$

$$3) x = \frac{3at}{1+t^2}, y = \frac{3at^2}{1+t^2} \text{ Dekart yaprog'i sirtmog'ining yuzi};$$

$$4) x = t^2 - 1, y = t^3 - t \text{ chiziq sirtmog'ining yuzi};$$

$$5) x = a \cos t, y = b \sin t \text{ ellipsning yuzi};$$

$$J: 1) 3\pi a^2; 2) \frac{3\pi a^2}{8}; 3) \frac{3\pi a^2}{2}; 4) \frac{8}{15}; 5) \pi ab.$$

Quyida berilgan egri chiziqlar yoyining uzunligi topilsin:

$$1) x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \text{ astroida yoyi uzunligini hisoblang};$$

$$2) y^2 = \frac{4}{9}(2-x)^3 \text{ egri chiziq yoyining } x = -1 \text{ to'g'ri chiziq bilan qismning uzunligini hisoblang};$$

$$3) y = 2\sqrt{x} \text{ parabola yoyining } x = 0 \text{ dan } x = 1 \text{ gacha bo'lgan qismning uzunligini hisoblang};$$

$$4) y = \ln x \text{ egri chiziq yoyining } x = \sqrt{3} \text{ dan } x = \sqrt{8} \text{ gacha bo'lgan qismi uzunligini toping};$$

$$5) x = \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2} \ln y \text{ egri chiziqning } y = 1 \text{ dan } y = e \text{ gacha yoyi uzunligini toping};$$

$$6) y^2 = x^3 \text{ egri chiziqning } x = \frac{4}{3} \text{ to'g'ri chiziq bilan kesilgan qismi uzunligini toping};$$

$$J: 1) 6a; 2) \frac{28}{3}; 3) \sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}); 4) 1 + \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}; 5) \frac{e^2 + 1}{4}; 6) \frac{112}{27}.$$

Parametrik tenglama bilan berilgan quyidagi egri chiziqlar yoyining uzunligini toping:

$$1. x = t^2, y = \frac{1}{2}t(t^2 - 1) \text{ egri chiziqning ox o'qi bilan kesishish nuqtalari orasidagi yoyi uzunligini toping};$$

$$2. \begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases} \text{ aylana yoyilmasining } t = 0 \text{ dan } t = T \text{ gacha yoyi uzunligini toping};$$

$$3. \begin{cases} x = \frac{c^2}{a} \cos^2 t \\ y = \frac{c^2}{b} \sin^2 t, (c^2 = a^2 - b^2) \end{cases} \text{ ellips evolyutasining uzunligini toping};$$

4. $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 - t \\ y = t^2 + 2 \end{cases}$ egri chiziq yoyining $t = 0$ dan $t = 3$ gacha qismi

uzunligini toping.

5. $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$ egri chiziq yoyining $t = 0$ dan $t = \ln \pi$ gacha

qismi uzunligini toping.

6. $\begin{cases} x = \frac{t^2}{6} \\ y = 2 - \frac{t^2}{4} \end{cases}$ egri chiziqning koordinata o'qlari bilan kesishish

nuqtalari orasidagi yoyi uzunligini toping.

J: 1) $4\sqrt{3}$; 2) $\frac{1}{2}aT^2$; 3) $\frac{4(a^2-b^2)}{ab}$; 4) 12; 5) $\sqrt{2}(\pi - 1)$; 6) $4\frac{1}{3}$

Quyidagi egri chiziqlarning aylanishidan hosil bo'lgan sirtlarning yuzlarini toping.

1) $y = \sin x$ egri chiziqning bitta yarim to'liqini OX o'qi atrofida;

2) $y = \frac{x^2}{2}$ ning $y = 1,5$ to'g'ri chiziq bilan kesishgan qismini OY o'qi atrofida;

3) $4x^2 + y^2 = 4$ ni OY o'qi atrofida;

4) $y = \frac{x^2}{3}$ egri chiziqning $x = -2$ dan $x = 2$ gacha bo'lgan yoyini OX o'qi atrofida;

5) $y^2 = 4 + x$ egri chiziqning $x = 2$ to'g'ri chiziq bilan kesilgan qismini OX o'qi atrofida;

6) $y = \operatorname{tg} x$ tangensoidaning $x = 0$ dan $x = \frac{\pi}{4}$ gacha qismini OX o'qi atrofida;

1) $2\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$; 2) $\frac{14\pi}{3}$; 3) $2\pi(1 - \frac{\pi}{2\sqrt{3}})$; 4) $\frac{24\sqrt{17}-2}{9}\pi$;

5) $\frac{11\pi}{4}$; 6) $\pi[\sqrt{5} - \sqrt{2} + \ln \frac{2\sqrt{2}+2}{\sqrt{5}+1}]$.

Parametrik va qutb koordinatalar sistemasida berilgan quyidagi chiziqlarning aylanishidan hosil bo'lgan jismlarning sirlari topilsin:

1. $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ astroidaning absissalar o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt yuzini toping. J: $\frac{12}{5}\pi a^2$.

2. $x = e^t \sin t, y = e^t \cos t$ egri chiziq yoyining $t_1 = 0$ dan $t_2 = \frac{\pi}{2}$ gacha qismi absissalar o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt yuzini hisoblang. J: $\frac{2\pi\sqrt{2}}{5}(e^\pi - 2)$.

3. $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ sikloida bitta arkasining bu sikloidaga uning eng yuqori nuqtasida o'tkazilgan urinma atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt yuzini hisoblang. J: $\frac{32\pi a^2}{3}$.

4. $x = \frac{t^2}{3}, y = 4 - \frac{t^2}{2}$ egri chiziq yoyining koordinata o'qlari bilan kesishgan nuqtalari orasidagi yoyining OX o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt yuzini toping. J: $29,6\pi$

5. $r = a(1 + \cos \varphi)$ kardioidaning qutb o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt yuzini toping. J: $\frac{32\pi a^2}{5}$.

6. $r = 2a \sin \varphi$ aylana qutb o'qi atrofida aylanyapti. Bunda hosil bo'lgan aylanish sirti yuzini hisoblang. J: $4\pi^2 a^2$.

7. $r^2 = a^2 \cos 2\varphi$ lemniskataning qutb o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt yuzini hisoblang. J: $2\pi a^2(2 - \sqrt{2})$.

8. $r = 2(1 - \cos\varphi)$ kardioidaning qutb o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt yuzini toping. $J: \frac{128}{5}\pi$.

Quyidagi chiziqlar bilan chegaralangan figuraning aylanishidan hosil bo'lgan jismlarning hajmini topilsin:

1. $xy = 4, x = 1, x = 4, y = 0$ chiziqlar bilan chegaralangan figuraning OX va OY o'qlari atrofida;

2. $y^2 = (x + 4)^3$ egri chiziq va $x = 0$ chiziqlar bilan chegaralangan figuraning OY o'q atrofida;

3. $y^2 = 2px$ va $x = h$ chiziqlar bilan chegaralangan figuraning OX o'q atrofida;

4. $y^2 = 4 - x$ va $y = 0$ chiziqlar bilan chegaralangan figuraning OY o'q atrofida;

5. $y^2 = x^3, x = 0$, va $y = 8$ chiziqlar bilan chegaralangan figuraning OY o'q atrofida;

6. $y = x^2$ va $y = 4$ chiziqlar bilan chegaralangan figuraning $x = 2$ to'g'ri chiziq atrofida;

7. $(y - 3)^2 + 3x = 0$ va $x = -3$ chiziqlar bilan chegaralangan figuraning OX o'q atrofida;

8. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ellips bilan chegaralangan figuraning OY o'q atrofida.

J: 1) 12π va 24π ; 2) $\frac{2048\pi}{35}$; 3) $\pi p h^2$; 4) $\frac{512\pi}{15}$; 5) $19,5\pi$;
6) $\frac{128\pi}{3}$; 7) 72π ; 8) $\frac{4}{3}\pi a^2 b$.

Quyidagi egri chiziqlar bilan chegaralangan figuralarning aylanishidan hosil bo'lgan jismlarning hajmlari topilsin:

1. $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ sikloidaning bir arkasi va OX o'qi bilan chegaralangan figuraning OX va OY o'qlar atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismlarning hajmini toping.

2. $x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t$ astroidaning OY o'q atrofida aylanishidan hosil bo'lgan figuraning hajmini toping.

3. $r = a(1 + \cos\varphi)$ kardioidaning qutb o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan figuraning hajmini toping.

4. $r = a\cos^2\varphi$ egri chiziqning qutb o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan figuraning hajmini toping.

5. $r = 2(1 - \cos\varphi)$ kardioidaning qutb o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan figuraning hajmini toping.

6. $r = 2a\cos\varphi$ egri chiziqning qutb o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan figuraning hajmini toping.

J: 1) $5\pi^2 a^3$ va $6\pi^3 a^3$; 2) $\frac{32\pi a^2}{105}$; 3) $\frac{8\pi a^2}{3}$; 4) $\frac{4}{21}\pi a^3$; 5) $\frac{64\pi}{3}$; 6) $\frac{2}{3}\pi a^3$.

4-§. Aniq integralning mexanik tadbirlari

m massali moddiy nuqtaning l qismiga nisbatan statik moment deb, $M_l = md$ kattalikka aytiladi, bu yerda d moddiy nuqtadan l o'qqacha bo'lgan masofa.

Agar Oxy tekislikda massalari $m_1, m_2, \dots, m_i, \dots, m_n$ bo'lgan moddiy nuqtalarning $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), P_i(x_i, y_i), \dots, P_n(x_n, y_n)$ (1) sistemasi berilgan bo'lsa, u holda $x_i m_i$ va $y_i m_i$ ko'paytmalar m_i massaning Oy va Ox o'qlarga nisbatan statik momentlari deyiladi. Berilgan moddiy nuqtalar sistemasi og'irlik markazining koordinatalari quyidagi formulalardan topiladi.

$$x_c = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2 + \dots + x_n m_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, \quad y_c = \frac{y_1 m_1 + y_2 m_2 + \dots + y_n m_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

bu yerda $\sum_{i=1}^n x_i m_i$ va $\sum_{i=1}^n y_i m_i$ lar berilgan sistemaning Oy va Ox o'qlariga nisbatan statik momentlari deyiladi. Ya'ni $M_x = \sum_{i=1}^n x_i m_i$ va $M_y = \sum_{i=1}^n y_i m_i$ m massali moddiy nuqtaning l o'qlarga nisbatan **inertsia momenti** deb $J_i = m d^2$ songa aytiladi, bu yerda d - nuqtadan o'qqacha bo'lgan masofa. (1) moddiy sistemaning Ox va Oy o'qqa nisbatan inertsia momentlari:

$$J_x = \sum_{i=1}^n y_i^2 m_i \quad \text{va} \quad J_y = \sum_{i=1}^n x_i^2 m_i$$

AB yoy og'irlik markazining koordinatalari:

$$x_c = \frac{\int_a^b x y ds}{\int_a^b y ds}, \quad y_c = \frac{\int_a^b y^2 ds}{\int_a^b y ds}$$

formuladan topiladi.

Inertsia momentlari esa

$$J_x = \int_a^b x^2 ds, \quad J_y = \int_a^b y^2 ds$$

formuladan topiladi. Bu yerda $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$.

Biron figura og'irlik markazining koordinatalari

$$x_c = \frac{\int y x ds}{\int y ds}, \quad y_c = \frac{\int y^2 ds}{\int y ds}$$

formulalardan, statik momentlari esa

$$M_x = \frac{1}{2} \int_a^b y^2 dx, \quad M_y = \int_a^b x y dx$$

formulalardan topiladi. Inertsia momentlari esa

$$J_x = \frac{1}{2} \int_a^b y^3 dx, \quad J_y = \int_a^b x^2 y dx$$

Aniq integralning mexanik tadbirlariga doir misollar:

1. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ to'g'ri chiziqning koordinata o'qlari orasida joylashgan

tesmasining koordinata o'qlariga nisbatan statik momentlarini toping.

J: $M_x = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 + b^2}, \quad M_y = \frac{a}{2} \sqrt{a^2 + b^2}.$

2. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ellipsning birinchi kvadrantda yotuvchi yoyining Ox

o'qqa nisbatan statik momentini toping.

J: $M_x = \frac{ab}{2c} \arcsin \varepsilon + \frac{b^2}{2} \quad (\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} - \text{ellipsning eksentrisiteti}).$

3. $y = 2\sqrt{x}$ egri chiziq yoyining $x = 3$ to'g'ri chiziq kesgan

qismining Ox o'qqa nisbatan statik momentini toping. J: $M_x = \frac{20}{3}.$

4. $x^2 + y^2 = 9$ aylananing birinchi kvadrantda yotgan choragining

Oy o'qqa nisbatan statik momentini toping. J: $M_y = 9.$

5. $r = 2a \sin \alpha$ aylananing qutb o'qiga nisbatan statik momentini

toping. J: $2\pi a^2.$

6. $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ yarim aylananing og'irlik markazi

koordinatalarini toping. J: $C(0, \frac{2r}{\pi}).$

7. Absissalar o'qi va $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ yarim aylana bilan chegaralangan yarim doira og'irlik markazining koordinatalarini toping. J: $C(0, \frac{4r}{3\pi})$.

8. Koordinata o'qlari va $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ellipsning birinchi kvadrantda yotuvchi yayi bilan chegaralangan figura og'irlik markazining koordinatalarini toping. J: $C(\frac{2a}{3\pi}, \frac{4b}{3\pi})$.

9. $y = \sin x$ sinusoida yayi va Ox o'qi bilan chegaralangan figura ($0 \leq x \leq \pi$) og'irlik markazining koordinatalarini toping. J: $C(\frac{\pi}{2}, \frac{1}{3})$.

10. $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ astroidaning birinchi kvadrantda yotgan yayining Ox va Oy o'qlarga nisbatan statik momentlari va og'irlik markazini toping. J: $M_x = M_y = \frac{2a^2}{5}, C(\frac{2a}{5}, \frac{2a}{5})$.

11. $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ sikloida birinchi arkani og'irlik markazining koordinatalarini toping. J: $C(\pi a, \frac{4a}{3})$.

12. Astroidaning birinchi kvadrantdagi qismi va koordinata o'qlari bilan chegaralangan figura og'irlik markazining koordinatalarini toping.

$$J: C(\frac{256a}{315\pi}, \frac{256a}{315\pi}).$$

13. $r = a(1 + \cos \alpha)$ kardioida bilan chegaralangan figura og'irlik markazining Dekart koordinatalarini toping. J: $C(\frac{5a}{6}, 0)$.

14. $r^2 = a^2 \cos 2\alpha$ Bernulli lemniskatasining o'ng sirtmog'i bilan chegaralangan figura og'irlik markazining Dekart koordinatalarini toping. J: $C(\frac{\pi a \sqrt{2}}{6}, 0)$.

15. R radiusli yarim aylananing uning diametriga nisbatan inertsiya momentini toping. J: $J_x = \frac{MR^2}{2}$ (bu yerda $M = \pi R$).

16. $y = 4\sqrt{x}$ parabola yayining $x = 4$ to'g'ri chiziq kesgan qismining absissalar o'qiga nisbatan inertsiya momentini toping.

$$J: 32(6\sqrt{2} - \ln(3 + 2\sqrt{2})).$$

17. $y = 2 - x^2$ va $y = x^2$ chiziqlar bilan chegaralangan figuraning koordinata o'qlariga nisbatan inertsiya momentini toping.

$$J: J_x = \frac{256}{105}, J_y = \frac{8}{15}$$

18. $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ siklonda bitta arkasining bir ikkala koordinata o'qlariga nisbatan inertsiya momentini toping.

$$J: J_x = \frac{256a^3}{15}, J_y = 16a^3(\pi^2 - \frac{128}{45})$$

19. $x = a \cos t, y = a \sin t$ doira chorak yuzining ux o'qqa nisbatan inertsiya momentini toping. J: $\frac{\pi a^4}{16}$.

5-§. Aniq integralning fizik tadbirlari

$V = f(t)$ ($f(t) \geq 0$) o'zgaruvchi tezlik bilan to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanayotgan muqianing $[a, b]$ vaqt oralig'ida bosib o'tgan yo'li

$s = \int_a^b f(t) dt$ formula bilan hisoblanadi.

$[a, b]$ kesmada o'zgaruvchan $F = f(x)$ kuchning hajargan ishi

$$A = \int_a^b f(t) dt$$

formula bilan hisoblanadi.

Suyuqlikning gorizantal yuzga bosim kuchi P bu yuzning cho'kish chuqurligi x ga, ya'ni yuzdan suyuqlik sirtigacha bo'lgan masofaga bog'liqdir.

Gorizantal yuzga bo'lgan bosim kuchi $R = 9,807\rho sx$ formula bilan hisoblanadi.

Bu yerda ρ – suyuqlikning zichligi, S – yuz sirti, x – yuzning cho'kish chuqurligi.

Vertikal yuzga suyuqlikning bosim kuchi $R = \int_a^b 9,807\rho xf(x)dx$ integral bilan hisoblanadi.

1. Nuqtaning tezligi $V = (100 + 8t) \frac{m}{sek}$. Bu nuqta $[0; 10]$ vaqt oralig'ida qanday masofani o'tadi? J: 1400 m.

2. Nuqtaning tezligi $v = (2t^2 - 3t) \frac{m}{sek}$ ga teng. Harakat boshlangandan keyin $t = 4$ sek. ichida nuqta bosib o'tgan S yo'lini toping. J: $66\frac{2}{3}$ m.

3. $48 \frac{km}{soat}$ tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil tormoz berib tezlikni kamaytirib hoshladi va 3 sek. dan keyin to'xtadi. Avtomobil butunlay to'xtaguncha qancha masofani bosib o'tkanini toping. J: 20 m.

4. 294 m balandlikdan pastga vertikal yo'nalishda $19,6 \frac{m}{sek}$ boshlang'ich tezlik bilan jism tashlandi. Necha sekunddan keyin jism yerga kelib tushadi? J: 6 sek.

5. Agar prujinani 1 sm ga qisish uchun 1 kg kuch kerak bo'lsa, prujinani 8 sm ga qisishga sarf bo'ladigan F kuch bajaradigan ishni toping. J: 0,32 (kg m).

6. Agar prujinani 2 sm ga cho'zish uchun 3 N kuch kerak bo'lsa, prujinani 5 sm ga cho'zishda bajaradigan ishni hisoblang. J: 0,1875 (J).

7. Uzunligi 1 m, kesimining radiusi 2 mm bo'lgan mis simni 1mm cho'zishda bajaradigan ishni hisoblang. J: $0,024\pi$ (kg m).

8. Massasi m bo'lgan jismni yerdan h balandlikka ko'tarish uchun sarf etish kerak bo'lgan ish aniqlansin. J: $\frac{mgh}{R+R}$.

9. Vertikal to'g'on trapetsiya shaklida bo'lib, yuqori asosi $a = 6,4$ m pastki asosi $b = 6,4$ m balandligi esa $h = 3$ m. Suvning butun to'g'onga bosim kuchini toping. J: 22,2 T.

10. Asosining radiusi R , balandligi H bo'lgan vertikal doiraviy konus uchi bilan suvga shunday bostirilganki, uning asosi suv sathida joylashgan. Konusga suvning bosim kuchini toping. J: $\frac{\pi R^2 H}{3}$.

11. To'g'on yuqori asosi 20 m, quyi asosi 10m va balandligi 6 m bo'lgan trapetsiya shaklida. Suvning to'g'onga bo'lgan bosimini aniqlansin. J: 240 T.

6-§. Aniq integralni taqribiy hisoblash

$\int_a^b f(x)dx$ aniq integral qiymatini hisoblash masalasi integral ostidagi $f(x)$ funksiyaning biror $F(x)$ boshlang'ich funksiyasini topish va uning qiymatlarini hisoblash masalasiga keltiriladi. Ammo ayrim aniq integrallar uchun bu usullarni qo'llashda bag'zi bir muammolar bo'lishi mumkin:

- 1) $F(x)$ boshlang'ich funksiyani topish murakkab;
- 2) $f(x)$ boshlang'ich funksiyani ko'rinishi murakkab, uning $F(a)$ va $F(b)$ qiymatlarini hisoblash qiyinchilik tug'diradi;


3) $f(x)$ boshlang'ich funktsiya elementar funktsiyalar orqali ifodalanmaydi;

4) Integral ostidagi funktsiya jadval ko'rinishida berilgan.

Bunday hollarda aniq integralni taqribiy hisoblash masalasi paydo bo'ladi. Bunda bir necha formulalar mavjud:


1. To'g'ri to'rtburchaklar formulasi (1-chizma).

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} (y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1}) \quad \int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} (y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n)$$




2. Trapetsiyalar formulasi (2-chizma).

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_{n-1} \right)$$



3. Parabolalar formulasi (Simpson formulasi) (3-chizma).

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6n} [y_0 + y_{2n} + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{2n-1}) + (y_2 + y_4 + \dots + y_{2n-2})]$$



Aniq integralni taqribiy hisoblash ga doir misollar.

1. Quyidagi aniq integrallarni to'g'ri to'rtburchaklar formulasi bilan taqribiy hisoblang.

1) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ ni 0,06 dan katta bo'lmagan xatolik bilan hisoblang.

J: 0,75998.

2) $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ integralni $n = 8$ deb hisoblang. J: 0,0167.

3) $\int_0^1 \frac{dx}{2-\sqrt{x}}$ ni 0,07 dan oshmaydigan xatolik bilan taqribiy hisoblang.

J: 1,3702 ortig'i bilan, 1,3037 kami bilan.

2. Quyidagi integrallarni trapetsiyalar formulasi bilan taqribiy hisoblang.

1) $\int_0^1 \frac{dx}{1-x}$ integralni trapetsiyalar formulasi bo'yicha $n = 10$ deb hisoblang. J: 0,78498.

2) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$ integralni trapetsiyalar formulasidan foydalanib hisoblang.

Bunda $n = 8$ deb olinsa. $J: 0,856$.

3. Quyidagi integrallarni parabolalar formulasidan foydalanib hisoblang.

1) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ integralni $n = 2$ deb Simpson (parabolalar) formulasi

bo'yicha taqribiy hisoblang. $J: 0,7854$.

2) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^3}$ integralni Simpson formulasi bo'yicha taqribiy hisoblang.

$J: 0,3217$.

VIII BOB. KO'P O'ZGARUVCHILI FUNKSIYA

1-§. Ko'p o'zgaruvchili funksiya, uning limiti va uzluksizligi

Agar biror D to'plamning har bir (x, y) haqiqiy sonlar juftligi biror nuqda bilan E to'plamdagi yagona z haqiqiy songa mos qo'yilgan bo'lsa, u holda D to'plamda ikki o'zgaruvchining funksiyasi Z berilgan deyiladi va quyidagi ko'rinishlarda belgilanadi.

$$Z = f(x, y), Z = F(x, y), Z = \varphi(x, y) \text{ va hokazolar.}$$

D to'plam funksiyaning aniqlanish sohasi deyiladi.

E to'plam funksiyaning qiymatlar sohasi deyiladi.

$Z = f(x, y)$ funksiyaning $Oxyz$ to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasidagi tasviri (grafigi) biror sirtidan iborat bo'ladi.

Istalgan chekli sondagi o'zgaruvchining funksiyasi ham yuqoridagi labi ta'riflanadi va quyidagicha belgilanadi.

$U = f(x, y, z)$ — uch o'zgaruvchili funksiya;

$V = f(x, y, z, u)$ — to'rt o'zgaruvchili funksiya;

$Y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ — n o'zgaruvchili funksiya.

Agar har qanday kichik $\varepsilon > 0$ soni uchun unga bog'liq shunday $r(\varepsilon) = r > 0$ son topilsaki $M_0(x_0, y_0)$ nuqtaning $r(\varepsilon)$ radiusli atrofiga tegishli bo'lgan barcha $M(x, y) \neq M_0(x_0, y_0)$ nuqtalar uchun

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon$$

tengsizlik bajarilsa, u holda $M(x, y)$ nuqta $M_0(x_0, y_0)$ nuqtaga intilganda $Z = f(x, y)$ funksiya A ga teng limitga intiladi deyiladi.

Ikki o'zgaruvchili funksiya $Z = f(x, y)$ ning $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ holdagi limiti $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$ yoki $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = A$ kabi yoziladi.

Ikki o'zgaruvchili funksiyaning limiti uchun bir o'zgaruvchili funksiya limitining ilgari ko'rib o'tilgan barcha xossalari saqlanib qoladi.

$M_0(x_0, y_0)$ nuqta $Z = f(x, y)$ funksiyaning $D\{f\}$ aniqlanish sohasidagi biror nuqta bo'lib, o'zgaruvchi $M(x, y)$ nuqta funksiyaning aniqlanish sohasida qolgan holda $M_0(x_0, y_0)$ nuqtaga ixtiyoriy muqaddar intilganda

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0) \text{ yoki } \lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = f(M_0)$$

tenglik o'rinli bo'lsa, $Z = f(x, y)$ funksiya $M_0(x_0, y_0)$ nuqtada uzluksiz deyiladi.

Agar biror $M_0(x_0, y_0)$ nuqtada yuqoridagi tenglik o'rinli bo'lmasa, bu nuqtada berilgan $Z = f(x, y)$ funksiya uzilishga ega deyiladi. $M_0(x_0, y_0)$ nuqta uzilish nuqtasi deyiladi.

1. $F(x, y) = \frac{x-2y}{2x-y}$ funksiya berilgan. 1) $F(3, 1)$; 2) $F(1, 3)$; 3) $F(1, 2)$; 4) $F(2, 1)$; 5) $F(a, a)$; 6) $F(a, -a)$ lar topilsin.

J: 1) $\frac{1}{5}$; 2) 5; 3) Muvjud emas; 4) 0; 5) -1; 6) 1.

2. $F(x, y) = \frac{x}{x-y}$ funksiya uchun $F(a, b) + F(b, a) = 1$ ekani ko'rsatilsin.

3. $F(x, y) = \sqrt{x^4 + y^4} - 2xy$ funksiya uchun $F(tx, ty) = t^2 F(x, y)$ ekani ko'rsatilsin.

4. $Z = e^{\sin(x+y)}$ funksiyaning $x = y = \frac{\pi}{2}$ bo'lgandagi qiymatini toping. J: 1.

5. $Z = y^{x^2-1} + x^{y^2-1}$ funksiyaning $x = y = 2$ bo'lgandagi qiymatini toping. J: 16.

6. $Z = \left(\frac{\arctg(x+y)}{\arctg(x-y)}\right)^2$ funksiyaning $x = \frac{1+\sqrt{3}}{2}, y = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$ bo'lgandagi qiymatini toping. J: $\frac{9}{16}$.

7. Quyidagi funksiyaning aniqlanish sohalari topilsin.

1) $Z = x^2 + y^2$; 2) $Z = \frac{4}{x^2 + y^2}$; 3) $Z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$;

4) $Z = \ln(1 - x^2 - y^2)$; 5) $Z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$; 6) $Z = \sqrt{xy}$;

7) $Z = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}$; 8) $Z = \frac{xy}{y-x}$; 9) $u = \ln \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$;

10) $u = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$; 11) $Z = \sqrt{x^2 + y^2 - 9}$;

12) $u = \frac{1}{1 - x^2 - y^2 - z^2}$.

J: 1) Tekislikdagi barcha nuqtalar; 2) Tekislikning $O(0,0)$ nuqtadan farqli barcha nuqtalari; 3) Markazi $O(0,0)$ nuqtada va radiusi 2 ga teng bo'lgan doiradan iborat; 4) Markazi $O(0,0)$ nuqtada va radiusi 1 ga teng bo'lgan aylananing ichki nuqtalari; 5) Markazi $O(0,0)$ nuqtada va radiusi 3 ga teng bo'lgan doiradan iborat; 6) I va III koordinata tekisliklaridagi nuqtalar to'plami; 7) Markazi $O(0,0)$ nuqtada va radiusi 1 ga teng bo'lgan aylananing ichki nuqtalari; 8) $y \neq x$ bo'lgan nuqtalar; 9) Markazi $O(0,0,0)$ nuqtada va radiusi 1 ga teng bo'lgan sferaning ichki nuqtalari; 10) Markazi $O(0,0,0)$ nuqtada va radiusi 2 ga teng bo'lgan sferadagi va ichki nuqtalari; 11) Markazi $O(0,0)$ nuqtada va radiusi 3 ga teng doira aylanasidagi va undan tashqaridagi nuqtalari;

12) Markazi $O(0,0,0)$ nuqtada va radiusi 1 ga teng bo'lgan sferada yotmagan nuqtalari.

8. $M(x, y)$ nuqta $M_0(x_0, y_0)$ nuqtaga ixtiyoriy usul bilan intilganda quyidagi limitlar hisoblansin:

$$1) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} (3x + 5y + 1); \quad 2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2x + 5xy - 3y + 1}{x^2 + y^2 + 2}; \quad 3) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2 - \sqrt{xy + 1}}{xy}$$

$$4) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{xy}; \quad 5) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 2} - 1}; \quad 6) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{x^2 y^2 + 1} - 1}{x^2 + y^2}$$

$$7) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}; \quad 8) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2 y^2}; \quad 9) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} \frac{\lg xy}{y}; \quad 10) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x}{x + y}$$

J: 1) 14; 2) $\frac{1}{2}$; 3) $-\frac{1}{2}$; 4) 1; 5) 2; 6) 0; 7) 0; 8) limitga ega emas; 9) 1; 10) limit mavjud emas.

9. Quyidagi funksiyalarning uzilish nuqtalari topilsin.

$$1) Z = \frac{z}{x^2 + y^2}; \quad 2) Z = \frac{1}{\sin^2 \pi x + \sin^2 \pi y}; \quad 3) Z = \frac{1}{x - y};$$

$$4) Z = \frac{1}{\sin \pi x} + \frac{1}{\sin \pi y}; \quad 5) Z = \frac{y^2 + 2x}{y^2 - 2x}; \quad 6) Z = \frac{20x}{(x-1)^2 + (y-1)^2};$$

$$7) Z = \frac{3y}{2x - y}; \quad 8) Z = \frac{x^2}{x^2 - 2y^2 - 4}$$

J: 1) $O(0,0)$; 2) Koordinatalari butun sonlardan iborat barcha nuqtalarda; 3) $y = x$ to'g'ri chiziqdagi nuqtalarda; 4) $x = m, y = n$ to'g'ri chiziqlarda ($m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}$); 5) $y^2 = 2x$ parabolda yotgan nuqtalarda; 6) $M(1, -1)$; 7) $y = 2x$ to'g'ri chiziqda yotgan nuqtalarda; 8) $x^2 - 2y^2 = 4$ giperbolada yotgan nuqtalarda.

2-§. Ko'p o'zgaruvchili funksiyaning xususiy va to'la orttirmalari.

Xususiy hosilalar. To'liq differensial

Agar $z = f(x, y)$ funksiyada x o'zgaruvchiga Δx ortirma berib, y ni o'zgartirishsiz qoldirsak, u holda $z = f(x, y)$ funksiya $\Delta_x z$ ortirma oladi. Bu ortirma z funksiyaning x o'zgaruvchi bo'yicha xususiy ortirma deyiladi va u quyidagicha yoziladi:

$$\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y)$$

Huddi shunday z funksiyaning y o'zgaruvchi bo'yicha xususiy ortirma $\Delta_y z$ deyiladi va u quyidagicha yoziladi:

$$\Delta_y z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

Agar $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{\Delta_x z}{\Delta x}$ chekli limit mavjud bo'lsa, u holda unga $z = f(x, y)$ funksiyaning erkli o'zgaruvchi x bo'yicha xususiy hosilasi deyiladi va $\frac{\partial z}{\partial x}$ yoki $f'_x(x, y)$ lardan biri bilan belgilanadi.

Agar $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{\Delta_y z}{\Delta y}$ chekli limit mavjud bo'lsa, u holda unga $z = f(x, y)$ funksiyaning erkli o'zgaruvchi y bo'yicha xususiy hosilasi deyiladi va $\frac{\partial z}{\partial y}$ yoki $f'_y(x, y)$ lardan biri bilan belgilanadi.

Huddi shunday uch, to'rt va hokazo o'zgaruvchili funksiyalarning xususiy hosilalari haqida ham gapirish mumkin.

Xususiy hosilalar uchun bir o'zgaruvchi funksiyasini differensiallashning qoida va formulalari saqlanadi.

Agar x va y o'zgaruvchilar mos ravishda Δx va Δy ortirmalar olsa, u holda $z = f(x, y)$ funksiya $\Delta z = f((x + \Delta x), (y + \Delta y)) - f(x, y)$ ortirma oladi. Bu ortirmaga to'la ortirma deyiladi.

$z = f(x, y)$ funksiyaning to'liq ortirmasini Δx va Δy larga nisbatan chiziqli bo'lgan bosh qismi funksiyaning to'liq differensial deyiladi va dz bilan belgilanadi.

$z = f(x, y)$ funksiyaning to'liq differensial quyidagi formulada bu'icha hisoblanadi:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy, \text{ bu yerda } dx = \Delta x, dy = \Delta y.$$

To'liq differensialdan ko'pincha funksiyaning taqribiy qiymatlarini hisoblashda ham foydalaniladi. Chunki $\Delta z \approx dz$, ya'ni

$$f((x + \Delta x), (y + \Delta y)) \approx f(x, y) + dz$$

$d_x z = \frac{\partial z}{\partial x} dx$ va $d_y z = \frac{\partial z}{\partial y} dy$ larga xususiy differensiallar deyiladi.

1. Quyidagi funksiyalarni xususiy va to'la ortirmalari topilsin.

- 1) $z = x + y$; 2) $z = xy$; 3) $z = x^2 + y^2$; 4) $z = \frac{x}{y}$;
 5) $z = x^2 + 3xy - 4y$; 6) $z = x^2y + xy^2$; 7) $u = x + y + z$;
 8) $u = xyz$; 9) $u = xy + yz$.

2. Quyidagi funksiyalarning xususiy hosilalari topilsin.

- 1) $z = x - y$; 2) $z = x^3y - xy^3$; 3) $z = (5x^2y - y^3 + 7)^2$;
 4) $z = x\sqrt{y} + \frac{y}{\sqrt{x}}$; 5) $z = \arctg \frac{x}{y}$; 6) $z = \ln(x^2 + y^2)$; 7) $z = e^{-\frac{x}{y}}$;
 8) $z = \ln \sqrt[3]{y}$; 9) $z = \ln(x + \ln y)$; 10) $z = e^{xy(x^2 + y^2)}$;
 11) $z = \arctg \frac{x}{1+x^3}$; 12) $z = \arctg \frac{x}{x} + \arctg \frac{x}{y}$; 13) $z = \sqrt[3]{e^{xy}}$;
 14) $z = x^3 + 5xy^2 - y^3$; 15) $z = (5x^2y^2 + 1)^3$; 16) $u = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} - \frac{z}{x}$;
 17) $u = xyz$; 18) $u = xy + yz + zx$; 19) $u = \sin(x^2 + y^2 + z^2)$;
 20) $u = \ln(x + y + z)$; 21) $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

3. Quyidagi funksiyalar xususiy hosilalarining qiymatlarini quyidagilarning berilgan qiymatlarida hisoblang.

- 1) $f(\alpha, \beta) = \cos(m\alpha - n\beta)$ ni $\alpha = \frac{\pi}{2m}$, $\beta = 0$ da;
 2) $z = \ln(x^2 + y^2)$ ni $x = 2$, $y = -1$ da;
 3) $u = \sin^2(3x + 2y - z)$ ni $M(1, -1, 1)$ nuqtada.
 4) 1) $-m$ va n ; 2) $\frac{c}{3}$ va $\frac{2}{3}$; 3) 0; $2\sin 2 = 1,82$; $0,84$.

4. $z = x \ln \frac{x}{y}$ funksiya $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$ tenglikni qanoatlantirishi ko'rsatilsin.

5. $z = x^y$ funksiya $\frac{x \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{z}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y}}{z} = 2z$ tenglikni qanoatlantirishi ko'rsatilsin.

6. $z = e^{\frac{x}{y}} \ln y$ funksiya $xz'_x + yz'_y = \frac{z}{\ln y}$ tenglikni qanoatlantirishi ko'rsatilsin.

7. $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ funksiya $(u'_x)^2 + (u'_y)^2 + (u'_z)^2 = 1$ tenglikni qanoatlantirishi ko'rsatilsin.

8. $u = x + \frac{x-y}{y-x}$ funksiya $u'_x + u'_y + u'_z = 1$ tenglikni qanoatlantirishi ko'rsatilsin.

9. Quyidagi funksiyalarni xususiy differensiallari topilsin.

- 1) $z = xy^3 - 3x^2y^2 + 2y^4$; 2) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$;
 3) $z = \frac{xy}{x^2 + y^2}$; 4) $y = \ln(x^3 + 2y^3 - z^3)$.
 1) 1) $d_x z = (y^3 - 6xy^2)dx$, $d_y z = (3xy^2 - 6x^2y + 8y^3)dy$
 2) $d_x z = \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, $d_y z = \frac{y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$; 3) $d_x z = \frac{y(y^2 - z^2) dx}{(x^3 + y^3 - z^3)^2}$, $d_y z = \frac{x(z^2 - y^2) dy}{(x^3 + y^3 - z^3)^2}$.

$$4) d_x u = \frac{3x^2 dx}{x^3 + 2y^2 - z^2}, \quad d_y u = \frac{6y^2 dy}{x^3 + 2y^2 - z^2}, \quad d_z u = -\frac{2z^2 dz}{x^3 + 2y^2 - z^2}$$

10. $z = \sqrt{x+y^2}$ funksiya berilgan $x = 2, y = 5, \Delta y = 0.01$ bo'lgandagi $d_y z$ topilsin. ($J: \frac{1}{270}$)

11. $z = \sqrt{\ln xy}$ funksiya berilgan. $x = 1, y = 1.2, \Delta x = 0.016$ bo'lgandagi $d_x z$ xususiy differensial topilsin. ($J: \approx 0.0187$)

12. $u = p - \frac{2q}{p} + \sqrt{p+q+r}$ funksiya berilgan $p = 1, q = 1, r = 5$ bo'lgandagi $d_p u$ xususiy differensial topilsin. ($J: = \frac{97}{600}$)

13. Quyidagi funksiyalarning to'liq differensiallari topilsin.

1) $z = x^2 y^6 - x^3 y^3 + x^6 y^2$; 2) $z = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$; 3) $z = \frac{x+y}{x-y}$

4) $z = \arcsin \frac{x}{y}$; 5) $z = \sin(xy)$; 6) $z = \operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy}$; 7) $z = \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$

8) $z = \operatorname{arctg}(xy)$; 9) $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$; 10) $u = 2x^{yz}$.

11) $xy[(2y^3 - 3xy^2 + 4x^2y)dx + (4y^2x - 3yx^2 + 2x^3)dy]$

2) $\frac{xy+y^2y}{x^2+y^2}$; 3) $\frac{2(xdy-ydx)}{(x-y)^2}$; 4) $\frac{ydx-xy}{x^2y^2-z^2}$; 5) $(xdy+ydx)\cos(xy)$

6) $\frac{dx}{1+x^2} + \frac{dy}{1+y^2}$; 7) $\frac{4xy(xdy-ydx)}{(x^2-y^2)^2}$; 8) $\frac{xy-ydx}{1+x^2y^2}$; 9) $\frac{zdx-ydy+adz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

10) $du = 2x^{yz}(\frac{yz}{x} dx + yz dx dy + yz dx dz)$.

14. $z = \operatorname{arctg} \frac{x}{y}$ funksiyaning $x=1, y=3, dx=0.01; dy=-0.05$ bo'lgandagi to'liq differensial topilsin. $J: -0.008$.

15. $z = \frac{z}{x}$ funksiyaning $x=2, y=1, dx=0.1; dy=0.2$ bo'lgandagi to'liq differensial topilsin. $J: 0.075$.

16. $u = e^{xy}$ funksiyaning $x=1, y=2, dx=-0.1; dy=0.1$ bo'lgandagi to'liq differensial topilsin. $J: -0.739$.

17. $z = xy$ funksiya uchun $x=5, y=4, \Delta x=0.3; \Delta y=-0.2$ bo'lganda dz va Δz hisoblang.

18. Quyidagilarni taqribiy hisoblang.

1) $1.02^{3.01}$; 2) $\ln(0.09^3 + 0.99^3)$; 3) $\sqrt{(4.05)^2 + (2.93)^2}$;

4) $\sqrt{(1.02)^2 + (1.97)^2}$; 5) $\sin 28^\circ \cdot \cos 61^\circ$; 6) $1.08^{3.06}$

7) 1) 1.06; 2) -0.03; 3) 4.998; 4) 2.95; 5) 0.227; 6) 1.32.

3.4. Murakkab va oshkormas funksiyalarning xususiy hosilalari

Agar $z = f(x, y)$, $x = x(t)$, $y = y(t)$ funksiyalar differensiallanuvchi bo'lsa, u holda $z = f(x(t), y(t))$ murakkab funksiya bo'lib, uning hosilasi

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

formuladan topiladi.

Agar $z = f(x, y)$, $y = y(x)$ bo'lsa, u holda $z = f(x, y(x))$ dan x bo'yicha hosilasi

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}$$

formuladan topiladi va u to'la hosila deyiladi.

Agar $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ bo'lsa, u holda $z = f(x, y)$ ning xususiy hosilalari

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}; \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v}$$

formulalardan topiladi.

Agar $F(x, y) = 0$ tenglama biror $y(x)$ funksiyani oshkormas ko'rinishda aniqlasa va $F'_y(x, y) \neq 0$ bo'lsa, u holda quyidagi formula o'rinlidir:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}$$

Agar $F(x, y, z) = 0$ tenglama ikki o'zgaruvchili $z = f(x, y)$ funksiyani oshkormas ko'rinishda aniqlasa va $F'_z(x, y, z) \neq 0$ bo'lsa, u holda quyidagi formulalar o'rindir:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}$$

1. $z = \frac{y}{x}, x = e^t, y = 1 - e^{2t}$ bo'lsa, $\frac{dz}{dt}$ topilsin. J: $\frac{dz}{dt} = -2cht$

2. $z = \frac{x}{y}, x = e^t, y = \ln t$ bo'lsa, $\frac{dz}{dt}$ topilsin. J: $\frac{tye^t - x}{y^2 t} = -2cht$

3. $y = u^2 e^v, u = \sin x, v = \cos x$ bo'lsa, $\frac{dy}{dx}$ topilsin. J: $2ue^v \cos x + u^2 e^v (-\sin x)$

4. $u = e^{x-2y}, z = \sin x, y = x^3$ bo'lsa, $\frac{dz}{dx}$ topilsin.

J: $e^{x-2y}(\cos x - 6x^2)$

5. Agar $y = x^2$ bo'lsa, $z = \arctg \frac{y}{x}$ funksiyaning to'liq hosilasini toping. J: $\frac{1}{1-x^2}$

6. Agar $f(x) = \arcsin \frac{x}{y}, y = \sqrt{x^2 + 1}$ bo'lsa, $\frac{df}{dx}$ topilsin. J: $\frac{1}{x^2 + 1}$

7. Agar $z = \sqrt{x^2 + y^2}, y = \sin^2 x$ bo'lsa, $\frac{dz}{dx}$ topilsin. J: $\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}(x + y \sin 2x)$

8. Agar $z = \ln(x^2 + y^2), y = e^{x^2}$ bo'lsa, $\frac{dz}{dx}$ topilsin. J: $\frac{2x}{x^2 + y^2}(1 + 2ye^{x^2})$

9. Agar $z = \arctg \frac{x+y}{1-xy}, y = \cos x$ bo'lsa, $\frac{dz}{dx}$ topilsin. J: $\frac{1}{1-x^2} - \frac{1}{1+y^2} \sin x$

10. Agar $z = \frac{x^2}{y}, x = u - 2v, y = v + 2u$ bo'lsa, $\frac{\partial z}{\partial u}$ va $\frac{\partial z}{\partial v}$ lar

topilsin. J: $\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{2x}{y} \left(1 - \frac{x}{y}\right), \quad \frac{\partial z}{\partial v} = -\frac{x}{y} \left(4 + \frac{x}{y}\right)$

11. Agar $p = u^2 \ln v, u = \frac{x}{y}, v = 3x - 2y$ bo'lsa, $\frac{\partial p}{\partial x}$ va $\frac{\partial p}{\partial y}$ lar

topilsin. J: $\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{2}{vy} (3x + 2v \ln v), \quad \frac{\partial p}{\partial y} = -\frac{2xu}{vy^2} (y + v \ln v)$

12. Agar $z = \arctg \frac{u}{v}, u = x \sin y, v = x \cos y$ bo'lsa, $\frac{\partial z}{\partial x}$ va $\frac{\partial z}{\partial y}$ lar

topilsin. J: $\frac{\partial z}{\partial x} = 0; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 1$

13. Agar $z = \ln(u^2 + v), u = e^{x+y^2}, v = x^2 + y$ bo'lsa, $\frac{\partial z}{\partial x}$ va $\frac{\partial z}{\partial y}$

lar topilsin. J: $\frac{2}{u^2+v} (ue^{x+y^2} + x); \quad \frac{1}{u^2+v} (2uye^{x+y^2} + 1)$

14. Oshkormas ko'rinishda $(x^2 + y^2)^3 - 3(x^2 + y^2) + 1 = 0$

tenglama bilan berilgan $y(x)$ funksiyaning hosilasini toping. J: $-\frac{x}{y}$

15. Oshkormas ko'rinishda $x^2 - 2y^2 + 3z^2 - yz + y = 0$

tenglama bilan berilgan $z(x, y)$ funksiyaning xususiy hosilalarini toping.

J: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x}{6z-y}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1-4y-z}{6z-y}$

16. Oshkormas holda berilgan quyidagi funksiyalarning xususiy hosilalari topilsin.

1) $x^2 + y^2 + z^2 - 6x = 0; \quad 2) z^2 = xy;$

3) $\cos(ax + by - cz) = k(ax + by - cz);$

4) $x^2 + y^2 + z^2 - 2zx = a^2.$

J: 1) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{3-x}{z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{z}; \quad 2) \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{2z}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{2z};$

3) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{a}{c}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{b}{c}; \quad 4) \frac{\partial z}{\partial x} = 1, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x-z}$

17. $2\sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ bo'lsa, $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ bo'lishi ko'rsatilsin.

4-§. Yuqori tartibli xususiy hosilalar va to'liq differensiallar

$z = f(x, y)$ funksiyaning ikkinchi tartibli xususiy hosilalari deb, birinchi tartibli xususiy hosilalardan olingan xususiy hosilalarga aytiladi. Ikkinchi tartibli xususiy hosilalar quyidagicha belgilanadi:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = z''_{xx} = f''_{xx}(x, y); \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = z''_{xy} = f''_{xy}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = z''_{yx} = f''_{yx}(x, y); \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = z''_{yy} = f''_{yy}(x, y)$$

f''_{xy} va f''_{yx} xususiy hosilalar aralash hosilalar deyiladi.

Uchinchi tartibli va boshqa yuqori tartibli xususiy hosilalar ham shunga o'xshash ta'riflanadi va belgilanadi.

Hosila olish tartibi bilangina farqlanuvchi aralash hosilalar uzluksiz bo'lsa, ular o'zaro teng bo'ladi.

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} = \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y \partial x} = \frac{\partial^3 z}{\partial y \partial x^2}$$

Yuqori tartibli to'liq differensiallar quyidagicha aniqlanadi:

$$d^2 z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2 = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^2 z$$

$$d^3 z = \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} dx^3 + 3 \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} dx^2 dy + 3 \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} dx dy^2 + \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} dy^3 = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^3 z$$

$$d^n z = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^n z$$

1. Quyidagi funksiyalarning ikkinchi tartibli xususiy hosilalari topilsin.

1) $z = xy$; 2) $z = e^{ax+by}$; 3) $z = e^{-xy}$;

4) $z = x^3 - 2x^2y + 3y^2$; 5) $u = e^{xyz}$; 6) $z = x^2y + y^3$.

1) 1) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$; 2) $z''_{xx} = a^2 e^{ax+by}$;

$f''_{yy} = abe^{ax+by}$, $z''_{yy} = b^2 e^{ax+by}$; 3) $z''_{xx} = y^2 e^{xy}$, $z''_{xy} = e^{xy}(xy + 1)$, $z''_{yy} = x^2 e^{-xy}$; 4) $z''_{xx} = 6x - 4y$, $z''_{xy} = -4x$,

$f''_{yy} = 6$; 5) $u''_{xx} = y^2 t^2 e^{xyt}$, $u''_{xy} = u''_{yx} = t(1 + xyt)e^{xyt}$,

$u''_{xt} = u''_{tx} = y(1 + xyt)e^{xyt}$; $u''_{yt} = u''_{ty} = x(1 + xyt)e^{xyt}$,

$u''_{yy} = y^2 t^2 e^{xyt}$, $u''_{tt} = x^2 e^{xyt} \cdot y^2$; 6) $z''_{xx} = 2y$, $z''_{xy} = z''_{yx} = 2x$,

$f''_{yy} = 6y$.

2. $u = \sin(xyz)$ funksiya uchun u''_{xyz} topilsin.

1) $(1 - x^2y^2z^2) \cos(xyz) - 3xyz \sin(xyz)$.

3. $u = \ln(x + y)$ funksiya uchun u''_{xy} topilsin.

4. $u = 2^{xyz}$ funksiya uchun u''_{yx} topilsin.

5. $z = \ln \frac{x}{y}$ va $z = \arctg(x + 2y)$ funksiyalar uchun $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$

tenglikni o'rinli bo'lishi ko'rsatilsin.

6. $z = e^{xy}$ funksiya $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} - z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2z$ tenglamani

qanoatlantirishini tekshiring.

7. $u = \frac{y}{x}$ funksiyaning 3-tartibli xususiy hosilalari topilsin.

8. $u = x^4 + 3x^2y^2 - 2y^4$ funksiyaning 4-tartibli xususiy hosilalari topilsin.

9. $u = \frac{y}{x^2}$ funksiyaning 3-tartibli xususiy hosilalari topilsin.

10. 1) $z = \frac{y^2}{x^2}$; 2) $z = x \ln \frac{y}{x}$ bo'lsa, $d^2 z$ topilsin.

1) 1) $\frac{2}{x^2} (3y^2 dx^2 - 4xy dx dy + x^2 dy^2)$; 2) $-\frac{(y dx - x dy)^2}{xy^2}$.

11. $z = y \ln x$ funksiya berilgan $d^2 z$ va $d^3 z$ topilsin.

$$J: d^2 z = -\frac{y}{x^2} dx^2 + \frac{2}{x} dx dy, \quad d^3 z = \frac{2y}{x^3} dx^3 - \frac{3}{x^2} dx^2 dy$$

12. $z = x^2 y^2$ funksiya berilgan. $d^2 z$ topilsin.

$$J: d^2 z = 2y^2 dx^2 + 8xy dx dy + 2x^2 dy^2.$$

13. $z = \cos(x + 2y^2)$ funksiya berilgan. $d^2 z$ topilsin.

14. $z = x^3 y^3$ funksiya berilgan. $d^2 z$ topilsin.

$$J: 6xy^3 dx^2 + 18x^2 y^2 dx dy + 6x^3 y dy^2.$$

5-§. Sirtga urinma tekislik va normal. Yo'nalish bo'yicha hosila.

Gradient

Agar sirt $z = f(x, y)$ tenglama bilan berilgan bo'lsa, u holda $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqtada bu sirtga o'tkazilgan urinma tekislik tenglamasi:

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

normal tenglamasi:

$$\frac{x - x_0}{f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{1}$$

dan iborat bo'ladi.

Agar sirt $F(x, y, z)$ tenglama bilan berilib, $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqta shu sirtga yotuvchi nuqta bo'lsa, u holda sirtga M_0 nuqtada o'tkazilgan urinma tekislik tenglamasi

$$(x - x_0)F'_x(M_0) + (y - y_0)F'_y(M_0) + (z - z_0)F'_z(M_0) = 0$$

tenglama bilan aniqlanadi. M_0 nuqtada sirtga o'tkazilgan normal

$$\frac{x - x_0}{F'_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(M_0)}$$

tenglama bilan aniqlanadi.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial F}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial^2 F}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial^2 F}{\partial z} \cos \gamma$$

holida $y = F(x, y, z)$ funksiyaning berilgan $l_0 = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ yo'nalish bo'yicha hosilasi deyiladi.

$u = F(x, y, z)$ skalyarning gradienti deb, $\text{grad } u = \frac{\partial u}{\partial x} i + \frac{\partial u}{\partial y} j + \frac{\partial u}{\partial z} k$ vektorga aytiladi.

1. $z = x^2 - xy + y^2 - x + 2y$ sirtga $M_0(1, 1, 1)$ nuqtada o'tkazilgan urinma tekislik va normal tenglamalari tuzilsin.

$$J: x - 2y + z = 0 \quad \text{va} \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{1}$$

2. $z = x^3 + y^3 + z^3 + xyz - 6 = 0$ sirtga $M_0(1, 2, -1)$ nuqtada o'tkazilgan urinma tekislik va normal tenglamalari tuzilsin.

$$J: x + 11y + 5z - 18 = 0 \quad \text{va} \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{11} = \frac{z+1}{5}$$

3. $z = x^2 + 2y^2$ sirtga $M_0(1, 1, 3)$ nuqtada o'tkazilgan urinma tekislik tenglamasi tuzilsin. J: $2x + 4y - z = 3$.

4. Absissalar o'qining musbat yo'nalishi bilan 60° li burchak hosil qiluvchi l vektor yo'nalishi bo'yicha $f(x, y) = x^3 - y^3$ funksiyaning $M(1, 1)$ nuqtadagi hosilasi topilsin. J: $\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{3}{2}(1 - \sqrt{3})$.

5. Absissalar o'qining musbat yo'nalishi bilan α burchak hosil qiluvchi l vektor yo'nalishi bo'yicha $f(x, y) = 3x^2 - 6xy + y^2$ funksiyaning $M(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{2})$ nuqtadagi hosilasi topilsin.

$$J: \frac{\partial f}{\partial t} = \cos \alpha + \sin \alpha.$$

6. $u = x^2 + y^2 + z^2$ funksiyaning $S = 2i + j + 3k$ vektor yo'nalishi bo'yicha $M(1, 1, 1)$ nuqtadagi hosilasi topilsin. J: $\frac{12}{\sqrt{14}}$.

7. $u = x^2 + y^2 + z^2$ funksiyaning $S = i + j + k$ vektor yo'nalishi bo'yicha $M(1, 1, 1)$ nuqtadagi hosilasi topilsin. J: $2\sqrt{3}$.

8. $u = x^2 + y^2 + z^2$ funksiyaning $M(1,1,1)$ nuqtadagi gradienti topilsin. $J: |gradu|_M = 2\sqrt{3}$.

9. $u = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3}$ funksiyaning $M(2,4)$ nuqtadagi gradienti topilsin.

$J: gradu = 2i + \frac{8}{3}j$.

6-§. Ko'p o'zgaruvchili funksiyaning ekstremumlari. Taylor formulasi

Agar $z = f(x, y)$ funksiyaning $P_0(x_0, y_0)$ nuqtadagi qiymati uning bu nuqtani biror atrofidagi istalgan $P(x, y)$ nuqtasidagi qiymatidan katta, ya'ni $f_0(x_0, y_0) > f(x, y)$ bo'lsa, u holda $z = f(x, y)$ funksiya $P_0(x_0, y_0)$ nuqtada maksimumga ega deyiladi.

Agar $z = f(x, y)$ funksiyaning $P_0(x_0, y_0)$ nuqtadagi qiymati uning bu nuqtani biror atrofidagi istalgan $P(x, y)$ nuqtasidagi qiymatidan kichik, ya'ni $f_0(x_0, y_0) < f(x, y)$ bo'lsa, u holda $z = f(x, y)$ funksiya $P_0(x_0, y_0)$ nuqtada minimumga ega deyiladi.

Funksiyaning maksimumi yoki minimumi uning ekstremumlari deyiladi.

Funksiya ekstremumga ega bo'lgan nuqta uning ekstremum nuqtasi deyiladi.

Ekstremumning zaruriy sharti. Agar $P_0(x_0, y_0)$ nuqta $z = f(x, y)$ uzluksiz funksiyaning ekstremum nuqtasi bo'lsa, u holda $f'_x(x_0, y_0) = 0$, $f'_y(x, y) = 0$ bo'ladi yoki bu hosilalarning aqalli bittasi mavjud bo'lmaydi.

Bu shartlar bajariladigan nuqtalar kiritik nuqtalar deyiladi. Har qanday kiritik nuqta ham ekstremum nuqtasi bo'lmaymaydi.

Ikkinchi tartibli hosilalarning $P_0(x_0, y_0)$ kiritik nuqtadagi qiymatlarini mos ravishda A , B va C lar bilan belgilaymiz, ya'ni

$$A = f''_{xx}(x_0, y_0), \quad B = Z''_{xy}(x_0, y_0), \quad C = Z''_{yy}(x_0, y_0)$$

bu yerda, $\Delta = AC - B^2$ diskriminantni tuzamiz.

Ekstremumning yetarli sharti.

a) Agar $\Delta > 0$ bo'lsa, $Z = f(x, y)$ funksiya $P_0(x_0, y_0)$ nuqtada ekstremumga ega bo'lib, bunda $A < 0$ (yoki $C < 0$) bo'lganda P_0 nuqta maksimum nuqtasi, $A > 0$ (yoki $C > 0$) bo'lganda minimum nuqtasi bo'ladi.

b) Agar $\Delta < 0$ bo'lsa, P_0 nuqtada ekstremum mavjud emas.

c) Agar $\Delta = 0$ bo'lsa, ekstremum mavjud bo'lishi ham mavjud bo'lmashligi ham mumkin.

Chegaralangan yopiq D sohada differensiallanuvchi funksiya z ning eng katta va eng kichik qiymatiga yo D soha ichida yotuvchi kiritik nuqtada yo bu soha chegarasida erishadi.

Yopiq D sohada funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatini topish uchun: a) soha ichida va uning chegarasida yotgan barcha kiritik nuqtalar topiladi;

b) Funksiyaning bu nuqtalardagi va chegaradagi qiymatlari hisoblanadi;

c) topilgan qiymatlar orasidan eng katta va eng kichik qiymatlar ajratiladi.

$z = f(x, y)$ funksiyaning shartli ekstremumi deb, bu funksiyaning x va y o'zgaruvchilarining bog'lanish tenglamasi deb ataluvchi $\varphi(x, y) = 0$ tenglama bilan bog'langanlik shartida erishadigan ekstremumga aytiladi.

Ushbu $\Phi(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$ funksiya Lagranj funksiyasi deyiladi. Bu yerda λ – biror o'zgarimas ko'paytuvchi. Shartli ekstremumni topish $\Phi(x, y, \lambda)$ funksiyaning oddiy ekstremumini izlashga keltiriladi. Lagranj funksiyasi ekstremumining zaruriy sharti quyidagicha bo'ladi:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} = 0. \end{cases} \quad \text{yoki} \quad \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0, \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

Agar $P_0(x_0, y_0)$, λ_0 – bu sistemaning istalgan yoechimi va

$$\Delta = - \begin{vmatrix} 0 & \varphi'_x(x_0, y_0) & \varphi'_y(x_0, y_0) \\ \varphi'_x(x_0, y_0) & \Phi''_{xx}(x_0, y_0, \lambda_0) & \Phi''_{xy}(x_0, y_0, \lambda_0) \\ \varphi'_y(x_0, y_0) & \Phi''_{xy}(x_0, y_0, \lambda_0) & \Phi''_{yy}(x_0, y_0, \lambda_0) \end{vmatrix}$$

bo'lsa, $\Delta < 0$ da $z = f(x, y)$ funksiya $P_0(x_0, y_0)$ nuqtada shartli maksimumga, $\Delta > 0$ da shartli minimumga ega bo'ladi.

Agar $z = f(x, y)$ funksiya $P_0(x_0, y_0)$ nuqta atrofida $(n+1)$ - tartibgacha uzluksiz xususiy hosilalarga ega bo'lsa, u holda qaralayotgan nuqta atrofida ushbu **Taylor formulasi** o'rinlidir:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x_0, y_0) + \frac{1}{1!} [f'_x(x_0, y_0)(x-x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y-y_0)] + \\ &+ \frac{1}{2!} [f''_{xx}(x_0, y_0)(x-x_0)^2 + 2f''_{xy}(x_0, y_0)(x-x_0)(y-y_0) + f''_{yy}(x_0, y_0)(y-y_0)^2] + \\ &\dots + \frac{1}{n!} \left[(x-x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y-y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right]^n f(x_0, y_0) + R_n(x, y), \text{ bu yerda} \\ R_n(x, y) &= \frac{1}{(n+1)!} \left[(x-x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y-y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right]^{n+1} f((x_0 + \theta(x-x_0)), (y_0 + \\ &+ \theta(y-y_0))), \quad 0 < \theta < 1. \end{aligned}$$

Taylor formulasida $x_0 = y_0 = 0$ bo'lsa, u holda hosil bo'lgan formula **Makloren formulasi** deyiladi.

1. Quyidagi funksiyalarning ekstremumlari topilsin.

1) $z = xy(x + y - 2)$; 2) $z = x^2 - xy + y^2 + 9x - 6y + 20$;

3) $z = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$; 4) $z = x^3 + 8y^3 - 6xy + 1$;

5) $z = 2xy - 4x - 2y$; 6) $z = e^{\frac{x}{2}}(x + y^2)$;

7) $z = 3x + 6y - x^2 - xy - y^2$; 8) $z = x^2 + y^2 - 2x - 4\sqrt{xy} - 2y + 8$;

9) $z = 2x^3 - xy^2 + 5x^2 + y^2$; 10) $z = 3x^2 - 2x\sqrt{y} + y - 8x + 8$;

11) $z = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$; 12) $z = \frac{1}{2}xy + (17 - x - y)\left(\frac{x}{3} + \frac{y}{6}\right)$;

13) $z = xy^2(1 - x - y)$; 14) $z = x^3 + y^3 - 15xy$.

1) $z_{\min} = z\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = -\frac{8}{27}$; 2) $z_{\min} = -1$; 3) $z_{\max}(4, 4) = 12$;

4) $z_{\min}\left(1, -\frac{1}{2}\right) = 0$; 5) Ekstremum mavjud emas; 6) $z_{\min}(-2, 0) = -\frac{2}{3}$;

7) $z_{\min}(0, 3) = 9$; 8) $z_{\min}(2, 2) = 0$; 9) $z_{\min}(0, 0) = 0$;

10) $z_{\min}(2, 4) = 0$; 11) $z_{\min} = -9$; 12) $z_{\max} = 282$;

13) $z_{\max} = \frac{1}{64}$; 14) $z_{\min} = -125$.

2. Quyidagi funksiyalarning ko'rsatilgan sohadagi eng katta va eng kichik qiymatlarini toping.

1) $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$; $x \leq 0, y \leq 0, x + y \geq -3$;

2) $z = x^2 - xy + y^2 - 4x$; $x \geq 0, y \geq 0, 2x + 3y \leq 12$;

3) $z = x^2 + 3y^2 + x - y$; $x \leq 1, y \leq 1, x + y \geq 1$;

4) $z = x^2 + 2xy - 4x + 8y$; $x \geq 0, y \geq 0, x \leq 1, y \leq 2$;

5) $z = x^2 - 2y^2 + 4xy - 6x + 5$; $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3$.

1) $z_{\text{eng katta}} = 6, z_{\text{eng kichik}} = -1$; 2) $z_{\text{eng kichik}} = -\frac{16}{3}, z_{\text{eng katta}} = 16$;

3) $z_{\text{eng kichik}} = 1, z_{\text{eng katta}} = 4$; 4) $z_{\text{eng kichik}} = -3, z_{\text{eng katta}} = 17$;

5) $z_{\text{eng kichik}} = -9, z_{\text{eng katta}} = 5$.

3. Quyidagi funksiyalarning shartli ekstremumlari topilsin.

1) $z = x + 2y$ ni $x^2 + y^2 = 5$ shartda;

2) $z = x^2 + y^2 - xy + x + y - 4$ ni $x + y = 3$ shartda;

3) $z = xy$ ni $2x + 3y - 5 = 0$ shartda;

4) $z = x^2 + y^2$ ni $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$ shartda;

5) $z = 6 - 4x - 3y$ ni $x^2 + y^2 = 1$ shartda;

6) $z = \cos^2 x + \cos^2 y$ ni $y - x = \frac{\pi}{4}$ shartda;

7) $z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ ni $x + y = 2$ shartda;

8) $z = xy^2$ ni $x + 2y = 1$ shartda.

1) $z_{\min} = -5, z_{\max} = 5;$ 2) $z_{\min} = -\frac{16}{4};$ 3) $z_{\max} = \frac{25}{24};$

4) $z_{\min} = \frac{144}{25};$ 5) $z_{\max} = 11, z_{\min} = 1;$ 6) $z_{\max} = \frac{2+\sqrt{2}}{2}, z_{\min} = \frac{2-\sqrt{2}}{2};$

7) $z_{\min} = 2;$ 8) $z_{\min} = 0, z_{\max} = \frac{1}{27};$

4. $z = x^3 - 5x^2 - xy + y^2 + 10x + 5y - 4$ funksiyani $P_0(2, -1)$ nuqta atrofida Teylor formulasi bo'yicha yoying.

5. $z = x^3 - 2y^3 + 3xy$ funksiyani $P_0(1, 2)$ nuqta atrofida Teylor formulasi bo'yicha yoying.

6. $z = e^{x-y}$ funksiyani $P_0(1, -1)$ nuqta atrofida uchinchi tartibli hadfargacha Teylor formulasi bo'yicha yoying.

7. $z = e^x \sin y$ funksiyani $P_0(0, 0)$ nuqta atrofida Teylor formulasi bo'yicha yoying.

IX BOB. ODDIV DIFFERENSIAL TENGLAMALAR

1-§. Differensial tenglamalar bo'yicha asosiy tushunchalar. Birinchi tartibli tenglamalar. O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan tenglamalar. Bir jinsli va bir jinsli tenglamaga keltiriladigan tenglamalar. To'la differensialli tenglamalar

Erkli o'zgaruvchi x , noma'lum funksiya y va uning turli tartibli hosilalari $y', y'', y''', \dots, y^{(n)}$ lar orasidagi bog'lanishni ifodalovchi tenglik oddiy differensial tenglama deb ataladi.

Noma'lum funksiyaning differensial tenglamada qatnashuvchi hosilalarining eng yuqori tartibi bu differensial tenglamaning tartibi deyiladi.

Umumiy holda n - tartibli differensial tenglama

$$F(x, y, y', y'', y''', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

ko'rinishda yoziladi

Agar bu tenglamani $y^{(n)}$ ga nisbatan yechish mumkin bo'lsa, u holda uni $y^{(n)} = f(x, y, y', y'', y''', \dots, y^{(n-1)})$ (2) ko'rinishda yoziladi.

Agar biror $\varphi(x)$ funksiya n marta differensiallanuvchi bo'lib, bu funksiya va uning hosilalari (1) yoki (2) tenglamaga qo'yilganda bu tenglama ayniyat ko'rinishiga kelsa, unda $\varphi(x)$ funksiya (1) yoki (2) tenglamaning yechimi deyiladi.

(1) yoki (2) tenglamaning yechimini topish uni integrallash topilgan $y = \varphi(x)$ yechim esa uning integrali deyiladi.

$y' = f(x, y)$ (3) – tenglamani birinchi tartibli hosilaga nisbatan yechilgan tenglama deyiladi. Uni $y' = \frac{dy}{dx}$ ekanligini e'tiborga olib, boshqacha $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ yoki $dy = f(x, y)dx$ ko'rinishida yozish mumkin.

(3) – differensial tenglamani berilgan x_0 nuqtada y_0 qiymatni qabul qiluvchi $y = y(x)$ yechimini topish masalasi Koshi masalasi deyiladi.

Bundagi shart $y(x_0) = y_0$ yoki $y|_{x=x_0} = y_0$ (4) ko'rinishida yoziladi va uni boshlang'ich shart deb ataladi.

Rifta ixtiyoriy o'zgarmas c soniga bog'liq $y = \varphi(x, c)$ funktsiya birinchi tartibli (3)–differensial tenglamaning umumiy yechimi deyiladi, agar u quyidagi ikkita shartni qanoatlantirsa:

1) bu funktsiya c o'zgarmas sonning har bir qiymatida (3)–tenglamani yechimi bo'ladi;

2) berilgan (4)–boshlang'ich shartda c o'zgarmaning shunday c_0 qiymati topiladiki, $y = \varphi(x, c_0)$ funktsiya bu boshlang'ich shartni qanoatlantiradi.

Birinchi tartibli differensial tenglamaning umumiy yechimi ko'pincha $F(y, x, c) = 0$ ko'rinishida oshkormas holda topilishi mumkin. Bunday hollarda $F(y, x, c) = 0$ ga differensial tenglamaning umumiy integrali deyiladi.

$y' = f(x)$ (5) – tenglama eng sodda birinchi tartibli differensial tenglama bo'lib, uning yechimi $y = \int f(x)dx$ dan iborat bo'ladi.

$$y' = -\frac{M(x)}{N(y)} \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{M(x)}{N(y)} \rightarrow M(y)dy + N(x)dx = 0$$

(5) – tenglamaga o'zgaruvchilari ajralgan birinchi tartibli differensial tenglama deyiladi. Bu tenglama har ikkala qismini hadma-had ajratish orqali yechiladi, ya'ni

$$\int M(y)dy + \int N(x)dx = C \quad (6)$$

$$f_1(x) \cdot f_2(y)dx + f_3(x) \cdot f_4(y)dy = 0 \quad (7)$$

tenglama o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama deyiladi. Bu tenglamani yechish uchun $f_2(y) \neq 0$, $f_3(x) \neq 0$ shartda tenglamani har ikkala qismini hadma-had $f_2(y) \cdot f_3(x)$ ifodaga bo'lamiz va natijada shu ko'rib o'tilgan

$$\frac{f_1(x)}{f_3(x)}dx + \frac{f_4(y)}{f_2(y)}dy = 0$$

tenglamaga ega bo'lamiz. Bundan esa (7) tenglamaning umumiy yechimi uchun

$$\int \frac{f_1(x)}{f_3(x)}dx + \int \frac{f_4(y)}{f_2(y)}dy = C$$

formulaga ega bo'lamiz.

Agar $f(x, y)$ funktsiya ixtiyoriy o'zgarmas λ soni uchun $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda f(x, y)$ shartni qanoatlantirsa, u holda bu funktsiya x va y o'zgaruvchilarga nisbatan bir jinsli funktsiya deyiladi.

Agar $f(x, y)$ funktsiya bir jinsli funktsiya bo'lsa, u holda uni $f(x, y) = g\left(\frac{y}{x}\right)$ ko'rinishida yozish mumkin.

Agar birinchi tartibli $y' = f(x, y)$ tenglamada $f(x, y)$ bir jinsli funktsiya bo'lsa, u holda uni bir jinsli differensial tenglama deyiladi. Bu tenglama $u = \frac{y}{x}$ yoki $y = ux$ almashtirish bilan yechiladi.

$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}$ (*) ko'rinishdagi tenglamalar bir jinsli tenglamalarga keltiriladi. Bu yerda $c_1 \neq 0, c_2 \neq 0, x = x_1 + h, y = y_1 + k$ almashtirish qilamiz. U holda $\frac{dy}{dx} = \frac{dy_1}{dx_1}$ (*). x, y va $\frac{dy}{dx}$ larining ifodalarni (*) tenglamaga qo'ysak,

$$\frac{dy_1}{dx_1} = \frac{ax_1+by_1+ah+bk+c}{a_1x_1+b_1y_1+a_1h+b_1k+c_1} \quad (*)''$$

hosil bo'ladi. h va k ni $\begin{cases} ah + bk + c = 0 \\ a_1h + b_1k + c_1 = 0 \end{cases}$ tengliklar o'rtasida bo'ladigan qilib tanlaymiz, ya'ni h va k ni yuqoridagi tenglamalar sistemasining yechimi kabi aniqlaymiz. Bu shartda (*)'' tenglama

$$\frac{dy_1}{dx_1} = \frac{ax_1+by_1}{a_1x_1+b_1y_1}$$

bir jinsli tenglamaga aylanadi. Bu tenglamani yechib, so'ngra (*) formulaga muvofiq, yana x va y larga qo'ysak, $\frac{dy_1}{dx_1} = \frac{ax_1+by_1}{a_1x_1+b_1y_1}$ tenglama hosil bo'ladi. Bu bir jinsli tenglamadir. Uni yechish usuli bizga ma'lum.

Agar $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ (9) tenglamada $M(x, y)$ va $N(x, y)$ funksiyalar tekislikdagi biror D sohada uzluksiz, differensiallanuvchi bo'lib, ularning xususiy hosilalari uchun

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

shart bajarilib, bu hosilalar ham D sohada uzluksiz bo'lsa, unda tenglama to'liq differensialli tenglama deyiladi.

To'liq differensialli (9) tenglamaning chap tomonini

$$U(x, y) = \int_{x_0}^x M(t, y) dt + \int_{y_0}^y N(x_0, s) ds \quad (9')$$

hisob bilan topiladigan funksiyaning to'liq differensialli ko'rinishida ifodalash mumkin. Bu holda (9) tenglamaning umumiy integrali $U(x, y) = C$ tenglik bilan oshkormas ko'rinishda ifodalanadi.

$U(x, y)$ ni topish uchun y ni o'zgarmas deb qaraymiz. U holda $dy = 0$ ekanligidan $du = M(x, y)dx$ bo'ladi. Bu tenglikni x bo'yicha integrallasak,

$$U = \int M(x, y)dx + \varphi(y)$$

Oxirgi tenglikni y bo'yicha differensiallaymiz va natijani $N(x, y)$ ga tenglaymiz. Chunki $\frac{\partial U}{\partial y} = N(x, y)$.

$$\int \frac{\partial M}{\partial y} dx + \varphi'(y) = N(x, y) \text{ yoki } \varphi'(y) = N(x, y) - \int \frac{\partial M}{\partial y} dx$$

U ifodani y bo'yicha integrallab, $\varphi(y)$ ni topamiz:

$$\varphi(y) = \int \left(N(x, y) - \int \frac{\partial M}{\partial y} dx \right) dy + c.$$

$$\text{Demak, } U(x, y) = \int M(x, y)dx + \int \left(N(x, y) - \int \frac{\partial M}{\partial y} dx \right) dy + c.$$

Bu ifodani ixtiyoriy o'zgarmasga tenglab, tenglamaning umumiy integralini hosil qilamiz.

Agar $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ tenglamada

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

bo'lsa, u holda tenglama to'liq differensialli tenglama bo'lmaydi. Bu holda ba'zi shartlar bajarilganda shunday $\mu(x, y)$ funksiyani topish mumkinki uning uchun $\mu M dx + \mu N dy = dU$ bo'ladi. Bu $\mu(x, y)$ funksiya integrallovchi ko'paytuvchi deyiladi.

Quyidagi hollarda integrallovchi ko'paytuvchini topish oson:

$$1) \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \Phi(x) \text{ bo'lganda } \ln \mu = \int \Phi(x) dx \text{ bo'ladi;}$$

$$2) \frac{\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}}{M} = \Phi_1(y) \text{ bo'lganda, } \ln u = \int \Phi_1(y) dy \text{ bo'ladi.}$$

1. Quyidagi funksiyalar berilgan differensial tenglamalarning yechimi ekanligi tekshirilsin.

- 1) $y = \sqrt{x}$ funksiya $2yy' = 1$ tenglamani;
- 2) $\ln x \ln y = c$ funksiya $y \ln y dx + x \ln x dy = 0$ tenglamani;
- 3) $S = -t - \frac{1}{2} \sin 2t$ funksiya $\frac{d^2s}{dt^2} + \operatorname{tg} t \cdot \frac{ds}{dt} = \sin 2t$ tenglamani;
- 4) $y = Ce^{-2x}$ funksiya $y' - 2y = 0$ tenglamani;
- 5) $y = C_1 x + C_2 x^2$ funksiya $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$ tenglamani;
- 6) $x^2 + 2xy = C$ funksiya $(x + y)dx + xdy = 0$ tenglamani.

2. Quyidagi o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalarning umumiy integrallari topilsin.

- 1) $(x + 1)^3 dy - (y - 2)^2 dx = 0$; 6) $xyy' = 1 - x^2$;
- 2) $\sec^2 x \sec y dx = -\operatorname{ctg} x \sin y dy$; 7) $yy' = \frac{1-2x}{y}$;
- 3) $(\sqrt{xy} + \sqrt{x})y' - y = 0$; 8) $xy' + y = y^2$;
- 4) $yy' + x = 1$; 9) $y' + \frac{1-y^2}{\sqrt{1-x^2}} = 0$;
- 5) $(y + xy)dx + (x - xy)dy = 0$; 10) $y' = 10^{x+y}$;
- J: 1) $\frac{1}{y-2} + \frac{1}{2(x-1)^2} = C$; 2) $\operatorname{tg}^2 x + \sin^2 y = C$;
- 3) $2\sqrt{y} + \ln|y| - 2\sqrt{x} = C$; 4) $(x-1)^2 + y^2 = C^2$;
- 5) $x - y + \ln(xy) = C$; 6) $x^2 + y^2 = \ln Cx^2$;
- 7) $y = \sqrt[3]{C + 3x - 3x^2}$; 8) $Cx = \frac{y-1}{y}$;
- 9) $x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2} = C$; 10) $10^x + 10^{-y} = C$.

3. Quyidagi o'zgaruvchilari ajratiladigan differensial tenglamalarning berilgan boshlang'ich shartlari qanoqlantiruvchi umumiy integrallari topilsin.

- 1) $2y\sqrt{x} = y$ tenglamani $x = 4$ bo'lganda $y = 1$ bo'ladigan;
- 2) $y' = (2y + 1)\operatorname{ctg} x$ tenglamani $x = \frac{\pi}{4}$ bo'lganda $y = \frac{1}{2}$ bo'ladigan;
- 3) $x^2 y' + y^2 = 0$ tenglamani $x = -1$ bo'lganda $y = 1$ bo'ladigan;
- 4) $y' = 2\sqrt{y} \ln x$ tenglamani $x = e$ bo'lganda $y = 1$ bo'ladigan;
- 5) $(1 + x^2)y' + y\sqrt{1 + x^2} = xy$ tenglamani $x = 0$ bo'lganda $y = 1$ bo'ladigan;
- 6) $y^2 + x^2 y' = 0$ tenglamani $x = -1$ bo'lganda $y = 1$ bo'ladigan;
- 7) $2(1 + e^x)yy' = e^x$ tenglamani $x = 0$ bo'lganda $y = 0$ bo'ladigan;
- 8) $(1 + x^2)y^3 dx - (y^2 - 1)x^3 dy = 0$ tenglamani $x = 1$ bo'lganda $y = -1$ bo'ladigan.
- J: 1) $y = e^{\sqrt{x-2}}$; 2) $y = 2\sin^2 x - \frac{1}{2}$; 3) $y = -x$; 4) $\sqrt{y} = x \ln x - x + 1$;
- 5) $y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x - \sqrt{1+x^2}}$; 6) $x + y = 0$; 7) $2ye^{y^2} = e^x + 1$;
- 8) $x^{-2} + y^{-2} = 2 \left(1 + \ln \left| \frac{x}{y} \right| \right)$.

4. Quyidagi bir jinsli tenglamalar yechilsin.

- 1) $(x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0$; 2) $y - xy' = y \ln \frac{x}{y}$;
- 3) $y - xy' = x + yy'$; 4) $ydy + (x - 2y)dx = 0$;
- 5) $ydx + (2\sqrt{xy} - x)dy$; 6) $xy + y^2 = (2x^2 + xy)y'$;
- 7) $yy' = 2y - x$; 8) $x^2 y' = y^2 + xy$.

- 3) 1) $y^2 = x^2 - cx$; 2) $y = xe^{cx}$; 3) $\arctg \frac{y}{x} + \ln c \sqrt{x^2 + y^2} = 0$
 4) $x = (y-x) \ln c(y-x)$; 5) $\sqrt{x} + \sqrt{y} \ln cy = 0$; 6) $y^2 = cxe^{-1}$
 7) $y-x = ce^{y-x}$; 8) $y = \frac{x}{c-\ln x}$

5. Quyidagi bir jinsli tenglamalarni berilgan boshlang'ich shartlar bo'yicha xususiy integrallari topilsin.

1) $y + \sqrt{x^2 + y^2} - xy' = 0$ tenglamani $x=1$ bo'lganda $y=0$ bo'ladigan;

2) $xy' = y(1 + \ln \frac{y}{x})$ tenglamani $x=1$ bo'lganda $y = \frac{1}{2}$ bo'ladigan;

3) $y' = \frac{y^2}{x^2} - \frac{y}{x}$ tenglamani $x=-1$ bo'lganda $y=1$ bo'ladigan;

4) $(y^2 - 3x^2)dy + 2xydx = 0$ tenglamani $x=1$ bo'lganda $y=-2$ bo'ladigan;

5) $xy' - y = xtg \frac{y}{x}$ tenglamani $x=1$ bo'lganda $y = \frac{\pi}{2}$ bo'ladigan;

6) $xy' = xe^{\frac{y}{x}} + y$ tenglamani $x=1$ bo'lganda $y=0$ bo'ladigan.

J: 1) $y = \frac{x^2-1}{2}$; 2) $y = xe^{cx}$; 3) $y = \frac{2x}{1-cx^2}$; 4) $3y^3 = 8(x^2 - y^2)$;

5) $y = x \arcsin x$; 6) $y = -x \ln|1 - \ln x|$.

6. Bir jinsli tenglamaga keltiriladigan quyidagi tenglamalar yechilsin.

1) $y' = -\frac{2x+y+1}{x+2y-2}$; 2) $(x-2y-3)y' + (2x+y-1) = 0$;

3) $(x-y+4)dy + (x+y-2)dx = 0$; 4) $y' = \frac{2x-y+1}{x-2y+1}$;

5) $(2x-y+4)dy + (x-2y+5)dx = 0$; 6) $y' = \frac{2x+y-1}{4x+2y+5}$;

- 1) 1) $x^2 + xy + y^2 + x - y = c$; 2) $x^2 + xy - y^2 - x + 3y = c$;
 3) $x^2 + 2xy - y^2 - 4x + 8y = c$; 4) $x^2 - xy + y^2 + x - y = c$;
 5) $(x+y-1)^2 - c(x-y+3)$; 6) $10y - 5x + 7 \ln|10x + 5y + 9| - c$.

7. Quyidagi to'liq differensialli differensial tenglamalar yechilsin.

1) $(4 - \frac{y^2}{x^2})dx + \frac{2y}{x}dy = 0$; 2) $3x^2 e^y dx + (x^3 e^y - 1)dy = 0$;

3) $e^{-y} dx + (1 - xe^{-y})dy = 0$;

4) $2x \cos^2 y dx + (2x - x^2 \sin 2y)dy = 0$;

5) $(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2 y + 4y^3)dy = 0$;

6) $(3x^2 + 2y)dx + (2x - 3)dy = 0$.

J: 1) $4x^2 + y^2 = cx$; 2) $x^3 e^y - y = c$; 3) $y + xe^{-y} = c$;

4) $x^2 \cos^2 y + y = c$; 5) $x^2 + 3x^2 y^2 + y^4 = c$; 6) $x^3 + 2xy - 3y = c$.

8. Quyidagi differensial tenglamalarning integrallovchi ko'paytuvchilari topilsin va ular yechilsin.

1) $(x^2 - y)dx + xdy = 0$; 2) $2xtg y dx + (x^2 - 2 \sin y)dy = 0$;

3) $(e^{2x} - y^2)dx + ydy = 0$; 4) $(1 + 3x^2 \sin y)dx - xctgydy = 0$;

5) $(x^2 - 3y^2)dx + 2xydy = 0$; 6) $y^2 dx + (yx - 1)dy = 0$.

J: 1) $\mu = \frac{1}{x^2}$, $x + \frac{y}{x} = c$; 2) $\ln \mu = \ln \cos y$, $x^2 \sin y + \frac{1}{2} \cos 2y = c$;

3) $\mu = e^{-2x}$, $y^2 = (c - 2x)e^{2x}$; 4) $\mu = \frac{1}{\sin y}$, $\frac{x}{\sin y} + x^3 = c$;

5) $\mu = \frac{1}{x^4}$, $y^2 = cx^3 + x^2$; 6) $\mu = \frac{1}{y}$, $xy - \ln y = 0$.

2-§. Biriuchi tartibli chiziqli tenglama. Bernulli tenglamasi

$y' + p(x)y = q(x)$ (1) ko'rinishidagi tenglama birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama deb ataladi.

Bu yerda $p(x)$ va $q(x)$ lar x ning uzluksiz funksiyalari yoki o'zgarmas sonlar. Agar $q(x) \neq 0$ bo'lsa, tenglama chiziqli bir jinsli

bo'lmagan tenglama, agar $q(x) = 0$ bo'lsa, tenglama birinchi tenglama deyiladi.

(1) tenglamani umumiy yechimini $y = u(x) \cdot v(x) = uv$ (Bernulli usuli) ko'rinishda izlanadi. U holda $y' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$ bo'lib, berilgan tenglama $u'v + uv' + puv = q$ yoki $u'(v + u(v' + pv)) = q$ ko'rinishga keladi.

$v' + pv = 0$ deb olib uni yechamiz:

$v' = -pv$, $\frac{v'}{v} = -p$, $\frac{dv}{v} = -pdx$, $\int \frac{dv}{v} = -\int pdx$, $\ln v = -\int pdx + \ln c$, $\ln \frac{v}{c} = -\int pdx$, $\frac{v}{c} = e^{-\int pdx}$, $v = ce^{-\int pdx}$. Buni o'rniga qo'yib, ($c=1$ deb oldik) $u'e^{-\int pdx} = q$, $u' = qe^{\int pdx}$, $u = \int qe^{\int pdx} dx + C_1$. Uning bu qiymatini $y = uv$ ga qo'yib, berilgan tenglamani umumiy yechimini topamiz: $y = uv = e^{-\int pdx} [\int qe^{\int pdx} dx + C_1]$.

(1) tenglamani umumiy yechimini $y' + py = 0$ tenglamani umumiy yechimidan foydalanib ham topish mumkin.

$y' + py = 0$, $y' = -py$, $\frac{dy}{y} = -pdx$, $dy = -pydx$, $\frac{dy}{y} = -pdx$, $\int \frac{dy}{y} = -\int pdx + \ln c$, $\ln y = -\int pdx + \ln c$, $\ln \frac{y}{c} = -\int pdx$, $\frac{y}{c} = e^{-\int pdx}$, $y = ce^{-\int pdx}$.

Bu yechimdagi c ni x ning funksiyasi deb, ya'ni $c(x)$ deb olsak u dastlabki tenglamaning yechim bo'lmasmikan deb $c(x)$ ni topamiz, ya'ni $y = c(x) e^{-\int pdx}$ deb olamiz.

U holda $y' = c'(x) e^{-\int pdx} - c(x) e^{-\int pdx} \cdot p$ bo'lib, berilgan tenglamadan $c'(x) e^{-\int pdx} - c(x) e^{-\int pdx} \cdot p + p \cdot c(x) e^{-\int pdx} = q$ yoki $c'(x) e^{-\int pdx} = q$ tenglama hosil bo'ladi. Bundan esa $c'(x) = \frac{q}{e^{-\int pdx}} =$

$q e^{\int pdx}$, $c(x) = \int q e^{\int pdx} dx + c_1$ kelib chiqadi. Demak berilgan tenglamaning yechimi quyidagicha,

$$y = c(x) e^{-\int pdx} = e^{-\int pdx} \left[\int q e^{\int pdx} dx + c_1 \right]$$

$y' + py = qy^n$ ko'rinishdagi tenglama Bernulli tenglamasi deyiladi. Bu yerda $n \neq 0, n \neq 1, n = 0$ yoki $n = 1$ bo'lganda yuqorida ko'rib o'tilgan tenglamalar hosil bo'ladi. Shuning uchun $n \neq 0$ va $n \neq 1$, Bernulli tenglamasini yechish uchun tenglamani har ikkala qismni hadma-had y^n ga bo'lamiz. U holda berilgan tenglama

$$\frac{y'}{y^n} + p \cdot \frac{y}{y^n} = q \quad y' \cdot y^{-n} + p \cdot y^{1-n} = q$$

ko'rinishga keladi. Endi $z = y^{1-n}$ belgilash qilamiz. U holda $z' = (1-n)y^{-n} \cdot y'$ bo'lib, undan

$$y' = \frac{z'}{(1-n)y^{-n}}$$

kelib chiqadi. Belgilashlarni va y' ni o'rnilariga qo'yamiz:

$y' \cdot y^{-n} + p \cdot y^{1-n} = q$, $\frac{z'}{(1-n)y^{-n}} \cdot y^{-n} + p \cdot z = q$, $\frac{z'}{1-n} + pz = q$, $z' + (1-n)pz = q(1-n)$ bu tenglama esa z ga nisbatan chiziqli tenglama bo'lib, uni yechish usuli bizga ma'lum. Bundan z ni keyin esa y ni topamiz.

Bernulli tenglamasini yangi z o'zgaruvchi kiritmay, chiziqli tenglama sifatida $y = uv$ o'rniga qo'yishdan foydalanib ham yechish mumkin.

1. Quyidagi chiziqli tenglamalar yechilsin.

1) $y' - \frac{3}{x}y = x$; 2) $y' - \frac{2}{x}y = \frac{e^{-x^2}}{x}$; 3) $y' \cos x - y \sin x = \sin 2x$;

4) $(2x + 1)y' + y = x$; 5) $y' - y \operatorname{tg} x = \operatorname{ctg} x$;

6) $(x^2 - x)y' + y = x^2(2x - 1)$; 7) $(1 + x^2)y' - 2xy = (1 + x^2)$

J: 1) $y = cx^3 - x^2$; 2) $y = \frac{e - e^{-2x}}{2x^2}$; 3) $y = \frac{e - \cos 2x}{2 \cos x}$;

4) $y = \frac{x-1}{3} + \frac{c}{\sqrt{2x+1}}$; 5) $y = 1 + \frac{\ln c \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\cos x}$; 6) $y = \frac{x(x^2 - x + c)}{x - 1}$;

7) $y = (x + c)(1 + x^2)$.

2. $(2x - y^2)y' = 2y$ tenglamani $y|_{x=1} = 1$ boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi xususiy yechimini toping.

Ko'rsatma: Berilgan tenglamani $(2x - y^2) \frac{1}{y'} = 2y$ deb olinadi va uni x ga nisbatan chiziqli tenglama deb yechiladi. J: $x = \frac{1}{2}y(3 - y)$.

3. $y' - y \operatorname{tg} x = \sec x$ tenglamani $y|_{x=0} = 0$ shartni qanoatlantiruvchi xususiy yechimini toping. J: $y = \frac{x}{\cos x}$.

4. Bernulli tenglamasi ga doir quyidagi tenglamalar yechilsin.

1) $y'x + y = -xy^2$; 2) $y' - xy = -y^2e^{-x^2}$; 3) $y' + xy = xy^3$;

4) $y' + \frac{y}{x} = y^2 \frac{\ln x}{x}$; 5) $y' + xy = x^3y^3$; 6) $x^2y^2y' + xy^2 = 1$.

J: 1) $y = \frac{1}{x \ln cx}$; 2) $y^2 = \frac{e^{x^2}}{2x + c}$; 3) $y^2 = \frac{1}{1 + ce^{x^2}}$; 4) $y = \frac{1}{cx + 1 + \ln cx}$;

5) $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1 + ce^{2x}}}$; 6) $y = \sqrt[3]{\frac{3}{2x} + \frac{c}{x^3}}$.

5. $(1 - x^2)y' - xy = xy^2$ tenglamani $y|_{x=0} = 0,5$ boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi xususiy yechimini toping. J: $y = \frac{1}{3\sqrt{1-x^2}}$.

6. $y' - 7y = e^{2x}y^2$ tenglamani $y|_{x=0} = 2$ boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi xususiy yechimini toping. J: $y = \frac{10e^{2x}}{e^{10x} - 6}$.

3-§. Yuqori tartibli differensial tenglamalar

n -tartibli differensial tenglamani odatda

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

yoki uni n -tartibli hosilaga nisbatan yechish mumkin bo'lsa,

$$y^{(n)} = F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}) = 0$$

ko'rinishda yozish mumkin. Bunday tenglamalar uchun birinchi tartibli tenglamani yechimi haqidagi teorema ga o'xshash yechimning mavjudligi va yagonaligi haqidagi quyidagi teorema o'rindir.

Teorema. Agar

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}) = 0$$

tenglamada $f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}) = 0$ funksiya va uning

$y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}$ argumentlari bo'yicha olingan xususiy hosilalari

$$x = x_0, \quad y = y_0, \quad y' = y'_0, \quad y'' = y''_0, \quad \dots, \quad y^{(n-1)} = y_0^{(n-1)}$$

qiymatlarini o'z ichiga olgan biror sohadagi uzluksiz funksiyalardan iborat bo'lsa, bu holda berilgan tenglamani

$$\begin{cases} y|_{x=x_0} = y_0 \\ y'|_{x=x_0} = y'_0 \\ \dots \\ y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)} \end{cases} \quad (2)$$

shartlarni qanoatlantiruvchi $y = y(x)$ yechimi mavjud va yagonadir. Bu yerdagi (2) shartlar boshlang'ich shartlar deb ataladi.

Ta'rif. n -tartibli differensial tenglamani umumiy yechimi deb, n ta c_1, c_2, \dots, c_n o'zgarmas miqdorga bog'liq bo'lgan

$$y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$$

funksiyaga aytiladi va bu funksiya:

a) c_1, c_2, \dots, c_n ixtiyoriy o'zgarmas miqdorlarning har qanday qiymatlarida ham tenglamani qanoatlantiradi;

$$b) \text{ berilgan } \begin{cases} y|_{x=x_0} = y_0 \\ y'|_{x=x_0} = y'_0 \\ \dots \\ y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y^{(n-1)}_0 \end{cases}$$

boshlang'ich shartlarda c_1, c_2, \dots, c_n o'zgarimas miqdorlarni shunday taulab olish mumkinki, $y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$ funksiya berilgan boshlang'ich shartlarni qanoatlantiradi.

Umumiy yechimni oshkormas holda aniqlovchi $\varphi(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0$ ko'rinishdagi funksiya differensial tenglamaning umumiy integrali deyiladi.

Umumiy yechimdan c_1, c_2, \dots, c_n larning tayin qiymatlarida hosil bo'ladigan har qanday funksiya xususiy yechim deyiladi.

Xususiy yechimning grafigi berilgan differensial tenglamaning integral egri chizig'i deyiladi.

Eng sodda n-tartibli differensial tenglama

$$y^{(n)} = f(x) \quad (3)$$

ko'rinishda bo'ladi. Bu tenglama n marta ketma-ket integrallash orqali yechiladi.

$y^{(n)} = f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n-1)})$ (4) ko'rinishdagi tenglamada noma'lum funksiya va uning $(k-1)$ - tartibgacha hosilalari qatnashmaydi. Bunday tenglamaning tartibini $y^{(k)} = p(x)$ o'rniga qo'yish bilan pasaytiriladi.

$y^{(n)} = f(y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}) = 0$ (5) ko'rinishdagi tenglamada x erkli o'zgaruvchi qatnashmaydi. Bunday tenglamaning tartibini $y' = p(y)$ o'rniga qo'yish orqali pasaytiriladi.

$y' = f(x, y)$ (6) ko'rinishdagi tenglama noma'lum y funksiyani oshkor holda o'z ichiga olmaydi. Bu tenglama $y' = p$ o'rniga qo'yish orqali birinchi tartibli tenglamaga keltiriladi.

$y'' = f(y, y')$ (7) ko'rinishdagi tenglama x erkli o'zgaruvchini oshkor holda o'z ichiga olmaydi. Bu tenglamada $y' = p$ deb olib, va $y'' = p'p = \frac{dp}{dy} \cdot p$ dan foydalanib, birinchi tartibli tenglamaga keltiriladi va yechiladi.

1. Quyidagi tenglamalar yechilsin.

$$1) y''' = e^{2x}; \quad 2) y''' = \frac{6}{x^2}; \quad 3) y'' = x \sin x; \quad 4) y^{(IV)} = x;$$

$$5) y'' = 2 \sin x \cdot \cos^2 x - \sin^3 x; \quad 6) y'' = \operatorname{arctg} x; \quad 7) y'' = \frac{2}{1+x^2};$$

$$8) y'' = \ln x.$$

$$J: 1) y = \frac{e^{2x}}{8} + c_1 x^2 + c_2 x + c_3; \quad 2) y = -6x \ln x + 6x + c_1 \frac{x^3}{6} + c_2 x + c_3; \quad 3) y = c_1 x + c_2 - x \sin x - 2 \cos x; \quad 4) y = \frac{x^5}{120} + c_1 \frac{x^3}{6} + c_2 \frac{x^2}{2} + c_3 x + c_4; \quad 5) y = \frac{1}{3} \sin^3 x + c_1 x + c_2; \quad 6) y = \frac{\operatorname{arctg} x}{2} (x^2 - 1) - \frac{x}{2} \ln(1+x^2) + c_1 x + c_2; \quad 7) y = c_1 x + x \operatorname{arctg} x - \ln \sqrt{1+x^2} + c_2; \quad 8) y = \frac{x^2}{2} \left(\ln x - \frac{3}{2} \right) + c_1 x + c_2.$$

2. Quyidagi tenglamalarni berilgan boshlang'ich shartlarni qanoatlaniruvchi xususiy yechimlari topilsin.

$$1) y'' = x e^{-x}, \quad y|_{x=0} = 1, \quad y'|_{x=0} = 0;$$

$$2) y''' = x e^{-x}, \quad y|_{x=0} = 0, \quad y'|_{x=0} = 2, \quad y''|_{x=0} = 2;$$

$$3) y'' = x \sin x, \quad y|_{x=0} = 0, \quad y'|_{x=0} = 0, \quad y''|_{x=0} = 2;$$

$$4) y'' = 3x^2, \quad y|_{x=0} = 2, \quad y'|_{x=0} = 1;$$

$$5) y'' = \frac{2}{\cos^2 x}, \quad x = \frac{\pi}{4} \text{ bo'lganda } y = \frac{\ln 2}{2}, \quad y' = 1;$$

$$6) y'' = 4\cos 2x, \quad y|_{x=0} = 0, \quad y'|_{x=0} = 0.$$

$$J: 1) y = xe^{-x} + 2e^{-x} + x - 1; \quad 2) y = -(x+3)e^{-x} + \frac{1}{2}x^2 + 1;$$

$$3) y = x \cos x - 3 \sin x + x^2 + 2x; \quad 4) 4y = x^4 + 4x + 8;$$

$$5) y = c_1 x + c_2 - \ln \cos x; \quad 6) y = 1 - \cos 2x.$$

3. Quyidagi ($F(x, y', y'') = 0$ ko'rinishidagi) tenglamalar yechilsin.

$$1) y'' = \frac{y'}{x} \ln \frac{y'}{x}; \quad 2) (1-x^2)y'' - xy' = 2; \quad 3) y'' = \frac{y'}{x} + x;$$

$$4) x^2 y'' + x^2 y' = 1; \quad 5) (1+x^2)y'' + 2xy' = x^2;$$

$$6) y'' \operatorname{tg} x = y' + 1; \quad 7) xy'' = y' \ln \frac{y'}{x};$$

$$8) (1+x^2)y'' + 1 + (y')^2 = 0.$$

$$J: 1) y = \frac{x}{c_1} e^{c_1 x + 1} - \frac{1}{(c_1)^2} e^{c_1 x + 1} + c_2; \quad 2) y = (\arcsin x)^2 + c_1 \arcsin x + c_2;$$

$$3) y = \frac{x^3}{3} + c_1 x^2 + c_2; \quad 4) y = \frac{1}{x} + c_1 \ln x + c_2;$$

$$5) y = \frac{x^2}{12} - \frac{x}{6} + c_1 \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + c_2; \quad 6) y = c_2 - c_1 \cos x - x;$$

$$7) y = \frac{1}{c_1} x e^{1+c_1 x} - \frac{1}{(c_1)^2} e^{1+c_1 x} + c_2;$$

$$8) y = (1+c_1^{-2}) \ln(1+c_1 x) + c_1^{-1} x + c_2.$$

4. $y'' - \frac{y'}{x-1} = x(x-1)$ tenglamani $y(2) = 1, y'(2) = -1$ shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

$$J: y = \frac{1}{24}(3x^4 - 4x^3 - 36x^2 + 72x + 8).$$

5. $(y''x - y')y' = x^3$ tenglamani $y(1) = 1, y'(1) = 0$ shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

$$1) 225(y-1)^2 = 8(x-1)^2(3x+2)^2.$$

6. Quyidagi ($F(y, y', y'') = 0$ ko'rinishidagi) tenglamalar yechilsin.

$$1) y'' = \frac{1+y'^2}{y}; \quad 2) y''(2y+3) - 2y'^2 = 0; \quad 3) yy'' + y'^2 = 0;$$

$$4) y'' + 2y(y')^3 = 0; \quad 5) 2yy'' = 1 + (y')^2; \quad 6) y''y^3 = 1;$$

$$7) yy'' - (y')^2 = y^2 \ln y; \quad 8) y'' + ay = b.$$

$$J: 1) \frac{1}{c_1} \ln |c_1 y + \sqrt{c^2 y^2 - 1}| - \pm(x + c_2); \quad 2) \frac{1}{2} \ln |2y + 3| - c_1 x - c_2;$$

$$3) y^2 = c_1 x + c_2; \quad 4) y^3 + c_1 y + c_2 = 3x;$$

$$5) (c_1 x + c_2)^2 = 4(c_1 y - 1); \quad 6) c_1 y^2 = 1 + (c_1 x + c_2)^2;$$

$$7) \ln y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}; \quad 8) ay = b + c_1 \sin(x\sqrt{a} + c_2)$$

7. Quyidagi ($F(y, y', y'') = 0$ ko'rinishidagi) tenglamalarni berilgan boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimlari topilsin.

$$1) yy'' - (y')^2 = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2;$$

$$2) y'' = y'e^y, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1;$$

$$3) yy'' = (y')^2 - (y')^3, \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = -1;$$

$$4) y^3 y'' + 1 = 0, \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = 0;$$

$$5) yy'' + (y')^2 = 1, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1;$$

$$6) 3yy'y'' = 1 + (y')^2, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0;$$

$$J: 1) y = e^{2x}; \quad 2) y = -\ln|1-x|; \quad 3) y-x = 2\ln|y|;$$

$$4) y^2 + x^2 = 2x; \quad 5) x + y - 1 = 0; \quad 6) 2x = 3(y-1)^{\frac{2}{3}}.$$

4-§. Bir jinsli chiziqli tenglamalar

Ta'rif. Agar n - tartibli differensial tenglama noma'lum y funksiya va uning $y', y'', \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}$ hosilalariga nisbatan, birinchi darajali bo'lsa, bunday tenglama chiziqli differensial tenglama deyiladi va u

$$y^n + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f(x) \quad (1)$$

ko'rinishda yoziladi. Bu yerda a_1, a_2, \dots, a_n va $f(x)$ lar x ning ma'lum funksiyalari yoki o'zgarmas sonlar. (1) tenglamaning o'ng tomonida turgan $f(x)$ funksiya tenglamaning o'ng tomoni deyiladi.

Agar $f(x) \neq 0$ bo'lsa, u holda tenglama bir jinsli bo'lmagan chiziqli tenglama yoki o'ng tomonli tenglama deyiladi.

Agar $f(x) \equiv 0$ bo'lsa, u holda tenglama

$$y^n + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0 \quad (2)$$

ko'rinishida bo'ladi va bir jinsli chiziqli yoki o'ng tomonsiz tenglama deyiladi.

$$y'' + a_1y' + a_2y = 0 \quad (3)$$

tenglama 2-tartibli bir jinsli chiziqli tenglama deyiladi. Bu tenglama uchun quyidagi teoremlar o'rinlidir.

Teorema. Agar y_1 va y_2 2-tartibli (3) tenglamaning ikkita xususiy yechimi bo'lsa, u holda $y_1 + y_2$ ham bu tenglamaning yechimi bo'ladi.

Teorema. Agar y_1 (3) tenglamaning yechimi bo'lib, c ixtiyoriy o'zgarmas son bo'lsa, u holda cy_1 ham bu tenglamaning yechimi bo'ladi.

Ta'rif. Agar $[a, b]$ kesmada (3) tenglama y_1 va y_2 yechimining nisbati o'zgarmas miqdorga teng bo'lmasa, ya'ni

$$\frac{y_1}{y_2} \neq c$$

bo'lsa, u holda y_1 va y_2 yechimlar $[a, b]$ kesmada chiziqli bog'liq bo'lmagan yechimlar deyiladi. Aks holda chiziqli bog'liq yechimlar deyiladi.

Ta'rif. Agar y_1 va y_2 lar x ning funksiyasi bo'lsa, u holda

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1y_2' - y_1'y_2$$

determinant Vronskiy determinanti yoki berilgan funksiyalarning vronskiani deyiladi (Ya. Vronskiy (1778-1854) polyak matematigi).

Teorema. Agar y_1 va y_2 (3) tenglamaning ikkita chiziqli erkin yechimi bo'lsa, u holda

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

(3) tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi.

Teorema. Agar ikkinchi tartibli bir jinsli chiziqli tenglamaning bitta xususiy yechimi ma'lum bo'lsa, u holda umumiy yechimni topish funksiyalarni integrallashga keliriladi.

Agar y_1 (3) tenglamaning bitor xususiy yechimi bo'lsa, u holda u bilan chiziqli erkin y_2 xususiy yechimi

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int a_1 dx}}{y_1^2} dx \quad (4)$$

formuladan topiladi.

Teorema. Agar $y_1(x)$ (3) tenglamaning xususiy yechimi bo'lsa, u holda $y = y_1 \cdot z$ formula bilan z o'zgaruvchini kiritib, tenglamaning tartibini bittaga pasaytirish mumkin.

Teorema. Agar y_1 va y_2 funksiyalar $[a, b]$ kesmada chiziqli bog'liq bo'lsa, u holda bu kesmada Vronskiy determinanti ayon nolga teng bo'ladi.

Teorema. Agar bir jinsli chiziqli (3) tenglama ning y_1 va y_2 yechimlari uchun tuzilgan $W(y_1, y_2)$ Vronskiy determinanti tenglamaning koeffitsientlari uzluksiz bo'lgan $[a, b]$ kesmadagi biror $x = x_0$ qiymatida nolga teng bo'lmasa, u holda u x ning bu kesmadagi hech bir qiymatida nolga aylanmaydi.

Teorema. Agar (3) tenglamaning y_1 va y_2 yechimlari $[a, b]$ kesmada chiziqli erkli bo'lsa, bu yechimlardan tuzilgan W Vronskiy determinanti ko'rsatilgan kesmaning hech bir nuqtasida nolga aylanmaydi.

Ikkinchi tartibli chiziqli bir jinsli (3) tenglamaning (a, b) oraligida chiziqli bog'liq bo'lmagan yechimlari to'plamiga bu tenglamaning fundamental yechimlar sistemasi deyiladi.

1. $y_1 = \sin x$ va $y_2 = \cos x$ lar $y'' - y = 0$ tenglamaning xususiy yechimlari ekanligi tekshirilsin va ular fundamental sistema bosil qilishi ko'rsatilsin.

2. Xususiy yechimlari $y_1 = \frac{1}{\sqrt{x}} \sin x$, $y_2 = \frac{1}{\sqrt{x}} \cos x$ bo'lgan $y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{1}{4x^2}\right)y = 0$ ($x \neq 0$) tenglamaning umumiy yechimini yozish mumkinmi?

3. Quyida berilgan funksiyalar chiziqli bog'liq yoki chiziqli bog'liq emasligi tekshirilsin.

1) $y_1 = x + 1$, $y_2 = 2x + 1$, $y_3 = x + 2$;

2) $y_1 = 2x^2 + 1$, $y_2 = x^2 - 1$, $y_3 = x + 2$;

3) $y_1 = \sqrt{x}$, $y_2 = \sqrt{x+a}$, $y_3 = \sqrt{x+2a}$;

4) $y_1 = 4x^2$, $y_2 = x^3$;

5) $y_1 = \sin x$, $y_2 = \cos x$;

6) $y_1 = x$, $y_2 = |x|$;

7) $y_1 = x^5$, $y_2 = x^5 + 1$;

8) $y_1 = \sin^2 x$, $y_2 = \cos x$.

4. $y'' - \frac{3x^2}{x^2+1}y' + \frac{3x}{x^2+1}y = 0$ tenglama berilgan: 1) $y_1 = x$ bu tenglamaning yechimi bo'lishi ko'rsatilsin; 2) umumiy yechim topilsin.

Javob: $y = c_1x + c_2\left(\frac{x^2}{2} - 1\right)$.

5. $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ tenglama berilgan: 1) $y_1 = x^2$ tenglamaning yechimi ekanligi ko'rsatilsin; 2) umumiy yechim topilsin.

Javob: $y = c_1x^2 + c_2x$.

6. $y'' + \frac{x}{1-x}y' - \frac{1}{1-x}y = 0$ tenglama berilgan: 1) $y_1 = e^x$ tenglamaning yechimi ekanligi ko'rsatilsin; 2) umumiy yechim topilsin.

Javob: $y = c_1e^x + c_2x$.

7. $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$ tenglama berilgan: 1) $y_1 = \frac{\sin x}{x}$ tenglamaning yechimi ekanligi ko'rsatilsin; 2) umumiy yechim topilsin.

Javob: $y = c_2 \frac{\sin x}{x} - c_1 \frac{\cos x}{x}$.

5-§. O'zgarmas koeffitsientli ikkinchi tartibli bir jinsli chiziqli tenglamalar

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (1)$$

tenglamaga o'zgarmas koeffitsientli ikkinchi tartibli bir jinsli chiziqli tenglama deyiladi, bu yerda p va q o'zgarmas sonlar. Tenglamani umumiy integralini topish uchun uning ikkita chiziqli erkli xususiy yechimini topish yetarlidir. Xususiy yechimlarni $y = e^{kx}$ ($k = c$) (2) ko'rinishda izlaymiz. Bu holda $y' = ke^{kx}$, $y'' = k^2e^{kx}$ bo'ladi. Bularni (1) tenglamaga qo'yamiz. U holda (1) tenglama

$$e^{kx}(k^2 + pk + q) = 0$$

ko'rinishga keladi. Bundan $k^2 + pk + q = 0$ (3) tenglama hosil bo'ladi. Bu tenglama (1) tenglamaning karakteristik tenglamasi deyiladi. 1) kvadrat tenglama bo'lib, uning ildizlari

$$k_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}; \quad k_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

lardan iborat bo'ladi. Bunda quyidagi holatlar bo'lishi mumkin:

- I. k_1 va k_2 - haqiqiy va bir-biriga teng bo'lgan sonlar;
- II. k_1 va k_2 - haqiqiy va bir-biriga teng sonlar;
- III. k_1 va k_2 - kompleks sonlar.

Birinchi holda $y_1 = e^{k_1 x}$ va $y_2 = e^{k_2 x}$ lar xususiy yechimlar bo'lib, umumiy yechim (integral) $y = c_1 e^{k_1 x} + c_2 e^{k_2 x}$ bo'ladi.

Ikkinchi holda $y_1 = e^{kx}$ va $y_2 = xe^{kx}$ lar xususiy yechimlar bo'lib, umumiy yechim (integral) $y = c_1 e^{kx} + c_2 x e^{kx}$ yoki $y = e^{kx}(c_1 + c_2 x)$ dan iborat bo'ladi.

Uchinchi holda umumiy yechim (integral) $y = c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x$ bo'ladi.

I. Quyidagi (xarakteristik tenglamaning ildizlari haqiqiy va har xil) tenglamalar yechilsin:

$$1) y'' + y' - 2y = 0; \quad 2) y'' - 7y' + 6y = 0;$$

$$3) y'' - 5y' + 6y = 0; \quad 4) y'' - 5y' + 4y = 0;$$

$$5) y'' + 13y' + 42y = 0; \quad 6) y'' + 4y' + 3y = 0;$$

$$7) y'' - 4y' + 3y = 0; \quad 8) y'' + 3y' + 2y = 0$$

$$\text{Javob: } 1) y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x}; \quad 2) y = c_1 e^{6x} + c_2 e^x;$$

$$3) y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}; \quad 4) y = c_1 e^x + c_2 e^{4x};$$

$$5) y = c_1 e^{-6x} + c_2 e^{7x}; \quad 6) y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-3x};$$

$$7) y = c_1 e^x + c_2 e^{3x}; \quad 8) y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}.$$

2. $y'' - 4y' + 3y = 0$ tenglamani $y(0) = 6$, $y'(0) = 10$ shartlari ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

$$\text{Javob: } y = 4e^x + 2e^{3x}.$$

3. $y'' + 5y' + 6y = 0$ tenglamani $y(0) = 1$, $y'(0) = -6$ shartlari ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

$$\text{Javob: } y = 4e^{-3x} - 3e^{-2x}.$$

4. Quyidagi (xarakteristik tenglamaning ildizlari haqiqiy va o'zaro teng) tenglamalar yechilsin:

$$1) y'' - 4y' + 4y = 0;$$

$$2) y'' - 2y' + y = 0;$$

$$3) y'' + 4y' + 4y = 0;$$

$$4) y'' - 6y' + 9y = 0;$$

$$5) 4y'' - 20y' + 25y = 0.$$

$$\text{Javob: } 1) y = (c_1 + c_2 x)e^{2x}; \quad 2) y = (c_1 + c_2 x)e^x;$$

$$3) y = (c_1 + c_2 x)e^{2x}; \quad 4) y = (c_1 + c_2 x)e^{3x};$$

$$5) y = (c_1 + c_2 x)e^{2.5x}.$$

5. $y'' - 10y' + 25y = 0$ tenglamani $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin. Javob: $y = xe^{5x}$.

6. $4y'' + 4y' + y = 0$ tenglamani $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$ shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin. Javob: $y = e^{-\frac{x}{2}}(2 + x)$.

7. $y'' - 2y' + y = 0$ tenglamani $y(2) = 1$, $y'(2) = -2$ shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin. Javob: $y = (7 - 3x)e^{x-2}$.

8. Quyidagi (xarakteristik tenglamaning ildizlari kompleks sonlar) tenglamalar yechilsin:

$$1) y'' + 8y' + 25y = 0;$$

$$2) y'' + y = 0;$$

$$3) y'' - 4y' + 5y = 0;$$

$$4) y'' + 4y' + 8y = 0;$$

$$5) y'' - 4y' + 13y = 0;$$

$$6) y'' + 25y = 0;$$

$$7) y'' + 6y' + 13y = 0;$$

$$1) 4y'' - 8y' + 5y = 0;$$

Javob: 1) $y = e^{-4x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$; 2) $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$;

3) $y = e^{2x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x)$; 4) $y = e^{-2x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$;

5) $y = e^{2x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$; 6) $y = c_1 \cos 5x + c_2 \sin 5x$;

7) $y = e^{-3x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$; 8) $y = e^x \left(c_1 \cos \frac{x}{2} + c_2 \sin \frac{x}{2} \right)$.

9. $y'' - 2y' + 10y = 0$ tenglamani $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$, $y'\left(\frac{\pi}{6}\right) = e^{\frac{\pi}{6}}$

shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin. Javob: $y = -\frac{1}{3}e^x \cos 3x$.

10. $9y'' + y = 0$ tenglamani $y\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 2$, $y'\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$ shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin. Javob: $y = 2 \sin \frac{x}{3}$.

11. $y'' + 9y = 0$ tenglamani $y(0) = 0$, $y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$ shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin. Javob: $y = \sqrt{2} \cos 3x$.

6-§. n-tartibli o'zgarmas koeffitsientli bir jinsli chiziqli tenglamalar

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0 \quad (1)$$

tenglamaga n-tartibli o'zgarmas koeffitsientli bir jinsli chiziqli tenglama deyiladi. Bu yerda a_1, a_2, \dots, a_n lar o'zgarmas sonlar.

Ta'rif. Agar $[a, b]$ kesmadagi x ning barcha qiymatlari uchun

$$\varphi_n(x) = A_1 \varphi_1(x) + A_2 \varphi_2(x) + \dots + A_{n-1} \varphi_{n-1}(x)$$

tenglik o'rinli bo'lsa, unda $\varphi_n(x)$ funksiya $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_{n-1}(x)$, $\varphi_n(x)$ funksiyalar orqali chiziqli bog'liq funksiyalar deyiladi. Bu yerda A_1, A_2, \dots, A_n lar hammasi bir vaqtda nolga teng bo'lmaydigan o'zgarmas sonlar.

Ta'rif. Agar n ta $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_{n-1}(x), \varphi_n(x)$ funksiyalarning hech biri qolganlari orqali chiziqli ifoda etilmasa, u funksiyalar chiziqli erkin funksiyalar deb ataladi.

Agar $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_{n-1}(x)$ funksiyalar chiziqli bog'liq bo'lsa, u holda hammasi ham nolga teng bo'lmagan shunday c_1, c_2, \dots, c_n sonlar topiladiki, $[a, b]$ kesmadagi x ning hamma qiymatlari uchun

$$c_1 \varphi_1(x) + c_2 \varphi_2(x) + \dots + c_n \varphi_n(x) \equiv 0$$

ayniyat bajariladi.

Teorema. Agar y_1, y_2, \dots, y_n funksiyalar (1) tenglamaning chiziqli erkin yechimlari bo'lsa, u holda $y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$ (2) uning umumiy yechimi bo'ladi, bunda c_1, c_2, \dots, c_n ixtiyoriy o'zgarmas sonlar.

Agar (1) tenglamaning koeffitsiyentlari o'zgarmas sonlar bo'lsa, bu holda uning umumiy yechimi ikkinchi tartibli tenglamaning umumiy yechimini topgandek topiladi.

1) harakteristik tenglamani tuzamiz:

$$k^n + a_1 k^{n-1} + a_2 k^{n-2} + \dots + a_n = 0$$

2) harakteristik tenglamaning

$$k_1, k_2, \dots, k_n$$

ildizlarini topamiz.

3) Quyidagilarga asoslanib ildizlarning xarakteriga ko'ra chiziqli erkin xususiy yechimlarni topamiz:

a) Har bir karrali k ildizga e^{kx} xususiy yechim mos keladi;

b) Har bir juft ikkita $k^{(1)} = \alpha + \beta i$ va $k^{(2)} = \alpha - \beta i$ qo'shma kompleks bir karrali ildizlarga ikkita $e^{\alpha x} \cos \beta x$ va $e^{\alpha x} \sin \beta x$ xususiy yechimlar to'g'ri keladi;

c) Har bir r karrali haqiqiy k ildizga r ta chiziqli erkli

$$e^{kx}, xe^{kx}, x^2 e^{kx}, \dots, x^{r-1} e^{kx}$$

xususiy yechim to'g'ri keladi;

d) Har bir μ karrali juft $k^{(1)} = \alpha + \beta i$ va $k^{(2)} = \alpha - \beta i$ qo'shma kompleks ildizga 2μ ta

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, xe^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{\mu-1} e^{\alpha x} \cos \beta x,$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, xe^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{\mu-1} e^{\alpha x} \sin \beta x$$

xususiy yechimlar to'g'ri keladi:

4) n ta chiziqli erkli y_1, y_2, \dots, y_n xususiy yechimlarni topgandan so'ng berilgan chiziqli tenglamaning umumiy yechimini tuzamiz:

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$$

1. Quyidagi funksiyalar chiziqli bog'liq yoki chiziqli erkli ekanligi aniqlansin:

1) $y_1 = e^x, y_2 = e^{2x}, y_3 = 3e^x;$

2) $y_1 = 1, y_2 = x, y_3 = x^2;$

3) $y_1 = e^{k_1 x}, y_2 = e^{k_2 x}, \dots, y_n = e^{k_n x}, \dots$

Javob: 1) chiziqli bog'liq; 2) chiziqli erkli; 3) chiziqli erkli.

2. Quyidagi tenglamalar yechilsin:

1) $y^{IV} - y = 0;$

2) $y^{IV} - 13y'' + 36y = 0;$

3) $y^{IV} - 2y''' + y'' = 0;$

4) $y^{IV} + 5y'' + 4y = 0;$

5) $y^V - 16y^I = 0;$

6) $y^{IV} - 8y'' + 16y = 0;$

7) $y''' - y^I = 0; y(0) = 3, y'(0) = -1, y''(0) = 1.$

8) $y^V = y^I; y(0) = 0, y'(0) = 1, y''(0) = 0, y'''(0) = 1, y^{IV}(0) = 2.$

Javoblar:

1) $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 \cos x + c_4 \sin x;$

2) $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-3x} + c_3 e^{2x} + c_4 e^{-2x}$

3) $y = c_1 + c_2 x + c_3 e^x + c_4 x e^x;$

4) $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + c_3 \cos 2x + c_4 \sin 2x;$

5) $y = c_1 + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-2x} + c_4 \cos 2x + c_5 \sin 2x;$

6) $y = e^{2x}(c_1 + c_2 x) + e^{-2x}(c_3 + c_4 x);$

7) $y = 2 + e^{-x};$

8) $y = e^x + \cos x - 2;$

7-§. Ikkinchi tartibli o'zgarmas koeffitsientli chiziqli bir

jinslimas chiziqli tenglamalar

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = f(x) \quad (1)$$

tenglama ikkinchi tartibli o'zgarmas koeffitsientli chiziqli bir jinslimas tenglamadir. Bu tenglamaning umumiy yechimi quyidagi teorema bilan aniqlanadi:

Teorema. (1) tenglamaning umumiy yechimi bu tenglamaning biror y^* xususiy yechimi bilan unga mos bir jinsli

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = 0 \quad (2)$$

tenglamaning \bar{y} umumiy yechimi yig'indisi kabi aniqlanadi. Ya'ni,

$$y = y^* + \bar{y} \quad (3)$$

(1) tenglamaning biror xususiy yechimini o'zgarmasni variatsiyalash usuli bilan topamiz. Bunda dastlab (2) tenglamaning umumiy yechimini yozamiz:

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 \quad (4)$$

c_1 va c_2 ni x ning hozircha noma'lum funksiyalari deb hisoblab, (1) tenglamaning xususiy yechimini (4) ko'rinishda izlaymiz.

(4) tenglikni differensiallaymiz:

$$y' = c_1 y_1' + c_2 y_2' + c_1' y_1 + c_2' y_2$$

c_1 va c_2 larni $c_1' y_1 + c_2' y_2 = 0$ (5) tenglik bajariladigan qilib tanlaymiz. Agar bu qo'shimcha shartni e'tiborga olsak, u holda birinchi tartibli y' hosila

$$y' = c_1 y_1' + c_2 y_2'$$

ko'rinishni oladi. Endi bundan y'' ni topamiz:

$$y'' = c_1 y_1'' + c_2 y_2'' + c_1' y_1' + c_2' y_2'$$

y , y' , y'' larni (1) tenglamaga qo'yamiz:

$$c_1 y_1 + c_2 y_2 + c_1' y_1' + c_2' y_2' + a_1 (c_1 y_1' + c_2 y_2') + a_2 (c_1 y_1 + c_2 y_2) = f(x)$$

yoki $c_1 (y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1) + c_2 (y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2) + c_1' y_1' + c_2' y_2' = f(x)$ ni hosil qilamiz. Bu yerdagi birinchi ikkita qavs ichidagi ifodalar nolga tengligi ravshan. Demak, oxirgi tenglik

$$c_1' y_1' + c_2' y_2' = f(x) \quad (6)$$

ko'rinishga keladi. Shunday qilib, c_1 va c_2 funksiyalar (5) va (6) tenglamalarning sistemasini qanoqlantirsa, ya'ni

$$c_1' y_1 + c_2' y_2 = 0, \quad c_1' y_1' + c_2' y_2' = f(x)$$

bo'lsa, (4) funksiya (1) tenglamaning yechimi bo'ladi. Ammo bu sistemaning determinanti chiziqli erkin y_1 va y_2 funksiyalarning

Wronskiy determinanti bo'lgani uchun u nolga teng bo'lmaydi. Demak, sistemani yechib c_1' va c_2' ni x ning ma'lum funksiyalari sifatida aniqlaymiz:

$$c_1' = \varphi_1(x), \quad c_2' = \varphi_2(x).$$

Bularni integrallab,

$$c_1 = \int \varphi_1(x) dx + \bar{c}_1, \quad c_2 = \int \varphi_2(x) dx + \bar{c}_2$$

larni hosil qilamiz. c_1 va c_2 larni topilgan ifodalarini (4) tenglikka qo'yib, (1) tenglamaning umumiy yechimini topamiz.

Xususiy yechimni topishda quyidagi teoremaning natijalaridan foydalanish qulaydir.

Teorema. $y'' + a_1 y' + a_2 y = f_1(x) + f_2(x)$ (7) tenglamaning y'' yechimini $y'' = y_1'' + y_2''$ yig'indi shaklida tasvirlash mumkin, bunda y_1'' va y_2'' lar mos ravishda

$y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1 = f_1(x)$ (8) va $y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2 = f_2(x)$ (9) tenglamalarning yechimlari.

Agar $y'' + p y' + q y = f(x)$ (10) tenglamada p va q lar o'zgarmas sonlar bo'lsa, u holda (10) tenglama ikkinchi tartibli o'zgarmas koeffitsientli chiziqli bir jinslimas tenglama deyiladi.

Yuqorida biz bir jinslimas tenglama yechimini topishning umumiy usulini ko'rdik. Ba'zan o'zgarmas koeffitsientli tenglamani yechishda xususiy yechimni osonroq topish mumkin bo'ladi. Quyida o'ng tomon $f(x)$ ning ba'zi bir ko'rinishlarida xususiy yechimni qanday izlash mumkinligini ko'rib chiqamiz:

1. O'ng tomon ko'rsatkichli funksiya bilan ko'phad ko'paytmasidan iborat, ya'ni

$$f(x) = e^{\alpha x} P_n(x) \quad (11)$$

ko'rinishda bo'lgan hol. Bu yerda $P_n(x)$ — n -darajali ko'phad.

Bunda quyidagi xususiy hollar bo'lishi mumkin:

a) α soni $k^2 + pk + q = 0$ xarakteristik tenglamaning ildizi bo'lmagan hol. Bu holda xususiy yechimni

$$y^* = (A_0 x^n + A_1 x^{n-1} + \dots + A_n) e^{\alpha x} = Q_n(x) e^{\alpha x} \quad (12)$$

ko'rinishda izlash kerak.

b) α xarakteristik tenglamaning oddiy (bir karrali) ildizi bo'lgan hol. Bu holda $y^* ni$

$$y^* = x Q_n(x) e^{\alpha x}$$

ko'rinishda qidiriladi.

c) α soni xarakteristik tenglamaning ikki karrali ildizi bo'lgan hol. Bu holda xususiy yechimni

$$y^* = x^2 Q_n(x) e^{\alpha x}$$

ko'rinishda qidiriladi.

II. O'ng tomon $f(x) = P(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + Q(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$ ko'rinishda bo'lgan hol.

Bunda xususiy yechimni ko'rinishi quyidagicha bo'lishi mumkin:

a) agar $\alpha + \beta i$ xarakteristik tenglamaning ildizi bo'lmasa, u holda (10) tenglamaning xususiy yechimini

$$y^* = u(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + v(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$$

ko'rinishda izlash kerak. Bu yerda $u(x)$ va $v(x)$ -darajasi $P(x)$ va $Q(x)$ ko'phadlarining eng yuqori darajasiga teng bo'lgan ko'phadlardir.

b) agar $\alpha + \beta i$ xarakteristik tenglamaning ildizi bo'lmasa, u holda xususiy yechimni

$$y^* = x[u(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + v(x)e^{\alpha x} \sin \beta x]$$

ko'rinishda izlanadi.

III. O'ng tomon $f(x) = M \cos \beta x + N \sin \beta x$ bo'lgan hol. Bunda M va N — o'zgarmas sonlar.

a) agar βi xarakteristik tenglamaning ildizi bo'lmasa, xususiy yechimni

$$y^* = A \cos \beta x + B \sin \beta x$$

ko'rinishda izlash kerak.

b) agar βi xarakteristik tenglamaning ildizi bo'lsa, xususiy yechimni

$$y^* = x(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

ko'rinishda izlash kerak.

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f(x)$$

tenglama n -tartibli bir jinslimas chiziqli tenglamadir. Bu yerda a_1, a_2, \dots, a_n va $f(x)$ lar x ning uzluksiz funksiyalari yoki o'zgarmas sonlar. Bu tenglamaga mos bir jinsli

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0$$

tenglamaning

$$\bar{y} = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$$

umumiy yechimi ma'lum bo'lsin. Bu holda ham quyidagi teorema o'rinlidir.

Teorema. Agar \bar{y} bir jinsli tenglamaning umumiy yechimi, y^* esa bir jinslimas tenglamaning xususiy yechimi bo'lsa, u holda $y = \bar{y} + y^*$ funksiya berilgan bir jinslimas tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi.

Bu yerda ham bir jinslimas tenglamaning xususiy yechimini

$$\bar{y} = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$$

ifodadagi c_1, c_2, \dots, c_n larni x ning funksiyalari deb qarab o'zgarmas miqdorlarni variatsiyalash usuli bilan topiladi.

n -tartibli o'zgarmas koeffitsientli chiziqli bir jinsli tenglamaning xususiy yechimlari ba'zan ancha sodda topiladi.

I. Differensial tenglamaning o'ng tomonida

$$f(x) = P(x)e^{\alpha x}$$

funksiya turgan bo'lsin. Bu yerda $P(x)$ x ga nisbatan ko'phad. Bunda ikki hol bo'lishi mumkin:

a) agar α xarakteristik tenglamaning ildizi bo'lmasa, u holda xususiy yechimni

$$y^* = Q(x)e^{\alpha x}$$

ko'rinishda izlash mumkin, bunda $Q(x)$ - koeffitsiyentlari noma'lum bo'lgan va darajasi $P(x)$ ning darajasi bilan bir xil bo'lgan ko'phad;

b) α xarakteristik tenglamaning μ karrali ildizi bo'lsa, bu holda bir jinsli tenglamaning xususiy yechimini

$$y^* = x^\mu Q(x)e^{\alpha x}$$

ko'rinishda izlash mumkin bo'lib, bunda $Q(x)$ - darajasi $P(x)$ ning darajasi bilan bir xil bo'lgan ko'phad.

II. Tenglamaning o'ng tomoni

$$f(x) = M \cos \beta x + N \sin \beta x$$

ko'rinishda (M va N - o'zgarmas sonlar) bo'lgan hol. Bu holda xususiy yechimini quyidagicha aniqlanadi:

a) βi xarakteristik tenglamaning ildizi bo'lmasa, bu holda xususiy yechimni

$$y^* = A \cos \beta x + B \sin \beta x$$

ko'rinishda izlanadi. A va B noma'lum o'zgarmas koeffitsiyentlar.

b) βi xarakteristik tenglamaning μ karrali ildizi bo'lsa, u holda xususiy yechimni

$$y^* = x^\mu (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

ko'rinishda izlanadi.

III. O'ng tomon

$$f(x) = P(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + Q(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$$

ko'rinishda bo'lgan hol. Bu yerda $P(x)$ va $Q(x)$ lar x ga nisbatan ko'phadlar.

a) agar $\alpha + \beta i$ xarakteristik tenglamaning ildizi bo'lmasa, xususiy yechimni

$$y^* = u(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + v(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$$

ko'rinishda izlanadi. Bu yerda $u(x)$ va $v(x)$ - darajasi $P(x)$ va $Q(x)$ ko'phadlarning eng yuqori darajasiga teng bo'lgan ko'phadlar.

b) agar $\alpha + \beta i$ xarakteristik tenglamaning μ karrali ildizi bo'lsa, xususiy yechimni

$$y^* = x^\mu [u(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + v(x)e^{\alpha x} \sin \beta x]$$

ko'rinishda izlanadi.

1. Quyidagi tenglamalar yechilsin:

$$1) y'' - \frac{y'}{x} = x;$$

$$2) y'' - 4y = x + 3e^x;$$

$$3) x^2 y'' - xy' + y = 4x^3;$$

$$4) y'' - \frac{x}{x-1} y' + \frac{1}{x-1} y = x - 1;$$

$$5) x^2 y'' - xy' + y = 0;$$

$$6) (4x-1)^2 y'' - 2(4x-1)y' + 8y = 0;$$

Javob: 1) $y = \bar{c}_1 x^2 + \bar{c}_2 + \frac{x^3}{3}$; 2) $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} + \frac{7}{2}x + \frac{3}{8}e^x$;

3) $y = x^3 + x(c_1 + c_2 \ln|x|)$; 4) $y = c_1 e^x + c_2 x - x^2 - 1$;

5) $y = (c_1 + c_2 \ln x)x$; 6) $y = c_1(4x-1) + c_2 \sqrt{4x-1}$.

2. Quyidagi o'zgarmas koeffitsientli chiziqli bir jinsli tenglamalar yechilsin:

1) $y'' - 7y' + 6y = 0$;

2) $y'' - y' - 2y = 0$;

3) $y'' - y' = 0$;

4) $y'' - 4y' + 4y = 0$;

5) $y'' - 2y' + y = 0$;

6) $4y'' - 20y' + 25y = 0$;

7) $y'' - 4y' + 13y = 0$;

8) $y'' + 25y = 0$;

9) $y'' + 4y' + 8y = 0$;

10) $y^{IV} - 13y^{II} + 36y = 0$;

11) $y^{VI} - 16y^I = 0$;

12) $y^{VI} - 13y^{IV} + 36y^{II} = 0$;

13) $y^{IV} - 8y^{II} + 16y = 0$;

Javoblar: 1) $y = c_1 e^{6x} + c_2 e^x$; 2) $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x}$;

3) $y = c_1 + c_2 e^x$; 4) $y = (c_1 + c_2 x)e^{2x}$; 5) $y = (c_1 + c_2 x)e^x$;

6) $y = (c_1 + c_2 x)e^{2.5x}$; 7) $y = e^{2x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$;

8) $y = c_1 \cos 5x + c_2 \sin 5x$; 9) $y = e^{-2x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$;

10) $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-3x} + c_3 e^{2x} + c_4 e^{-2x}$; 11) $y = c_1 + c_2 e^{2x} +$

$c_3 e^{-2x} + c_4 \cos 2x + c_5 \sin 2x$; 12) $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-3x} + c_3 e^{2x} +$

$c_4 e^{-2x} + c_5 + c_6 x$; 13) $y = e^{2x}(c_1 + c_2 x) + e^{-2x}(c_3 + c_4 x)$.

3. $y'' - y' - 2y = 0$ tenglamaning $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin. Javob: $y = e^{2x} - e^{-x}$.

4. $y'' + 4y' + 29y = 0$ tenglamaning $y(0) = 0$, $y'(0) = 15$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

Javob: $y = 3e^{-2x} \sin 5x$.

5. $y^V = y'$ tenglamaning $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = 0$, $y'''(0) = 1$ va $y^{IV}(0) = 2$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin. Javob: $y = e^x + \cos x - 2$.

6. Quyidagi o'zgarmas koeffitsientli chiziqli bir jinsli tenglamalar yechilsin:

1) $y'' + 4y' + 3y = x$;

2) $y'' - 4y = 8x^3$;

3) $y'' + 3y' = 9x$;

4) $y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$;

5) $y'' - 3y' + 2y = e^x$;

6) $y'' - 2y = xe^{-x}$;

7) $y^{III} + 8y = e^{-2x}$;

8) $y^{IV} - 81y = 27e^{-3x}$;

9) $y'' + 3y' + 2y = \sin 2x + 2\cos 2x$;

10) $y'' + y' + 2.5y = 25\cos 2x$;

11) $y'' - 5y' + 6y = 13\sin 3x$.

- Javoblar: 1) $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-3x} + \frac{1}{3}x - \frac{4}{9}$; 2) $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} - 2x^2 - 3x$; 3) $y = c_1 + c_2 e^{-3x} + \frac{3}{2}x^2 - x$;
 4) $y = e^{-2x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x) + x^2 - 8x + 7$;
 5) $y = c_1 e^{2x} + (c_2 - x)e^x$; 6) $y = c_1 e^{x\sqrt{2}} + c_2 e^{-x\sqrt{2}} - (x-2)e^{-x}$;
 7) $y = (c_1 + \frac{x}{12})e^{-2x} + (c_2\sqrt{3}\cos x + c_3\sqrt{3}\sin x)e^x$;
 8) $y = c_1 e^{3x} + (c_2 - \frac{x}{2})e^{-3x} + c_3 \cos 3x + c_4 \sin 3x$;
 9) $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x} + 0,25\sqrt{2}\cos(\frac{x}{4} - 2x)$;
 10) $y = e^{-\frac{x}{2}}(c_1 \cos \frac{3x}{2} + c_2 \sin \frac{3x}{2}) - 6\cos 2x + 8\sin 2x$;
 11) $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} + \frac{1}{6}(5\cos 3x - \sin 3x)$.

7. $y'' - 7y' + 6y = xe^x$ tenglamani $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

Javob: $y = \frac{74}{125}e^x + \frac{51}{125}e^{6x} - e^x(\frac{x^2}{10} + \frac{x}{25})$.

8. $y'' + y = -\sin 2x$ tenglamani $y(\pi) = y'(\pi) = 1$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

Javob: $y = \frac{1}{3}\sin 2x - \frac{1}{2}\sin x - \cos x$.

9. $y' - 3y' + 2y = e^{3x}(x^2 + x)$ tenglamani $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

Javob: $y = 4(e^x - e^{-2x}) + \frac{1}{2}(x^2 - 2x + 2)e^{3x}$.

10. $y'' + y' - 2y = \cos x - 3\sin x$ tenglamani $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

Javob: $y = e^x + \sin x$.

11. $y''' - y' = -3x^2 + 6$ tenglamani $y(0) = y'(0) = y''(0) = 1$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

Javob: $y = e^x + x^3$.

12. $y''' - y' = -2x$ tenglamani $y(0) = 0$, $y'(0) = y''(0) = 2$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

Javob: $y = e^x - e^{-x} + x^2$.

8-§. Differensial tenglamalar sistemasi

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \frac{dy_2}{dx} = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \dots \\ \frac{dy_n}{dx} = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases} \quad (1)$$

bu birinchi tartibli oddiy differensial tenglamalar sistemasi deyiladi. Bunda y_1, y_2, \dots, y_n izlanayotgan funksiyalar, x esa argument. Bunday sistemaga normal sistema deyiladi.

(1) sistemani integrallash uni va $(y_1)_{x=x_0} = y_{1_0}$, $(y_2)_{x=x_0} = y_{2_0}$, \dots , $(y_n)_{x=x_0} = y_{n_0}$ (2) boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi y_1, y_2, \dots, y_n funksiyalarni topish demakdir. (1) sistemani integrallash quyidagicha bajariladi:

(1) sistemaning tenglamalaridan birinchisini x bo'yicha differensiallaymiz:

$$\frac{d^2 y_1}{dx^2} = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial y_1} \frac{dy_1}{dx} + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial y_n} \frac{dy_n}{dx}$$

$\frac{dy_1}{dx}, \frac{dy_2}{dx}, \dots, \frac{dy_n}{dx}$ hosilalarni ularning tenglamalardagi f_1, f_2, \dots, f_n ifodalari bilan almashtirib,

$$3. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + t \\ \frac{dy}{dt} = x + e^t \end{cases} \text{ sistemaning } x(0) = 1, y(0) = 0 \text{ shartlari}$$

qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

$$\text{Javob: } x = \frac{1}{4}(3e^t + 5e^{-t}) + \frac{1}{2}te^t - 1, y = \frac{5}{4}(e^t - e^{-t}) + \frac{1}{2}te^t - t.$$

$$4. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y \\ \frac{dy}{dt} = x - y \end{cases} \text{ sistemaning } x(0) = 2, y(0) = 0 \text{ shartlari}$$

qanoatlantiruvchi yechimi topilsin.

$$\text{Javob: } x = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right)e^{t\sqrt{2}} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)e^{-t\sqrt{2}}, y = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{t\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-t\sqrt{2}}.$$

X BOB. QATORLAR

1-§. Sonli qatorlar

$u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$ (1) sonli ketma-ketlikning hadlaridan hosil qilingan

$$u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} u_k \quad (2)$$

yig'indiga sonli qator deyiladi. $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$ lar sonli qatorning hadlari deyiladi. u_n - sonli qatorning n-hadi yoki umumiy hadi deyiladi.

Sonli qatorning dastlabki n ta hadining yig'indisi S_n bilan belgilanadi va u qatorning n-xususiy yig'indisi deyiladi. Demak,

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n \quad (3)$$

Agar $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ - chekli limit mavjud bo'lsa, u holda qator yaqinlashuvchi va S -uning yig'indisi deyiladi.

Agar $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$ yoki mavjud bo'lmasa, u holda qator uzoqlashuvchi deyiladi.

$$R_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+k} + \dots \quad (4)$$

ifodaga qatorning qoldig'i deyiladi.

Geometrik progressiyaning hadlaridan tuzilgan

$$b + bq + bq^2 + bq^3 + \dots + bq^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} bq^{n-1}$$

qator geometrik qator deyiladi. U $|q| \geq 1$ da uzoqlashuvchi va $|q| < 1$ bo'lganda yaqinlashuvchidir.

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

qator garmonik qator deb ataladi. Bu qator uzoqlashuvchidir.

$$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

qator umumlashgan garmonik qator deb ataladi. Bu qator $p \leq 1$ da uzoqlashuvchi, $p > 1$ da yaqinlashuvchidir.

Teorema (qator yaqinlashishining zaruriy sharti). Agar $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ qator yaqinlashsa, u holda $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ bo'ladi.

Teorema (qator uzoqlashuvchi bo'lishining yetarli sharti). Agar $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ bo'lsa, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ qator uzoqlashuvchi bo'ladi.

Yaqinlashuvchi qatorlar bir qator xossalarga ega:

1. Agar $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ qator yaqinlashuvchi va yig'indisi S ga teng bo'lsa, u holda $\sum_{n=1}^{\infty} C u_n$ qator ham yaqinlashuvchi va yig'indisi CS ga teng bo'ladi.

2. Agar $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ va c qatorlar yaqinlashuvchi bo'lib, yig'indilari mos ravishda S_1 va S_2 ga teng bo'lsa, u holda $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ qator ham yaqinlashuvchi bo'lib, yig'indisi $S_1 \pm S_2$ ga teng bo'ladi.

3. Agar qator yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda undan istalgan chekli sondagi hadlarni tashlab yuborish yoki unga chekli sondagi hadlarni qo'shish natijasida hosil bo'lgan qator ham yaqinlashuvchi bo'ladi.

1. Quyidagi qatorlar uchun yaqinlashish ning zaruriy sharti bajariladimi?

1) $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{7}{8} + \dots$;

2) $\frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots$;

3) $\frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{6}{27} + \frac{8}{81} + \dots$.

Javoblar: 1) bajarilmaydi; 2) bajariladi; 3) bajariladi.

2. $u_n = \frac{n}{10^{n-1}}$ qatorning dastlabki 4 ta hadini yozing.

3. $\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \frac{7}{2^4} + \dots$ qatorning umumiy hadini yozing.

4. $\frac{2}{3} + \left(\frac{3}{7}\right)^2 + \left(\frac{4}{11}\right)^3 + \left(\frac{5}{15}\right)^4 + \dots$ qatorning umumiy hadini yozing.

5. $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 9} + \dots$ qatorning yig'indisini toping.

Javob: $\frac{1}{2}$.

6. $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots$ qatorning yig'indisini toping.

Javob: 1.

7. $\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \dots$ qatorning yig'indisini toping.

Javob: $\frac{1}{3}$.

8. $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots$ qatorning yig'indisini toping.

Javob: $\frac{1}{4}$.

9. Quyidagi qatorlarning yaqinlashuvchi ekanini isbotlang va yig'indisini toping.

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{6^n}; \quad 2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6^n}{(2n-1)2^{(2n-1)^2}}; \quad 3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$$

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)(3n-2)}; \quad 5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 2^n}{6^n}; \quad 6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n - 1}{n^2(n-1)^2}$$

Javoblar: 1) $S = \frac{3}{2}$; 2) $S = \frac{1}{3}$; 3) $S = \frac{11}{19}$; 4) $S = \frac{1}{6}$; 5) $S = \frac{5}{4}$; 6) $S = 1$.

10. $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \dots$ qatorni yaqinlashuvchi ekanligi ko'rsatilsin.

11. $\frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \dots$ qator tekshirilsin.

12. $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} + \frac{3}{6} + \frac{4}{11} + \dots$ qator tekshirilsin.

13. $0,6 + 0,51 + 0,501 + 0,5001 + \dots$ qator tekshirilsin.

2-§. Musbat hadli qatorlarning yaqinlashish va uzoqlashish alomatlari

1. **Taggoshlash alomati.** Agar musbat hadli ikkita $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ va $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ qator berilgan bo'lib, biror N nomerdan boshlab $u_n \leq v_n$ tengsizlik bajarilsa, u holda:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ qator yaqinlashuvchi bo'lsa, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ qator ham yaqinlashuvchi bo'ladi;

2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ qator uzoqlashuvchi bo'lsa, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ qator ham uzoqlashuvchi bo'ladi.

2. **Dalamber alomati.** Agar musbat hadli $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ qator uchun

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$ mavjud bo'lsa, u holda $l < 1$ da qator yaqinlashuvchi,

$l > 1$ da uzoqlashuvchi bo'ladi. $l = 1$ bo'lsa qatorni yaqinlashish yoki uzoqlashish aniq bo'lmaydi.

3. **Koshi alomati.** Agar musbat hadli $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ qator uchun $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = d$

$d < 1$ da qator yaqinlashuvchi, $d > 1$ da uzoqlashuvchi bo'ladi. $d = 1$ bo'lsa qatorni yaqinlashish yoki uzoqlashish aniq bo'lmaydi.

4. **Koshining integral alomati.** Agar $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ qatorning hadlari musbat

va o'smaydigan bo'lib, $x > 1$ da aniqlagan, uzluksiz, musbat va monoton kamayuvchi $f(x)$ funksiya uchun $f(1) = u_1$, $f(2) = u_2$,

$f(3) = u_3$, ..., $f(n) = u_n$, ... tengliklar o'rinli bo'lsa, u holda $\int_1^{\infty} f(x) dx$

xosmas integral yaqinlashsa, berilgan qator ham yaqinlashuvchi va aksincha, xosmas integral uzoqlashsa, qator ham uzoqlashuvchi bo'ladi.

5. **Taggoshlashning ikkinchi alomati.** Agar $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = k$ chekli limit

mavjud bo'lsa, u holda $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ va $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ qatorlar bir vaqtda uzoqlashuvchi yoki yaqinlashuvchi bo'ladi.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 2^2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \dots + \frac{1}{n \cdot 2^n} + \dots$ qatorning yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchi ekanligi aniqlansin. Javob: Yaqinlashuvchi.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} = \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \frac{\ln 4}{4} + \dots + \frac{\ln n}{n} + \dots$ qatorning yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchi ekanligi aniqlansin. Javob: Uzoqlashuvchi.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \dots$ qatorning yaqinlashuvchi

yoki uzoqlashuvchi ekanligi aniqlansin. Javob: Uzoqlashuvchi.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}$ qator tekshirilsin. Javob: Yaqinlashuvchi.

5. $1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{5^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$ qator tekshirilsin.

Javob: Uzoqlashuvchi.

6. Umumiy hadi $u_n = \frac{1}{4 \cdot 2^{n-3}}$ bo'lgan qator tekshirilsin.

Javob: Yaqinlashuvchi.

7. $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \dots$ qator tekshirilsin. Javob: Uzoqlashuvchi.

8. Dalamber alomatidan foydalanib quyidagi qatorlar tekshirilsin:

1) $\frac{2}{5} + \frac{4}{9} + \frac{6}{25} + \frac{8}{81} + \dots$ (Yaqinlashadi);

2) $1 + \frac{2}{21} + \frac{4}{3} + \frac{8}{41} + \dots$ (Yaqinlashadi);

3) $1 + \frac{1-2}{1-3} + \frac{1-2 \cdot 3}{1-3 \cdot 5} + \dots$ (Yaqinlashadi);

4) $1 + \frac{3}{2 \cdot 3} + \frac{3^2}{2^2 \cdot 5} + \frac{3^3}{2^3 \cdot 7} + \dots$ (Uzoqlashadi);

5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \dots + \frac{2n-1}{2^n} + \dots$ (Yaqinlashadi);

6) $\frac{2}{1} + \frac{2^2}{2^{10}} + \frac{2^3}{3^{10}} + \dots + \frac{2^n}{n^{10}} + \dots$ (Uzoqlashadi);

7) $\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{2}{3} + \frac{3}{3\sqrt{3}} + \frac{4}{9} + \frac{5}{9\sqrt{3}} + \dots$ (Yaqinlashadi);

8) $\frac{10}{11} + \frac{10^2}{21} + \frac{10^3}{31} + \dots$ (Yaqinlashadi);

9) $\frac{10}{11} + \left(\frac{10}{11}\right)^2 \cdot 2^5 + \left(\frac{10}{11}\right)^3 \cdot 3^5 + \left(\frac{10}{11}\right)^4 \cdot 4^5 + \dots$ (Yaqinlashadi);

10) $\frac{11}{10} + \left(\frac{11}{10}\right)^2 \cdot \frac{1}{2^5} + \left(\frac{11}{10}\right)^3 \cdot \frac{1}{3^5} + \left(\frac{11}{10}\right)^4 \cdot \frac{1}{4^5} + \dots$ (Uzoqlashadi);

9. Kosli alomatidan foydalanib quyidagi qatorlar tekshirilsin:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{n^2}$; 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{(5)^n}$;

3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^{n^2}$; 4) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln n \cdot e^{n \cdot \frac{1}{n}}$;

5) $\frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln^2 3} + \frac{1}{\ln^3 4} + \dots + \frac{1}{\ln^n(n+1)} + \dots$;

6) $\arcsin 1 + \arcsin^2 \frac{1}{2} + \dots + \arcsin^n \frac{1}{n} + \dots$;

7) $\frac{2}{3} + \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^4}{9} + \dots + \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{n^2}}{3^n} + \dots$;

8) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2+2n+1}{3n^2-2n+1}\right)^n$;

9) $3 + (2,1)^2 + (2,01)^3 + (2,001)^4 + \dots$;

10) $\frac{1}{2} + \frac{3}{3^2} + \frac{5}{3^3} + \dots + \frac{2n-1}{3^n} + \dots$.

Javoblar: 1) Uzoqlashuvchi; 2) Yaqinlashuvchi; 3) Yaqinlashuvchi;

4) Yaqinlashuvchi; 5) Uzoqlashuvchi; 6) Yaqinlashuvchi;

7) Yaqinlashuvchi; 8) Yaqinlashuvchi; 9) Uzoqlashuvchi;

10) Yaqinlashuvchi.

10. Koshining integral alomatidan foydalanib quyidagi qatorlar tekshirilsin:

1) $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots$;

2) $1 + \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{10}} + \dots$;

3) $\frac{1}{2^2} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{4^2} + \dots$;

4) $\frac{1}{1+3^2} + \frac{1}{1+2^2} + \frac{1}{1+3^2} + \dots$;

$$5) \frac{1}{1+1^2} + \frac{2}{1+2^2} + \frac{3}{1+3^2} + \dots;$$

$$6) \frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \dots;$$

$$7) \frac{1}{2!n^2} + \frac{2}{3!n^2} + \frac{1}{4!n^2} + \dots;$$

$$8) \frac{1}{9!n^9} + \frac{1}{19!n^9} + \frac{1}{29!n^9} + \dots;$$

$$9) \frac{2}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots;$$

$$10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n}}.$$

Javoblar: 1) uzoqlashadi; 2) uzoqlashadi; 3) yaqinlashadi;
4) yaqinlashadi; 5) uzoqlashadi; 6) yaqinlashadi; 7) yaqinlashadi;
8) uzoqlashadi; 9) yaqinlashadi; 10) yaqinlashadi.

3-§. O'zgaruvchan ishorali qatorlar

Hadlarining ishoralari turlicha bo'lgan qator o'zgaruvchan ishorali qator deyiladi. Agar qator hadlarining ishoralari navbatlashuvchi bo'lsa, u holda qatorni ishoralari navbatlashuvchi qator deyiladi. Bu qatorni quyidagicha yoziladi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots + (-1)^{n+1} u_n + \dots \quad (u_n > 0).$$

Leybnis teoremasi. Agar ishoralari navbatlashuvchi

$$u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots \quad (u_n > 0)$$

qatorning hadlari $u_1 > u_2 > u_3 > \dots$ va $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ bo'lsa, u holda berilgan qator yaqinlashadi, uning yig'indisi musbat va birinchi hadidan katta bo'lmaydi.

Ishoralari navbatlashuvchi qatorning qoldig'i $|R_n| < u_{n+1}$ tengsizlik bilan baholanadi.

O'zgaruvchan ishorali $u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots$ qator hadlarining absolt qiymatlaridan tuzilgan

$$|u_1| + |u_2| + |u_3| + \dots + |u_n| + \dots$$

qator yaqinlashuvchi bo'lsa, berilgan qator absolt yaqinlashuvchi qator deyiladi.

Agar o'zgaruvchan ishorali qator yaqinlashuvchi bo'lib, bu qator hadlarining absolt qiymatlaridan tuzilgan qator uzoqlashuvchi bo'lsa, u holda berilgan o'zgaruvchan ishorali qator shartli yaqinlashuvchi qator deyiladi.

Teorema. Agar qator absolt yaqinlashuvchi bo'lsa, uning hadlarini o'rinlarini ixtiyoriy ravishda almashtirilganda ham u absolt yaqinlashuvchiligi qoladi. Bu holda qatorning yig'indisi qator hadlarining tartibiga bog'liq bo'lmaydi.

Quyidagi qatorlarning shartli yoki absolt yaqinlashishini tekshiring:

$$1) 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots;$$

$$2) 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots;$$

$$3) \frac{\sin x}{1^2} + \frac{\sin 2x}{2^2} + \frac{\sin 3x}{3^2} + \dots + \frac{\sin nx}{n^2} + \dots;$$

$$4) \frac{\cos \frac{x}{4}}{3} + \frac{\cos \frac{3x}{4}}{3^2} + \frac{\cos \frac{5x}{4}}{3^3} + \dots + \frac{\cos(2n-1)\frac{x}{4}}{3^n} + \dots;$$

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2+1};$$

$$6) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3n-2}{3n-1};$$

$$7) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n+1)};$$

$$8) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \cdot 2^n};$$

$$9) \frac{1}{2} - \frac{4}{3} + \frac{7}{9} - \frac{10}{11} + \dots;$$

$$10) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n-1}.$$

Javoblar: 1) yaqinlashadi; 2) yaqinlashadi; 3) yaqinlashadi; 4) yaqinlashadi; 5) shartli yaqinlashadi; 6) uzoqlashadi; 7) shartli yaqinlashadi; 8) absolut yaqinlashadi; 9) uzoqlashadi; 10) noabsolut yaqinlashadi.

4-§. Funktsional qatorlar

Ta'rif. Agar qatorning hadlari x ning funksiyalaridan iborat bo'lsa, u holda unga **funksional qator** deyiladi.

U quyidagicha yoziladi:

$$u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

Agar $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ sonli qator yaqinlashsa, u holda funksional qator $x = x_0$ nuqtada yaqinlashuvchi deyiladi.

x ning $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ qatorni yaqinlashuvchi qiladigan barcha qiymatlar

to'plami funksional qatorning **yaqinlashish sohasi** deyiladi.

$S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x)$ yig'indi funksional qatorning **n -qismiy yig'indisi** deyiladi. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$ ga funksional qatorning yig'indisi deyiladi. $R_n(x) = S(x) - S_n(x)$ ayirmaga **qatorning qoldig'i** deyiladi.

Agar yaqinlashuvchi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ funksional qator uchun har qanday

$\epsilon > 0$ berilganda ham shunday $N(\epsilon)$ nomer topish mumkin bo'lsaki, $n \geq N$ bo'lganda $[a, b]$ kesmadagi istalgan x uchun $|R_n(x)| < \epsilon$ tengsizlik bajarilsa, berilgan funksional qator $[a, b]$ da **tekis yaqinlashuvchi** deyiladi.

Qator tekis yaqinlashuvchi bo'lishining Veyersstrass atomati.

Agar $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ funksional qator uchun hadlari musbat shunday $\sum_{n=1}^{\infty} C_n$ qator mavjud bo'lib, $x \in [a, b]$ da $|u_n(x)| \leq C_n$ bo'lsa, u holda funksional qator $[a, b]$ kesmada tekis yaqinlashadi va bu holda $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ qator **kuchaytirilgan qator** deyiladi.

Tekis yaqinlashuvchi funksional qatorlar bir qator xossalarga ega:

a) Tekis yaqinlashuvchi funksional qatorning hadlari $[a, b]$ kesmada uzluksiz bo'lsa, uning yig'indisi $S(x)$ ham bu kesmada uzluksiz bo'ladi;

b) Agar $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ funksional qatorning hadlari $[a, b]$ kesmada uzluksiz bo'lib, qator bu kesmada tekis yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda

$$\int_a^b S(x) dx = \int_a^b u_1(x) dx + \int_a^b u_2(x) dx + \int_a^b u_3(x) dx + \dots + \int_a^b u_n(x) dx + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

bo'ladi. Bu yerda $S(x)$ - qator yig'indisi;

c) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ funksional qatorning hadlari $[a, b]$ kesmada aniqlangan va bu kesmada $u_n'(x)$ uzluksiz hosilalarga ega bo'lsin;

Agar bu kesmada berilgan qator yaqinlashuvchi va uning hadlari hosilalaridan tuzilgan

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x) = u_1'(x) + u_2'(x) + \dots + u_n'(x)$$

qator tekis yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda funksional qatorning yig'indisi $S(x)$ ham $[a, b]$ kesmada hosilaga ega bo'ladi va

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$$

bo'ladi.

Quyidagi qatorlarni yaqinlashish sohalarini topilsin:

1. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1+x^{2k}} = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^4} + \dots + \frac{1}{1+x^{2n}} + \dots$; 2. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n \cdot n!}$;

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$; 4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+8)^{n+1}}{n^2}$; 5. $\sum_{n=1}^{\infty} 10^{n^2} (2n-3)^{n-1}$;

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2^n}$; 7. $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n^2}$; 8. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln^n x$;

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}}$; 10. $1 + \frac{1}{2^x} + \frac{1}{3^x} + \frac{1}{4^x} + \dots$; 11. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-(n-1)x}$;

12. $x \operatorname{tg} \frac{x}{2} + x^2 \operatorname{tg} \frac{x}{4} + \dots + x^n \operatorname{tg} \frac{x}{2^n} + \dots$

Javoblar: 1) $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$; 2) $(-3; 3]$; 3) $(-\infty; +\infty)$;
4) $[-9; -7]$; 5) $(1,45; 1,55)$; 6) $(-\infty; -3) \cup (-1; +\infty)$; 7) $(-1; 1)$;
8) $(\frac{1}{e}; e)$; 9) $x \neq \pm 1$; 10) $(1; +\infty)$; 11) $(0; +\infty)$; 12) $(-2; 2)$.

13. Veyershtross alomatiga ko'ra

$$\sin x + \frac{1}{2^2} \sin^2 2x + \frac{1}{3^2} \sin^3 3x + \dots$$

qatorni $(-\infty; +\infty)$ oraliqda tekis yaqinlashishi ko'rsatilsin.

14. $\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+2} + \frac{1}{x^2+3} - \frac{1}{x^2+4} + \dots$

qator x ning $(-\infty; +\infty)$ oraliqdagi barcha qiymatlarida tekis yaqinlashuvchi ekanligi ko'rsatilsin.

15. $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ qator $(-1; 1)$ oraliqda tekis yaqinlashuvchi emasligi ko'rsatilsin.

16. $\cos x + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2^2} \cos 3x + \frac{1}{3^2} \cos 4x + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \cos nx + \dots$ qatorni $[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}]$ kesmada hadma-had integrallash mumkinmi?

17. $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{x}{2\sqrt{2}} + \operatorname{arctg} \frac{x}{3\sqrt{3}} + \dots + \operatorname{arctg} \frac{x}{n\sqrt{n}} + \dots$

qatorga qator hadlarini hadma-had differensiallash haqidagi teoremani qo'llash mumkinmi?

18. $\frac{\cos x}{1} + \frac{\cos 2x}{2^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \dots + \frac{\cos nx}{n^2} + \dots$

qator $(-\infty; +\infty)$ oraliqda kuchaytirilgan qator ekanligi ko'rsatilsin.

5-§. Darajali qatorlar

Ta'rif. $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$ (1) ko'rinishdagi funksional qator darajali qator deb ataladi, bunda $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ o'zgarmas sonlar bo'lib, ular qatorning koeffitsiyentlari deb ataladi.

Teorema (Abel teoremasi). 1) Agar darajali qator noldan farqli biror x_0 qiymatda yaqinlashsa, x ning $|x| < |x_0|$ tengsizlikni qanoqlantiruvchi har qanday qiymatlarida u absolut yaqinlashadi;

2) agar qator biror x_0 qiymatda uzoqlashsa, x ning $|x| > |x_0|$ tengsizlikni qanoqlantiruvchi har qanday qiymatlarida uzoqlashadi.

Teorema. Darajali qatorning yaqinlashish sohasi markaziy koordinatalar boshida bo'lgan intervaldan iboratdir.

Ta'rif. Darajali qatorning yaqinlashish intervali deb, $-R$ dan $+R$ gacha bo'lgan shunday intervalga aytiladiki, bu interval ichida yotuvchi har qanday x nuqtada qator yaqinlashadi, shu bilan birga absolut yaqinlashadi, uning tashqisidagi x nuqtalarida esa qator uzoqlashadi. R soni darajali qatorning yaqinlashish radiusi deb ataladi.

$x = R$ va $x = -R$ da berilgan qatorning yaqinlashishi yoki uzoqlashishi har bir qator uchun alohida-alohida tekshiriladi. Ba'zi qatorlar uchun $R = 0$ yoki $R = \infty$ bo'lishi mumkin.

Agar qatorning barcha $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ koeffitsiyentlari nolga teng bo'lmasa, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ qatorning yaqinlashish radiusi

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \text{ yoki } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$$

formuladan topiladi.

Agar qator faqat juft yoki toq darajalarni o'z ichiga olsa yoki darajalari karrali bo'lsa, u holda yaqinlashish oralig'i Dalamber yoki Kosliu alomatlaridan foydalanib topiladi.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{np}$ qator uchun yaqinlashish radiusi:

$$R = \sqrt[p]{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|} \text{ yoki } R = \sqrt[p]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[p]{|a_n|}}}$$

formulalardan topiladi.

Darajali qatorlar quyidagi xossalarga ega:

a) yaqinlashish oralig'ining ichida yotuvchi har qanday $[a, b]$ kesmada darajali qator tekis yaqinlashadi. Uning yig'indisi yaqinlashish oralig'ida uzluksiz funksiya bo'ladi;

b) darajali qatorlarni ularning yaqinlashish oralig'ida hadma-had integrallash va differensiallash mumkin.

$a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + \dots + a_n(x-a)^n + \dots$ ko'rinishdagi funksional qator ham darajali qator deyiladi. Bunday $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ lar o'zgarimas sonlar bo'lib, qatorning koeffitsiyentlari deyiladi.

$a = 0$ bo'lganda yuqorida ko'rib o'tgan qator hosil bo'ladi. Yuqoridagi qatorning yaqinlashish sohasini topish uchun $x - a = X$ deb olamiz. U holda

$$a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_n X^n + \dots$$

qator hosil bo'ladi. Agar $-R < X < R$ bo'lsa, u holda berilgan darajali qatorni yaqinlashish sohasi $a - R < X < a + R$ bo'ladi.

1. Quyidagi qatorlarning yaqinlashish intervallari topilsin:

1) $1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots$; Javob: $(-1; 1)$;

2) $\frac{2x}{1} - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^3}{3} - \dots$; Javob: $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$;

3) $x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$; Javob: $(-\infty; +\infty)$;

4) $1 + x + (2x)^2 + (3x)^3 + \dots + (nx)^n + \dots$; Javob: $R = 0$;

5) $x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \dots$; Javob: $[-1; 1)$;

6) $1 + \frac{x^2}{10} + \frac{x^6}{10^2} + \frac{x^9}{10^3} + \dots$; Javob: $(-\sqrt[3]{10}; \sqrt[3]{10})$;

7) $1 + \frac{x}{3^2} + \frac{x^2}{3^{2 \cdot 3}} + \frac{x^3}{3^{2 \cdot 4}} + \dots$; Javob: $[-3; 3)$;

8) $1 + \frac{2x}{3^2 \sqrt{3}} + \frac{4x^2}{5^2 \sqrt{5}} + \frac{6x^3}{7^2 \sqrt{7}} + \dots$; Javob: $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

2. $(x-2) + \frac{1}{2^2}(x-2)^2 + \frac{1}{3^2}(x-2)^3 + \dots$ qatorning yaqinlashish intervali topilsin. Javob: $1 \leq x \leq 3$.

$$3. \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{k+1}{2k+1}\right)^k (x-2)^k \text{ qatorning yaqinlashish sohasi topilsin.}$$

Javob: $2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2}$.

$$4. \frac{x+1}{1!} + \frac{(x+1)^2}{2!} + \frac{(x+1)^3}{3!} + \dots \text{ qator tekshirilsin. Javob: } -\infty < x < +\infty.$$

$$5. (x-4) + \frac{1}{\sqrt{2}}(x-4)^2 + \frac{1}{\sqrt{3}}(x-4)^3 + \dots \text{ qator tekshirilsin.}$$

Javob: $1 \leq x \leq 3$.

$$6. \frac{x-1}{1} + \frac{(x-1)^2}{2^2} + \frac{(x-1)^3}{2^3} + \dots \text{ qator tekshirilsin. Javob: } 1 < x < 3.$$

6-8. Funksiyalarini Teylor va Makloren qatorlariga yoyish

Agar $y = f(x)$ funksiya $x = x_0$ nuqta atrofida $(n+1)$ -tartibgacha hosilalarga ega bo'lsa, u holda quyidagi Teylor formulasi o'rinaladi:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

bu yerda $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ ($0 < \theta < 1$) bo'lib,

unga Teylor formulasining Lagranch shaklidagi goldiq hadi deyiladi.

$x_0 = 0$ da Teylor formulasining xususiy holi - Makloren formulasi hosil bo'ladi.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x),$$

bu yerda $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$ ($0 < \theta < 1$).

Agar $y = f(x)$ funksiya x_0 nuqta atrofida istalgan marta differentsiallanuvchi va bu nuqtaning biror atrofida $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ bo'lsa, Teylor va Makloren formulalaridan quyidagi

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \dots$$

va $f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$ qatorlar hosil bo'lib, ularni Teylor va Makloren qatorlari deb ataladi. Bu qatorlar x ning $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ bo'ladigan qiymatlarida $f(x)$ ga yaqinlashadi.

Ba'zi bir funksiyalarining Makloren qatoriga yoyilmalaridan amaliyotda ko'p qo'llaniladi. Quyida ularni keltiramiz:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n!} + \dots \quad -1 < x \leq 1;$$

$$(1+x)^m = 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n + \dots$$

($-1 < x < 1$).

Oxirgi qator binomial qator deb ataladi.

Ba'zi hollarda funksiyaning taqribiy qiymatini berilgan aniqlikda hisoblash uchun uning darajali qatorga yoyilmasidan foydalaniladi.

Ba'zi bir integrallarni hisoblashda integral ostidagi funksiyaning darajali qatorga yoyib, darajali qatorni integrallash to'g'risidagi teoremdan foydalanib, $\int f(x) dx$ integralni darajali ko'rinishida tasvirlanadi va uning qiymatini bu qatorning yaqinlashish oralig'idagi x ning har qanday qiymatida berilgan aniqlik bilan hisoblash mumkin bo'ladi.

$$(1+x)^m = 1 + \frac{m}{1}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \dots \text{ qatoridan } m$$

ning ba'zi bir qiymatlari uchun quyidagi qatorlarni hosil qilish mumkin:

$m = -1$ bo'lganda:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

$m = \frac{1}{2}$ bo'lganda:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 4}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}x^4 + \dots$$

$m = -\frac{1}{2}$ bo'lganda:

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^2 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}x^4 - \dots$$

Oxirgi tenglikdagi x ni o'rniga $-x^2$ ifodani qo'ysak:

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^4 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^6 + \dots + \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}x^{2n} + \dots$$

$|x| < 1$ bo'lganda darajali qatorlarni integrallash haqidagi teorema asosan quyidagini hosil qilamiz:

$$\int_0^x \frac{u}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u - u + \frac{1}{2}u^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}u^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}u^7 + \dots + \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)u^{2n+1}}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n(2n+1)} + \dots$$

1. $y = x^4 - 3x^2 + 2x + 2$ funksiyani $x - 1$ ning darajalari bo'yicha yoying. I: $2 + 3(x-1)^2 + 4(x-1)^3 + (x-1)^4$.

2. $y = x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 4$ ko'phadni $x - 4$ ning darajalari bo'yicha yoying.

3. $y = x^{20} - 3x^5 + 1$ funksiyani $x - 1$ ning darajalari bo'yicha yoying.

4. $f(x) = \ln x$ funksiyani $x_0 = 1$ nuqta atrofida Teylor qatoriga yoying.

5. $f(x) = \frac{1}{x+1}$ funksiyani Makloren qatoriga yoying.

6. $f(x) = x^2 e^x$ funksiyani Makloren qatoriga yoying.

7. $f(x) = \sec x$ va $f(x) = \ln(e^x + x)$ funksiyalarni Makloren qatoriga yoyilmasining dastlabki 3 ta hadini yozing.

8. $f(x) = e^x$ ni $x + 2$ ning darajalari bo'yicha; 2) $f(x) = \sqrt{x}$ ni $x - 4$ ning darajalari bo'yicha; 3) $f(x) = \cos \frac{x}{2}$ ni $x - \frac{\pi}{2}$ ning darajalari bo'yicha yoying.

9. $f(x) = e^x$, $f(x) = \sin x$, $f(x) = \cos x$, $f(x) = (1+x)^m$, $f(x) = \ln(1+x)$ funksiyalarni Makloren qatoriga yoyilmasidan foydalanib: 1) $f(x) = (1+x)e^x$, 2) $f(x) = \sin^2 x$, 3) $f(x) = \frac{x-3}{(1+x)^2}$, 4) $f(x) = e^{-x} \sin x$, 5) $f(x) = \ln(1+3x+2x^2)$ funksiyalarni x ning darajalari bo'yicha qatorga yoying.

10. Integral ostidagi funksiyalarni Makloren qatoriga yoyilmasini hadlab integrallash natijasida quyidagi integrallarni qatorga yoyilmasini toping:

1) $\int \sin x^2 dx$; 2) $\int \sqrt{x} e^x dx$; 3) $\int \sqrt{1-x^2} dx$.

11. Quyidagi funksiyalarni darajali qatorga yoying.

1) $f(x) = x \cos 2x$; 2) $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$; 3) $f(x) = e^x \sin x$.

12. Mos kelgan qatorlardan foydalanib, $\ln 1,1$ va $\sqrt[4]{17}$ larni 0,0001 aniqlikda taqribiy hisoblang.

7-§. Furje qatorlari

$$\frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + b_1 \sin x + a_2 \cos 2x + b_2 \sin 2x + \dots \text{ yoki}$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (1) \text{ funksional qatorga } \underline{\text{trigonometrik qator}}$$

deyiladi. a_0, a_n, b_n o'zgarmas sonlar bo'lib, ularga trigonometrik qatorning koeffitsientlari deyiladi.

Agar (1) qator yaqinlashsa, u holda uning yig'indisi davri 2π bo'ldan $f(x)$ davriy funksiya bo'ladi.

(1) qatoridagi a_0, a_n, b_n lar quyidagi

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx; \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx; \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (2)$$

förmular bo'yicha aniqlanib, ularni **Furje koeffitsientlari** deb ataladi. Koeffitsientlari (2) förmular bo'yicha topiladigan (1) trigonometrik qator **Furje qatori** deyiladi.

Agar $f(x)$ funksiya juft bo'lsa, u holda Furje qatorida faqat kosinuslar qatnashadi, chunki bu holda barcha $b_n = 0$ bo'lib,

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \text{ bo'ladi. Agar } f(x) \text{ toq bo'lsa, u holda Furje qatorida}$$

faqat sinuslar qatnashadi, chunki u holda barcha $a_n = 0$ bo'lib,

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \text{ bo'ladi.}$$

1. Davri 2π bo'lgan

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{agar } -\pi < x < 0 \text{ bo'lsa,} \\ x, & \text{agar } 0 < x < \pi \text{ bo'lsa} \end{cases}$$

funksiyani Furje qatoriga yoying.

$$J: f(x) = \frac{\pi}{4} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi(2n-1)^2} \cos(2n-1)x + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx.$$

$$2. \quad f(x) = \begin{cases} -x, & \text{agar } -2 \leq x < 0 \text{ bo'lsa,} \\ x, & \text{agar } 0 \leq x \leq 2 \text{ bo'lsa.} \end{cases} \quad \text{funksiyani Furje}$$

$$\text{qatoriga yoying. } J: f(x) = 1 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{\pi(2n-1)x}{2}.$$

$$3. \quad -\pi \leq x \leq \pi \text{ oralig'ida } f(x) = x \text{ funksiyaning Furje qatoriga yoying. } J: f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin nx}{n}.$$


$$4. \quad f(x) = \begin{cases} -2, & \text{agar } -\pi < x \leq 0 \text{ bo'lsa,} \\ 1, & \text{agar } 0 < x \leq \pi \text{ bo'lsa} \end{cases} \quad \text{funksiyaning Furje}$$

$$\text{qatoriga yoying. } J: f(x) = -1 - \frac{6}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{2n-1}.$$

XI BOB. KARRALI VA EGRI CHIZIQLI INTEGRALLAR

1-§. Ikki o'lchovli integral va uni hisoblash

$z = f(x, y) = f(p)$ funksiya L chiziq bilan chegaralangan yopiq D sohada aniqlangan va uzluksiz bo'lib, $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ lar D sohani n ta elementar bo'laklarga bo'lish natijasida hosil bo'lgan yuzalar bo'lsin (1-chizma).



1-chizma

Har bir ΔS_i elementar sohada ixtiyoriy $P_i(x_i, y_i)$ nuqtani tanlaymiz va funksiyaning P_i nuqtadagi qiymatini hisoblab

$$f(P_i)\Delta S_i = f(x_i, y_i)\Delta S_i$$

ko'paytmani tuzamiz. So'ngra bu ko'paytmalarning barchasini yig'indisini tuzamiz:

$$\sum_{i=1}^n f(P_i)\Delta S_i = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i)\Delta S_i$$

Bu yig'indi $z = f(x, y) = f(p)$ funksiya uchun D sohada integral yig'indi deyiladi.

ΔS_i yuzalar soni cheksiz ortirilsa, u holda ular diametrlarining eng kattasi nolga intilgandagi integral yig'indining limiti $z = f(x, y)$ funksiyadan D soha bo'yicha olingan ikki o'lchovli integral deyiladi va quyidagicha yoziladi:

$$\iint_D f(P)ds \text{ yoki } \iint_D f(x, y)ds$$

Demak, $\iint_D f(x, y)ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i)\Delta S_i$, bu yerda D -integrallash sohasi, $f(x, y)$ integral ostidagi funksiya, ds - yuz elementi deyiladi. Dekart koordinatalarida $ds = dxdy$ bo'lganligi uchun ikki o'lchovli integral

$$\iint_D f(x, y)ds = \iint_D f(x, y)dxdy$$

Agar $f(x, y) \geq 0$ bo'lsa, $f(x, y)$ funksiyaning D soha bo'yicha olingan ikki o'lchovli integrali $z = f(x, y)$ sirt, $z = 0$ tekislik va yasovchisi OZ o'qqa parallel, yo'naltiruvchisi esa D sohaning

chegarasidan iborat bo'lgan silindrik sirt bilan chegaralangan jismning hajmi V ga teng bo'ladi.

Ikki o'lchovli integralni hisoblash ikkita aniq integralni ketma-ket hisoblashga keltiriladi.

Agar D soha $y_1 = f_1(x)$, $y_2 = f_2(x)$ funksiyalarning grafiklari hamda $x = a$, $x = b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan bo'lsa, u holda ikki o'lchovli integral


$$\iint_D f(x, y)dxdy = \int_a^b \left[\int_{f_1(x)}^{f_2(x)} f(x, y)dy \right] dx = \int_a^b dx \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} f(x, y)dy$$

formula bilan hisoblanadi (2-chizma).

Agar D soha $y = c$, $y = d$ to'g'ri chiziqlar hamda $x_1(y)$ va $x_2(y)$ chiziqlar bilan chegaralangan bo'lsa, u holda ikki o'lchovli integral


$$\iint_D f(x, y)dxdy = \int_c^d \left[\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y)dx \right] dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y)dx$$

formula bilan hisoblanadi (3-chizma).



Agar integrallash sohasi 4-chizmadagidek bo'lsa, ya'ni u $x = a$, $x = b$, $y = c$, $y = d$ to'g'ri chiziqlar bilan faqat bitta nuqtada keshishsa, u holda ikki o'lchovli integral quyidagicha hisoblanadi:

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y) dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y) dx$$



Agar integrallash sohasi 5-chizmadagidek bo'lsa, u holda ikki o'lchovli integralni hisoblash uchun D soha $x = x_0$ nuqta bilan bo'laklarga bo'linib, yuqoridagi formulalardan foydalanib hisoblanadi.

Oddiy aniq integralning barcha xossalari ikki o'lchovli integrallar uchun ham o'riniidir.

Quyidagi ikki o'lchovli integrallar hisoblansin.

1. $\iint_D (x-y) dx dy$, bu yerda D soha $y = 2 - x^2$ va $y = 2x - 1$ chiziqlar bilan chegaralangan. J: $\frac{64}{15}$.

2. $\iint_D e^{2x} dx dy$, bu yerda D soha $y = x$, $y = 0$, $x = 1$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan. J: $\frac{e-1}{2}$.

3. $\iint_D xy dx dy$, bu yerda D soha: a) $x = 0$, $x = a$, $y = 0$, $y = b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan to'g'ri to'rtburchak; b) $4x^2 + y^2 \leq 4$ ellips bilan chegaralangan; c) $y = x - 4$ to'g'ri chiziq va $y^2 = 2x$ parabola bilan chegaralangan. J: a) $\frac{a^2 b^2}{2}$; b) 0; c) 90.

4. $\iint_D (x+y) dx dy$, bu yerda D soha $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 3$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan. J: 9.

5. $\iint_D \frac{x dx dy}{x^2 + y^2}$, bu yerda D soha $x = 2$, $y = x$, $x = 2y$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan. J: $\frac{\pi}{2} - 2 \arctg \frac{1}{2}$.

6. Quyidagi ikki karrali integrallar hisoblansin:

1) $\int_0^1 dx \int_{\frac{x}{2}}^x (x-y) dy$, J: $\frac{1}{3}$;

2) $\int_0^1 dy \int_{\frac{y}{2}}^y \left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} \right) dx$, J: 6π ;

3) $\int_{-1}^1 dx \int_x^1 (x-y) dy$, J: $112 \frac{8}{105}$;

4) $\int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_1^x (x \ln y) dy$, J: 8;

5) $\int_0^1 dy \int_{y-1}^1 (x+2y) dx$, J: $50 \frac{2}{3}$;

6) $\int_0^1 dx \int_0^x (x^2 + 2xy) dy$, J: 26;

7) $\int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_0^x (x+2y) dx$, J: -11,2;

8) $\int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{\frac{1}{2}}^x e^{2xy} dy$, J: $\frac{e-1}{2}$;

9) $\int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{\frac{1}{2}}^x \sqrt{4-x+y} dy$, J: $\frac{506}{15}$;

10) $\int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{\frac{1}{2}}^x (2x-y) dy$, J: 0,9;

11) $\int_{\frac{1}{2}}^1 \int_{\frac{1}{2}}^x \cos^2 x dx dy$, J: $\frac{a^2 \pi}{2}$.

$$12) \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{1-x}} dy, \quad J: \frac{a^2(3\pi-2)}{12}$$

7. Quyidagi ikki o'lovli integrallarda integrallash tartibi o'zgartirilsin:

$$1) \int_a^b \int_y^x f(x,y) dx; \quad J: \int_a^b \int_y^x f(x,y) dy dx;$$

$$2) \int_a^b dx \int_a^x f(x,y) dy; \quad J: \int_a^b dx \int_a^x f(x,y) dx;$$

$$3) \int_a^b dy \int_x^y f(x,y) dx; \quad J: \int_a^b dy \int_x^y f(x,y) dy;$$

$$4) \int_a^b dx \int_0^x f(x,y) dy; \quad J: \int_a^b dx \int_0^x f(x,y) dx.$$

2-§. Ikki o'lovli integrallar yordamida yuzlar va hajmlarni hisoblash


Agar $\iint_D f(x,y) dx dy$ integralda $f(x,y) \equiv 1$ bo'lsa, u holda bu integralning qiymati D sohaning yuzini beradi. Demak,

$$S = \iint_D dx dy$$

Agar D soha to'g'ri bo'lsa (1-chizma), u holda yuz ushbu

$$S = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \right) dx$$

ikki karali integral bilan hisoblanadi.



Agar D soha $h \leq y \leq l$, $x_1(y) \leq x \leq x_2(y)$ tengsizliklar bilan aniqlangan bo'lsa (2-chizma), u holda bu sohaning yuzi ushbu

$$S = \iint_D dx dy = \int_h^l dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} dx$$

ikki karali integral bilan hisoblanadi.

Agar D soha qutb koordinatalarida $\varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2$, $r_1(\varphi) \leq r \leq r_2(\varphi)$ tengsizliklar bilan aniqlansa, u holda bu sohaning yuzi

$$S = \iint_D r dr d\varphi = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} r dr$$

formula bilan hisoblanadi.

$z = f(x,y)$ sirt, $z = 0$ tekislik va yo'naltiruvchisi D sohaning chegarasidan iborat bo'lgan to'g'ri chiziq, yasovchisi esa Oz o'qqa parallel silindrik sirt bilan chegaralangan jismning V hajmi, D soha bo'yicha $f(x,y)$ funksiyadan olingan ikki o'lovli integralga teng, ya'ni

$$V = \iint_D f(x,y) dx dy$$

Sirt zichligi birga teng bo'lgan yassi shakl og'irlik markazining koordinatalari:

$$x_c = \frac{\iint_D x \rho(x,y) dx dy}{\iint_D \rho(x,y) dx dy}; \quad y_c = \frac{\iint_D y \rho(x,y) dx dy}{\iint_D \rho(x,y) dx dy}$$

formulalar bilan hisoblanadi. Agar sirt zichligi o'zgaruvchan, ya'ni $\rho = \rho(x, y)$ bo'lsa, u holda yuqoridagi formulalar quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$x_c = \frac{\iint_D x \rho(x,y) dx dy}{\iint_D \rho(x,y) dx dy}; \quad y_c = \frac{\iint_D y \rho(x,y) dx dy}{\iint_D \rho(x,y) dx dy}$$

D yassi shaklning Oy va Ox o'qlarga nisbatan statik momentlari

$$M_y = \iint_D \rho(x,y) x dx dy; \quad M_x = \iint_D \rho(x,y) y dx dy$$

formulalar yordamida hisoblanadi.

$\iint_D \rho(x,y) dx dy$ integral qaralayotgan shaklning massasini ifodalaydi.

1. Quyidagi chiziqlar bilan chegaralangan yuzlar ikki o'lchovli integral bilan yozilsin va hisoblansin:

1) $xy = 4, y = x, x = 4;$ J: $6 - 4 \ln 2;$

2) $y = x^2, 4y = x^2, y = 4;$ J: $10 \frac{2}{3};$

3) $y = x^2, 4y = x^2, x = \pm 2;$ J: $4;$

4) $y^2 = 4 + x, x + 3y = 0;$ J: $20 \frac{5}{6};$

5) $ay = x^2 - 2ax, y = x;$ J: $\frac{9a^2}{2};$

6) $y = \ln x, x - y = 1, y = -1;$ J: $\frac{1}{2} - \frac{1}{e};$

7) $y = x^2, y = x + 2;$ J: $4,5;$

8) $y = \sin x, y = \cos x, x = 0;$ J: $\sqrt{2} - 1;$

9) $x = 4y - y^2, x + y = 6;$ J: $\frac{1}{6};$

10) $y = 2 - x, y^2 = 4x + 4;$ J: $\frac{64}{3};$

2. Quyidagi sirtlar bilan chegaralangan jismning hajmi hisoblansin:

1) $z = x^2 + y^2, x + y = 4, x = 0, y = 0, z = 0;$ J: $42 \frac{2}{3};$

2) $z = x^2 + y^2, y = x^2, y = 1, z = 0;$ J: $\frac{88}{105};$

3) $y = x^2, y = 1, x + y + z = 4, z = 0;$ J: $\frac{60}{15};$

4) $z = y^2 - x^2, z = 0, y = \pm 2;$ J: $\frac{32}{3};$

3. $y^2 = 4x + 4$ va $y^2 = -2x + 4$ chiziqlar bilan chegaralangan figura og'irlik markazining koordinatalari topilsin: J: $x_c = \frac{2}{5}, y_c = 0.$

4. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ va uning $\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$ vafari bilan chegaralangan jismning og'irlik markazini topilsin.

J: $x_c = \frac{20}{3(n-2)}, y_c = \frac{2}{n-2}.$

3-§. Uch o'lchovli integral va uni hisoblash

Fazo S yopiq sirt bilan chegaralangan biror V soha va uning chegarasida biror $f(x,y,z)$ uzluksiz funksiya aniqlangan bo'lsin. $f(x,y,z) \geq 0$ bo'lgan holda bu funksiyaning qandaydir bir moddaning V sohaga taqsimlanish zichligi deb olishimiz mumkin. V sohani ixtiyoriy ravishda ΔV_i sohalarga bo'lamiz. (ΔV_i belgi sohaning o'zgarishi emas, balki uning hajmi ham deb qaraymiz). Har bir ΔV_i sohada ixtiyoriy P_i nuqtani tanlab olamiz va f funksiyaning bu nuqtadagi qiymatini $f(P_i)$ bilan belgilab,

$$\sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta V_i \quad (1)$$

integral yig'indini tuzamiz. Agar bunda ΔV_i ning eng katta diametrini nolga intiladigan qilib ΔV_i larining sonini cheksiz o'ttirib boramiz. Agar $f(x, y, z)$ funksiya uzluksiz bo'lsa, (1) integral yig'indining limiti mavjud bo'ladi. V sohani bo'lish usuliga ham P_i nuqtani tanlash usuliga ham bo'liq bo'lmagan bu limit

$$\iiint_V f(P) dV$$

ko'rinishda belgilanadi va uch o'lchovli integral deyiladi. Demak,

$$\lim_{\max \Delta V_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta V_i = \iiint_V f(P) dV \quad \text{yoki}$$

$$\iiint_V f(P) dV = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz \quad (2)$$

Agar $f(x, y, z)$ funksiya V sohadagi modda taqsimlanishining hajm zichligi deb xisoblansa, (2) integral V hajmga kirgan barcha moddaning massasini beradi.

V soha pastdan $z = \varphi(x, y)$ sirt bilan, yuqoridan $z = \psi(x, y)$ sirt bilan chegaralangan bo'lsin. V sohaning XOY tekislikdagi proyeksiyasi D soha bo'lib, u $y = \varphi_1(x)$, $y = \varphi_2(x)$, $x = a$, $x = b$ chiziqlar bilan chegaralangan deylik. U holda V soha bo'yicha olingan uch karrali integral quyidagicha aniqlanadi:

$$\int_a^b \left\{ \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left[\int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} f(x, y, z) dz \right] dy \right\} dx \quad (3)$$

Uch o'lchovli integralni xisoblash uchta aniq integralni yoki bitta ikki o'lchovli va bitta aniq integralni ketma-ket hisoblashga keltiriladi.

Agar V soha ushbu

$$\begin{cases} a \leq x \leq b \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \\ z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \end{cases}$$

tengsizliklar sistemasi bilan aniqlangan bo'lsa, u holda uch o'lchovli integral quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$\begin{aligned} \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz &= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz \quad \text{yoki} \\ \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz &= \iint_D dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz \end{aligned}$$

Agar $f(x, y, z) = 1$ bo'lsa, V soha bo'yicha olingan uch o'lchovli integral V sohaning hajmini ifodalaydi.

$$V = \iiint_V dx dy dz$$

Quyidagi uch o'lchovli integrallar hisoblansin:

$$1. \iiint_V z dx dy dz, \text{ bu yerda } V \text{ soha } x + y + z = 1, z = 0, y = 0, x = 0$$

tekisliklar bilan chegaralangan. J: $\frac{1}{24}$.

2. $\iiint_V xyz \, dx \, dy \, dz$, bu yerda V soha $z = xy$ giperbolik paraboloid hamda $x + y = 1, z = 0$ tekisliklar bilan chegaralangan. $J: \frac{1}{180}$.

3. $\iiint_V y \cos(\pi + x) \, dx \, dy \, dz$, bu yerda V soha $y = \sqrt{x}$ silindr va $y = 0, z = 0, x + z = \frac{\pi}{2}$ tekisliklar bilan chegaralangan. $J: \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

4. $\iiint_V xyz \, dx \, dy \, dz$, bu yerda V soha $y = x^2, x = y^2, z = xy$ va $z = 0$ sirtlar bilan chegaralangan. $J: \frac{1}{96}$.

5. $\iiint_V (2x+y) \, dx \, dy \, dz$, bu yerda V soha $y = x, x = 1, z = 1$ va $z = 1 + x^2 + y^2$ sirtlar bilan chegaralangan. $J: \frac{41}{60}$.

6. Quyidagi uch karrali integrallar hisoblansin:

1) $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x^2 y^2 z \, dx \, dy \, dz$, $J: \frac{1}{110}$.

2) $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 z \, dx \, dy \, dz$, $J: \frac{81}{4}$.

3) $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (4+z) \, dx \, dy \, dz$, $J: \frac{46}{3}$.

4) $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 dx \, dy \, dz$, $J: \frac{1}{12}$.

5) $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz$, $J: \frac{abc}{3} (a^2 + b^2 + c^2)$;

6) $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 dx \, dy \, dz$, $J: \frac{a^3 b}{6}$;

7. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ellipsoidning hajmi hisoblansin. $J: \frac{4}{3} \pi a^3$.

8. $x^2 + y^2 + z^2 = 64$ sferaning hajmi topilsin. $J: \frac{256\pi}{3}$.

4-§. Birinchi va ikkinchi tur egri chiziqli integrallar

$f(x, y) = f(P)$ funksiya AB yassi silliq egri chiziqning barcha nuqtalarida aniqlangan va uzluksiz bo'lsin. Bu yoyni uzunliklari $\Delta l_1, \Delta l_2, \dots, \Delta l_n$ bo'lgan n ta elementar yoychalarga bo'lamiz. Har bir i -bo'lakda ixtiyoriy $P_i(x_i, y_i)$ nuqtani tanlab olib, funksiyaning bu P_i nuqtadagi qiymatini mos elementar yoycha uzunligiga ko'paytiramiz. Bu ko'paytmalardan

$$\sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta l_i \quad \text{yoki} \quad \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta l_i \quad (1)$$

yig'indini tuzamiz. Bu yig'indi $f(x, y)$ funksiya uchun AB yoy bo'yicha integral yig'indi deyiladi.

(1) integral yig'indining elementar yoychalar uzunliklarining eng kattasi nolga intilgandagi limiti birinchi tur egri chiziqli integral deyiladi.

$$\lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta l_i = \int_{AB} f(x, y) dl$$

Agar AB fazodagi egri chiziq yoyi va bu egri chiziq bo'ylab uzluksiz $f(x, y, z)$ funksiya berilgan bo'lsa, u holda egri chiziqli integral quyidagicha bo'ladi:

$$\lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta l_i = \int_{AB} f(x, y, z) dl$$

Birinchi tur egri chiziqli integral uchun quyidagi tenglik o'rinlidir:

$$\int_{AB} f(x, y) dl = \int_{AB} f(x, y) dl$$

Birinchi tur egri chiziqli integralni hisoblash aniq integralni hisoblashga keltiriladi:

1) agar yassi AB egri chiziq $x = x(t), y = y(t), \alpha \leq t \leq \beta$ parametrik tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, egri chiziqli integral quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$\int_{AB} f(x, y) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$$

Agar AB egri chiziq fazoda $x = x(\tau), y = y(\tau), z = z(\tau), \alpha \leq \tau \leq \beta$ parametrik tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, u holda egri chiziqli integral quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$\int_{AB} f(x, y, z) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(\tau), y(\tau), z(\tau)] \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} d\tau$$

2) agar AB egri chiziq $y = y(x)$ ($a \leq x \leq b$) tenglama bilan berilgan bo'lsa, egri chiziqli integral quyidagicha hisoblanadi:

$$\int_{AB} f(x, y) dl = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + y'^2} dx$$

3) agar AB yassi egri chiziq $x = x(y)$ ($c \leq y \leq d$) tenglama bilan berilgan bo'lsa, egri chiziqli integral quyidagicha hisoblanadi:

$$\int_{AB} f(x, y) dl = \int_c^d f[x(y), y] \sqrt{1 + x'^2} dy$$

$P(x, y)$ va $Q(x, y)$ funksiyalar biror yassi silliq AB egri chiziqning barcha nuqtalarida aniqlangan va uzluksiz, hamada $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$ va

$\Delta y_1, \Delta y_2, \dots, \Delta y_n$ lar elementar yoychalarning Ox va Oy o'qlarga proyeksiyalari bo'lsa, u holda

$$\sum_{i=1}^n [P(x_i, y_i) \Delta x_i + Q(x_i, y_i) \Delta y_i] \quad (2)$$

yig'indi $P(x, y)$ va $Q(x, y)$ funksiyalar uchun koordinaatlar bo'yicha integral yig'indi deyiladi.

(2) integral yig'indining $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ va $\max \Delta y_i \rightarrow 0$ dagi limiti AB yoy yo'nalishi bo'yicha ikkinchi tur egri chiziqli integral deyiladi.

$$\lim_{\substack{\max \Delta x_i \rightarrow 0 \\ \max \Delta y_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n P(x_i, y_i) \Delta x_i + Q(x_i, y_i) \Delta y_i = \int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

Ikkinchi tur egri chiziqli integral uchun

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = - \int_{BA} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

Agar integrallash yo'li yopiq egri chiziq bo'lsa, u holda egri chiziqli integral quyidagicha yoziladi:

$$\oint P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

Ikkinchi tur egri chiziqli integralni hisoblash ham aniq integralni hisoblashga keltiriladi:

1) agar yassi AB egri chiziq $x = x(t), y = y(t)$ parametrik tenglama bilan berilgan bo'lsa, u holda ikkinchi tur egri chiziqli integral quyidagicha hisoblanadi:

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{t_1}^{t_2} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt$$

Agar AB egri chiziq fazoda $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ parametrik tenglama bilan berilgan bo'lsa, u holda ikkinchi tur egri chiziqli integral quyidagicha hisoblanadi:

$$\int_{AB} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz = \int_{t_0}^{t_1} [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)]dt.$$

2) agar yassi AB egri chiziq $y = y(x)$ tenglama bilan berilgan bo'lsa, u holda ikkinchi tur egri chiziqli integral quyidagicha hisoblanadi:

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b [P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x)]dx$$

3) agar yassi AB egri chiziq $x = x(y)$ tenglama bilan berilgan bo'lsa, u holda ikkinchi tur egri chiziqli integral quyidagicha hisoblanadi:

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_c^a [P(x(y), y)x'(y) + Q(x(y), y)]dy.$$

1. $\int_1^4 (x-y)dy$ egri chiziqli integral hisoblansin. Bu yerda L — to'g'ri chiziqning $A(0, 0)$ dan $B(4, 3)$ gacha bo'lagi. $J: \frac{5}{2}$.

2. $\int_1^2 xdy$ ni hisoblang. Bu yerda L $O(0, 0)$ va $A(1, 2)$ nuqtalarini tutashiruvchi to'g'ri chiziq kesmasi. $J: \frac{\sqrt{5}}{2}$.

3. $\int_1^3 x^2 dy$ ni hisoblang. Bu yerda L $x^2 + y^2 = 9$ aylananing birinchi kvadrantda yotuvchi qismi. $J: 27$.

4. $\int_1^2 \frac{dy}{x+y}$ ni hisoblang. Bu yerda L $y = x + 2$ to'g'ri chiziqning $A(2, 3)$ dan $B(3, 5)$ gacha bo'lgan qismi. $J: \frac{\sqrt{2}}{2}$.

5. $\int_1^2 ((4\sqrt{x} - 3\sqrt{y}))dy$ ni hisoblang. Bu yerda L $E(-1, 0)$ va $H(0, 1)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq kesmasi. $J: -5\sqrt{2}$.

6. $A(4, 2)$ va $B(2, 0)$ nuqtalar berilgan: 1) OA to'g'ri chiziq; 2) OBA sinq chiziq bo'yicha $\int_1^2 [(x-y)dx - xy]$ ni hisoblang. $J: 1) 8; 2) 4$.

7. $A(0, 1)$, $B(2, 5)$ va $C(0, 5)$ nuqtalar berilgan. $\int_1^2 [(x+y)dx - 2xy]$ integral: 1) AB to'g'ri chiziq bo'yicha; 2) $y = x^2 + 1$ parabolaning \overline{AB} yoyi bo'yicha; 3) ABC sinq chiziq bo'yicha hisoblansin.

$J: 1) -16; 2) -\frac{52}{3}; 3) -12$.

8. Agar $x = \sqrt{\cos t}$, $y = \sqrt{\sin t}$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ bo'lsa, $\int_1^2 x^2 dy - y^2 dx$ ni hisoblang. $J: \frac{\pi}{4}$.

9. $\int_1^2 y(x-y)dx + xdy$ ni hisoblang: 1) $y = 2x$ chiziq bo'yicha; 2) $y = 2x^2$ chiziq bo'yicha. $J: 1) \frac{1}{3}; 2) \frac{31}{30}$.

10. $\int_1^2 y^2 dx + x^2 dy$ ni hisoblang. Bu yerda $L: x = a \cos t, y = b \sin t$ ellipsning soat mili harakati bo'yicha aylanib o'tiladigan yuqori yarmi. $J: \frac{4}{3} ab^2$.

ADABIYOTLAR

1. Matematika ta'limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasining V.I. Ruznitskiy nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. 2019 yil 9-iyul.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PQ-1947 sonli farmoni.
3. A. Sa'dullayev va boshqalar. Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami. T.: "O'zbekiston" 1993.
4. Д.Ф.Файзибоев, Н.М.Сидмиракпе. Интеграл хисоб курсидан амалий машгулотлар. Т.: "Ўқитувчи" 1982.
5. Е.У.Солтоқ. Олий математика. 3-жилд. Т.: "Ўзбекистон" 1996 й.
6. N.P.Rasulov, I.S.Salimov, R.T.Mehitdinov. Oliy matematika. Toshkent: 2012.
7. Г.М.Запорожц. Руководство к решению задач по математическому анализу. М.: "Высшая школа" 1964 г.
8. Н.С.Лиссунов. Дифференциальное и интегральное исчисления. 1-часть. М.: "Наука" 1978 г.
9. Н.С.Лиссунов. Дифференциал ва интеграл ҳисоб 2-том. Т.: "Ўқитувчи" 1974 е. 614 б.
10. В.П.Минорский. Олий математикадан масалалар тўловма. Т.: "Ўқитувчи" 1977 й.
11. И.А.Марин. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. М.: "Наука" 1970.
12. Г.Н.Берман. Сборник задач по курсу математического анализа. М.: 1966.
13. И.А.Калинд. Практические занятия по высшей математике. II-часть. Харьков. 1973 г.
14. П.Э.Данко, А.Г.Полод, Т.Я.Кожановская. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч.II. М.: Высшая школа, 1980 г.
15. В.И.Ляшко, А.К.Бохриук, Я.Г.Гай, Г.П.Головач. Математический анализ в примерах и задачах. II-часть. Киев, 1977 г.
16. Б.П.Демидович. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: Наука, 1990 г. 624 с.
17. Н.А.Давыдов, П.П.Коровкин, Н.Н.Николаевский. Сборник задач по математическому анализу. М.: Просвещение 1973 г.
18. В.Т.Лисневский, И.Л.Соловьевич. Математика. М.: "Высшая школа". 1991 г. 480 с.

MUNDARIJA

So'z boshi.....	3
I BOB. TO'PLAMLAR.....	6
1-§. To'plam tushunchasi, To'plamlar ustida amallar.....	6
2-§. Sonli to'plamlar, Haqiqiy sonning absolyut qiymati.....	10
3-§. Kompleks sonlar va ular ustida amallar.....	13
II BOB. CHIZIQLI ALGEBRA.....	19
1-§. Matritsa va ular ustida amallar.....	19
2-§. Determinantlar.....	24
3-§. Ikki va uch noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasi, Kramer qoidasi, Gauss usuli.....	29
4-§. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning matritsalar usuli.....	31
III BOB. TEKISLIKDA VA FAZODA ANALITIK GEOMETRIYA.....	33
1-§. To'g'ri chiziqdagi va tekislikdagi nuqtaning koordinatalari, Ikki nuqta orasidagi masofa va kesmani berilgan nisbatda bo'lish.....	33
2-§. Chiziq tenglamasi, To'g'ri chiziq va uning turli xil tenglamalar.....	38
3-§. Ikkinchi tartibli egr chiziqlar. Aylana.....	40
4-§. Ellips.....	51
5-§. Giperbola.....	54
6-§. Parabola.....	55
7-§. Qutb koordinatalar sistemasi.....	50
8-§. Fazodagi analitik geometriyaning asosiy tushunchalari va masalalari.....	63
9-§. Tekislikda va fazoda vektorlar.....	65
10-§. Fazoda tekislik va uning tenglamasi.....	81
11-§. Fazoda to'g'ri chiziq va uning tenglamasi.....	88
12-§. Fazodagi to'g'ri chiziq va tekislik.....	92
13-§. Ikkinchi tartibli sirtlar.....	95
IV BOB. MATEMATIK ANALIZGA KIRISH.....	102
1-§. O'zgaruvchi va o'zgarmas miqdorlar, funksiya tushunchasi i.....	102
2-§. Ketma-ketlik va uning limiti.....	112
3-§. Funksiyaning limiti.....	119
4-§. Funksiyaning uzluksizligi.....	126
V BOB. HOSILA VA DIFFERENSIAL.....	134
1-§. Argument va funksiya orttiriasi, Hosila va uni hisoblash.....	134
2-§. Oshkormas funksiya va uning hosilasi, Parametrik shaklda berilgan funksiya va uning hosilasi.....	143
3-§. Yuqori tartibli hosilalar.....	145
4-§. Hosilaning geometrik ma'nosi.....	148

5-§. Hosilaning fizik tatbiqlari.....	152
6-§. Aniqlik va Lopital qoidalar.....	153
7-§. Funksiyaning o'sish va kamayishi.....	155
8-§. Funksiyaning ekstremumlari.....	157
9-§. Funksiyaning kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari.....	159
10-§. Funksiya grafigining qavariqlik va botiqlik oralig'lar. Bukilish nuqtalar. Assimptotalar.....	163
11-§. Funksiyaning differensial.....	165
12-§. Teylor va Makloren formulalari.....	169
VI BOB. ANIQMAS INTEGRAL.....	171
1-§. Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral. Aniqmas integralni bevosita hisoblash.....	171
2-§. Aniqmas integralda o'zgaruvchini almashtirish. Bo'laklab integrallash.....	175
3-§. Trigonometrik funksiyalarni integrallash.....	179
4-§. Giperbolik funksiyalarni integrallash.....	182
5-§. Kvadrat uchhad qatnashgan integrallarni hisoblash.....	183
6-§. Eng sodda ratsional kasrlar va ularni integrallash.....	186
7-§. Ratsional kasrlarni integrallash.....	188
8-§. Irratsional funksiyalarni integrallash.....	192
VII BOB. ANIQ INTEGRAL.....	197
1-§. Aniq integral va uni hisoblash.....	197
2-§. Xosmas integrallar.....	203
3-§. Aniq integralning geometrik tadbiqlari.....	206
4-§. Aniq integralning mexanik tadbiqlari.....	217
5-§. Aniq integralning fizik tadbiqlari.....	221
6-§. Aniq integralni taqribiy hisoblash.....	223
VIII BOB. KO'P O'ZGARUVCHILI FUNKSIYA.....	227
1-§. Ko'p o'zgaruvchili funksiya, uning limiti va uzluksizligi..	227
2-§. Ko'p o'zgaruvchili funksiyaning xususiy va to'la ortirmalari. Xususiy hosilalar. To'liq differensial.....	230
3-§. Murakkab va oshkormas funksiyalarning xususiy hosilalari	235
4-§. Yuqori tartibli xususiy hosilalar va to'liq differensiallar..	237
5-§. Sirtga urinma tekislik va normal. Yo'nalish bo'yicha hosila. Gradient.....	240
6-§. Ko'p o'zgaruvchili funksiyaning ekstremumlari. Teylor formulasi.....	242
IX BOB. ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR.....	247
1-§. Differensial tenglamalar bo'yicha asosiy tushunchalar. Birinchi tartibli tenglamalar. O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan tenglamalar. Bir jinsli va bir jinsli tenglamaga keltiriladigan tenglamalar. To'la differensial tenglamalar.....	247
2-§. Birinchi tartibli chiziqli tenglama. Bernulli tenglamasi....	255

3-§. Yuqori tartibli differensial tenglamalar.....	258
4-§. Bir jinsli chiziqli tenglamalar.....	263
5-§. O'zgarmas koeffitsientli ikkinchi tartibli bir jinsli chiziqli tenglamalar.....	267
6-§. n-tartibli o'zgarmas koeffitsientli bir jinsli chiziqli tenglamalar.....	270
7-§. Ikkinchi tartibli o'zgarmas koeffitsientli chiziqli bir jinslimas chiziqli tenglamalar.....	273
8-§. Differensial tenglamalar sistemasi.....	283
X BOB. QATORLAR.....	287
1-§. Sonli qatorlar.....	287
2-§. Musbat hadli qatorlarning yaqinlashish va uzoqlashish alomatlari.....	290
3-§. O'zgaruvchan ishorali qatorlar.....	294
4-§. Funksional qatorlar.....	296
5-§. Darajali qatorlar.....	299
6-§. Funksiyalarni Teylor va Makloren qatorlariga yoyish.....	301
7-§. Furiye qatorlari.....	305
XI BOB. KARRALI VA EGRI CHIZIQLI INTEGRALLAR.....	307
1-§. Ikki o'lovli integral va uni hisoblash.....	307
2-§. Ikki o'lovli integrallar yordamida yuzlar va hajmlarni hisoblash.....	312
3-§. Uch o'lovli integral va uni hisoblash.....	315
4-§. Birinchi va ikkinchi tur egri chiziqli integrallar.....	318
ADABIYOTLAR.....	324

AXLIMIRZAYEV A., IBAYDULLAYEV T.T., QO'CHQAROV M.U.,
ZULFIXAROV I.

MATEMATIKADAN MASALALAR TO'PLAMI

Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma

Toshkent - "Innovatsiya-Ziyo" - 2022

Muharrir: Xolsaidov F. B.

Nashriyot litsenziyasi №023, 27.10.2018.
Boshiga 14.03.2022. da ruxsat etildi. Bichimi 60x90.
"Times New Roman" garniturasi.
Ofset bosma usulida bosildi.

Shartli bosma labor'i 21. Nashr bosma to'lovi 20.0.
Adadi 50 nusxa.

"Innovatsiya-Ziyo" MCHJ mas'ala bo'linida chop etildi.
Manzil: Toshkent shahri, Farhod ko'chasi, 6-a uy.



199893 552-11-21

Muallif va nashriyot rasmiy ravishda chop etish ta'qiqlanadi.

ISBN978-9943-7025-1-6



9 789943 702516