


A. AXLIMIRZAYEV, M. O'. QO'CHQAROV,
I. M. ZULFIXAROV, M. M. IBRAGIMOV.

OLIY MATEMATIKA

I QISM



Kitob quyidagi ko'rsatila...

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

ANDIJON DAVLAT UNIVERSINETI

A. AXLIMIRZAYEV, A. RIZAYEV, M. IBRAGIMOV, M. QO'CHQAROV

OLIIY MATEMATIKA

I qism

O'QUV QO'LLANMA

Toshkent
"INNOVATSIYA-ZIYO"
2022

UO'K: 517.1
KBK: 22.11
O-45

Axlimirzayev, Ahmadjon
«Oliy matematika» 1-qism/o'quv qo'llanma/ A.Rizayev, M.Ibragimov,
M.Qo'chqarov. Toshkent: "INNOVATSIYA-ZIYO", 2022, 31 4 b.

Ushbu o'quv qo'llanma universitetlarning tabiiy, ijtimoiy va gumanitar fanlar sohalariga kiruvchi yo'nalishlar talabalariga mo'ljallangan bo'lib, unda oliy matematika tarkibiga kiruvchi chiziqli algebra, analitik geometriya, matematik mantiq va kombinatorika elementlari hamda matematik analizdan bir o'zgaruvchili funksiyaning differentsial va integral hisobi bo'yicha nazariy ma'lumotlar, ular yordamida yechilgan masala va misollar hamda talabalar mustaqil yechishlari uchun topshiriqlar keltirilgan.

Mas'ul muharrir:

Mo'minov G'. – fizika-matematika fanlari doktori, professor

Taqrizchilar:

O'rinov A.Q. – fizika-matematika fanlari doktori, professor

Ibaydullayev T.T. – fizika-matematika fanlari nomzodi

Ushbu o'quv qo'llanma Andijon davlat universiteti ilmiy kengashining yig'ilishida muhokama qilinib ma'qullangan va chop etishga tavsiya etilgan

ISBN 978-9943-5867-8-9

© Axlimirzayev A., 2022
© "INNOVATSIYA-ZIYO", 2022

SO'Z BOSHI

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng, barcha sohalarida bo'lgani kabi, mamlakatimizda ta'lim sohasida ham muhim islohotlar amalga oshirildi. Bu davrda respublikamizda jahon andozalariga mos raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashni ko'zda tutuvchi "Ta'lim to'g'risida" gi qonun va unga asoslangan "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" qabul qilindi.

Ma'lumki, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim, oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim, kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash hamda maktabdan keyingi ta'lim bosqichlarini o'z ichiga oluvchi uzluksiz ta'lim tizimini yaratishni ko'zda tutadi. Oliy ta'lim bosqichi uzluksiz ta'lim bosqichlari ichida eng muhimi hisoblanadi. Chunki bu bosqichda xalq xo'jaligining barcha sohalarida faoliyat olib boradigan mutaxassislar tayyorlanadi. Oliy o'quv yurtlarida malakali mutaxassislarni tayyorlashda o'quv adabiyotlarining, ayniqsa o'zbek tilidagi adabiyotlarning o'rni beqiyosdir.

Ma'lumki, hozirgi kunda oliy o'quv yurtlarining barcha mutaxassisliklarida oliy matematika fani o'qitiladi. Talabalarni oliy matematikadan chuqur bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlarida o'quv adabiyotlarining, ayniqsa, masala va misollar yechish bo'yicha yo'l-yo'riqlar ko'rsatilgan o'quv qo'llanmalarining o'rni muhimdir.

Hozirgi kunda oliy matematika va matematik analizdan masalalar yechish bo'yicha bir qator qo'llanmalar mavjud. Ulardan I.A.Maron muallifligidagi "Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах" nomli, I.A.Kaplan muallifligidagi "Практические занятия по высшей математике" nomli, P.E.Danko, A.G.Паров, T.Ya.Kojevnikovalar muallifligidagi "Высшая математика в упражнениях и задачах" nomli va hokazolarni keltirish mumkin.

Bunday qo'llanmalar ko'p bo'lishiga qaramasdan ular davlat tilida emas. Bundan tashqari, bu qo'llanmalarda oily matematikadan nazariy ma'lumotlar masala va misollar yechish uchun yetarli darajada

yoritilmagan hamda ularni qo'llashga doir misol va masalalar keltirilmagan.

Mualliflar tomonidan yozilgan ushbu o'quv qo'llanma yuqorida aytilgan bu kamchiliklarni to'ldirishga qaratilgan.

Ushbu o'quv qo'llanmada dastlab har bir mavzu bo'yicha nazariy ma'lumotlar qisqa va aniq bayon qilingan hamda ular yordamida bir nechta misol va masalalar yechib ko'rsatilgan. So'ngra talabalar bilan mashg'ulot vaqtida va mashg'ulotdan so'ng yechishga mo'ljallangan misol va masalalar berilgan.

Ushbu o'quv qo'llanmaning boshqa o'quv qo'llanmalardan farqi shundaki, unda barcha mavzular bo'yicha nazariy ma'lumotlar ancha mukammal berilgan hamda deyarli barcha tushuncha va formulalarni qo'llashga doir topshiriqlar yechimlari bilan keltirilgan. O'quv qo'llanmada berilgan nazariy ma'lumotlarni o'quv rejasida oliy matematika bo'yicha kamroq soat ajratilgan yo'nalishlar uchun ma'ruza matnlari sifatida qabul qilish mumkin. Ushbu o'quv qo'llanmadan oliy matematika o'qitiladigan barcha oliy o'quv yurtlarining talabalari va o'qituvchilari foydalanishlari mumkin. Ushbu o'quv qo'llanma mualliflarning uzoq yillardan beri oliy matematikadan olib borgan mashg'ulotlari jarayonida to'plangan tajribalari asosida yozilgan bo'lib, u ayrim kamchiliklardan holi bo'lmasligi mumkin.

Ushbu o'quv qo'llanmaning qo'lyozmasini o'qib chiqib o'zining qimmatli maslahatlarini bergan fizika – matematika fanlari doktori, professor A.Q.O'rinovga, fizika – matematika fanlari nomzodi T.Ibaydullayevga va fizika – matematika fanlari doktori, professor G'.Mo'minovga mualliflar o'z minnatdorchiliklarini bildiradilar.

I.BOB. TO'PLAMLAR

§1. To'plam tushunchasi. To'plamlar ustida amallar

To'plam tushunchasi matematikaning muhim boshlang'ich tushunchalaridan biri bo'lib u ta'riflanmaydi. To'plam deyilganda, biror bir xususiyati bo'yicha umumiylikka ega bo'lgan obyektlar majmuasini tushunamiz. Masalan 1-kurs talabalarining to'plami, $[0,1]$ kesmadagi nuqtalar to'plami, matematikadagi raqamlar to'plami va hokazo. To'plamlar $A, B, C, D, \dots$ harflar bilan belgilanadi. To'plamga kiruvchi obyektlarni uning elementlari deyiladi va ular $a, b, c, d, \dots$ lar bilan belgilanadi. Masalan, elementlari a, b, c, d bo'lgan A to'plam $A = \{a, b, c, d\}$ ko'rinishda yoziladi. $a \in A$ yozuv a element A to'plamga tegishli ekanligini, $a \notin A$ yoki $a \bar{\in} A$ yozuv esa a element A to'plamga tegishli emasligini bildiradi.

Birorta ham elementi bo'lmagan to'plam bo'sh to'plam deyiladi va $\emptyset$ bilan belgilanadi. Masalan, $\sin x = 5$ tenglamaning yechimlari to'plami, perimetri 0 ga teng bo'lgan kvadratlar to'plamlari bo'sh to'plamdir.

Chekli sondagi elementlardan tashkil topgan to'plam chekli to'plam deb ataladi. Masalan, matematikadagi raqamlar to'plami chekli to'plam bo'ladi. Uni $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ko'rinishda yozish mumkin.

Matematikada ko'pincha chekli bo'lmagan to'plamlarni – cheksiz to'plamlarni qarashga to'g'ri keladi. Masalan, barcha to'g'ri kasrlar to'plami, natural sonlar to'plami, bir nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar to'plami cheksiz to'plamlarga misol bo'la oladi.

Agar A to'plamning har bir elementi B to'plamning ham elementi bo'lsa, A to'plam B to'plamning qismi yoki qisman to'plami deyiladi va $A \subset B$ kabi belgilanadi. Masalan, $A = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots\}$ bo'lsa, u holda $A \subset B$ ekanligi ravshan.

Agar $A \subset B$, $B \subset A$ bo'lsa, A va B teng to'plamlar deyiladi va $A = B$ kabi yoziladi.

A va B to'plamlarning barcha elementlaridan tashkil topgan C to'plam A va B to'plamlarning yig'indisi (birlashmasi) deb ataladi. Uni $C = A \cup B$ kabi yoziladi.

A va B to'plamlarning barcha umumiy elementlaridan tashkil topgan D to'plam A va B to'plamlarning ko'paytmasi (kesishmasi) deyiladi. U $D = A \cap B$ kabi yoziladi.

A to'plamning B to'plamga kirmagan barcha elementlaridan tuzilgan E to'plam A to'plamdan B to'plamning ayirmasi deyiladi va u $E = A \setminus B$ kabi yoziladi.

Agar A to'plam S to'plamning qismi bo'lsa, ushbu $S \setminus A$ ayirma A to'plamning S ga to'ldiruvchi to'plami deyiladi va $C(A)$ kabi yoziladi.

Agar A va B to'plam elementlari orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatish mumkin bo'lsa, ular bir-biriga ekvivalent to'plamlar deb ataladi.

Natural sonlar to'plami N ga ekvivalent bo'lgan har qanday to'plam sanoqli to'plam deb ataladi.

A va B to'plamlarning Dekart ko'paytmasi deb $A \times B$ kabi belgilanadigan va $(x, y) (x \in A, y \in B)$ ko'rinishdagi juftliklardan tuzilgan yangi to'plamga aytiladi.

To'plamlarni birlashtirish amali sonlarni qo'shish amali singari,

$$A \cup B = B \cup A \text{ (kommutativlik),}$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = (A \cup C) \cup B \text{ (assotsiativlik)}$$

qonunlariga bo'ysinadi. Bulardan tashqari $A \cup \emptyset = A$ va sonlardan farqli ravishda $A \cup A = A$, $B \subset A$ bo'lsa, $A \cup B = A$ tengliklar ham o'rinli bo'ladi.

To'plamlarning kesishmasi amali quyidagi qonunlarga bo'ysunadi:

$$A \cap B = B \cap A \text{ (kommutativlik),}$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \text{ (assotsiativlik),}$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{ (distributivlik)}$$

Bulardan tashqari $A \cap A = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$ va $B \subset A$ bo'lsa, $A \cap B = B$ tengliklar ham o'rinli bo'ladi.

To'plamlar ayirmasi uchun $A \setminus A = \emptyset$, $A \setminus \emptyset = A$, $\emptyset \setminus A = \emptyset$ va $A \subset B$ bo'lsa, $A \setminus B = \emptyset$ munosabatlar o'rinlidir.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. Barcha juft va toq sonlar to'plamlarini yozing.

2. Barcha juft va toq sonlar to'plamlari uchun $A \cup B$ va $A \cap B$ lar topilsin.

3. Tomonining uzunligi 2 ga teng bo'lgan muntazam ko'pburchaklar perimetrlari to'plami yozilsin.

4. Birinchi tikuvchilik fabrikasida bolalar ko'ylagi, kostyum va kurtka tikiladi. Ikkinchi tikuvchilik fabrikasida esa ayollar ko'ylagi va kostyum tikiladi. Bu fabrikalarda tikilayotgan kiyimlar to'plamlari tuzilsin va ular uchun $A \cup B$, $A \cap B$ lar topilsin.

$$5. \frac{(x^2-1)(x^2-4)}{x+3} = 0 \text{ tenglama ildizlari to'plami tuzilsin.}$$

$$6. (x-2)(x-3)(x^2+5) = 0 \text{ tenglama ildizlari to'plami yozilsin.}$$

7. $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ va $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ to'plamlar berilgan. $A \cup B$ va $A \cap B$ lar topilsin.

$$8. \frac{(x-1)(x^2-3)(x^2-4)}{x-2} = 0 \text{ tenglama ildizlari to'plami yozilsin.}$$

$$9. A = [-3; 0] \text{ va } B = (-1; 5] \text{ to'plamlar birlashmasi yozilsin.}$$

10. $A = \{n-3, n-2, n-1, n, n+1\}$ va $B = \{n-1, n+1, n+2, n+3, n+4\}$ to'plamlar uchun $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ va $B \setminus A$ larni toping.

11. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan yil raqamlari to'plamini yozing.

12. $A = \{10; 12\frac{3}{4}; 17.3; -7; 136\}$ to'plam berilgan. Qaysi natural sonlar bu to'plamga tegishli?

13. A to'plam $-5; -4; -3; -2; 6$ elementlardan tuzilgan. Shu sonlarga qarama-qarshi bo'lgan sonlar to'plamini yozing.

$$14. x^2 - 6x + 10 = 0 \text{ tenglama ildizlari to'plamini yozing.}$$

15. $A = \{3, 6, 9, 12, 15\}$ to'plamning barcha qism to'plamlarini tuzing.

16. $A = \{2; 3; 4; 5; 7\}$, $B = \{3; 5; 7; 9\}$, $C = \{4; 9; 11\}$ to'plamlar uchun $A \cup (B \cap C)$, $(C \cup B) \cup A$ va $A \cap (B \cup C)$ lar topilsin.

17. 30 o'quvchidan 18 tasi matematikaga, 17 tasi esa fizikaga qiziqadi. Ikkala fanga ham qiziqadigan o'quvchilar soni nechta bo'lishi mumkin?

§2. Haqiqiy sonlar. Haqiqiy sonning absolyut qiymati

Son tushunchasi matematikaning asosiy tushunchalaridan biridir. Sanash natijasida dastlab 1, 2, 3, ... natural sonlar hosil bolgan. Ulardan tuzilgan to'plam natural sonlar to'plami deb ataladi va u N bilan belgilanadi. Demak, $N = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$ natural sonlar to'plamidir.

Natural sonlar, ularga qarama-qarshi sonlar va nol soni birgalikda butun sonlar to'plamini hosil qiladi va Z bilan belgilanadi. Demak,

$$Z = \{\dots, -n, \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$$

butun sonlar to'plamidir.

Qisqarmaydigan $r = \frac{m}{n}$; $m \in Z$, $n \in N$ kasr ko'rinishida tasvirlangan har bir son ratsional son deyiladi. Barcha ratsional sonlar to'plami Q deb belgilanadi. Demak,

$$Q = \{r: r = \frac{m}{n}; m \in Z, n \in N\}$$

Agar $\frac{m}{n}$ kasrning maxraji $n = 10^k$ ($k \in N$) bo'lsa, u o'nli kasr deyiladi.

Agar m ni n ga bo'lish jarayonida biror qadamdan keyin qoldiq nolga teng bo'lsa, u holda bo'lish jarayoni to'xtab, $\frac{m}{n}$ kasr o'nli kasrga aylanadi. Odatda, bunday o'nli kasr chekli o'nli kasr deyiladi. Masalan, $\frac{59}{40} = 1,475$.

Agar m ni n ga bo'lish jarayoni cheksiz davom etsa, ma'lum qadamdan keyin ilgari paydo bo'lgan qoldiqlardan biri yana uchraydi, so'ng undan oldingi raqamlar mos tartibda takrorlanadi. Odatda bunday kasr cheksiz davriy o'nli kasr deyiladi. Masalan, $\frac{1}{3}$ kasrda 1 ni 3 ga bo'lib, 0,333... bo'lishini ko'ramiz. Ya'ni,

$$\frac{1}{3} = 0,333 \dots$$

Ushbu 0,333..., 1,4777..., 2,131313..., kasrlar cheksiz davriy kasrlardir. Bu kasrlarning davri mos ravishda 3, 7, 13 bo'lib, ularni 0,(3); 1,4(7); 2,(13) kabi yoziladi.

Shunday kasrlar uchraydiki, ular cheksiz, lekin davriy emas. Masalan, 0,1010010001...; 0,12345...; 1,4142135...; bunday cheksiz, davriy bo'lmagan o'nli kasrlarni $\frac{m}{n}$ ratsional son ko'rinishida ifodalab bo'lmaydi.

Cheksiz davriy bo'lmagan o'nli kasr irratsional son deb ataladi.

Masalan, $\sqrt{2} = 1,4142135 \dots$; $\pi = 3,141583 \dots$

Barcha irratsional sonlarni irratsional sonlar to'plami deb ataladi va u I bilan belgilanadi.

Ratsional va irratsional sonlar to'plami birgalikda haqiqiy sonlar to'plamini hosil qiladi. U R bilan belgilanadi. Demak, $R = Q \cup I$.

Haqiqiy sonlardan tashkil topgan quyidagi to'plamlar matematika kursida juda ko'p ishlatiladi.

1. Ushbu $\{x \in R: a \leq x \leq b\}$ to'plam segment yoki kesma deyiladi va $[a; b]$ kabi belgilanadi.

2. $\{x \in R: a < x < b\}$ to'plam interval yoki oraliq deyiladi va $(a; b)$ kabi yoziladi.

3. $\{x \in R: a \leq x < b\}$, $\{x \in R: a < x \leq b\}$ to'plamlar yarim interval (oraliq) deyiladi va mos ravishda $[a; b)$, $(a; b]$ kabi belgilanadi.

4. $-\infty < x < +\infty$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning qiymatlar to'plamiga cheksiz oraliq deyiladi va u $(-\infty; +\infty)$ kabi yoziladi.

5. $-\infty < x < 0$ va $0 < x < +\infty$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning qiymatlar to'plamiga yarim cheksiz oraliqlar deyiladi hamda ular mos ravishda $(-\infty; 0)$ va $(0; +\infty)$ kabi yoziladi.

Agar shunday o'zgarmas M son mavjud bo'lsaki, $\forall x \in E$ uchun $x \leq M$ tengsizlik bajarilsa, E to'plam yuqoridan chegaralangan to'plam deyiladi, M son esa E to'plamning yuqori chegarasi deyiladi.

Yuqoridan chegaralangan E to'plamning yuqori chegaralarining eng kichigi E ning aniq yuqori chegarasi deyiladi va $\sup E$ (supremum) kabi belgilanadi.

Agar shunday o'zgarmas m son mavjud bo'lsaki, $\forall x \in E$ uchun $x \geq m$ tengsizlik bajarilsa, E to'plam quyidan chegaralangan deyiladi, m son esa E to'plamning quyi chegarasi deyiladi.

Quyidan chegaralangan E to'plamning quyi chegaralarining eng kattasi E ning aniq quyi chegarasi deyiladi va $\inf E$ (infimum E) kabi belgilanadi.

Haqiqiy sonning moduli (absolyut miqdori) tushunchasi matematikada ko'p ishlatiladigan tushunchalardan hisoblanadi.

x haqiqiy son musbat bo'lsa, shu sonning o'ziga, manfiy bo'lsa, unga qarama-qarshi ishorali $-x$ soniga x haqiqiy sonning moduli (absolyut miqdori) deyiladi va u $|x|$ kabi belgilanadi. Nol sonining moduli nolga teng. Yani: $|0| = 0$. Demak,

$$x = \begin{cases} x, & \text{agar } x \geq 0 \text{ bo'lsa,} \\ -x, & \text{agar } x < 0 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

Haqiqiy sonning moduli bir qator xossalarga ega:

1. Ixtiyoriy x haqiqiy son uchun

$$|x| \geq 0, |x| = |-x|, x \leq |x|, -x \leq |x| \text{ munosabatlar o'rinlidir.}$$

2. Biror musbat a haqiqiy son berilgan bo'lsin. Agar x haqiqiy son $|x| < a$ tengsizlikni qanoatlantirsa, u $-a < x < a$ tengsizlikni ham qanoatlantiradi va aksincha. Demak, $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$. Agar $|x| > a$ bo'lsa, $x < -a$ va $x > a$ bo'ladi.

3. Ikki haqiqiy x va y sonlar uchun

$$|x + y| \leq |x| + |y|; |x - y| \geq |x| - |y|;$$

$$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|; \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|} \quad (y \neq 0);$$

4. Har qanday haqiqiy a son uchun $\sqrt{a^2} = |a|$ munosabat o'rinlidir.

1. $|2 - \sqrt{2}|$ sonini modul belgisiz yozing.

Yechish: $2 - \sqrt{2} > 0$ bo'lganligi uchun, haqiqiy sonning modulining ta'rifiga asosan $|2 - \sqrt{2}| = 2 - \sqrt{2}$.

2. $|\sqrt{2} - \sqrt{3}|$ sonini modul belgisiz yozing.

Yechish: $\sqrt{2} - \sqrt{3} < 0$ bo'lganligi uchun, haqiqiy son modulining ta'rifiga asosan $|\sqrt{2} - \sqrt{3}| = -(\sqrt{2} - \sqrt{3}) = \sqrt{3} - \sqrt{2}$.

3. $|-6\frac{3}{4}|$ va $-6\frac{3}{4}$ sonlarni taqqoslang.

Yechish: $|-6\frac{3}{4}| = -(-6\frac{3}{4}) = 6\frac{3}{4}$. Demak, $|-6\frac{3}{4}| > -6\frac{3}{4}$.

4. $|-a| - 2|b|$ ifodani qiymatini $a = -1$ va $b = -2$ bo'lganda hisoblang.

Yechish: $|-a| - 2|b| = |-(-1)| - 2|-2| = |1| - 2 \cdot 2 = -3$.

5. Quyidagi ifodalarni modul belgisiz yozing.

1) $|x - 2|$; 2) $|x^2 - x|$; 3) $|x + 2| - x$.

Yechish: 1) Bu yerda $|a|$ o'rnida $|x - 2|$ ni qaraymiz. Modulning ta'rifiga asosan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$|x - 2| = \begin{cases} x - 2, & \text{agar } x - 2 \geq 0 \text{ bo'lsa,} \\ -(x - 2), & \text{agar } x - 2 < 0 \text{ bo'lsa.} \end{cases} \text{ yoki}$$

$$|x - 2| = \begin{cases} x - 2, & \text{agar } x \geq 2 \text{ bo'lsa,} \\ 2 - x, & \text{agar } x < 2 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

2) Bu yerda $|a|$ o'rnida $|x^2 - x|$ ni qaraymiz. Modul ta'rifidan foydalanamiz:

$$|x^2 - x| = \begin{cases} x^2 - x, & \text{agar } x^2 - x \geq 0 \text{ bo'lsa,} \\ -(x^2 - x), & \text{agar } x^2 - x < 0 \text{ bo'lsa.} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - x, & \text{agar } x(x - 1) \geq 0 \text{ bo'lsa,} \\ -x^2 + x, & \text{agar } x(x - 1) < 0 \text{ bo'lsa.} \end{cases} \text{ yoki}$$

$$|x^2 - x| = \begin{cases} x^2 - x, & \text{agar } x \leq 0 \text{ yoki } x \geq 1 \text{ bo'lsa,} \\ x - x^2, & \text{agar } 0 < x < 1 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

3) Bu yerda $|a|$ o'rnida $|x + 2|$ bo'lib $-x$ modulga bog'liq emas. Modul ta'rifidan foydalanamiz.

$$|x + 2| - x = \begin{cases} x + 2 - x, & \text{agar } x + 2 \geq 0 \text{ bo'lsa,} \\ -(x + 2) - x, & \text{agar } x + 2 < 0 \text{ bo'lsa.} \end{cases} \text{ yoki}$$

$$|x + 2| - x = \begin{cases} 2, & \text{agar } x \geq -2 \text{ bo'lsa,} \\ -2x - 2, & \text{agar } x < -2 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Taqqoslang:

- a) $|9,7|$ va 9 ; e) $-|-4,2|$ va $-4,2$;
 b) $|-16,2|$ va $16,2$; g) $|a|$ va 0 ;
 d) $|-6\frac{2}{5}|$ va $-6\frac{2}{5}$; h) $-6|a|$ va 0 .

2. a va b ning berilgan qiymatlarida quyidagi ifodalarning qiymatlarini hisoblang.

- a) $|a| + 3|b|$, $a = 2$, $b = 5$;
 b) $|-a| - 3|b|$, $a = -1$, $b = -2$;
 c) $\frac{-1 - |-3a| + 4|b|}{2|a| + |b|}$, $a = -4$, $b = 0$;
 d) $\frac{-1 - |-3a| + 5|b|}{3|a| + |b|}$, $a = -4$, $b = 2$;

3. Ifodani modul belgisiz yozing.

- a) $|x - 3|$; b) $|x + 3|$; c) $|x + 2|$; d) $|x - 4|$;
 e) $|x - 1| - 2|x - 2|$; g) $|7x - 5| + |2x - 1| + |x - 2|$;
 m) $2|x - y| + y$; k) $|4x - 8| + |x - 2| + |x|$;

4. $|x - 3| > 3$ tengsizlik yechilsin.

5. $|3x - 2| < 4$ tengsizlik yechilsin.

6. $x^2 > 9$ tengsizlik yechilsin.

7. $|x + 2| < 2$ tengsizlik yechilsin.

8. Agar t birdan kichik bo'lmagan har qanday qiymatlarni qabul qilsa, u holda $x = 1 - \frac{1}{t}$ o'zgaruvchining qabul qiladigan qiymatlar to'plamini toping.

9. Quyidagi tengsizliklar yechilsin.

- 1) $-1 < x - 3 \leq 2$; 2) $(x - 2)^2 \leq 4$;
 3) $(x - 1)^2 \leq 4$; 4) $(x - 3)^2 < 81$.

10. Agar $t \geq 1$ qiymatlarni qabul qilsa, u holda $x = 2 + \frac{1}{t}$ o'zgaruvchining qiymatlar to'plamini toping.

11. Quyidagi tenglamalar yechilsin.

- 1) $|x| = x + 5$; 2) $|x| = x - 5$; 3) $|\sin x| = \sin x + 1$.

II. BOB. KOMPLEKS SONLAR.

§1. Kompleks son tushunchasi. Kompleks sonlar ustida arifmetik amallar

Matematikada ko'plab masalalarni hal qilish haqiqiy sonlar to'plamini kengaytirishni taqozo etadi. Misol uchun kvadrat tenglamalar va ularning yechimlarini o'rganishda yangi bir sonlar, kompleks sonlar to'plamiga o'tish zaruriyati tug'iladi. Bunda dastlab mavhum birlik tushunchasi kiritiladi.

Kvadrati -1 ga teng bo'lgan son mavhum birlik deb ataladi va u i bilan belgilanadi. Demak, $i^2 = -1$ yoki $i = \sqrt{-1}$.

Masalan, $\sqrt{-36} = \sqrt{36 \cdot (-1)} = 6\sqrt{-1} = 6 \cdot i$;

$$\sqrt{-\frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{1}{4} \cdot (-1)} = \frac{1}{2}i.$$

$i^2 = -1$ dan foydalanib i ning darajalarini hosil qilish mumkin:

Yani,

$$i^2 = -1;$$

$$i^3 = i^2 \cdot i = -1 \cdot i = -i;$$

$$i^4 = i^3 \cdot i = -i \cdot i = -i^2 = -(-1) = 1;$$

$$i^5 = i^4 \cdot i = 1 \cdot i = i;$$

$$i^6 = i^5 \cdot i = i \cdot i = i^2 = -1;$$

$$i^7 = i^6 \cdot i = -1 \cdot i = -i;$$

$$i^8 = i^7 \cdot i = -i \cdot i = -i^2 = -(-1) = 1 \text{ va hokazo. Bularni kuzatib}$$

$i^{4n} = 1$; $i^{4n+1} = i$; $i^{4n+2} = -1$; $i^{4n+3} = -i$ ($n \in \mathbb{N}$) ekanligini ko'ramiz.

a va b haqiqiy sonlar hamda mavhum birlik i bilan hosil qilingan
 $a + bi$

ko'rinishdagi songa kompleks son deyiladi. Odatda, kompleks son $Z = a + bi$ ko'rinishda yoziladi. a son Z kompleks sonning haqiqiy qismi deyilib, ReZ kabi belilanadi. bi kompleks sonning mavhum qismi deyiladi va u ImZ kabi yoziladi. b soni esa mavhum qismning koeffitsienti deyiladi.

Har qanday sonni $a + bi$ ko'rinishda yozish mumkin. Masalan, $a = a + 0i$, $bi = 0 + bi$, $0 = 0 + 0i$.

$0 + bi$ soni sof mavhum son deyiladi.

Kompleks sonning moduli deb $|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ga aytiladi. $Z = a + bi$ va $\bar{Z} = a - bi$ sonlarga o'zaro qo'shma kompleks sonlar deyiladi. Masalan, $7 + 3i$ va $7 - 3i$ lar o'zaro qo'shma kompleks sonlardir. Ular uchun $|Z| = |\bar{Z}|$ o'rinalidir.

Ikkita $Z_1 = a_1 + b_1i$ va $Z_2 = a_2 + b_2i$ kompleks sonlar berilgan bo'lsin. Agar $a_1 = a_2$, $b_1 = b_2$ bo'lsa, u holda Z_1 va Z_2 kompleks sonlar o'zaro teng deyiladi va $Z_1 = Z_2$ kabi belgilanadi. Kompleks sonlar uchun kata, kichik tushunchalari o'rnatilmagan.

Aytilik, ikkita $Z_1 = a_1 + b_1i$ va $Z_2 = a_2 + b_2i$ kompleks sonlar berilgan bo'lsin. U holda

$$Z_1 + Z_2 = (a_1 + b_1i) + (a_2 + b_2i) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i;$$

$$Z_1 - Z_2 = (a_1 + b_1i) - (a_2 + b_2i) = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i;$$

$$Z_1 \cdot Z_2 = (a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i) = a_1a_2 + a_1b_2i + a_2b_1i + b_1b_2i^2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{a_1 + b_1i}{a_2 + b_2i} = \frac{a_1a_2 + b_1b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{a_2b_1 - a_1b_2}{a_2^2 + b_2^2}i \text{ lar o'rinli bo'ladi.}$$

Agar $Z = a + bi$ va $\bar{Z} = a - bi$ sonlarga o'zaro qo'shma kompleks sonlar berilgan bo'lsa, u holda

$$Z + \bar{Z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a;$$

$$Z - \bar{Z} = (a + bi) - (a - bi) = 2bi;$$

$$Z \cdot \bar{Z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2;$$

$$\frac{Z}{\bar{Z}} = \frac{a + bi}{a - bi} = \frac{(a + bi)(a + bi)}{(a - bi)(a + bi)} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} + i \frac{2ab}{a^2 + b^2}$$

lar o'rinli bo'ladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. i^{28} , i^{33} va i^{135} lar topilsin.

Yechish: $i^{28} = i^{4 \cdot 7} = 1$; $i^{33} = i^{4 \cdot 8 + 1} = i$; $i^{135} = i^{4 \cdot 33 + 3} = -i$.

2. $(i^{133} + i^{115} + i^{200} + i^{142})(i^{17} + i^{36})$ ni hisoblang.

Yechish: $i^{133} + i^{115} + i^{200} + i^{142} = i^{4 \cdot 33 + 1} + i^{4 \cdot 28 + 3} + i^{4 \cdot 50} +$

$$i^{133} = i - i + 1 - 1 = 0; i^{17} + i^{36} = i^{4 \cdot 4 + 1} + i^{4 \cdot 9} = i + 1;$$

$$0 \cdot (i + 1) = 0.$$

3. $(2x + 3y) + (x - y)i = 7 + 6i$ tenglikdan x va y topilsin.

Yechish: Kompleks sonlarni tenglik shartiga asosan

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 6 \end{cases}$$

sistemaga ega bo'lamiz. Uni yechish uchun sistemani ikkinchi tenglamasini 3 ga ko'paytiramiz va birinchi tenglamaga qo'shamiz. Natijada $5x = 25$ yoki $x = 5$ ni hosil qilamiz. Buni ikkinchi tenglamaga qo'yib $y = -1$ ni hosil qilamiz.

4. $Z_1 = 2 + 3i$ va $Z_2 = 5 - 7i$ kompleks sonlar berilgan.

Quyidagilar topilsin: 1) $Z_1 + Z_2$; 2) $Z_1 - Z_2$; 3) $Z_1 \cdot Z_2$; 4) $\frac{Z_1}{Z_2}$.

Yechish: 1) $Z_1 + Z_2 = (2 + 3i) + (5 - 7i) = 2 + 3i + 5 - 7i = 7 + 4i$;

$$2) Z_1 - Z_2 = (2 + 3i) - (5 - 7i) = 2 + 3i - 5 + 7i = -3 + 10i;$$

$$3) Z_1 \cdot Z_2 = (2 + 3i)(5 - 7i) = 10 - 14i + 15i - 21i^2 = 10 + i + 21 = 31 + i.$$

$$4) \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{2 + 3i}{5 - 7i} = \frac{(2 + 3i)(5 + 7i)}{(5 - 7i)(5 + 7i)} = \frac{10 + 14i + 15i + 21i^2}{25 + 49} = \frac{10 + 29i - 21}{74} = \frac{-11 + 29i}{74} = -\frac{11}{74} + \frac{29}{74}i.$$

5. $(3 - 5i)^2$ topilsin.

$$\text{Yechish: } (3 - 5i)^2 = 9 - 2 \cdot 3 \cdot 5i + 25i^2 = 9 - 30i - 25 = -16 - 30i.$$

6. $(3i - 1)x + (2 - 3i)y = 2 - 3i$ tenglikdan x va y ning qiymatlari topilsin.

Yechish: Tenglikning chap tomonini $a + bi$ ko'rinishga keltiramiz:

$$(3i - 1)x + (2 - 3i)y = 3xi - x + 2y - 3yi = (-x + 2y) + (3x - 3y)i. \text{ Demak, berilgan tenglik } (-x + 2y) + (3x - 3y)i = 2 - 3i$$

ko'rinishga keldi. Bundan $\begin{cases} -x + 2y = 2 \\ 3x - 3y = -3 \end{cases}$ sistemani hosil qilamiz. Uni yechish uchun birinchi tenglamaning har ikkala qismini 3 ga, ikkinchi tenglamaning har ikkala qismini 2 ga ko'paytiramiz va ularni qo'shamiz:

$$\begin{cases} -3x + 6y = 6 \\ 6x - 6y = -6 \end{cases}, 3x = 0, x = 0.$$

x ning bu qiymatini birinchi tenglamaga qo'yib $2y = 2$ yoki $y = 1$ ni hosil qilamiz.

$$7. x^2 - 6x + 13 = 0 \text{ tenglama yechilsin.}$$

Yechish: Bu yerda $a = 1$, $b = -6$, $c = 13$ bo'lgani uchun $D = b^2 - 4ac = 36 - 52 = -16 < 0$.

$$\sqrt{D} = \sqrt{-16} = \sqrt{16 \cdot (-1)} = 4\sqrt{-1} = 4i \text{ Demak,}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{6 + 4i}{2} = 3 + 2i; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{6 - 4i}{2} = 3 - 2i.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Hisoblang:

$$1) i^{98} + i^{64} + i^{37} + i^{13};$$

$$2) (i^{145} + i^{115} + i^{200} + i^{142})(i^{17} + i^{34});$$

$$3) (i^{13} + i^{14} + i^{15}) \cdot i^{32};$$

2. Quyidagi tengliklardan x va y ning qiymatlari topilsin:

$$1) 3y + 5xi = 15 - 7i; \quad 2) 7x + 5i = 1 - 10yi;$$

$$3) (2 - i)x + (1 + i)y = 5 - i; \quad 4) (1 + 2i)x + (3 - 5i)y = 1 - 3i.$$

$$\text{Javob: } 1) x = -\frac{7}{5}, y = 5; \quad 2) x = \frac{1}{7}, y = -\frac{1}{2}; \quad 3) x = 2, y = 1;$$

$$4) x = -\frac{4}{11}, y = \frac{5}{11}.$$

3. Quyidagi yig'indi va ayirmalarni hisoblang:

$$1) (6 + 2i) + (5 + 3i); \quad 2) (5 - 4i) + (6 + 2i);$$

$$3) (-2 + 3i) + (7 - 2i); \quad 4) (3 - 2i) - (5 + i);$$

$$5) (-3 - 5i) - (7 - 2i); \quad 6) (4 - 3i) - (9 + 6i).$$

4. Quyidagi ko'paytmalarni aniqlang:

$$1) (2 + 3i)(5 - 7i); \quad 2) (-4 + 5i) \cdot (3 - 9i); \quad 3) 4i \cdot (3i - 5);$$

$$4) (5 + 3i) \cdot 6i; \quad 5) (2 - 7i)(3 + 5i); \quad 6) 8i \cdot (2i + 5).$$

5. Bo'lishni bajaring.

$$1) \frac{5i}{3+2i}; \quad 2) \frac{2-3i}{5+2i}; \quad 3) \frac{3+2i}{1-5i}; \quad 4) \frac{3-7i}{2-6i}.$$

6. $Z = 6 + 7i$ va $\bar{Z} = 6 - 7i$ lar berilgan:

$$1) +\bar{Z}; \quad 2) Z - \bar{Z}; \quad 3) Z \cdot \bar{Z}; \quad 4) \frac{Z}{\bar{Z}} \text{ lar topilsin.}$$

7. Amallarni bajaring.

$$1) \frac{1+2i}{1-i} + \frac{3+2i}{3+2i}; \quad 2) \frac{6+2i}{3-7i} - \frac{2+3i}{2+5i};$$

$$3) \left(\frac{1+2i}{1-i}\right)^{12} + \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{12}; \quad 4) \frac{6+2i}{1-i} - i^{27}$$

$$\text{Javob: } 1) \frac{24}{13} + \frac{8}{13}i; \quad 2) -\frac{17}{29} + \frac{28}{29}i; \quad 3) 2; \quad 4) 2 + 5i.$$

8. Quyidagi kvadrat tenglamalar yechilsin:

$$1) x^2 - 4x + 13 = 0; \quad 2) x^2 + 3x + 4 = 0;$$

$$3) 2,5x^2 + x + 1 = 0; \quad 4) 4x^2 - 20x + 26 = 0.$$

$$\text{Javob: } 1) x_1 = 2 - 3i, x_2 = 2 + 3i; \quad 2) x_1 = \frac{-3+i\sqrt{7}}{2}, x_2 = \frac{-3-i\sqrt{7}}{2};$$

$$3) x_1 = -0,4 - 0,8i, x_2 = -0,4 + 0,8i;$$

$$4) x_1 = 2,5 + 0,5i, x_2 = 2,5 - 0,5i.$$

9. Quyidagi tenglamalar yechilsin:

$$1) x^3 - 8 = 0; \quad 2) x^6 + 64 = 0; \quad 3) x^4 - 81 = 0.$$


$$\text{Javob: } 1) x_1 = 2, x_{2,3} = -1 \pm i\sqrt{3}; \quad 2) \pm 2i, \pm\sqrt{3} \pm i;$$

$$3) \pm 3, \pm 3i.$$

§2. Kompleks sonni geometrik tasvirlash. Kompleks sonning trigonometrik shaklda yozilishi. Trigonometrik shakldagi kompleks sonlar ustida amallar

$z = a + bi$ kompleks sonni geometrik tasvirlash uchun oxy to'g'ri burchakli Dekart koordinatalari sistemasidan foydalanamiz. Bunda ox o'qida a birlikni, oy o'qida b birlikni ajratib ularning oxirlaridan o'qlarga perpendikulyarlar o'tkazamiz. Ular o'zaro kesishib $M(a; b)$ nuqtani hosil qiladi. Bu nuqta z kompleks sonning tekislikdagi geometrik tasviri bo'ladi. Demak, har bir kompleks songa tekislikda bitta nuqta mos kelar ekan va aksincha tekislikdagi har bir M nuqtaga bitta kompleks son mos keladi (1-chizma). Bu esa kompleks sonlar to'plami bilan tekislik nuqtalari orasida bir qiymatli moslik borligini anglatadi. Shunday qilib, oxy tekislikni kompleks sonlar tekisligi deb qarash mumkin ekan.

DENOV TA'JIBIRKORLIK
VA PEDAGOGIKA
INSTITUTI ARM
№ 29005



Koordinatalar boshi O nuqta bilan M nuqtani birlashtiruvchi OM kesma uzunligi r ga z kompleks sonning moduli deyiladi va $|z|$ kabi belgilanadi.

Pifagor teoremasiga asosan,

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

bo'lishi ravshan.

OM vektor bilan Ox o'qi orasidagi α burchakka z kompleks sonning argument deyiladi va $\arg z$ kabi belgilanadi. Demak, $0 \leq \arg z \leq 2\pi$. 1-chizmadan ko'rinadiki,

$$\cos \alpha = \frac{a}{r}, \sin \alpha = \frac{b}{r} \text{ yoki } \operatorname{tg} \alpha = \frac{b}{a}$$

bo'lib, bular yordamida kompleks sonning argumentini topish mumkin. Ulardan $a = r \cos \alpha$, $b = r \sin \alpha$ ifodalarga ega bo'lib, bundan esa $z = a + bi$ kompleks sonni

$$z = r \cos \alpha + i r \sin \alpha = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$$

ko'rinishda yozish mumkinligini aniqlaymiz. Kompleks sonning bu ko'rinishiga uning trigonometrik shakli deyiladi. Kompleks sonning bunday ko'rinishda yozilishi bir qator qulayliklarga olib keladi.

Aytaylik $Z_1 = r_1(\cos \alpha_1 + i \sin \alpha_1)$ va $Z_2 = r_2(\cos \alpha_2 + i \sin \alpha_2)$ kompleks sonlar berilgan bo'lsin. Bu yerda $r_1 = |Z_1|$, $r_2 = |Z_2|$, $\alpha_1 = \arg Z_1$ va $\alpha_2 = \arg Z_2$. U holda $Z_1 \cdot Z_2$ va $\frac{Z_1}{Z_2}$ lar quyidagicha aniqlanadi.

$$Z_1 \cdot Z_2 = r_1 \cdot r_2 [\cos(\alpha_1 + \alpha_2) + i \sin(\alpha_1 + \alpha_2)];$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\alpha_1 - \alpha_2) + i \sin(\alpha_1 - \alpha_2)].$$

Trigonometrik shaklda berilgan $Z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ kompleks

son uchun z^n va $\sqrt[n]{z}$ larni quyidagicha aniqlash mumkin:

$$z^n = r^n (\cos n\alpha + i \sin n\alpha); \quad \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\alpha + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right)$$

Bu formulalar Muavr formulalari deyiladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $Z_1 = 5$; $Z_2 = -3i$; $Z_3 = 3 + 2i$; $Z_4 = 5 - 2i$; $Z_5 = -3 + 2i$; $Z_6 = -1 - 5i$ sonlarni tekislikda tasvirlang.

Yechish: $Z_1 = 5$ ni $Z_1 = 5 + 0i$ ko'rinishda yozish mumkin. Demak, $a = 5$, $b = 0$ bo'lib, berilgan sonning geometrik tasviri $M_1(5; 0)$ nuqtadan iborat.


$Z_2 = -3i$ ni $Z_2 = 0 - 3i$ ko'rinishda yozish mumkin. Demak, $a = 0$, $b = -3$ bo'lib, berilgan sonning geometrik tasviri $M_2(0; -3)$ nuqtadan iborat bo'ladi.

$Z_3 = 3 + 2i$ da $a = 3$, $b = 2$ bo'lgani uchun uning geometrik tasviri $M_3(3; 2)$ nuqtadan iborat bo'ladi.

$Z_4 = 5 - 2i$ da $a = 5$, $b = -2$ bo'lgani uchun uning geometrik tasviri $M_4(5; -2)$ nuqtadan iborat bo'ladi.

$Z_5 = -3 + 2i$ da $a = -3$, $b = 2$ bo'lgani uchun uning geometrik tasviri $M_5(-3; 2)$ nuqtadan iborat.

$Z_6 = -1 - 5i$ da $a = -1$, $b = -5$ bo'lgani uchun uning geometrik tasviri $M_6(-1; -5)$ nuqta bo'ladi (2-chizma).



2. $Z = 1 - i$ kompleks sonning moduli va argumenti topilsin.

Yechish: Bu yerda $a = 1$, $b = -1$ bo'lib, undan $r = |z| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$ kelib chiqadi. bo'lib, $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin \alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ bo'lishi ravshan. Bu tenglamalar $[0; 2\pi)$ oralig'ida yagona $\alpha = \frac{3\pi}{4}$ yechimga ega.

3. $Z = 1 + i$ kompleks sonni trigonometrik shaklda yozing.

Yechish: $a = 1$, $b = 1$ bo'lganligi uchun $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.


$\cos \alpha = \frac{a}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ va $\sin \alpha = \frac{b}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ bo'lib, bu munosabatlardan $\alpha = 45^\circ$ ni topamiz. Demak, $r = \sqrt{2}$ va $\alpha = 45^\circ$ yoki $\alpha = \frac{\pi}{4}$ bo'lgani uchun

$$Z = 1 + i = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

4. $Z = -2 + 2i\sqrt{3}$ kompleks sonni trigonometrik shaklda tasvirlang.

Yechish: Bu yerda $a = -2$, $b = 2\sqrt{3}$ bo'lganligi uchun $r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$.

$Z = -2 + 2i\sqrt{3}$ kompleks sonni geometrik shaklda tasvirlaymiz (3-chizma).



3-chizma

$$\cos \alpha = \frac{a}{r} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}, \quad \sin \alpha = \frac{b}{r} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Bu munosabatlarga $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ burchak mos keladi. Demak,


$$Z = -2 + 2i\sqrt{3} = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right).$$

5. $Z = -3i$ kompleks sonni trigonometrik shaklda yozing.

Yechish: $Z = -3i = 0 - 3i$ bo'lganligi uchun $a = 0$, $b = -3$ bo'ladi.

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{0^2 + (-3)^2} = \sqrt{9} = 3.$$

$Z = -3i$ kompleks sonni geometrik shaklda tasvirlaymiz (4-



4-chizma

chizma).

Berilgan kompleks sonning argumenti $\alpha = \frac{3\pi}{2}$ ga teng. Demak,

$$Z = -3i = 0 - 3i = 3 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right).$$

6. $Z_1 = 3(\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ)$ va $Z_2 = 2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$ kompleks sonlar berilgan. $Z_1 \cdot Z_2$; $\frac{Z_1}{Z_2}$; Z_2^4 ; $\sqrt[3]{Z_1}$, lar topilsin.

Yechish:

$$\begin{aligned} Z_1 \cdot Z_2 &= 3(\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ) \cdot 2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = \\ &= 6[(\cos(330^\circ + 60^\circ) + i \sin(330^\circ + 60^\circ))] = \\ &= 6(\cos 390^\circ + i \sin 390^\circ) = 6(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ). \end{aligned}$$

$$\text{Demak, } Z_1 \cdot Z_2 = 6(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ) = 6 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = 3(\sqrt{3} + i) = 3\sqrt{3} + 3i.$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \frac{Z_1}{Z_2} &= \frac{3(\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ)}{2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)} = \frac{3}{2}(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ) = \frac{3}{2}(0 - i) = \\ &= -\frac{3}{2}i. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad Z_2^4 &= [2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)]^4 = 2^4 \cdot (\cos 240^\circ + i \sin 240^\circ) = \\ &= 16 \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 16 \left(-\frac{1}{2} \right) (1 + \sqrt{3}i) = -8(1 + \sqrt{3}i) = -8 - 8\sqrt{3}i. \end{aligned}$$

$$4) \quad \sqrt[3]{Z_1} = \sqrt[3]{3} \left(\cos \frac{330^\circ + 360^\circ \cdot k}{3} + i \sin \frac{330^\circ + 360^\circ \cdot k}{3} \right) \text{ bo'lib,}$$

$$k = 0 \text{ da } (z_1)_1 = \sqrt[3]{3}(\cos 110^\circ + i \sin 110^\circ);$$

$$k = 1 \text{ da } (z_1)_2 = \sqrt[3]{3}(\cos 230^\circ + i \sin 230^\circ);$$

$$k = 2 \text{ da } (z_1)_3 = \sqrt[3]{3}(\cos 350^\circ + i \sin 350^\circ).$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. $z_1 = 3 + 2i$; $z_2 = 5 - 4i$; $z_3 = -3 + 5i$;

$z_4 = 4$; $z_5 = -6i$; $z_6 = -4 - 2i$ kompleks sonlarni geometrik shaklda tasvirlang.

2. Quyidagi kompleks sonlarni trigonometrik shaklda yozilsin:

1) $z = \sqrt{3} + i$; 2) $z = -3 + 3i$;

3) $z = 2\sqrt{2} - 2i\sqrt{6}$; 4) $z = 5$;

5) $z = -10$; 6) $z = 6i$.

Javob: 1) $z = 2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$; 2) $z = 3\sqrt{2}\left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}\right)$;

3) $z = 4\sqrt{2}\left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)$; 4) $z = 5(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)$;

5) $z = 10(\cos \pi + i \sin \pi)$; 6) $z = 6\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$.

3. $Z_1 \cdot Z_2$ ko'paytma topilsin.

1) $Z_1 = 2\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$, $Z_2 = 0,4\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$;

2) $Z_1 = 2(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$, $Z_2 = 3(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ)$;

3) $Z_1 = 0,6\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$, $Z_2 = 5\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$.

4. $\frac{z_1}{z_2}$ topilsin.

1) $Z_1 = 0,6(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$, $Z_2 = 3(\cos 240^\circ + i \sin 240^\circ)$;

2) $Z_1 = 3(\cos 225^\circ + i \sin 225^\circ)$, $Z_2 = 5(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$

1) Agar $Z = -\sqrt{3} + i$ bo'lsa, Z^6 topilsin.

2) Agar $Z = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$ bo'lsa, Z^4 topilsin.

3) Agar $Z = \sqrt{3} + i\sqrt{3}$ bo'lsa, Z^5 topilsin.

5. Quyidagilarni hisoblang.

1) $Z = \sqrt[4]{-16}$; 2) $Z = -1$ bo'lsa, $\sqrt[4]{Z}$ topilsin.

3) $Z = -5 + 5i$ bo'lsa, $\sqrt[4]{Z}$ topilsin.

4) $Z = \sqrt[6]{-1}$ topilsin.

5) $Z = \sqrt[6]{1}$ topilsin.

III. BOB. MATEMATIK MANTIQLI VA KOMBIRATORIKA ELEMENTLARI

§1. Matematik mantiq elementlari

1.1. Matematik tushuncha. Tushuncha hajmi va mazmuni.

Tushunchani ta'riflash usullari

Matematika atrofimizdagi turli ob'ektlarni miqdoriy va fazoviy xossa va munosabatlarini o'rganuvchi fandır. U turli-tuman hodisa va predmetlarni o'rganish maqsadida turli-tuman matematik modellar yaratadi. Bu tashqi dunyo hodisalarining biron-bir majmuasini matematik simbolikalar yordamida tavsiflashdir. Matematik modellarni o'rganish bilan birga, biz biror real voqelikni o'rganamiz. Masalan, $y = kx$ funksiyaning xossalari haqidagi bilimlar turli miqdorlar orasidagi vaqt bilan masofa orasidagi, buyum miqdori bilan narxi orasidagi va boshqa bog'lanishlarning o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflash imkonini beradi.

Har qanday matematik ob'ekt ma'lum bir xossaga ega. Ob'ektning bu xossalari shu ob'ektni boshqa ob'ektlardan farqlash imkonini beradi. Bu xossalarni muhim va muhim bo'lmagan xossalarga ajratish mumkin.

Masalan, kvadratning to'rtta tomoni va to'rtta burchagi teng deyilgan xossa muhimdir. Uning tomoni gorizontol holatda turibdi degan xossa muhim emasdir.

Ob'ektning muhim xossasini bilish shu ob'ekt to'g'risida tushuncha hosil qilish demakdir.

Ob'ektning o'zaro bog'langan muhim xossalari to'plami bu ob'ekt haqidagi tushunchalar mazmuni deyiladi.

Matematik ob'ektlar bitta termin (so'z, nom) bilan ifodalanadi.

Tushunchaning hajmi deganda bitta termin bilan ifodalanadigan ob'ektlar to'plamiga aytiladi.

Tushuncha hajmi va mazmuni orasida bog'lanish mavjuddir.

Tushuncha hajmi qancha katta bo'lsa, uning mazmuni shuncha kichik bo'ladi. Masalan, "to'g'ri burchakli uchburchak" tushunchasi "uchburchak" tushunchasining hajmidan kichikdir, lekin uning mazmuni ikkinchisida kattadir.

Ob'ektni bilish uchun uning muhim xossalarini ko'rsatish kerak. Bu

muhiim xossalarni ko'rsatish ob'ektni ta'riflash deyiladi.

Ta'riflash oshkor va oshkormas ko'rinishda bo'lishi mumkin. Boshlang'ich sinflarda oshkormas ta'riflash usulidan foydalaniladi. To'g'ri burchakli uchburchak ta'rifi oshkor ta'riflashdir.

Kvadrat ta'rifining tuzilishini tahlil qilamiz. "Kvadrat deb hamma tomonlari teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchakka aytiladi." U mana bunday: dastlab ta'riflanuvchi tushuncha "kvadrat" ko'rsatiladi, keyin esa ushbu: to'g'ri to'rtburchak bo'lishlik, hamma tomonlari teng bo'lishlik xossalarini o'z ichiga oluvchi ta'riflovchi tushuncha kiritilgan.

"To'g'ri to'rtburchak bo'lishlik" xossasi "kvadrat" tushunchasiga nisbatan jins jihatdan tushunchadir. Ikkinchi xossa – "tomonlari teng bo'lishlik" – bu tur jihatdan xossa ko'rsatgichi, shu asosda kvadrat to'g'ri to'rtburchakning boshqa turlaridan farq qilinadi.

Maktab matematika kursining boshqa ta'riflari ham xuddi shunday tuzilishga ega. Bunday ta'riflar tuzilishini sxematik ravishda quyidagicha tasvirlash mumkin.

Tushunchalarni bunday sxema bo'yicha ta'riflash jins va tur jihatdan ta'riflash deyiladi.

Matematikada boshqa ta'riflash ham uchraydi. Masalan, "Uchburchak deb bir to'g'ri chiziqli yotmagan uchta nuqta va ularni juft-jufti bilan tutashtiruvchi uchta kesmadan iborat figuraga aytiladi" degan ta'riflashda, uchburchakni yasash usuli ko'rsatib ta'riflangan. Shu sababdan bu ta'riflash genetik (kelib chiqish) ta'riflash deb ataladi. Tushuncha ta'rifi quyidagi talablar qo'yiladi:

- 1) Ta'riflanuvchi va ta'riflovchi tushunchalar o'zaro mutanosib bo'lishi;
- 2) Tushunchani o'zini-o'zi orqali ta'riflash mumkin emas;
- 3) Tushunchada ortiqcha narsalar bo'lmaslik.

1.2. Fikr tushunchasi. Fikrning inkori

Mantiq fikrlash usullarining tahlilidan iboratdir. Matematik mantiq esa, mantiq ob'ektlarini matematik usulda tekshiradigan fandır.

Matematik mantiqda fikr (mulohaza) boshlang'ich tushuncha bo'lib,

u ta'riflanmaydi. U rost yoki yolg'onligi bir qiymatli aniqlanadigan darak gap deb tushuniladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Tekislikda berilgan ikkita turli nuqtadan bitta va faqat bitta to'g'ri chiziqli o'tadi;

2. Oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugaydigan butun sonlar 5 ga bo'linadi;

3. Toshkent - O'zbekistonning poytaxti;

4. 16 natural son to'la kvadrat emas;

5. $2 > 5$.

Bu keltirilgan fikrlardan birinchi uchasi rost, qolgan ikkitasi yolg'ondir.

Fikrlarni $A, B, C, \dots, A_1, B_1, C_1, \dots$ yoki $a, b, c, \dots, a_1, b_1, c_1, \dots$ lotin harflari bilan belgilaymiz. Agar fikrlar o'zgaruvchi bo'lsa ularni $X, Y, Z, \dots$ yoki $x, y, z, \dots$ lotin harflari bilan belgilaymiz va ular fikr o'zgaruvchilari yoki propozitsional o'zgaruvchilar deyiladi.

Agar A fikr bo'lsa, u faqat rost yoki yolg'on fikrlardan bittasigina bo'lishi mumkin. Agar A fikr rost bo'lsa, unga 1 ni, yolg'on bo'lsa 0 ni mos qo'yamiz. 0 va 1 lar A fikrning rostlik qiymatlari deyiladi.

Shunday fikrlar borki, ularni bir nechta tarkibiy qismlarga ajratish mumkin. Masalan, "P natural son tub yoki murakkab son" fikrni "P natural son tub", "P natural son murakkab" deyilgan ikkita fikrga ajratish mumkin. "Tub sonlar to'plami cheksiz to'plamdir" yoki "Sardorbek nimaga bordi" fikrlarini yuqoridagidek tashkil etuvchi fikrlarga ajratib bo'lmaydi.

Ta'rif. Agar A fikrni ikkitadan kam bo'lmagan tashkil etuvchi fikrlarga ajratish mumkin bo'lmasa, u holda A elementar (sodda) fikr deyiladi, aks holda, A murakkab fikr deyiladi.

Matematik mantiqda "emas", "va", "yoki", "agar... bo'lsa, u holda... bo'ladi", "... bo'lgan holda va faqat shu holda... bo'ladi" terminlar orqali elementar fikrlardan murakkab fikrlar, murakkab fikrlardan yana ham murakkabroq fikrlar hosil qilinadi va bu jarayon fikrlar ustida mantiq

amallarini bajarish deyiladi. Yuqoridagi terminlarni mantiq bog'lovchilari, propozitsional yoki mantiq amallari deyilib, ularni mos ravishda "inkor", "konyunktsiya", "dizyunktsiya", "implikatsiya" va "ekvivalentsiya" deb ataladi.

Matematik mantiqning fikrlarni yoki fikrlar ustidagi amallarni o'rganadigan bo'limi fikrlar algebrasi deyiladi.

Ta'rif. A fikrning inkori deb, A rost bo'lganda yolg'on va yolg'on bo'lganda rost bo'ladigan yangi fikrga aytiladi va u $\neg A$ (yoki $\bar{A}$) ko'rinishda belgilanib, u A emas deb o'qiladi.

Quyidagi jadval inkorning rostlik jadvali deyiladi:

A	$\neg A$
1	0
0	1

Misol. A - "Toshkent - O'zbekistonning poytaxti", u holda $\neg A$ - "Toshkent O'zbekistonning poytaxti emas" degan fikrni bildiradi.

Ba'zan fikrning inkori "emas" mantiq bog'lovchisi bilan bir xil ma'noga ega bo'lgan terminlar orqali ham ifodalanadi.

Masalan, A - "Akmal bugun maktabga bordi" fikrining inkori $\neg A$ - "Akmal bugun maktabga bormadi", "Akmal bugun maktabga borgani yo'q" kabi ifodalash mumkin.

1.3. Fikrlarni konyunktsiya, dizyunktsiya, implikatsiya va ekvivalentsiyasi

Ta'rif. A va B fikrlarning konyunktsiyasi deb, u fikrlarni har ikkalasi rost bo'lgandagina rost bo'lib, qolgan hollarda yolg'on bo'ladigan A va B fikrlardan tuzilgan murakkab fikrga aytiladi va $A \wedge B$ ko'rinishda belgilanadi, hamda " A va B " deb o'qiladi.

Quyidagi jadval konyunktsiya amalining rostlik jadvalidir:

A	B	$A \wedge B$
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0

Misol. A - "Kecha havo ochiq bo'ldi", B - "Kecha yomg'ir yog'madi" degan fikrlarning konyunktsiyasi $A \wedge B$ - "Kecha havo ochiq bo'ldi va yomg'ir yog'madi" degan fikrdan iborat.

Ta'rif. A va B fikrlarning dizyunktsiyasi deb, u fikrlardan har ikkalasi yolg'on bo'lganda yolg'on, qolgan hollarda rost bo'ladigan A va B fikrlardan tuzilgan murakkab fikrga aytiladi va $A \vee B$ ko'rinishda belgilanadi, hamda " A yoki B " deb o'qiladi.

Quyidagi jadval dizyunktsiya amalining rostlik jadvalidir:

A	B	$A \vee B$
1	1	1
0	1	1
1	0	1
0	0	0

Misol. A - "Ertaga havo ochiq bo'ladi", B - "Ertaga havo bulutli bo'ladi" degan fikrlarning dizyunktsiyasi $A \vee B$ - "Ertaga havo ochiq yoki bulutli bo'ladi" degan fikrdan iborat.

Ta'rif. A va B fikrlarning implikatsiyasi deb, faqat A fikr rost B fikr yolg'on bo'lgandagina yolg'on bo'lib, qolgan hollarda rost bo'ladigan A va B fikrlardan tuzilgan murakkab fikrga aytiladi va $A \Rightarrow B$ (yoki $A \supset B$) ko'rinishda belgilanadi va uni "Agar A bo'lsa, u holda B bo'ladi" deb o'qiladi. Bunda A ni implikatsiya sharti, B esa uning xulosasi deyiladi.

Quyidagi jadval implikatsiya amalining rostlik jadvalidir:

A	B	$A \Rightarrow B$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Misol. A - "Rustam uyda qoladi", B - "Rustam kinoga boradi" degan fikrlarning implikatsiyasi $A \Rightarrow B$ - "Agar Rustam uyda qolsa, u holda u kinoga boradi" degan fikrdan iborat.

Ta'rif. A va B fikrlarning ekvivalentsiyasi deb, u fikrlarning har ikkalasi ham bir xil rostlik qiymatlariga ega bo'lgandagina rost bo'ladigan, qolgan hollarda yolg'on bo'ladigan A va B fikrlardan tuzilgan murakkab fikrga aytiladi hamda $A \Leftrightarrow B$ (yoki $A \equiv B$, yoki $A \sim B$) ko'rinishda belgilanadi. $A \Leftrightarrow B$ ni " A bo'lgan holda va faqat shu holda B bo'ladi" deb o'qiladi.

Quyidagi jadval ekvivalentsiya amalining rostlik jadvalidir:

A	B	$A \Leftrightarrow B$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Misol. A - "Javlon kitob ustida ishlaydi", B - "Javlon a'lochi" degan fikrlarning ekvivalentsiyasi $A \Leftrightarrow B$ - "Javlon kitob ustida ishlagan holda va faqat shu holda a'lochi bo'ladi" degan fikrdan iboratdir.

Ekvivalentsiya tushunchasi matematikada muhim o'rin tutadi. Ikkita fikrlardan birining rostligidan ikkinchisining rostligi kelib chiqadigan bo'lgan hollarda unga murojaat qilinadi. Bu ekvivalentsiya ikki fikrlardan biri ikkinchisi uchun zaruriy va yetarli sharti ham deyiladi. Masalan, A - " $3n$ juft son", B - " n juft son" degan fikrlar bo'lsin. $A \Leftrightarrow B$ - " n juft son bo'lgan holda va faqat shu holda $3n$ juft son bo'ladi" degan fikrdan iborat bo'ladi. Misoldagi $A \Leftrightarrow B$ ekvivalentsiyani matematikada $A \Leftrightarrow B$ - " $3n$ juft son bo'lishi uchun, n ning juft son bo'lishi zarur va yetarlidir" ko'rinishida ifodalanadi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. A - "yetti murakkab son" fikrning inkori yozilsin.

Yechish: A fikrning inkori $\neg A$ - "yetti murakkab son emas". Bu yerda A - yolg'on, $\neg A$ - rost mulohazadir.

2. A - " $6 \cdot 4 = 24$ ", B - " $6 \cdot 4 = 25$ " mulohazalarning dizyunktsiyasi yozilsin.

Yechish: $A \vee B$ - " $6 \cdot 4$ ko'paytma 24 yoki 25 ga teng".

3. A - "13 soni - toq", B - "13 soni tub" mulohazalarning konyunktsiyasi yozilsin.

Yechish: $A \wedge B$ - "13 soni toq va tubdir".

4. Quyidagi matematik mulohazalarni mantiqiy belgilar yordamida yozing.

1) Agar $a > b$ va $b > c$ bo'lsa, $a > c$ bo'ladi.

Yechish: $(a > b) \wedge (b > c) \Rightarrow (a > c)$.

2) Agar $a > b$ bo'lsa, $a + c > b + c$ bo'ladi.

Yechish: $(a > b) \Rightarrow (a + c > b + c)$.

3) Agar $a = 0$ yoki $b = 0$ bo'lsa, $ab = 0$ bo'ladi va aksincha, $ab = 0$ bo'lsa, $a = 0$ yoki $b = 0$ bo'ladi.

Yechish: $(ab = 0) \Leftrightarrow ((a = 0) \vee (b = 0))$.

4) Agar $a > 0$ va $b > 0$ bo'lsa, $ab > 0$ bo'ladi.

Yechish: $(a > 0) \wedge (b > 0) \Rightarrow (ab > 0)$.

5) $\frac{a}{b} = 0$ kasrni konyunktsiya shaklida yozing.

Yechish: Kasr nolga teng bo'lishi uchun uning surati nolga teng bo'lib, maxraji nolga teng bo'lmasligi kerak. Demak, $(a = 0) \wedge (b \neq 0)$.

§2. Kombinatorika elementlari

Bir qator amaliy masalalarni yechish uchun berilgan to'plamdan uning qandaydir xossaga ega bo'lgan elementlarini tanlab olish va ularni ma'lum bir tartibda joylashtirishga to'g'ri keladi.

Ta'rif. Biror chekli to'plam elementlari ichida ma'lum bir xossaga ega bo'lgan elementlaridan iborat qism to'plamlarni tanlab olish yoki to'plam elementlarini ma'lum bir tartibda joylashtirish bilan bog'liq masalalar kombinatorik masalalar deyiladi.

Masalan, o'nta ishchidan to'rt kishidan iborat brigadalarni necha xil usulda tuzish mumkinligini (ishlab chiqarishni tashkil etish), molekulada atomlar qanday usullarda birlashishi mumkinligi (kimyo), oqsil moddalarda aminokislotalarni qanday tartiblarda joylashtirish mumkinligi (biologiya), turli bloklardan iborat mexanizmida bu bloklarni turli tartiblarda birlashtirish (konstruktorlik), bir necha dala uchastkalarida turli

xil ekinlarni almashtirib ekish (agronomiya), davlat budgetini ishlab chiqarish tarmoqlari bo'yicha taqsimoti (iqtisodiyot) kabilar kombinatorik masalalarga keladi va kombinatorikani inson faoliyatining turli yo'nalishlarida qo'llanishini ko'rsatadi.

Ta'rif. Kombinatorik masalalar bilan shug'ullanadigan matematik fan kombinatorika deyiladi.

Kombinatorikani mustaqil fan sifatida birinchi bo'lib olmon matematigi G.Leybnits o'rgangan va 1666 yilda "Kombinatorika san'ati haqida" asarini chop etgan.

Kombinatorikada qo'shish va ko'paytirish qoidasi deb ataluvchi ikkita asosiy qoida mavjud.

Qo'shish qoidasi. Agar biror α tanlovni $m(\alpha)$ usulda, β tanlovni $m(\beta)$ usulda amalga oshirish mumkin bo'lsa va bu yerda α tanlovni ixtiyoriy tanlash usuli β tanlovni ixtiyoriy tanlash usulidan farq qilsa, u holda " α yoki β " tanlovni amalga oshirish usullari soni $m(\alpha \text{ yoki } \beta) = m(\alpha) + m(\beta)$ formuladan topiladi.

Ko'paytirish qoidasi. Agar biror α tanlovni $m(\alpha)$ usulda, β tanlovni $m(\beta)$ usulda amalga oshirish mumkin bo'lsa, u holda " α va β " tanlovni (yoki (α, β) juftlikni) amalga oshirish usullari soni $m(\alpha \text{ va } \beta) = m(\alpha) \cdot m(\beta)$ formuladan topiladi.

Kombinatorik masalalarni yechishda ko'p qo'llaniladigan tushunchalardan biri o'rin almashtirish tushunchasidir.

Ta'rif. Chekli va n ta elementdan iborat to'plamning barcha elementlarini faqat joylashish tartibini o'zgartirib qism to'plam hosil qilish n elementli o'rin almashtirish deb ataladi.

Berilgan n ta elementdan tashkil topadigan o'rin almashtirishlar soni P_n bilan belgilanadi.

Teorema. n ta elementdan iborat o'rin almashtirishlar soni $P_n = n!$ formula bilan hisoblanadi.

Bu yerda $n!$ – en faktorial deb o'qiladi va $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ kabi aniqlanadi. Bunda $0! = 1$ deb olinadi. Masalan, $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$, $4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$, $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$ va hokazo. Faktoriallarni hisoblashda $(n+1)! = n! \cdot (n+1)$ tenglikdan foydalanish

qulay bo'ladi. Masalan, $n = 3$ elementli $\{a, b, c\}$ to'plamdan hosil bo'ladigan o'rin almashtirishlar $\{a, b, c\}$, $\{b, a, c\}$, $\{c, b, a\}$, $\{a, c, b\}$, $\{b, c, a\}$, $\{c, a, b\}$ bo'lib, ularning soni $P_3 = 3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$.

Kombinatorik tushunchalardan yana biri kombinatsiya tushunchasidir.

Ta'rif. Chekli va n ta elementli to'plamning k ($k < n$) ta elementli va kamida bitta element bilan farqlanadigan qism to'plam hosil qilish n elementdan k ta olingan kombinatsiya deyiladi.

Masalan, $\{a, b, c\}$ ko'rinishdagi $n = 3$ elementli to'plamdan ikkita elementli kombinatsiyalar $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ bo'lib, ularning soni 3 tadir. Bu yerda $\{b, a\} = \{a, b\}$, $\{a, c\} = \{c, a\}$, $\{b, c\} = \{c, b\}$ deb olinadi.

n ta elementdan k tadan olingan kombinatsiyalar soni C_n^k kabi belgilanadi va uning qiymati $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ formula yordamida hisoblanadi.

Bu formula orqali kiritilgan C_n^k sonlar yordamida quyidagi tenglikni yozish mumkin:

$$(a+b)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + b^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k.$$

Bu tenglikda n ixtiyoriy natural son bo'lib, u $(a+b)^2$ va $(a+b)^3$ qisqa ko'paytirish formulalarining umumlashmasini ifodalaydi va uni Nyuton binomi deb ataladi. Unga kiruvchi C_n^k sonlari binomial koeffitsientlar deb ataladi.

Agar Nyuton binomida $a = b = 1$ yoki $a = 1$, $b = -1$ deb olsak,

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n, \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = 0$$

unda

tengliklar o'rinli bo'ladi.

Agar formulada k o'rniga $n-k$ qo'yilsa yoki $k = 0$ yoki $k = n$ deb olinsa, unda $C_n^k = C_n^{n-k}$, $C_n^0 = C_n^n = 1$ tengliklar hosil bo'ladi. Bular kombinatsiyalarni hisoblashni osonlashtiradi.

Kombinatorik masalalarni yechishda o'rinashtirish deb ataluvchi tushunchadan ham foydalaniladi.

Ta'rif. Chekli va n ta elementdan iborat to'plamdan bir-biridan yoki elementlari yoki elementlarining joylashish tartibi bilan farq qiladigan va k ta elementdan iborat qism to'plamlarni hosil qilish n elementdan k tadan o'rinashtirish deb ataladi.

Berilgan n ta elementdan k tadan o'rinashtirishlar soni A_n^k kabi belgilanadi va uning qiymati

$A_n^k = n(n-1)(n-2) \cdots [n-(k-1)]$ yoki $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ formula bilan hisoblanadi.

Masalan, $\{a, b, c\}$ to'plamdan $n = 3$ elementdan $k = 2$ tadan o'rinashtirishlar $\{a; b\}$, $\{b; a\}$, $\{a; c\}$, $\{c; a\}$, $\{b; c\}$, $\{c; b\}$ bo'lib, ularning soni $A_3^2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ yoki $A_3^2 = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{3!}{1!} = \frac{6}{1} = 6$.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Korxonada 10 erkak va 8 ayol xodim ishlaydi. SHu korxonadan bitta xodimni necha xil usulda tanlab olish mumkin?

Yechish: α - erkak xodimni tanlash, β - ayol xodimni tanlash bo'lsin. U holda, shartga ko'ra, $m(\alpha) = 10$, $m(\beta) = 8$ bo'lgani uchun bitta xodimni $m(\alpha \text{ yoki } \beta) = m(\alpha) + m(\beta) = 10 + 8 = 18$ usulda tanlash mumkin.

2. 10 ta talabadan iborat guruhga ikkita yo'llanma ajratildi. Bu yo'llanmalarni necha xil usul bilan tarqatish mumkin?

Yechish: α birinchi yo'llanmani, β esa ikkinchi yo'llanmani tarqatishni ifodalasin. U holda $m(\alpha) = 10$ va $m(\beta) = 9$, chunki bitta talabaga birinchi yo'llanma berilganda, ikkinchi yo'llanmaga to'qqizta talaba davogar bo'ladi. Demak, ikkinchi yo'llanmani tarqatishlar soni $m(\alpha \text{ va } \beta) = m(\alpha) \cdot m(\beta) = 10 \cdot 9 = 90$ ga teng bo'ladi.

3. Qurilishda 10 ta suvoqchi va 8 ta bo'yoqchi ishlaydi. Ulardan bir suvoqchi va bir bo'yoqchidan iborat juftlikni necha usulda tanlash mumkin?

Yechish: $m(\alpha) = 10$ va $m(\beta) = 8$ bo'lgani uchun $m(\alpha \text{ va } \beta) = m(\alpha) \cdot m(\beta) = 10 \cdot 8 = 80$.

4. Nazoratchi korxonada ishlab chiqarilgan 5 ta maxsulot sifatini ketma-ket tekshirishi kerak. Nazoratchi buni nechta usulda amalga oshirishi mumkin?

Yechish: Bu 5 ta maxsulot sifatini ketma-ket tekshirishlar 5 tadan o'rinashtirishlardan iborat.

Ya'ni, $P_5 = 5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$ bo'ladi.

5. Ishlab chiqarish korxonasini tekshirish uchun besh kishidan iborat guruh ajratildi. Shu besh kishidan tarkibida uch kishi bo'lgan guruhni necha xil usulda tuzish mumkin.

Yechish: $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ formuladan foydalanamiz. Bizda $n = 5$, $k = 3$ bo'lgani uchun $C_5^3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2!} = \frac{4 \cdot 5}{1 \cdot 2} = \frac{20}{2} = 10$.

6. Tikuvchilik favrikasida ishlayotgan xodimga haftaning ixtiyoriy ikki kunini dam olish uchun tanlash imkoni berildi. Xodim dam olish kunlarini necha usulda tanlashi mumkin?

Yechish: Hafta kunlarini $n = 7$ elementli $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ to'plam sifatida qarasak, dam olish kunlari $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{1, 4\}$, ... kabi juftliklardan iborat bo'ladi. Bunda $\{i, j\}$ va $\{j, i\}$ bitta variantni ifodalaydi. Demak, dam olish kunlarini tanlash $n = 7$ elementdan $k = 2$ tadan kombinatsiyalarni tashkil etadi va ularning soni $C_7^2 = \frac{7!}{2!(7-2)!} = \frac{7!}{2!5!} = \frac{6 \cdot 7}{1 \cdot 2} = \frac{42}{2} = 21$ bo'ladi.

7. Talaba 4 ta fan bo'yicha qo'shimcha tayyorlanish uchun ularning har biriga haftaning bir kunini ajratmoqchi bo'ldi. Talaba hafta kunlarini fanlarga necha usulda taqsimlashi mumkin?

Yechish: Talabani I-IV fanlari uchun haftaning tanlagan kunlarini $k = 4$ ta elementli $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ to'plam, hafta kunlarini esa $n = 7$ elementidan iborat $H = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ to'plam sifatida qaraymiz. Bu holda $X \subset H$ bo'lib, uni hosil etish $n = 7$ elementidan $k = 4$ tadan o'rinashtirishlarga mos keladi, chunki bu holda elementlarning joylashishi tartibi ham ahamiyatga ega. Masalan, $\{2, 4, 6, 7\}$ taqsimotda birinchi fanga dushanba (2), ikkinchi fanga chorshanba (4), uchinchi fanga juma (6) va

to'rtinchi fanga shanba (7) kunlari ajratilgan bo'ladi. Unda $\{4,2,6,7\}$, $\{6,4,2,7\}$ kabilar turlicha taqsimotlarni ifodalaydi. Demak, talaba fanlarga hafta kunlarini

$$A_7^4 = \frac{7!}{(7-4)!} = \frac{7!}{3!} = 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 = 840 \text{ usulda tanlashi mumkin.}$$

8. Xorijiy tillar fakulteti ingliz tili yo'nalishining birinchi kursida 10 ta fan o'qitiladi va har kuni 4 xil dars o'tiladi. Kunlik dars necha usul bilan taqsimlab qo'yilishi mumkin?

Yechish: Darslarning barcha mumkin bo'lgan kunlik taqsimoti o'n elementdan to'rttadan olib tuzish mumkin bo'lgan barcha o'rinashtirishlardan iborat. Ya'ni, $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ formuladan foydalanamiz.

Bizda $n = 10$, $k = 4$ bo'lgani uchun

$$A_{10}^4 = \frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10!}{6!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} = 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 = 5040.$$

9. Butun sonlarning har biri uchta har xil qiymatli raqamlar bilan ifoda qilinadigan bo'lsa, qancha butun son tuzish mumkin?

Yechish: Izlangan son 9 ta qiymatli raqamdan 3 tadan olib tuzilgan o'rinashtirishlardan iborat. Ya'ni,

$$A_9^3 = \frac{9!}{(9-3)!} = \frac{9!}{6!} = 7 \cdot 8 \cdot 9 = 504.$$

Buni $A_n^k = n(n-1)(n-2) \cdots [n-(k-1)]$ formuladan ham topish mumkin. Unga asosan $A_9^3 = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Quyidagi ifodalarning qiymati topilsin:

$$1) \frac{14!}{12!}; \quad 2) \frac{16!}{18!}; \quad 3) \frac{9!}{5! \cdot 4!}; \quad 4) 8! + 9!$$

2. Quyidagilarni isbotlang:

$$1) \frac{(m+3)!}{m!} = (m+1)(m+2)(m+3);$$

$$2) \frac{n!}{(n-m)!} = n(n-1) \cdots (n-m+2)(n-m+1), \text{ bunda } n > m.$$

3. Amallarni bajaring:

$$1) \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}; \quad 2) \frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!}.$$

4. To'qqizta har xil qiymatli raqam bilan nechta to'qqiz xonali son tuzish mumkin?

Javob: 362880.

5. 12 kishilik ovqat hozirlangan stolga 12 kishini necha turli o'tqazish mumkin?

Javob: 479001600.

6. Musobaqada 6 ta talaba qatnashmoqda. O'rinlarni ular o'rtasida necha xil usul bilan taqsimlash mumkin?

7. Talaba 6 ta kitobdan 4 tasini necha usul bilan ajratishi mumkin?

8. Ma'lum bo'limda ishlash uchun 20 nafar ishchidan 6 nafar ishchini ajratish kerak. Buni necha usul bilan amalga oshirish mumkin?

9. Tenglik to'g'riligini isbotlang:

$$1) C_7^4 + C_7^3 = C_8^4; \quad 2) C_{10}^5 + C_{10}^6 = C_{11}^6.$$

10. Ifodani soddalashtiring:

$$\frac{3}{2(2n-1)} C_n^{2n-3}.$$

11. Musobaqada 12 ta jamoa ishtirok etadi. Uchta turli medalni necha xil usul bilan taqsimlash mumkin?

Javob: $A_{12}^3 = 1320$.

12. Gruppada 30 ta o'quvchi bor. Ularning ichidan 3 kishini kompyuterda ishlash uchun ajratish kerak. Buni necha usul bilan bajarish mumkin?

Javob: $C_{30}^3 = 4060$.

13. Turli rangdagi 5 to'p mato bor. Bu matolardan har bir mato faqat bitta polosani egallaydigan qilib nechta turli besh rangli bayroqlar tayyorlash mumkin?

Javob: $P_5 = 5! = 120$.

14. Tenglamani yeching:

$$1) \frac{P_{n+2}}{P_n} = 72; \quad 2) A_x^4 = A_{x-2}^2.$$

Javob: 1) 7; 2) $\emptyset$.

IV.BOB. FUNKSIYA TUSHUNCHASI. FUNKSIYA GRAFIGI

§1. Funksiya tushunchasi

Tabiatda, texnikada va fanning turli sohalarida uchraydigan ko'plab jarayonlarning matematik modellari funksiyalar bilan ifodalanadi. Shunday ekan, bu jarayonlar bilan bog'liq masalalarni o'rganish va yechish funksiyalarni o'rganishni taqozo etadi. Biz tabiatni kuzatish va o'rganish jarayonida uzunlik, yuza, hajm, vaqt, temperatura, bosim, massa kabi miqdorlarga duch kelamiz. Tayin sharoitda bu miqdorlar ba'zan turli qiymatlarni qabul qilsa, ba'zan bir xil qiymatlarni qabul qiladi. Bu esa miqdorlarning ikki guruhga, o'zgaruvchi va o'zgarmas miqdorlarga bo'linishini anglatadi. O'zgaruvchi miqdorlar $x, y, z, t, \dots$ harflar bilan, o'zgarmas miqdorlar $a, b, c, d, \dots$ harflar bilan belgilanadi. Matematikada, odatda, ikki va undan ortiq o'zgaruvchi miqdorlarning birgalikda o'zgarishi o'rganiladi.

Agar " x " o'zgaruvchining biror D sonli to'plamga tegishli har bir qiymatiga ma'lum bir qonun-qoida asosida " y " o'zgaruvchining biror E to'plamga tegishli yagona bir qiymati mos qo'yilgan bo'lsa, u holda " y " o'zgaruvchi " x " o'zgaruvchining funksiyasi deyiladi.

" y " o'zgaruvchi " x " o'zgaruvchining funksiyasi ekanligi $y = f(x)$, $y = F(x)$, $y = \varphi(x)$, $y = g(x)$ lardan biri bilan belgilanadi. Bu yerda " x " erkin o'zgaruvchi yoki argument, " y " erksiz o'zgaruvchi yoki funksiya deyiladi. D sonli to'plam funksiyaning aniqlanish sohasi, E — o'zgarish yoki qiymatlar sohasi deyiladi. Ular mos ravishda $D(f)$ va $E(f)$ bilan belgilanadi.

xOy koordinata tekisligidagi $(x, y) = (x, f(x))$, $x \in D(f)$ koordinatali nuqtalarning geometrik o'rni $y = f(x)$ funksiyaning grafigi deyiladi.

Turli masalalarni qarashda funksiya analitik usulda, jadval usulida, grafik usulda va so'z ifoda usulida berilishi mumkin.

D to'plamda x_0 nuqtani olamiz. Bu nuqtaga bitta y_0 son mos keladi. Bu y_0 son $y = f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi qiymati deyiladi va u $y_0 = f(x_0)$ kabi yoziladi.

Agar shunday M o'zgarmas son topilsaki, $\forall x \in D$ uchun $f(x) \leq M$ tengsizlik bajarilsa, u holda $f(x)$ funksiya D to'plamda yuqoridan chegaralangan deyiladi.

Agar shunday m o'zgarmas son topilsaki, $\forall x \in D$ uchun $f(x) \geq m$ tengsizlik bajarilsa, u holda $f(x)$ funksiya D to'plamda quyidan chegaralangan deyiladi.

Agar funksiya D to'plamda ham quyidan, ham yuqoridan chegaralangan bo'lsa, u holda u chegaralangan deyiladi.

Agar ixtiyoriy $x \in D$ uchun $f(-x) = f(x)$ tenglik bajarilsa, $f(x)$ funksiya juft deyiladi.

Agar ixtiyoriy $x \in D$ uchun $f(-x) = -f(x)$ tenglik bajarilsa, $f(x)$ toq funksiya deyiladi.

Agar ixtiyoriy $x \in D$ uchun $f(-x) = f(x)$ va $f(-x) = -f(x)$ tengliklarning har ikkalasi ham bajarilmasa, u holda $f(x)$ juft ham, toq ham emas deyiladi.

Berilgan $y = f(x)$ funksiya biror D sohaga tegishli ixtiyoriy 2 ta $x_1 < x_2$ nuqtalar uchun $f(x_1) < f(x_2)$ [$f(x_1) \leq f(x_2)$] shartni qanoatlantirsa, u holda funksiya D sohada o'suvchi (kamaymovchi) funksiya deyiladi.

$y = f(x)$ funksiya biror D sohaga tegishli ixtiyoriy 2 ta $x_1 < x_2$ nuqtalar uchun $f(x_1) > f(x_2)$ [$f(x_1) \geq f(x_2)$] shartni qanoatlantirsa, u holda funksiya D sohada kamayuvchi (o'smovchi) deyiladi.

O'suvchi (kamaymovchi) yoki kamayuvchi (o'smovchi) funksiyalarni monoton funksiyalar deyiladi.

Agar shunday $T \neq 0$ son mavjud bo'lsaki, ixtiyoriy $x \in D$ uchun $f(x + T) = f(x)$ bo'lsa, u holda $f(x)$ funksiyani T davrli davriy funksiya deyiladi. (Bu yerda $(x + T) \in D$ va $(x - T) \in D$).

Aniqlanish sohasi $D(f)$ va qiymatlar sohasi $E(f)$ bo'lgan $y = f(x)$ funksiya uchun har bir $y \in E(f)$ soniga $f(x) = y$ shartni qanoatlantiradigan yagona $x \in D(f)$ sonini mos qo'yadigan $x = \varphi(y)$ funksiya mavjud bo'lsa, u berilgan funksiyaga teskari funksiya deb ataladi.

Agar $z = \varphi(x)$ funksiya $x \rightarrow z$, $y = f(z)$ esa $z \rightarrow y$ akslantirishni ifodalasa, unda $y = f(\varphi(x))$ funksiya $x \rightarrow y$ akslantirishni ifodalaydi va murakkab funksiya yoki funksiyaning funksiyasi deb ataladi. Bu yerda φ ichki, f esa tashqi funksiya deyiladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Erkin tushayotgan jismning bosib o'tgan yo'li $S = \frac{gt^2}{2}$ formula bo'yicha ifodalanadi. Bunda erkli va erksiz o'zgaruvchilarni ko'rsating.

Yechish: Bu yerda g —erkin tushish tezlanishi bo'lib, u o'zgarmas miqdordir. Agar biz t o'zgaruvchiga biror oraliqdagi qiymatlarni bersak, S unga mos qiymatlarni qabul qiladi. Demak, t erkli o'zgaruvchi va S erksiz o'zgaruvchi ekan.

2. Sharning hajmi $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ formula bilan aniqlanadi. Bunda erkli va erksiz o'zgaruvchini ko'rsating.

Yechish: Bu yerda $\frac{4}{3}\pi$ o'zgarmas miqdordir. Agar biz R radiusga turlicha qiymatlar bersak, u holda V hajm ham unga mos turlicha qiymatlar qabul qiladi. Demak, R radius erkli o'zgaruvchi va V —hajm erksiz o'zgaruvchi ekan.

3. $f(x) = 2x^2 - 1$ funksiya $x = 3$ bo'lgandagi qiymatini toping.

Yechish: $f(3) = (2x^2 - 1)|_{x=3} = 2 \cdot 3^2 - 1 = 18 - 1 = 17$.

4. $\varphi(t) = \frac{2t}{1+\sin^2 t}$ funksiya $t = \frac{\pi}{4}$ bo'lgandagi qiymati topilsin.

Yechish: $\varphi(\frac{\pi}{4}) = \frac{2 \cdot \frac{\pi}{4}}{1 + \sin^2 \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{\pi}{2}}{1 + (\frac{\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{\frac{\pi}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{\pi}{3}$.

5. $y = \frac{1}{2x-5}$ funksiya aniqlanish sohasi topilsin.

Yechish: Berilgan funksiya kasrdan iborat bo'lgani uchun, u x ning kasrning maxrajini nolga aylantiradigan qiymatidan farqli qiymatlarida aniqlangan bo'ladi. Ya'ni, $2x - 5 \neq 0$, $2x \neq 5$, $x \neq 2,5$.

Demak, berilgan funksiya aniqlanish sohasi $(-\infty; 2,5) \cup (2,5; +\infty)$ dan iborat.

6. $y = \frac{x-2}{x^2+2x+5}$ funksiya aniqlanish sohasi topilsin.

Yechish: $x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4$ bo'lgani uchun u x ning hech qanday qiymatlarida nolga aylanmaydi. Demak, funksiyaning aniqlanish sohasi $(-\infty; +\infty)$ dan iborat.

7. $y = \frac{x+3}{x^2-7x+12}$ funksiya aniqlanish sohasi topilsin.

Yechish: $x^2 - 7x + 12 \neq 0$, $x_1 \neq 3$, $x_2 \neq 4$. Demak, funksiyaning aniqlanish sohasi $(-\infty; 3) \cup (3; 4) \cup (4; +\infty)$ dan iborat.

8. $y = \frac{1}{\sqrt{1-x}} - 2\sqrt{1-x}$ funksiyaning aniqlanish sohasi topilsin.

Yechish: Berilgan funksiya kvadrat ildizlar qatnashayotganligi uchun u x ning ildiz ostidagi ifodani musbat qiymatga ega qiladigan qiymatlar to'plamlarining kesishmasidan iborat bo'ladi. Uni aniqlaymiz:

$$\begin{cases} x+3 > 0 \\ 1-x \geq 0 \end{cases} \begin{cases} x > -3 \\ x \leq 1 \end{cases}, -3 < x \leq 1 \text{ yoki } (-3; 1].$$

9. $y = \sqrt{\frac{3x-2}{2x+6}}$ funksiyaning aniqlanish sohasi topilsin.

Yechish: $\frac{3x-2}{2x+6} \geq 0$, $\frac{3x-2}{x+3} \geq 0$. Oraliqlar usulidan foydalanib bu tengsizlikning yechimi $(-\infty; -3)$ va $[\frac{2}{3}; +\infty)$ lardan iborat ekanligini ko'ramiz.

Demak, funksiyaning aniqlanish sohasi $(-\infty; -3) \cup [\frac{2}{3}; +\infty)$ dan iborat ekan.

10. $f(x) = 2^x - 3x + 1$ funksiyaning juft yoki toq ekanini aniqlang.

Yechish: $f(x) = 2^{-x} - 3(-x) + 1 = 2^{-x} + 3x + 1$. Bundan berilgan funksiya uchun juftlik sharti ham, toqlik sharti ham bajarilmayotganligini ko'ramiz. Demak, funksiya juft ham, toq ham emas.

11. $f(x) = \sin 3x$ funksiyaning davri topilsin.

Yechish: $\sin 3x = \sin 3(x + \frac{2\pi}{3}) = \sin(3x + 2\pi) = \sin 3x$.

Demak, berilgan funksiyaning davri $T = \frac{2\pi}{3}$ dan iborat.

12. $y = 2x + 3$, $x \in [-1,5; 1]$ funksiya teskari funksiya toping.

Yechish: Berilgan funksiya teskari funksiya topish uchun uni tenglama sifatida qarab x ga nisbatan yechamiz.

$y = 2x + 3$, $2x = y - 3$, $x = \frac{y-3}{2}$. Bu tenglikdagi x va y larni o'rinlarini almashtirib, berilgan funksiyaga teskari funksiyani hosil qilamiz:

$$y = \frac{x-3}{2}, x \in [0; 5]$$

13. Agar $\varphi(x) = 3x + 2$, $f(x) = x^2 - 1$ bo'lsa, $f(\varphi(x))$ murakkab funksiyani tuzing.

Yechish: $f(\varphi(x)) = (3x + 2)^2 - 1 = 9x^2 + 12x + 4 - 1 = 9x^2 + 12x + 3$.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. $f(x) = x^2 + 2x - 5$ funksiya berilgan. $f(3)$, $f(0)$ va $f(a)$ lar hisoblansin.

Javob: 10; -5; $a^2 + 2a - 5$.

2. $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 4}$ funksiya berilgan. $f(0)$ va $f(a + 1)$ lar topilsin.

Javob: 2; $\sqrt{a^2 - 3a}$.

3. $F(x) = x^2 + 10x + 9$ funksiyaning x_1 va x_2 ildizlari o'rta arifmetik hamda o'rta geometrik qiymatlarida funksiyaning qiymatini hisoblang.

Javob: -16; 48.

4. $P(x) = x^2 - 2x + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x}$ funksiya berilgan. $P(\frac{1}{x}) = P(x)$ tenglikni to'g'riligi ko'rsatilsin.

5. $f(x) = x^2$, $\varphi(x) = x^3$ bo'lsa, $f[\varphi(2)] = \varphi[f(2)]$ ekanligini ko'rsating.

6. $F(x) = \frac{3x+4}{x^2+1}$ funksiya berilgan. $F(0)$ va $F(2)$ lar topilsin.

Javob: 4; 2.

7. $(x) = x^2$, $\varphi(x) = x^3$ bo'lsa, $\frac{f(a)-f(b)}{\varphi(b)-\varphi(a)}$ hisoblansin.

Javob: $\frac{a+b}{a^2+ab+b^2}$.

8. Quyidagi funksiyalarning $[-3; 3]$ kesmadagi grafiklari yasalsin:

1) a) $y = 2x$; b) $y = 2x + 2$; v) $y = 2x - 2$.

2) a) $y = x^2$; b) $y = x^2 + 1$; v) $y = x^2 - 1$.

3) a) $y = \frac{x^3}{3}$; b) $y = \frac{x^3}{3} + 1$; v) $y = \frac{x^3}{3} - 1$.

4) 1) $y = \frac{6}{x}$; 2) $y = 2^x$; 3) $y = \log_2 x$ funksiyalarning

grafiklari yasalsin. Bu egri chiziqlarning koordinata o'qlariga nisbatan joylashishida qanday xususiyat borligi aniqlansin.

9. Quyida berilganlarga asosan, $f(x)$ chiziqli funksiya topilsin.

1) $f(-2) = 10$, $f(1) = -5$, 2) $f(-10) = -2$, $f(5) = 1$;

3) $f(-2) = -5$, $f(2) = -3$, 4) $f(-3) = 3$, $f(6) = 0$.

Javob: 1) $y = -5x$; 2) $y = \frac{1}{5}x$; 3) $y = \frac{1}{2}x - 4$; 4) $y = -\frac{1}{3}x + 2$.

10. Quyida berilganlarga asosan $f(x)$ kvadratik funksiya topilsin.

1) $f(-1) = -1$, $f(3) = -3$, $f(6) = 12$;

2) $f(-1) = 3$, $f(1) = 3$, $f(2) = 12$;

3) $f(-2) = 9$, $f(1) = 3$, $f(3) = 19$;

4) $f(-3) = -11$, $f(0) = 10$, $f(2) = -6$;

Javob: 1) $y = -\frac{1}{3}x^2$; 2) $y = 3x^2$;

3) $y = 2x^2 + 1$; 4) $y = -3x^2 - 2x + 10$

11. Agar $y(x) = \begin{cases} 2+x, & x > 0, \\ 5, & x = 0, \\ 2^x, & x < 0. \end{cases}$

bo'lsa, (-2) , $y(0)$, $y(1)$ va $y(3)$ lar topilsin.

Javob: $\frac{1}{4}$; 5; 3; 5.

12. Agar $f(1) = 3$, $f(-1) = 1$, $f(0) = 1$ bo'lsa, $f(x) = ax^2 + bx + c$ kvadrat uchhad yozilsin.

Javob: $f(x) = x^2 + x + 1$.

§2. Asosiy elementar funksiyalar

$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ ko'rinishdagi funksiya butun ratsional funksiya deyiladi. Bu yerda $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ - o'zgarmas sonlar, n esa natural son. Bu funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan.

$y = ax + b$ ($a \neq 0$) ko'rinishdagi funksiya chiziqli funksiya deyiladi. Bu yerda a, b - o'zgarmas sonlar. Bu funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan. Funksiyaning grafigi to'g'ri chiziqdan iborat.

$y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) ga kvadratik funksiya deyiladi. Bu yerda a, b, c - o'zgarmas sonlar. Funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan. Funksiyaning grafigi parabola dan iborat.

$y = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + b_2x^{m-2} + \dots + b_{m-1}x + b_m}$ ko'rinishdagi funksiyaga kasr ratsional funksiya deyiladi. Bunda $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ va $b_0, b_1, b_2, \dots, b_m$ lar o'zgarmas sonlar, n, m - natural sonlar. Bu funksiya $D = (-\infty; +\infty) \setminus \{x: b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_m = 0\}$ da aniqlangan.

$y = \frac{a}{x}$ ($x \neq 0$) Teskari proporsional bog'lanishni ifodalovchi funksiya. Bunda a - o'zgarmas son. Bu funksiya $D = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ da aniqlangan. Funksiya toq.

$y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ko'rinishdagi funksiyaga kasr-chiziqli funksiya deyiladi.

Bunda a, b, c, d - o'zgarmas sonlar. Funksiya $D = (-\infty; +\infty) \setminus \{-\frac{d}{c}\}$ to'plamda aniqlangan. Uni grafigi giperboladan iborat.

$y = x^\alpha$ ($x \geq 0$) ko'rinishdagi funksiyaga darajali funksiya deyiladi. Uni aniqlanish sohasi α ga bog'liq. Agar $\alpha > 0$ bo'lsa, $y = x^\alpha$ funksiya $(0; +\infty)$ da o'suvchi, $\alpha < 0$ da kamayuvchi bo'ladi.

$y = a^x$ ko'rinishdagi funksiyaga ko'rsatkichli funksiya deyiladi. Bunda x haqiqiy son, $a > 0$ va $a \neq 1$. Funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan. U $a > 1$ da o'suvchi, $0 < a < 1$ da kamayuvchi.

$y = \log_a x$ ko'rinishdagi funksiyaga logarifmik funksiya deyiladi. Bunda $a > 0$ va $a \neq 1$. Funksiya $(0; +\infty)$ da aniqlangan. U $a > 1$ da o'suvchi va $0 < a < 1$ da kamayuvchi bo'ladi.

$y = \sin x, y = \cos x, y = \operatorname{tg} x, y = \operatorname{ctg} x, y = \sec x, y = \operatorname{cosec} x$ lar trigonometrik funksiyalar deb ataladi.

$y = \sin x$ hamda $y = \cos x$ funksiyalar $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan 2π davrli davriy funksiyalar bo'lib, ixtiyoriy x da $-1 \leq \sin x \leq 1, -1 \leq \cos x \leq 1$ tengsizliklar o'rinlidir.

$\operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x, \sec x, \operatorname{cosec} x$ funksiyalar $\sin x, \cos x$ funksiyalar orqali ifodalangan:

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}, \sec x = \frac{1}{\cos x}, \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}.$$

$y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \operatorname{arctg} x, y = \operatorname{arcctg} x$ funksiyalar teskari trigonometrik funksiyalar deb ataladi.

Masalan: $y = \arcsin x$ funksiyaning aniqlanish sohasi $[-1; 1]$ hisoblanadi, qiymatlar sohasi esa $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ dan iborat.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $y = \frac{x}{x^2-1}$ funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

Yechish: Agar maxraj nolga teng bo'lsa, funksiya aniqlanmagan bo'ladi. Demak, funksiyaning aniqlanish sohasida $x^2 - 1 \neq 0$ bo'lishi kerak. Undan $x^2 \neq 1$ yoki $x \neq \pm 1$. Shunday qilib, funksiyaning aniqlanish sohasi quyidagi uchta oraliqdan iborat: $(-\infty; -1); (-1; 1); (1; +\infty)$. Ularni umumlashtirib

$D(y) = (-\infty; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; +\infty)$ ni hosil qilamiz.

2. $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}$ funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

Yechish: Berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi quyidagi sistemadan aniqlanadi:

$$\begin{cases} x+1 \geq 0, \\ x-1 \geq 0, \\ \sqrt{x+1} \neq \sqrt{x-1}, \end{cases} \begin{cases} x \geq -1, \\ x \geq 1, \\ x+1 \neq x-1, \end{cases} \text{ yoki } \begin{cases} x \geq -1, \\ x \geq 1, \\ 1 \neq -1, \end{cases}$$

dan iborat. Bu yerda $1 \neq -1$ doimo to'g'ridir. Demak, oxirgi sistemaning yechimi $x \geq 1$.

Demak, berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi $[1; +\infty)$ dan iborat.

3. $y = \lg(-x^2 + 5x - 6)$ funksiyaning aniqlanish sohasi topilsin.

Yechish: Logarifmik funksiyaning aniqlanish sohasi haqidagi kossaga asosan $-x^2 + 5x - 6 > 0$ bo'lishi kerak. Uni yechamiz: $-x^2 + 5x - 6 > 0, x^2 - 5x + 6 < 0, 2 < x < 3$. Demak, berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi $(2; 3)$ oraliqdan iborat.

4. $y = \sqrt{3^{2x-2} + 9^x} - 10$ funksiyaning aniqlanish sohasi topilsin.

Yechish: Bu funksiya x ning $3^{2x-2} + 9^x - 10 \geq 0$ tengsizlikni qanoatlantiradigan qiymatlarida aniqlangan. Uni yechamiz:

$$3^{2x-2} + 9^x - 10 \geq 0, \quad 3^{2x} \cdot 3^{-2} + 3^{2x} \geq 10, \quad 3^{2x} \cdot (3^{-2} + 1) \geq 10, \\ 3^{2x} \cdot \frac{10}{9} \geq 10, \quad 3^{2x} \geq 9, \quad 3^{2x} \geq 3^2, \quad 2x \geq 2, \quad x \geq 1.$$

Demak, berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi $[1; +\infty)$ dan iborat.

5. $y = \sqrt{\sin x + \cos x}$ funksiyaning aniqlanish sohasi topilsin.

Yechish: Funksiya aniqlangan bo'lishi uchun ildiz ostidagi ifoda manfiy emas bo'lishi kerak. Ya'ni $\sin x + \cos x \geq 0$. Uni yechamiz:

$$\sin x + \cos x \geq 0, \quad \cos(\frac{\pi}{2} - x) + \cos x \geq 0, \quad \sqrt{2} \cdot \cos(\frac{\pi}{4} - x) \geq 0, \\ \cos(\frac{\pi}{4} - x) \geq 0.$$

Bu $\cos x \geq a$ ko'rinishdagi eng sodda trigonometrik tengsizlikdir. Uning yechimi:

$$-\frac{\pi}{2} + 2\pi k \leq \frac{\pi}{4} - x \leq \frac{\pi}{2} + 2\pi k \text{ dan iborat. Bundan}$$

$$-\frac{\pi}{4} + 2\pi k \leq x \leq \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$$

ni hosil qilamiz. Demak, berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi $[-\frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k]$ kesmadan iborat.

6. $y = \arcsin(x - 3)$ funksiyaning aniqlanish sohasi topilsin.

Yechish: $y = \arcsin x$ funksiyaning aniqlanish sohasidan foydalanamiz. Berilgan funksiyada x o'rnida $x - 3$ ifoda turibdi. Demak, $-1 \leq x - 3 \leq 1, 2 \leq x \leq 4$.

Shunday qilib, berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi $[2; 4]$ kesmadan iborat.

7. $y = \arccos(x^2 - 6x + 8)$ funksiyaning aniqlanish sohasi topilsin.

Yechish: Berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi $-1 \leq x^2 - 6x + 8 \leq 1$ qo'sh tengsizlikning yechimidan iborat. Dastlab $x^2 - 6x + 8 \geq -1$ tengsizlikni yechamiz:

a) $x^2 - 6x + 8 \geq -1, x^2 - 6x + 9 \geq 0, (x - 3)^2 \geq 0$. Bu tengsizlik x ning har qanday qiymatlarida o'rinli.

$$b) x^2 - 6x + 8 \leq 1, x^2 - 6x + 7 \leq 0, 3 - \sqrt{2} \leq x \leq 3 + \sqrt{2}.$$

Demak, berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi $[3 - \sqrt{2}; 3 + \sqrt{2}]$ kesmadan iborat.

8. $y = \frac{a^x + 1}{a^x - 1}, a > 1$ funksiyaning juft yoki toqligi aniqlansin.

Yechish:

$$y(-x) = \frac{a^{-x} + 1}{a^{-x} - 1} = \frac{\frac{1}{a^x} + 1}{\frac{1}{a^x} - 1} = \frac{1 + a^x}{1 - a^x} = \frac{1 + a^x}{-(a^x - 1)} = -\frac{a^x + 1}{a^x - 1} = -y(x).$$

Demak, berilgan funksiya toq.

9. $y = \cos \frac{x}{3} + \lg \frac{x}{5}$ funksiya davri topilsin.

$$\text{Yechish: a) } \cos \frac{x}{3} = \cos \frac{1}{3}(x + 6\pi) = \cos(\frac{1}{3}x + 2\pi) = \cos \frac{1}{3}x;$$

Demak, $T_1 = 6\pi$.

$$\text{b) } \lg \frac{x}{5} = \lg \frac{1}{5}(x + 5\pi) = \lg(\frac{x}{5} + \pi) = \lg \frac{x}{5} \quad \text{bo'lganligi uchun}$$

$T_2 = 5\pi$.

Berilgan funksiyaning davri T_1 va T_2 larning, ya'ni 6π va 5π larning eng kichik umumiy karralesidan iborat. Ya'ni: $EKUK(5\pi; 6\pi) = 30\pi$.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. Quyidagi funksiyalar juft yoki toq bo'la oladimi?

$$1) y = x^3 - x^3; \quad 2) y = x^2 \cos x; \quad 3) y = x^2 \cdot \sin \frac{1}{x};$$

$$4) y = \log_2 \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}; \quad 5) y = x + \frac{1}{x}, x \in [2; 4];$$

$$6) y = \frac{1}{x + \frac{1}{x}}; \quad 7) y = \sin(\cos x); \quad 8) y = |\cos^3 x|;$$

$$9) y = x - \frac{1}{x}; \quad 10) y = \frac{2^x + 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}}.$$

Javob: 1) toq; 2) juft; 3) toq; 4) toq; 5) juft ham emas, toq ham emas;

6) toq; 7) juft; 8) juft; 9) toq; 10) toq.

2. $y = 5\cos 3x + 2\sin 3x$ funksiyaning yuqoridan chegaralangan ekanligini isbot qiling.

3. $y = \frac{x^2 + x + 6}{x^2 + x + 1}$ funksiyaning R to'plamda chegaralangan ekanligini isbotlang.

4. $y = 2\sin x + \cos x$ funksiya chegaralanganmi?

Javob: ha.

5. $y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1}$ funksiya chegaralanganmi?

Javob: ha

6. Quyidagi funksiyalar monoton funksiyalar bo'la oladimi?

1) $y = x^3$; 2) $y = \log_2 x$; 3) $y = (\frac{1}{2})^x$;

4) $y = \frac{1}{x-1}$; 5) $y = \frac{2x+3}{x+1}$; 6) $y = \lg x$.

Javob: 1) ha; 2) ha; 3) ha; 4) yo'q; 5) yo'q; 6) yo'q.

7. Quyidagi funksiyalarning o'sish va kamayish orliqlarini toping.

1) $y = |2x - 1|$; 2) $y = \frac{x-3}{2x+1}$; 3) $y = 2x^2 + x + 4$.

Javob: 1) $(-\infty; \frac{1}{2}]$ da kamayadi va $[\frac{1}{2}; +\infty)$ da o'sadi;

1) $(-\infty; -\frac{1}{2})$ va $(-\frac{1}{2}; +\infty)$ da o'sadi;

2) $(-\infty; -\frac{1}{4}]$ da kamayadi va $[-\frac{1}{4}; +\infty)$ da o'sadi.

8. Quyidagi funksiyalarning eng kichik musbat davri topilsin.

1) $y = \sin \frac{x}{2}$; 2) $y = 3\cos x + \cos 2x$; 3) $y = \sin \frac{3x}{2} - \cos \frac{x}{3}$;

4) $y = \sin x + \cos x$; 5) $y = \sin^4 x$; 6) $y = 3\sin x + \sin 2x$;

7) $y = \cos^2 x$; 8) $y = 3\sin 2x$;

Javob: 1) $T = 4\pi$; 2) $T = 2\pi$; 3) $T = 12\pi$; 4) $T = \pi$;

5) $T = \pi$; 6) $T = 2\pi$; 7) $T = \pi$; 8) $T = \pi$.


V.BOB. TEKISLIKDAGI ANALITIK GEOMETRIYA

§1. Tekislikdagi analitik geometriyaning sodda masalalari

Hisob boshlanadigan nuqta, masshtab birligi va musbat yo'nalishi ko'rsatilgan to'g'ri chiziq koordinatalar to'g'ri chizig'i (son o'qi) deb ataladi. Masalan, A nuqta hisob boshlanadigan nuqtadan musbat yo'nalish bo'yicha 2 birlik uzoqlikda joylashgan. Uni $A(2)$ deb yoziladi. $A(x_1)$ va $B(x_2)$ nuqtalar orasidagi AB masofa

$$AB = |x_1 - x_2|$$

formula yordamida hisoblanadi.



AB kesmani $\frac{AM}{MB} = \lambda$ nisbatda bo'luvchi M nuqtaning koordinatasi

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$$


formuladan topiladi. Agar AB kesmani o'rtasini M bilan belgilasak, u holda, uning koordinatasi

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$$


formuladan topiladi.

Sanoq boshlanadigan nuqtasi umumiy va bir xil masshtab birligi olingan ikkita o'zaro perpendikulyar koordinatalar to'g'ri chizig'i to'g'ri burchakli Dekart koordinatalar sistemasini hosil qiladi.

Tanlangan xOy koordinatalar sistemasida har qanday nuqta sonlarning $(a; b)$ juftligi bilan aniqlanadi. Bunda a - nuqtaning absissasi, b esa nuqtaning ordinatasi deyiladi. ox gorizontal o'q absissalar o'qi, vertikal oy o'q esa ordinatalar o'qi deyiladi (2-chizma).



2-chizma



3-chizma

Boshlang'ich nuqtasi $A(x_1; y_1)$ va oxirgi nuqtasi $B(x_2; y_2)$ nuqtada bo'lgan kesmaning uzunligi

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

formula bo'yicha hisoblanadi (3-chizma).

Tekislikda $A(x_1; y_1)$ va $B(x_2; y_2)$ nuqtalarni birlashtiruvchi AB kesmaning $\frac{AC}{CB} = \lambda$ nisbatda bo'luvchi C nuqtaning koordinatalari

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \quad \text{formulalardan topiladi.}$$

Agar C nuqta AB kesmaning o'rtasi bo'lsa, u holda $\lambda = 1$ bo'ladi va yuqoridagi formula $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$, $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$ ko'rinishga keladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $A(1)$ va $B(-5)$ nuqtalar bilan chegaralangan kesma $M(x)$ nuqta bilan $AM:MB = 1:2$ nisbatda bo'lingan. M nuqtaning koordinatasi topilsin.

Yechish: AB kesmani $\frac{AM}{MB} = \lambda$ nisbatda bo'luvchi M nuqtaning koordinatasi

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$$

formuladan topiladi. Bizda $x_1 = 1$, $x_2 = -5$ va $\lambda = \frac{1}{2}$ bo'lganligi uchun


$$x = \frac{1 + \frac{1}{2} \cdot (-5)}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{-\frac{3}{2}}{\frac{3}{2}} = -1$$

bo'ladi. Demak, (-1) .

2. $A(-4; 1)$, $B(0; -3)$, $C(-1; 8)$, $D(3; 2.5)$, $E(6; 0)$, $F(2; -4)$, $G(-0.5; 0)$ nuqtalar yasalsin.

3. $M(1; -4)$ nuqtaning koordinata o'qlaridagi proeksiyalari topilsin.

Yechish: Dastlab xOy to'g'ri burchakli Dekart kordinatalar sistemasida $M(1; -4)$ nuqtani tasvirlaymiz (4-chizma).



4-chizma

M nuqtaning koordinata o'qlaridagi proeksiyalarini topish uchun M nuqtadan Ox va Oy o'qlariga perpendikulyarlar tushiramiz. Ox o'qiga

tushirilgan perpendikulyar uni $M_1(1; 0)$ nuqtada, Oy o'qiga tushirilgan perpendikulyar $M_2(0; -4)$ nuqtada kesadi. Demak, $M(1; -4)$ nuqtaning koordinata o'qlaridagi proeksiyalari $M_1(1; 0)$ va $M_2(0; -4)$ bo'ladi.

4. $A(-3; 8)$ nuqtadan $B(-7; 5)$ nuqttagacha bo'lgan masofa topilsin.

Yechish: Boshlang'ich nuqtasi $A(x_1; y_1)$ va oxirgi nuqtasi $B(x_2; y_2)$ bo'lgan AB kesmaning uzunligi

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

formuladan topilishi ma'lum. Bizda $x_1 = -3$, $x_2 = -7$, $y_1 = 8$, $y_2 = 5$ bo'lganligi uchun

$$AB = \sqrt{(-7 - (-3))^2 + (5 - 8)^2} = \sqrt{(-7 + 3)^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5.$$

5. N nuqtaning absissasi -1 ga teng bo'lib, u $A(2; 5)$ nuqtadan 5 birlikka teng masofada yotadi. N nuqtaning ordinatasi topilsin.

Yechish: N nuqtaning ordinatasini y deb olamiz. U holda $N(-1; y)$ nuqtadan $A(2; 5)$ nuqttagacha masofa $AN = \sqrt{(2 + 1)^2 + (5 - y)^2}$ bo'lib, u 5 ga teng. Demak, $\sqrt{9 + (5 - y)^2} = 5$, $9 + (5 - y)^2 = 25$, $(5 - y)^2 = 16$, $5 - y = \pm 4$, $y_1 = 1$, $y_2 = 9$. Shunday N nuqtaning ordinatasi 1 yoki 9 ga teng.

6. $A(-1; 3)$ va $B(2; 1)$ nuqtani birlashtiruvchi kesma ordinata o'qini M nuqtada kesib o'tadi. M nuqta kesmani qanday nisbatda bo'ladi?

Yechish: Aytaylik M nuqta AB kesmani $AM:MB = \lambda$ nisbatda bo'lsin. U holda M nuqtaning absissasi A va B nuqtalar absissalari orqali quyidagi formula bo'yicha ifodalanadi:

$$x_M = \frac{x_A + \lambda x_B}{1 + \lambda}$$

M nuqta ordinata o'qida yotganligi uchun uning absissasi nolga teng.

$$\text{Ya'ni, } \frac{-1 + \lambda \cdot 2}{1 + \lambda} = 0, \frac{2\lambda - 1}{1 + \lambda} = 0, 2\lambda - 1 = 0, 2\lambda = 1, \lambda = \frac{1}{2}.$$

7. Uchlari $A(-4; 6)$ va $B(2; -1)$ nuqtalarda bo'lgan kesmaning o'rtasini toping.

Yechish: Agar AB kesmaning o'rtasini C deb olsak, u holda uning koordinatalari

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

formulalardan topiladi. Bizda $x_1 = -4$, $x_2 = 2$, $y_1 = 6$, $y_2 = -1$ bo'lgan uchun

$$x = \frac{-4+2}{2} = \frac{-2}{2} = -1, \quad y = \frac{6+(-1)}{2} = \frac{5}{2} = 2.5.$$

Demak, $C(-1; 2.5)$.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. Koordinatalar to'g'ri chizig'ida $A(-5)$, $B(4)$ va $C(-2)$ nuqtalarni belgilang va AB , BC , AC masofalarni toping hamda $AB+BC=AC$ ekanligini tekshiring.

Javob: $AB = 9$, $BC = -6$, $AC = 3$, $9-6=3$.

2. Uchlari $A(-4; 2)$, $B(0; -1)$ va $C(3; 3)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak yasalsin hamda uning perimetri va burchaklari topilsin.

Javob: $5(2 + \sqrt{2})$, 90° , 45° .

3. Uchlari $A(-3; -2)$, $B(0; -1)$ va $C(-2; 5)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning to'g'ri burchakli ekanligini isbotlansin.

4. Uchlari $A(7; -3)$, $B(12; 9)$ va $C(6; 1)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning perimetri topilsin.

Javob: $23 + \sqrt{17}$.

5. Uchlari $A(-6; 0)$, $B(-7; 7)$ va $C(1; 1)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakka ichki chizilgan aylananing markazi topilsin.

Javob: $(-3; 4)$.

6. Uchlari $A(-4; 6)$, $B(2; -1)$ nuqtalarda bo'lgan AB kesmaning o'rtasi C ning koordinatalari topilsin.

Javob: $(-1; 2.5)$.

7. Uchburchakning uchlari $A(-5; 1)$, $B(-3; 3)$ va $C(1; -1)$ nuqtalarda joylashgan. Uchburchak tomonlarining o'rtalarini toping.

Javob: $(-4; 2)$, $(-2; 0)$, $(-1; 1)$.

8. $A(-6; 1)$ va $B(2; -11)$ nuqtalar orasidagi kesma to'rtta teng bo'lakka bo'lingan. Bo'linish nuqtalarining koordinatalarini toping.

Javob: $(-4; -2)$, $(-2; -5)$, $(0; -8)$.

9. $A(-4; -2)$, va $B(\frac{1}{3}; -\frac{2}{3})$ nuqtalarni birlashtiruvchi kesma M nuqta bilan $AM:MB = 3:7$ nisbatda bo'lingan. M nuqtaning koordinatalarini toping.

Javob: $M(1.5; -3)$.

10. $C(-\frac{4}{7}; 4)$ nuqta AB kesmani $AC:CB = 2:5$ nisbatda bo'ladi. Agar $A(-2; 4)$ bo'lsa, B nuqta topilsin.

Javob: $B(3; 4)$.

11. AB kesma B nuqtadan boshlab C nuqtagacha $AC = 3AB$ shartni qanoatlantiradigan qilib davom ettirilgan. Agar $A(-4; 7)$, bo'lsa, C nuqta topilsin.

Javob: $C(11; -17)$.

12. Agar uchburchak tomonlarining o'rtalari $K(4; 7)$, $M(6; -1)$ va $N(2; -2)$ nuqtalarda bo'lsa, uchburchakning uchlari topilsin.

Javob:

13. $A(-2; 1)$ va $B(3; 6)$ nuqtalar berilgan. AB kesmani

$AM:MB = -3:2$ nisbatda bo'luvchi M nuqtaning koordinatalari topilsin.

Javob: $(13; 16)$.

14. Uchlari $O(0; 0)$, $A(8; 0)$, va $B(0; 6)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning OC medyanasi va OD bissektrisasining uzunligi topilsin.

Javob: $OC = 5$, $OD = \frac{24\sqrt{2}}{7}$.

15. Uchlari $A(1; -1)$, $B(6; 4)$ va $C(2; 6)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning og'irlik markazi topilsin.

Ko'rsatma. Uchburchakning og'irlik markazi uning medyanalari kesishish nuqtasida bo'ladi.

Javob: $(3; 3)$.

16. Uchlari $A(2; 0)$, $B(5; 3)$ va $C(2; 6)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning yuzi topilsin.

Javob: 9.


17. Uchlari $A(3; 1)$, $B(4; 6)$, $C(6; 3)$ va $D(5; -2)$ nuqtalarda bo'lgan to'rtburchakning yuzi topilsin.

Javob: 13.

18. $A(1;1)$, $B(-1;7)$ va $C(0;4)$ nuqtalarni bir to'g'ri chiziqda yotishini isbotlang.


§2. To'g'ri chiziqdagi asosiy masalalar

Chiziq tenglamasi deb shunday $F(x;y) = 0$ tenglamaga aytiladiki, chiziqda yotgan nuqtalar bu tenglamani qanoatlantiradi, yotmaydigan nuqtalar esa qanoatlantirmaydi (1-chizma).



Chiziqlar ichida to'g'ri chiziq tushunchasi muhim tushuncha bo'lib, u analitik geometriyaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib hisoblanadi. To'g'ri chiziqni xarakterlovchi tushunchalardan biri esa burchak koeffitsienti tushunchasidir.


To'g'ri chiziqning burchak koeffitsienti deb, to'g'ri chiziqning Ox o'qini musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchagining tangensiga aytiladi va u k bilan belgilanadi. Demak, $k = \tan \alpha$ (2-chizma).



Ikkita $M_1(x_1; y_1)$ va $M_2(x_2; y_2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqning burchak koeffitsienti


$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

dan topiladi (3-chizma).




3-chizma.

$y = kx + b$ tenglamaga to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientli tenglamasi deyiladi. Bu yerda k -to'g'ri chiziqning burchak koeffitsienti, b esa to'g'ri chiziqning ordinata o'qidan ajratgan kesmasi (4-chizma).




4-chizma.



5-chizma.

Agar $y = kx + b$ da $b = 0$ bo'lsa, to'g'ri chiziq tenglamasi $y = kx$ ko'rinishga keladi va u koordinata boshidan o'tadi (5-chizma).

Agar $y = kx + b$ da $k = 0$ bo'lsa, $y = b$ bo'lib, bu holda to'g'ri chiziq Ox o'qiga parallel bo'ladi (6-chizma).



6-chizma

$Ax + By + C = 0$ tenglamaga to'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi deyiladi. A, B, C sonlar koeffitsientlar bo'lib, ular turli qiymatlar qabul

qilganda turlicha to'g'ri chiziqlar hosil bo'ladi. x va y lar o'zgaruvchi miqdorlar bo'lib, ular to'g'ri chiziqda yotgan nuqtaning koordinatalaridir.

Agar umumiy tenglamada $C = 0$ bo'lsa, $y = -\frac{A}{B}x$ bo'lib, to'g'ri chiziq koordinata boshidan o'tadi.


Agar $B = 0$ bo'lsa, $x = -\frac{C}{A} = a$ bo'lsa, to'g'ri chiziq Oy o'qiga parallel bo'ladi.

Agar $A = 0$ bo'lsa, $y = -\frac{C}{B} = b$ bo'lsa, to'g'ri chiziq Ox o'qiga parallel bo'ladi.

Agar $B = C = 0$ bo'lsa, $Ax = 0$ yoki $x = 0$ bo'lib, to'g'ri chiziq Oy oqi bilan ustma-ust tushadi.

Agar $A = C = 0$ bo'lsa, $By = 0$ yoki $y = 0$ bo'lib, to'g'ri chiziq Ox oqi bilan ustma-ust tushadi.

Agar umumiy tenglamada $A \neq 0$, $B \neq 0$, $C \neq 0$ bo'lsa, u holda uni $Ax + By = -C$ ko'rinishda yozamiz va dastlab uning har ikkala qismini hadma-had $-C$ ga bo'lib, so'ngra $-\frac{C}{A} = a$, $-\frac{C}{B} = b$ belgilashlar qilamiz. Natijada $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglama to'g'ri chiziqning kesmalar bo'yicha tenglamasi deyiladi. Bu yerda a va b lar to'g'ri chiziqning o'qlaridan ajratgan kesmalari (7-chizma).



7-chizma.

$M(x_0; y_0)$ nuqtadan o'tuvchi, burchak koeffitsienti k bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

dan iborat.

$M_1(x_1; y_1)$ va $M_2(x_2; y_2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

dan iborat.

$x \sin \alpha + y \cos \alpha - p = 0$ tenglamaga to'g'ri chiziqning normal tenglamasi deyiladi. Bu yerda α va p lar parametrlar bo'lib, to'g'ri chiziqning holati shu parametrlarga bog'liq.

Normal tenglama quyidagi xossalarga ega:

1. Tenglamada x va y oldidagi koeffitsientlar absolyut qiymati bo'yicha birdan katta bo'lmagan sonlar.
2. Tenglamadagi x va y oldidagi koeffitsientlar kvadratlari yig'indisi 1 ga teng.
3. Tenglamadagi ozod had manfiy son.

Agar berilgan tenglama normal bo'lmasa, uni normal holga keltirish mumkin. Buning uchun berilgan tenglamaning har ikkala tomonini normallovchi ko'paytuvchi deb ataluvchi


$$\mu = \frac{1}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}}$$

ga ko'paytiriladi. μ ning ishorasi berilgan tenglamadagi ozod hadning ishorasiga qarama-qarshi qilib tanlanadi.

$y = k_1x + b_1$ va $y = k_2x + b_2$ to'g'ri chiziqlar orasidagi φ burchak

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2}$$

formuladan topiladi. Bu yerda k_1 — birinchi to'g'ri chiziqning burchak koeffitsienti, k_2 esa ikkinchi to'g'ri chiziqning burchak koeffitsienti (8-chizma).



8-chizma

Agar $k_1 = k_2$ bo'lsa, to'g'ri chiziqlar parallel va $k_1 = -\frac{1}{k_2}$ bo'lsa to'g'ri chiziqlar perpendikulyar bo'ladi. Agar to'g'ri chiziqlar $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ va $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ umumiy tenglamalar bilan berilgan bo'lsa, u holda ikki to'g'ri chiziq orasidagi burchak

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{A_1B_2 - A_2B_1}{A_1A_2 + B_1B_2}$$

formuladan topiladi. Bu holda $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$ to'g'ri chiziqlarning parallel sharti va $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ ularning perpendikulyarlik sharti bo'ladi.

Tekislikdagi $M_0(x_0; y_0)$ nuqtadan $Ax + By + C = 0$ to'g'ri chiziqqacha masofa

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

formula yordamida hisoblanadi.

$M_0(x_0; y_0)$ nuqtadan $x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$ to'g'ri chiziqqacha masofa $d = |x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha - p|$ formula yordamida topiladi.

Uchta $M_1(x_1; y_1)$, $M_2(x_2; y_2)$ va $M_3(x_3; y_3)$ nuqtalarning bir to'g'ri chiziqda yotish sharti quyidagicha:

$$\frac{y_3 - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1}$$

bu yerda $x_2 \neq x_1$, $y_2 \neq y_1$.

To'g'ri chiziq tekislikda parametrik shaklda, ya'ni

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

ko'rinishda berilishi ham mumkin. Bu yerda $\varphi(t)$ va $\psi(t)$ lar t -ning chiziqli funksiyalari, ya'ni

$$\begin{cases} x = x_0 + pt \\ y = y_0 + qt \end{cases}$$

$t = 0$ bo'lsa, $\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$, demak, to'g'ri chiziq $M_0(x_0; y_0)$ nuqtadan o'tadi. To'g'ri chiziqning parametrik shaklda berilishidan uning burchak koeffitsientli tenglamasiga o'tish mumkin. Bunda burchak koeffitsient $k = \frac{q}{p}$ formula bilan hisoblanadi.

Masalaga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $B(0; 1)$ nuqtaga nisbatan $A(3; 5)$ nuqtaga ikki marta yaqin bo'lgan nuqtalar geometrik o'rning tenglamasi tuzilsin.

Yechish: Aytaylik, $M(x; y)$ nuqta izlanayotgan geometrik o'rinning nuqtasi bo'lsin. Bu nuqtadan A va B nuqtalargacha bo'lgan masofalarni aniqlaymiz:

$$MA = \sqrt{(x-3)^2 + (y-5)^2}; \quad MB = \sqrt{(x-0)^2 + (y-1)^2}$$

Masalaning shartiga asosan, $2MA = MB$ yoki

$$2\sqrt{(x-3)^2 + (y-5)^2} = \sqrt{(x-0)^2 + (y-1)^2} \text{ bo'ladi.}$$

Bundan esa $4(x^2 - 6x + 9 + y^2 - 10y + 25) = x^2 + y^2 - 2y + 1$ yoki $3x^2 + 3y^2 - 24x - 38y + 135 = 0$ tenglama kelib chiqadi. Bu tenglama shartlarni qanoatlantiruvchi tenglamadir.

2. $A(-2; 1)$, $B(3; -2.5)$, $C(4; 0)$ va $D(1; 10)$ nuqtalardan qaysilari $x + y + 7 = 0$ chiziqda yotadi?

Yechish: Agar nuqta chiziqda yotsa, u holda uning koordinatalari chiziq tenglamasini qanoatlantiradi. Shuning uchun berilgan nuqtalarning koordinatalarini chiziq tenglamasiga qo'yamiz.

1) $3 \cdot (-2) - 1 + 7 = -6 - 1 + 7 = 0$. Demak, A nuqta chiziqda yotadi;

2) $3 \cdot 3 - (-2.5) + 7 = 9 + 2.5 + 7 = 18.5 \neq 0$. Demak, B nuqta chiziqda yotmaydi;

3) $3 \cdot 4 - 0 + 7 = 12 + 7 = 19 \neq 0$. Demak, C nuqta chiziqda yotmaydi;

4) $3 \cdot 1 - 10 + 7 = 3 - 10 + 7 = -7 + 7 = 0$ Demak, D nuqta chiziqda yotadi.

3. $A(-1; 6)$ nuqta va koordinatalar boshidan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

Yechish: Dastlab to'g'ri chiziqning burchak koeffitsienti k ni topamiz.

$$k = \frac{y_1}{x_1} = \frac{6}{-1} = -6$$

Demak, to'g'ri chiziq tenglamasi $y = -6x$ dan iborat bo'ladi.

4. Koordinatalar boshidan o'tib Ox o'qini musbat yo'nalishi bilan 30° , 45° , 150° va -45° li burchak hosil qiladigan to'g'ri chiziqlarning tenglamalari tuzilsin.

Yechish: $k = \operatorname{tg} \alpha$ dan foydalanib to'g'ri chiziqlarni burchak koeffitsientlarini topamiz va $y = kx$ ga qo'yamiz:

$$1) k_1 = \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}, y = \frac{\sqrt{3}}{3} x;$$

$$2) k_2 = \operatorname{tg} 45^\circ = 1, y = x;$$

$$3) k_3 = \operatorname{tg} 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}, y = -\frac{\sqrt{3}}{3} x;$$

$$4) k_4 = \operatorname{tg} (-45^\circ) = -1, y = -x.$$

5. $y = 3x + 9$ to'g'ri chiziqning koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalari topilsin.

Yechish: berilgan tenglamadan to'g'ri chiziqning Oy o'qidan ajratgan kesmasi 9 ga teng ekanligini ko'ramiz. Demak, to'g'ri chiziqning Oy o'qi bilan kesishish nuqtasi $A(0; 9)$ dan iborat. To'g'ri chiziqning Ox o'qi bilan kesishish nuqtasi $3x + 9 = 0$ tenglamadan topiladi. Undan, $3x + 9 = 0$, $x = -3$. Shunday qilib, to'g'ri chiziqning Ox o'qi bilan kesishish nuqtasi $(-3; 0)$ dan iborat.

6. $A(2; 3)$ va $B(7; 5)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

Yechish: A va B nuqtaning koordinatalari berilgan ikkita nuqta orqali o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzish formulasiga qo'yamiz.

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

Bizda $x_1 = 2$, $x_2 = 7$, $y_1 = 3$, $y_2 = 5$ bo'lgani uchun

$$\frac{x-2}{7-2} = \frac{y-3}{5-3}, \quad \frac{x-2}{5} = \frac{y-3}{2}, \quad 2x-4 = 5y-15, \quad 5y = 2x+11, \\ y = \frac{2}{5}x + \frac{11}{5}.$$


7. $2x - y + 7 = 0$ tenglama bilan berilgan to'g'ri chiziqni burchak koeffitsienti topilsin.

Yechish: To'g'ri chiziqning burchak koeffitsientini topish uchun uning umumiy tenglamasini burchak koeffitsientli tenglama ko'rinishiga keltiramiz.

$$2x - y + 7 = 0, \quad -y = -2x - 7, \quad y = 2x + 7. \text{ Demak, } k = 2.$$

$$8. \frac{x}{-1} + \frac{y}{2} = 1 \text{ tenglama bilan berilgan to'g'ri chiziq yasalsin.}$$

Yechish: Berilgan tenglamadan $a = -2$, $b = 2$ larni topamiz. Demak, to'g'ri chiziq Ox o'qidan -2 birlik, Oy o'qidan 2 birlik ajratadi (9-chizma).



9-chizma.

9. $6x + 4y - 3 = 0$ tenglamani kesmalar bo'yicha tenglama ko'rinishiga keltiring.

$$Yechish: 6x + 4y - 3 = 0, \quad 6x + 4y = 3, \quad \frac{6x}{3} + \frac{4y}{3} = 1, \quad \frac{x}{\frac{1}{2}} + \frac{y}{\frac{3}{4}} = 1.$$

10. $2x - 3y + 5 = 0$ va $6x - 9y + 1 = 0$ to'g'ri chiziqlar o'zaro parallel ekanligi ko'rsatilsin.

Yechish: Umumiy tenglama bilan berilgan ikki to'g'ri chiziqning parallel shartining bajarilishini tekshiramiz. Bizda $A_1 = 2$, $A_2 = 6$, $B_1 = -3$, $B_2 = -9$ bo'lgani uchun $\frac{2}{6} = \frac{-3}{-9}$ yoki $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$.

Demak, berilgan to'g'ri chiziqlar parallel ekan.

11. $2x + 3y - 7 = 0$ va $3x - 2y = 0$ to'g'ri chiziqlar o'zaro perpendikulyar ekanligi ko'rsatilsin.

Yechish: Umumiy tenglama bilan berilgan ikki to'g'ri chiziqning perpendikulyarlik sharti $A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0$ ni bajarilishini ko'rsatamiz. Bizda $A_1 = 2$, $A_2 = 3$, $B_1 = 3$, $B_2 = -2$ bo'lgani uchun $A_1 A_2 + B_1 B_2 = 2 \cdot 3 + 3 \cdot (-2) = 6 - 6 = 0$. Demak, to'g'ri chiziqlar o'zaro perpendikulyar ekan.

12. $A(2; 3)$ nuqtadan o'tib $4x + 3y - 12 = 0$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

Yechish: $M(x_0; y_0)$ nuqtadan o'tuvchi va burchak koeffitsienti k bo'lgan to'g'ri chiziqli tenglamasi $y - y_0 = k(x - x_0)$ formula yordamida tuziladi. Dastlab $4x + 3y - 12 = 0$ to'g'ri chiziqli burchak koeffitsientini topamiz. $4x + 3y - 12 = 0$, $3y = -4x + 12$, $y = -\frac{4}{3}x + 3$. Demak, berilgan to'g'ri chiziqli burchak koeffitsienti $k_1 = -\frac{4}{3}$ ga teng. $A(2; 3)$ nuqtadan o'tib $4x + 3y - 12 = 0$ to'g'ri chiziqliqqa perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziqli burchak koeffitsienti k_2 ni to'g'ri chiziqlarning perpendikulyarlik sharti $k_2 = -\frac{1}{k_1}$ dan topiladi. Ya'ni, $k_2 = -\frac{1}{k_1} = -\frac{1}{-\frac{4}{3}} = \frac{3}{4}$.

Shunday qilib, izlanayotgan perpendikulyar tenglamasi

$$y - y_0 = k(x - x_0), \quad -3 = \frac{3}{4}(x - 3), \quad 4y - 12 = 3x - 9, \\ 3x - 4y + 3 = 0 \text{ dan iborat bo'ladi.}$$

13. $y_1 = 5x - 15$ va $y_2 = 3x - 4$ to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak topilsin.

Yechish: Berilgan tenglamalardan $k_1 = 5$ va $k_2 = 3$. Bularni ikki to'g'ri chiziqli orasidagi burchakni topish formulasiga qo'yamiz.

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} = \frac{5 - 3}{1 + 5 \cdot 3} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{8}, \quad \varphi = \arctg \frac{1}{8}.$$

14. $A(3; 4)$ nuqtadan $5x + 12y - 11 = 0$ to'g'ri chiziqliqqa bo'lgan masofa topilsin.

Yechish: $M_0(x_0; y_0)$ nuqtadan $Ax + By + C = 0$ to'g'ri chiziqliqqa masofa

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

formuladan topiladi. Bizda $x_0 = 3$, $y_0 = 4$, $A = 5$, $B = 12$, $C = -11$. Bularni yuqoridagi formulaga qo'yamiz.

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|5 \cdot 3 + 12 \cdot 4 - 11|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{52}{\sqrt{169}} = \frac{52}{13} = 4.$$

15. $6x + 8y - 7 = 0$ tenglama normal tenglama ko'rinishiga keltirilsin.

Yechish: Buning uchun dastlab normallovchi ko'paytuvchini topamiz.

$$\mu = \frac{1}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{1}{\pm \sqrt{36 + 64}} = \frac{1}{\pm 10}$$

Berilgan tenglamadagi ozod had manfiy bo'lgani uchun $\mu = \frac{1}{10}$ deb olamiz. Berilgan tenglamaning har ikkala qismini hadma-had $\mu = \frac{1}{10}$ ga ko'paytiramiz va quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\frac{1}{10}x + \frac{8}{10}y - \frac{7}{10} = 0 \text{ yoki } 0.6x + 0.8y - 0.7 = 0.$$

16. $A(-1; 1)$, $B(1; 2)$ va $C(3; 3)$ nuqtalar bir to'g'ri chiziqlida yotadimi?

Yechish: Qo'yilgan savolga javob berish uchun berilgan uchta nuqtaning bir to'g'ri chiziqlida yotish shartining bajarilishini ko'rsatamiz: u quyidagicha

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Bizda $x_1 = -1$, $y_1 = 1$, $x_2 = 1$, $y_2 = 2$, $x_3 = 3$, $y_3 = 3$. Demak,

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 3 + 3 - 6 + 3 - 1 = 0.$$

17. To'g'ri chiziqliqning parametrik shaklda berilgan

$$\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 3 + 4t \end{cases}$$

tenglamasini burchak koeffitsientli tenglama ko'rinishiga keltiring.

Yechish: To'g'ri chiziqli (5; 3) nuqtadan o'tadi va uning burchak koeffitsienti $k = \frac{q}{p} = \frac{4}{2} = 2$ ga teng. Demak, to'g'ri chiziqli tenglamasi $y - 3 = 2(x - 5)$ yoki $y = 2x - 7$ dan iborat.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. $A(1; 0)$, $B(-1; 2)$, $C(1; 4)$, $D(3; 2)$ va $E(2; 3.5)$ nuqtalardan qaysilari $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ chiziqlida yotadi?

Javob: A, B, C va D .

2. $C(-4; 7)$ va $D(5; 5)$ nuqtalardan bir xil uzoqlikda joylashgan nuqtalarning geometrik o'rnini ifodalovchi chiziq tenglamasi tuzilsin.

Javob: $18x - 4y + 15 = 0$.

3. Oy o'qidan 3 ga teng kesma ajratuvchi va Ox o'qi bilan 45° , 135° burchak hosil qiluvchi to'g'ri chiziqlar yasalsin hamda tenglamalari tuzilsin.

Javob: $y = x + 3$; $y = -x + 3$.

4. $y = 2x - 1$, $y = \frac{x-3}{3}$, $y = \frac{3x+1}{2}$, $y = x + 2$ va $y = 4x - 2$ to'g'ri chiziqlardan qaysilari ordinata o'qini bir xil nuqtada kesib o'tadi?

Javob: $y = 2x - 1$, $y = \frac{x-3}{3}$.

5. $5x - y + 4 = 0$, $2x + 4y - 8 = 0$ va $4x + 7y - 5 = 0$ tenglamalar bilan berilgan to'g'ri chiziqlarning burchak koeffitsientlari va ordinata o'qidan ajratgan kesmalari topilsin.

Javob: 1) $k = 5$, $b = 4$; 2) $k = -\frac{1}{2}$, $b = 2$; 3) $k = -\frac{4}{7}$, $b = \frac{5}{7}$.

6. $2x - y + 3 = 0$, $7x + 4y - 12 = 0$ va $3x - 4y = 0$ tenglamalar bilan berilgan to'g'ri chiziqlarning burchak koeffitsientlari topilsin.

Javob: $k = 2$; $k = -\frac{4}{7}$; $k = \frac{3}{4}$.

7. $y = x + 4$ va $y = \frac{2}{5}x + 2$ to'g'ri chiziqlar berilgan. Bu to'g'ri chiziqlar $A(-5; 0)$, $B(0; 4)$, $C(5; 4)$, $D(2; 6)$ nuqtalardan o'tadimi?

Javob: Birinchi to'g'ri chiziq B va D nuqtalardan, ikkinchi to'g'ri chiziq A va C nuqtalardan o'tadi.

8. $12x - 4y + 5 = 0$ tenglamani burchak koeffitsientli tenglama ko'rinishiga keltiring.

Javob: $= 3x + \frac{5}{4}$.

9. $x - 2y + 4 = 0$ tenglama bilan berilgan to'g'ri chiziqni Oy o'qidan ajratgan kesmasi topilsin.

Javob: 2.

10. $x - y + 8 = 0$ va $2x + y - 2 = 0$ to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi topilsin.

Javob: $A(-2; 6)$.

11. Uchburchak tomonlarining tenglamalari $2x + y - 4 = 0$, $y - 1 = 0$ va $x + y - 1 = 0$ lardan iborat. Uchburchak uchlarining tenglamalari topilsin.

Javob: $A(1; 2)$, $B(3; -2)$, $C(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$.

12. $y = \frac{2}{3}x - \frac{3}{7}$ to'g'ri chiziq tenglamasini umumiy tenglama ko'rinishiga keltiring.

Javob: $14x - 35y - 15 = 0$.

13. $x - y + 8 = 0$, $x + 5y - 4 = 0$ va $2x + 7y - 2 = 0$ to'g'ri chiziqlar bitta nuqtadan o'tadimi?

Javob: ha. Ular $A(-6; 2)$ nuqtadan o'tadi.

14. To'g'ri chiziqning quyidagi tenglamalarini kesmalar bo'yicha tenglama ko'rinishida yozilsin.

1) $x + y - 1 = 0$; 2) $x - y + 1 = 0$;

3) $5x - y + 20 = 0$; 4) $3x - 2y + 12 = 0$;

15. To'g'ri chiziqning kesmalar bo'yicha tenglamasi $\frac{x}{4} + \frac{y}{-1} = 1$ ni umumiy tenglama ko'rinishiga keltiring.

Javob: $3x - 4y - 12 = 0$

16. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} = 1$ va $\frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 1$ to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi topilsin.

Javob: $(2\frac{1}{7}; -\frac{2}{7})$.

17. $A(-3; 2)$ nuqtadan o'tuvchi va burchak koeffitsienti 4 ga teng bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

Javob: $4x - y + 14 = 0$.

18. $A(-4; 1)$ va $B(2; 3)$ nuqtalarni birlashtiruvchi AB kesmani o'rtasidan o'tuvchi va og'ish burchagi 135° bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

Javob: $x + y - 1 = 0$.

19. $A(-4; 3)$ nuqtadan o'tib Ox o'qining musbat yo'nalishi bilan 135° li burchak hosil qiluvchi to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

Javob: $x + y + 1 = 0$.

20. $M(-4;2)$ va $N(3;-1)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar tenglamasi tuzilsin.

Javob: $3x + 7y - 2 = 0$.

21. $B(-3;1)$ va $C(4;-2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar tenglamasi tuzilsin.

Javob: $3x + 7y + 2 = 0$.

22. $A(-1;6)$ nuqta bilan $M(-1;8)$ va $N(7;2)$ nuqtalarni tutashtiruvchi kesmaning o'rtasidan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar tenglamasi tuzilsin.

Javob: $x + 4y - 23 = 0$.

23. $A(3;-5)$, $B(-1;-1)$ va $C(4;0)$ nuqtalar - ABC uchburchakning uchlari. Uning tomonlarining tenglamalari tuzilsin.

Javob: $x + y + 2 = 0$, $x - 5y - 4 = 0$, $5x - y - 20 = 0$.

24. $A(8;6)$, $B(6;4)$ va $C(-2;14)$ nuqtalar - ABC uchburchakning uchlari. Uning medianalarining tenglamalari tuzilsin.

Javob: $x + 2y - 20 = 0$, $2x + y - 16 = 0$, $x + y - 12 = 0$.

25. $A(1.5;6)$ nuqta bilan $2x - 7y + 4 = 0$ va $x + y + 6.5 = 0$ to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasidan o'tuvchi to'g'ri chiziqlarning og'ish burchagi topilsin.

Javob: 45° .

26. Quyida berilgan to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak topilsin.

1) $4x + 6y - 1 = 0$ va $x - 3y + 5 = 0$;

2) $3x + y - 7 = 0$ va $x - y + 4 = 0$;

3) $y = 2x - 3$ va $y = \frac{1}{2}x + 1$;

4) $5x - y + 7 = 0$ va $2x - 3y + 1 = 0$;

5) $2x + y = 0$ va $y = 3x - 4$;

6) $3x - 4y = 6$ va $8x + 6y = 11$.

Javob: 1) $\arctg \frac{9}{7}$; 2) $\arctg 2$; 3) $\arctg \frac{3}{4}$; 4) 45° ; 5) 45° ; 6) 90° .

27. $3x - 2y + 7 = 0$, $6x - 4y - 9 = 0$, $6x + 4y - 5 = 0$, $2x + 3y - 6 = 0$ to'g'ri chiziqlardan o'zaro parallel va o'zaro perpendikulyar bo'lganlarini ko'rsating.

Javob: 1 va 2 lar parallel; 1 va 4 hamda 2 va 4 lar perpendikulyar.

28. Uchlari $A(-2;0)$, $B(2;4)$, $C(4;0)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak berilgan. Uchburchakning AE medianasi va AD balandligining tenglamasi tuzilsin.

Javob: $AE: 2x - 5y + 4 = 0$; $AD: x - 2y + 2 = 0$.

29. Tomonlarining tenglamalari $x+y=4$, $3x-y=0$, $x-3y-8=0$ bo'lgan uchburchak yasalsin. Uning yuzi va burchaklari topilsin.

Javob: $A = \frac{4}{3}$; $\lg B = \lg C = 2$; $S = 16$.

30. Quyida berilgan to'g'ri chiziqlar tenglamalarini normal ko'rinishga keltiring.

1) $3x - 4y - 20 = 0$; 2) $x + y + 3 = 0$; 3) $y = kx + b$.

Javob: 1) $\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y - 4 = 0$; 2) $\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{3}{\sqrt{2}} = 0$;

3) $\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}x - \frac{1}{\sqrt{k^2+1}}y + \frac{b}{\sqrt{k^2+1}} = 0$.

31. $2x + y + 6 = 0$ va $3x + 5y - 15 = 0$ to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi va $N(1;-2)$ nuqta orqali o'tuvchi to'g'ri chiziqlar tenglamasi tuzilsin.

Javob: $31x + 26y + 21 = 0$.

32. $A(4;3)$, $B(2;1)$ va $C(1;0)$ nuqtalardan $3x + 4y - 10 = 0$ to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofalar topilsin. Nuqtalar va to'g'ri chiziqlar yasalsin.

Javob: 2.8; 0; 1.4.

33. Koordinata boshidan $12x - 5y + 39 = 0$ to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa topilsin.

Javob: 3.

34. Uchlari $A(-3;0)$, $B(2;5)$ va $C(3;2)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning BD balandligi topilsin.

Javob: $\sqrt{10}$.

35. $2x - 3y = 6$ va $4x - 6y = 25$ parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi masofa topilsin.

Javob: $\frac{\sqrt{13}}{2}$.

36. Quyida berilgan tenglamalar $y = kx + b$ ko'rinishda yozilsin.

$$1) \begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = 3 + 8t, \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x = 3 - t, \\ y = 2 + t, \end{cases} \quad 3) \begin{cases} x = 5 + 2t, \\ y = 10 - t. \end{cases}$$

Javob: 1) $y = 4x - 1$; 2) $y = -x + 5$; 3) $y = -0.5x + 12.5$.

§3. Ikkinchi tartibli egri chiziqlar

Bu paragrafda ikkinchi tartibli egri chiziqlardan aylana, ellips, giperbola va parabolalar hamda ularga doir masalalarni keltiramiz.

3.1. Aylana

Ma'lumki tekislikda berilgan $M(a;b)$ nuqtadan bir xil R masofada joylashgan nuqtalarning geometrik o'rni aylana deb ataladi. Bunda $M(a;b)$ nuqta aylana markazi, R esa aylana radiusidir.

Aylana ta'rifidan foydalanib, markazi $M(a;b)$ nuqtada va radiusi R bo'lgan aylananing

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

kanonik tenglamasini keltirib chiqarish mumkin.

Agar aylananing markazi koordinata boshida bo'lsa, ya'ni $a=0$, $b=0$ bo'lsa, u holda tenglama $x^2 + y^2 = R^2$ ko'rinishga keladi.

Agar aylananing markazi OX o'qida yotsa, u holda uning tenglamasi

$$(x - a)^2 + y^2 = R^2$$

ko'rinishda, agar aylananing markazi OY o'qida yotsa, u holda uning tenglamasi

$$x^2 + (y - b)^2 = R^2$$

ko'rinishda bo'ladi.

Aylana tenglamasi x va y larga nisbatan ikkinchi darajali tenglama bo'lib, unda x^2 va y^2 lar bir xil koeffitsientlar bilan qatnashadi. Bundan tashqari, tenglamada x va y lar ko'paytmasi qatnashmaydi.

Demak, aylana tenglamasi umumiy ko'rinishda quyidagicha yoziladi.

$$Ax^2 + Ay^2 + Bx + Cy + D = 0.$$

Bu tenglamani $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ tenglama bilan solishtirib,

$$a = -\frac{B}{2A}, \quad b = -\frac{C}{2A}, \quad R = -\frac{\sqrt{B^2 + C^2 - 4AD}}{2A}$$

shartini ko'rishimiz mumkin.

Bunda quyidagi xususiy hollar bo'lishi mumkin:

a) $B^2 + C^2 > 4AD$ bo'lsa, u holda $R > 0$ bo'lib, $Ax^2 + Ay^2 + Bx + Cy + D = 0$ tenglama aylana tenglamasini ifodalaydi;

b) $B^2 + C^2 = 4AD$ bo'lsa, u holda $R = 0$ bo'lib, qaralayotgan tenglama bitta nuqtani anglatadi.

c) $B^2 + C^2 < 4AD$ bo'lsa, u holda R mavhum son bo'lib, qaralayotgan tenglama ma'noga ega bo'lmaydi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Markazi $M(3;4)$ nuqtada va radiusi $R = 5$ bo'lgan aylananing tenglamasini yozing.

Yechish: Masalaning shartiga asosan $a = 3$, $b = 4$ va $R = 5$. Bularni aylananing kanonik tenglamasiga qo'yib $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$ ni hosil qilamiz.


2. $x^2 + 4x + y^2 - 6y - 3 = 0$ tenglama bilan berilgan aylananing markazi va radiusini toping.

Yechish: Berilgan tenglamani kanonik ko'rinishga keltiramiz:

$x^2 + 4x + y^2 - 6y - 3 = (x+2)^2 - 4 + (y-3)^2 - 9 - 3 = (x+2)^2 + (y-3)^2 - 16$. Demak, $(x+2)^2 + (y-3)^2 - 16 = 0$ yoki $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 4^2$. Bundan esa $M(-2;3)$ va $R=4$ kelib chiqadi.

3. Markazi $C(5;-1)$ nuqtada va radiusi $R = 1$ bo'lgan aylanaga koordinatalar boshidan o'tkazilgan urinmalar yasalsin hamda ularning tenglamalari tuzilsin.

Yechish: Aylananing markazi absissa o'qidan radiusga teng masofada joylashganligi uchun, urinmalardan biri absissa o'qidan iborat bo'ladi (1-chizma).



Aytaylik, $\angle CON = \alpha$ bo'lsin, u holda $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{5}$ bo'ladi, $\operatorname{tg} 2\alpha$ ni hisoblaymiz:

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{2 \cdot \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{25}} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{24}{25}} = \frac{5}{12}$$

Demak, OM to'g'ri chiziqning burchak koeffitsienti $-\frac{5}{12}$ ga teng bo'lib, uning tenglamasi $y = -\frac{5}{12}x$ dan iborat bo'ladi.

4. $x^2 + y^2 + 6y - 8y + 25 = 0$ tenglama tekislikdagi qanday nuqtalarning geometrik o'rnini aniqlaydi?

Yechish: $x^2 + y^2 + 6y - 8y + 25 = (x+3)^2 - 9 + (y-4)^2 - 16 + 25 = (x+3)^2 + (y-4)^2$.

Demak, berilgan tenglama $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 0$ ko'rinishga keladi. Bu tenglamani faqat birgina $C(-3;4)$ nuqta qanoatlantiradi. Demak, berilgan tenglama nuqtani aniqlaydi.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan aylanalar yasalsin.

1) $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$; 2) $(x-2)^2 + (y+4)^2 = 25$;

3) $x^2 + (y-2)^2 = 4$; 4) $x^2 + y^2 = 16$.

2. $A(5;3)$ nuqtadan o'tuvchi va markazi $5x-3y-13=0$ va $x+4y+2=0$ to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasida bo'lgan aylana tenglamasi tuzilsin.

Javob: $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 25$.

3. $x^2 + y^2 = 169$ aylana bilan $5x-12y=0$ to'g'ri chiziqning kesishish nuqtalari topilsin.

Javob: $(12;5)$ va $(-12;-5)$.

4. Quyidagi aylanalar koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalari topilsin.

1) $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$; 2) $x^2 + (y+3)^2 = 9$;

3) $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$; 4) $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 12$.

Javob: 1) $(0;0)$; $(6;0)$ va $(0;8)$; 2) $(0;0)$ va $(0;-8)$; 3) $(0;0)$, $(0;-4)$ va $(2;0)$; 4) $(0;-3+\sqrt{8})$, $(0;-3-\sqrt{8})$ va $(2-\sqrt{3};0)$.

5. $(x-2)^2 + (y+4)^2 = 4$ va $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 9$ aylanalar markazlaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

Javob: $3x-y-10=0$.

6. Aylana koordinatalar tekisligining birinchi choragida yotadi va koordinata o'qlariga urinadi. Agar aylananing radiusi 5 ga teng bo'lsa, uning tenglamasi tuzilsin.

Javob: $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$.

7. Uchburchak tomonlarining tenglamalari $2x+y-1=0$, $x-2y+7=0$ va $3x+y+11=0$ lardan iborat. Bu uchburchakka tashqi chizilgan aylananing tenglamasi yozilsin.

Javob: $(x+2,5)^2 + (y-3,5)^2 = 2,5$.

8. $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ va $(x-5)^2 + (y-1)^2 = 16$ aylanalar umumiy vatarining tenglamasi tuzilsin.


Javob: $4x-y-7=0$.

3.2 Ellips

Berilgan ikkita F_1 va F_2 nuqtalargacha masofalarning yig'indisi o'zgarmas songa teng bo'lgan tekislikdagi nuqtalarning geometrik o'rnini ellips deb ataladi. Bunda $F_1(-c;0)$ va $F_2(c;0)$ nuqtalar ellipsning fokuslari deyiladi (1-chizma).

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (b^2 = a^2 - c^2)$$

bu ellipsning kanonik tenglamasi deyiladi.



$A_1A_2 = 2a$ ellipsning katta o'qi, $B_1B_2 = 2b$ ellipsning kichik o'qi deyiladi. $OA_1 = OA_2 = a$ va $OB_1 = OB_2 = b$ lar mos ravishda ellipsning

katta va kichik yarim o'qlari deyiladi. $OF_1 = OF_2 = c$ ellipsning fokuslari deyiladi (1-chizma).

Ellipsning fokuslari orasidagi masofa uning katta o'qi uzunligiga nisbati ellipsning eksentrisiteti deyiladi va ε bilan belgilanadi. Demak,

$$\varepsilon = \frac{2c}{2a} = \frac{c}{a}.$$

$r_1 = a + \varepsilon x$ va $r_2 = a - \varepsilon x$ larni ellipsning fokal radiuslari deyiladi.

$x = \frac{a}{\varepsilon}$ va $x = -\frac{a}{\varepsilon}$ tenglamalar bilan berilgan to'g'ri chiziqlarga ellipsning direktrisalari deyiladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $x^2 + 4y^2 = 4$ tenglama ellipsni ifodalashini ko'rsating va uning barcha xarakteristikalarini toping.

Yechish: Dastlab berilgan tenglamaning ikkala tomonini 4 ga bo'lamiz:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$$

Bu yerdan berilgan tenglama yarim o'qlari $a = 2$ va $b = 1$ bo'lgan ellipsni bildirishini ko'ramiz. Unda $c^2 = a^2 - b^2 = 4 - 1 = 3$ bo'lgani uchun qaralayotgan ellipsning fokuslari $F_1(-\sqrt{3}; 0)$ va $F_2(\sqrt{3}; 0)$ nuqtalarda joylashganini aniqlaymiz. Topilganlardan foydalanib, ellipsning eksentrisiteti va direktrisasini topamiz:

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad x = \pm \frac{a}{\varepsilon} = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \pm \frac{4}{\sqrt{3}}$$

Ellipsga tegishli $M(x; y)$ nuqtaning fokal radiuslari


$$r_1 = a + \varepsilon x = 2 + \frac{\sqrt{3}}{2}x \quad \text{va} \quad r_2 = a - \varepsilon x = 2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x \quad \text{lardan iborat.}$$

2. $16x^2 + 25y^2 = 400$ ellips berilgan. Bu ellips o'qlarining uzunliklarini, uchlari va fokuslarining koordinatalarini hamda eksentrisitetining miqdorini toping.

Yechish: Berilgan tenglamaning ikkala tomonini hadma-had 400 ga bo'lsak,

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

tenglama hosil bo'ladi. Bu tenglamadan $a^2 = 25$, $b^2 = 16$ bo'lib, ulardan $a = 5$ va $b = 4$ kelib chiqadi. Demak, ellipsning katta o'qi $AA_1 = 2a = 10$, kichik o'qi esa $BB_1 = 2b = 8$ (2-chizma).



Demak ellipsning uchlari $A(5;0)$, $A_1(-5;0)$, $B(0;4)$, $B_1(0;-4)$ nuqtalarda. Ellipsning fokuslari $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ formuladan topiladi.

Demak, $c = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$. Shunday qilib, ellipsning fokuslari $F_1(-3; 0)$ va $F_2(3; 0)$ nuqtalarda bo'ladi.

Ellipsning eksentrisiteti $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{3}{5} = 0.6$ ga teng.

3. Fokuslari orasidagi masofa 6 ga va kichik o'qi 8 ga teng bo'lgan ellipsning tenglamasi tuzilsin.

Yechish: Berilganlarga ko'ra, $2c = 6$, $2b = 8$ bo'lib, ulardan $c = 3$ va $b = 4$ ni aniqlaymiz. a ni topish uchun $a = \sqrt{b^2 + c^2}$ dan foydalanamiz.

Demak, $a = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$.

a va b ning qiymatlari ellipsning kanonik tenglamasiga qo'yilsa, berilgan tenglama hosil bo'ladi. U quyidagicha:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1.$$

4. Ellipsning tenglamasi $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} = 1$ dan iborat. Ellipsning absissasi 4 birlikka teng bo'lgan nuqtasining radius-vektorlari topilsin.

Yechish: Berilgan tenglamadan $a^2 = 64$ va $b^2 = 36$ bo'lib, ulardan $a = 8$ va $b = 6$ larni topamiz. c ni $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ formuladan topamiz. $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{64 - 36} = \sqrt{28} = \sqrt{4 \cdot 7} = 2\sqrt{7}$.

Demak, $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{7}}{8} = \frac{\sqrt{7}}{4}$ va masalaning shartiga asosan $x = 4$. Bularni

$r_1 = a - \varepsilon x$ va $r_2 = a + \varepsilon x$ larga qo'yamiz va

$r_1 = a - \varepsilon x = 8 - \frac{\sqrt{7}}{4} \cdot 4 = 8 - \sqrt{7}$, $r_2 = 8 + \frac{\sqrt{7}}{4} \cdot 4 = 8 + \sqrt{7}$
larni hosil qilamiz.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. Uchlari $(\pm 5; 0)$ va $(0; \pm 3)$ nuqtalarda bo'lgan ellipsning kanonik tenglamasi tuzilsin hamda uning fokuslari topilsin.

Javob: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, $F_1(-4; 0)$, $F_2(4; 0)$.

2. Fokuslari Ox o'qida bo'lib, o'qlari 16 va 10 bo'lgan ellipsning tenglamasi tuzilsin.

Javob: $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{25} = 1$.

3. Fokuslari $(\pm 8; 0)$ nuqtada va eksentrisiteti $\varepsilon = 0,8$ bo'lgan ellipsning tenglamasi yozilsin.

Javob: $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$.

4. Agar ellipsning kichik o'qi: a) katta o'qining $\frac{4}{5}$ qismini; b) katta o'qining 60% ni tashkil etsa, ellipsning eksentrisitetini hisoblang.

Javob: a) 0,6; b) 0,8.

5. $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{4} = 1$ va $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{6} = 1$ ellipsning kesishish nuqtalari topilsin.

Javob: $(\sqrt{2.4}; \pm\sqrt{2.4})$, $(-\sqrt{2.4}; \pm\sqrt{2.4})$.

6. $x^2 + 2y^2 = 18$ ellipsning o'qlari orasidagi burchakni teng ikkiga bo'luvchi vatar uzunligi topilsin.

Javob: $4\sqrt{3}$.

7. $x^2 + y^2 = 36$ aylanadagi barcha nuqtalarni ordinatalarini uch marta qisqartirishdan hosil bo'lgan yangi egri chiziqning tenglamasi yozilsin.

Javob: $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$.

8. $3x^2 + 4y^2 - 18x - 40y + 115 = 0$ tenglama bilan berilgan egri chiziq ellipsdan iborat ekanligi isbotlansin. Uning o'qlari, fokuslari va eksentrisiteti topilsin.

Javob: $\frac{(x-3)^2}{4} + \frac{(y-5)^2}{9} = 1$; $a=2$, $b=\sqrt{3}$, $F_1(2; 5)$, $F_2(4; 5)$ $\varepsilon = \frac{1}{2}$.

9. Fokuslari $(10; \pm 8)$ nuqtada, kichik yarim o'qi 6 ga teng bo'lgan ellips tenglamasi tuzilsin va uning eksentrisiteti hisoblansin.

Javob: $\frac{(x-10)^2}{36} + \frac{y^2}{100} = 1$, $\varepsilon = 0,8$.

10. $M_1(2; 3)$ va $M_2(1; \frac{3\sqrt{5}}{2})$ nuqtalardan o'tuvchi ellips tenglamasi tuzilsin.

Javob: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$.

11. $3x^2 + 16y^2 = 192$ tenglama ellipsni aniqlashini ko'rsating. Uning o'qlari, fokuslari va eksentrisiteti topilsin.

Javob: $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{12} = 1$; $a=8$; $b=2\sqrt{3}$; $F_1(-2\sqrt{13}; 0)$; $F_2(2\sqrt{13}; 0)$; $\varepsilon = \frac{\sqrt{13}}{4}$.

12. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ellips va uni direktrisasi yasalsin.

Ellipsdagi absissasi 3 ga teng bo'lgan nuqtadan o'ng fokusigacha va o'ng direktrisasiigacha bo'lgan masofa topilsin.

Javob: $r = 7,4$; $d = 9,25$.

13. Direktrisasi $x = \pm \frac{4}{\sqrt{3}}$ va katta yarim o'qi 2 ga teng bo'lgan ellipsning kanonik tenglamasi yozilsin.


Javob: $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

3.3 Giperbola

Tekislikdagi ikkita F_1 va F_2 nuqtalargacha masofalar ayirmasining absolut qiymati o'zgarmas $2a$ soniga teng bo'lgan tekislikdagi nuqtalarning geometrik o'rniga giperbola deb ataladi. Bunda F_1 va F_2 nuqtalar giperbolaning fokuslari deb ataladi (1-chizma).

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (b^2 = c^2 - a^2)$$

tenglamaga giperbolaning kanonik tenglamasi deyiladi.



1-chizma

Giperbola Ox o'qini ikkita $A_1(-a; 0)$ va $A_2(a; 0)$ nuqtalarda kesib o'tadi. Ular giperbolaning uchlari deyiladi. Ular orasidagi $|A_1 A_2| = 2a$ masofa giperbolaning haqiqiy o'qi deyiladi. $B_1(0; -b)$ va $B_2(0; b)$ nuqtalar giperbolaning mavhum uchlari, ular orasidagi $|B_1 B_2| = 2b$ masofa esa giperbolaning mavhum o'qi deb ataladi. a va b sonlariga giperbolaning haqiqiy va mavhum yarim o'qlari deb ataladi. Giperbolaning o'qlari kesishadigan nuqta uning markazi deyiladi.

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

tenglamalar bilan aniqlangan chiziqlarga giperbolaning asimptotalari deb ataladi.

Giperbolaning fokuslari orasidagi masofani uning haqiqiy o'qi uzunligiga nisbat giperbolaning eksentrisiteti deyiladi va u ε bilan belgilanadi. Demak,

$$\varepsilon = \frac{2c}{2a} = \frac{c}{a} > 1$$

Giperbolaning $M(x; y)$ nuqtasidan uning F_1 va F_2 fokuslarigacha bo'lgan masofalar shu nuqtaning fokal radiuslari deyiladi. Ular uchun

$$r_1 = \pm(a + \varepsilon x) \text{ va } r_2 = \pm(a - \varepsilon x)$$

formulalar o'rinalidir.

Tenglamalari $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$ bo'lgan ikkita l_1 va l_2 vertikal to'g'ri chiziqlar giperbolaning direktrisalari deb ataladi. Ularning biri O markaz bilan A_1 nuqta orasida, ikkinchisi esa O markaz bilan A_2 nuqta orasida joylashgan bo'ladi.

Agar giperbolaning kanonik tenglamasida $a = b$ bo'lsa, u holda tenglama $x^2 - y^2 = a^2$ ko'rinishga keladi va u teng tomonli giperbola deyiladi.

Masala: Berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ tenglama bilan berilgan giperbolaning barcha xarakteristikalarini toping. Absissasi 8 ga teng va ordinatasi musbat bo'lgan M nuqtaning fokal radiuslarini aniqlang.

Yechish: $a^2 = 16$ va $b^2 = 9$ lardan giperbolaning yarim o'qlari $a = 4$ va $b = 3$ larni topamiz.

$c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 9 = 25$ bo'lib, undan $c = 5$ ni topamiz. Demak, giperbolaning fokuslari $F_1(-5; 0)$ va $F_2(5; 0)$ nuqtalarda joylashadi.

Berilgan giperbolaning asimptotalari

$$y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{3}{4}x = \pm 0.75x.$$

Eksentrisiteti $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{5}{4} = 1.25$ ga teng va direktrisalarning tenglamalari $x = \pm \frac{a}{\varepsilon} = \pm \frac{4}{1.25} = \pm 3.2$ bo'ladi.

Giperboladagi $M(8; y)$ nuqtaning fokal radiuslari $r_1 = a + \varepsilon x = 4 + 1.25 \cdot 8 = 14$, $r_2 = -a + \varepsilon x = -4 + 1.25 \cdot 8 = 6$.

2. Tenglamasi $5x^2 - 9y^2 - 45 = 0$ bo'lgan giperbolaning eksentrisiteti va asimptotalari topilsin.

Yechish: Berilgan tenglamani kanonik ko'rinishiga keltiramiz: $5x^2 - 9y^2 - 45 = 0$, $5x^2 - 9y^2 = 45$, $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{5} = 1$. Bundan $a^2 = 9$ va $b^2 = 5$ bo'lib, ulardan $a = 3$ va $b = \sqrt{5}$ lar kelib chiqadi. Bularni eksentrisitetni aniqlash va asimptotalar tenglamasini tuzish formulalariga qo'yamiz. Demak,

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{\sqrt{14}}{3}, \quad y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}x.$$

3. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ giperbola berilgan. $A(2; 15)$ nuqta giperbolaning biror asimptotasida yotish yoki yotmasligini aniqlang.

Yechish: Berilgan tenglamadan $a = \sqrt{16} = 4$ va $b = \sqrt{9} = 3$ larni topamiz. Demak, asimptotalarning tenglamalari

$$y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{3}{4}x.$$

Shartga ko'ra, A nuqta birinchi koordinata burchagida yotgani uchun, bu nuqta faqat $y = \frac{3}{4}x$ tenglama bilan aniqlangan asimptotaga tegishi bo'lishi mumkin. Bu tenglamadagi x va y larning o'rniga A nuqtaning koordinatalarini qo'yib, $1,5 = \frac{3}{4} \cdot 2$ yoki $1,5 = 1,5$ ayniyatni hosil qilamiz. Demak, A nuqta ko'rsatilgan asimptotada yotadi.

4. Uchlari $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ ellipsning fokuslarida, fokuslari esa shu ellipsning uchlari bo'lgan giperbolaning tenglamasi tuzilsin.

Yechish: Giperbola tenglamasini tuzish uchun uning yarim o'qlari a va b larni topish kerak. Ellipsning tenglamasidan $a_e^2 = 16$ va $b_e^2 = 9$ larni ulardan esa $a_e = 4$ va $b_e = 3$ larni topamiz. Bundan tashqari $a_e^2 - c_e^2 = b_e^2$ munosabatdan $c_e = \sqrt{7}$ ni topamiz. $a_e > b_e$ bo'lganligi uchun ellipsning fokal o'qi Ox o'qi bilan ustma-ust tushadi. Bundan esa giperbolaning haqiqiy o'qi ham Ox o'qi bilan ustma-ust tushishi kelib chiqadi. Giperbolaning izlanayotgan tenglamasi

$$\frac{x^2}{a_e^2} - \frac{y^2}{b_e^2} = 1$$

ko'rinishda bo'ladi.

Masalaning shartiga asosan, $a_g = c_g = \sqrt{7}$ va $c_g = a_e = 4$. Giperbola uchun $c_g^2 - a_g^2 = b_g^2$ bo'lganligidan $16 - 7 = b_g^2$ yoki $b_g^2 = 9$ ni aniqlaymiz. Shunday qilib, giperbolaning izlanayotgan tenglamasi

$$\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{9} = 1$$

bo'ladi.

5. Giperbolaning fokuslari koordinata boshiga nisbatan simmetrik va Ox o'qida yotadi. Fokuslar orasidagi masofa 8 ga teng. Giperbolaning asimptotalaridan biri Ox o'qi bilan 60° li burchak hosil qiladi. Shu giperbolaning tenglamasi tuzilsin.

Yechish: Masalaning shartiga asosan $2c = 8$ bo'lib, undan $c = 4$. Giperbolada $c^2 = a^2 + b^2$ bo'lganligi uchun $a^2 + b^2 = 16$ bo'ladi. Masalaning shartni qanoatlantiruvchi asimptota tenglamasi $y = \frac{b}{a}x$ bo'lib,

bu yerda $\frac{b}{a} = k = \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$. Demak, biz quyidagi tenglamalar tizimiga ega bo'lamiz:

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 16 \\ \frac{b}{a} = \sqrt{3} \end{cases}$$

Uni yechib, $a^2 = 4$ va $b^2 = 12$ larni topamiz. Shunday qilib giperbolaning izlanayotgan tenglamasi

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$$

aniqlorat bo'ladi.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. $3x^2 - 4y^2 = 12$ tenglama giperbolani aniqlashini ko'rsating va uning barcha xarakteristikalarini toping.

Javob: $a = 2$, $b = \sqrt{3}$, $F_1(-\sqrt{7}; 0)$, $F_2(\sqrt{7}; 0)$, $e = \frac{\sqrt{7}}{2}$, $y = \pm \frac{\sqrt{7}}{2}x$.

2. Giperbolaning quyidagi tenglamalarini kanonik ko'rinishga keling:

1) $9x^2 - 16y^2 - 144 = 0$; 2) $2x^2 - y^2 = 6$

Javob: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$; $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$.

3. $4x^2 - 25y^2 - 100 = 0$ tenglama bilan berilgan giperbolaning asimptotalarining tenglamalari tuzilsin.

Javob: $y = \pm 0,4x$.

4. $3x^2 - 5y^2 = 28$ giperbola bilan $2x - y = 8$ to'g'ri chiziqning kesishish nuqtalari topilsin.

Javob: $(6; 4)$, $(3\frac{7}{17}; -1\frac{3}{17})$.

5. $y = -5\sqrt{3}$ to'g'ri chiziqning $25x^2 - 4y^2 = 100$ giperbola tarmoqlari orasiga joylashgan qismining uzunligi topilsin.

Javob: 8.

6. Fokuslari $(\pm 2\sqrt{2}; 0)$ nuqtalarda va asimptotalari $y = \pm x$ lardan iborat bo'lgan giperbola tenglamasi tuzilsin.

Javob: $x^2 - y^2 = 4$.

7. $A(8; -\sqrt{7})$ va $B(-10; -4)$ nuqtalardan o'tuvchi va koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik bo'lgan giperbola tenglamasi tuzilsin.

Javob: $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$.

8. $9x^2 - 4y^2 - 144 = 0$ giperbolaning fokuslarini toping va eksenini sitetini hisoblang.

Javob: $F_1(-2\sqrt{13}; 0); F_2(2\sqrt{13}; 0); \varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

9. $x^2 - 4y^2 = 16$ giperbolada ordinatasi 1 ga teng M nuqta olingan. Bu nuqtadan fokuslargacha bo'lgan masofalar topilsin.

Javob: $r_1 = 1, r_2 = 9$.

10. Giperbola uchlarining biridan fokuslarigacha masofalar 9 va 1 ga teng. Giperbolaning kanonik tenglamasi tuzilsin.

Javob: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

11. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ giperbola va uning direktrisasini yasang. Giperboladagi absissasi 5 ga teng bo'lgan nuqtadan uning chap fokusigacha va chap direktrisasigacha bo'lgan masofalar topilsin.

Javob: Direktrisa tenglamasi $y = \pm 3.2$; $\varepsilon = 1.25$; $r = 10.25$, $d = 8.2$.


12. Asimptotalari $y = \pm x$, direktrisalari $x = \pm\sqrt{6}$ bo'lgan giperbolaning tenglamasi yozilsin.

Javob: $x^2 - y^2 = 12$.

3.4 Parabola

Har bir nuqtasidan fokus deb ataluvchi berilgan nuqttagacha va direktrisa deb ataluvchi berilgan to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa o'zaro teng bo'lgan tekislikdagi barcha nuqtalar to'plamiga parabola deb ataladi. Bunda F nuqta fokus, l to'g'ri chiziq esa direktrisa deyiladi.


$y^2 = 2px$ tenglamaga parabolaning kanonik tenglamasi, $p(p > 0)$ uning parametri deyiladi.




1-chizma

$r = d = x + \frac{p}{2}$ parabolaning focal radiusi deb ataladi. Parabola uchun $\frac{r}{d} = 1$ bo'ladi (1-chizma).


$y^2 = -2px$, $x^2 = 2py$ va $x^2 = -2py$ lar ham parabolaning tenglamalari bo'lib, ular mos ravishda Ox o'qining chap qismida, Oy o'qining yuqori qismida va Oy o'qining quyi qismida joylashgan bo'ladi (2, 3, 4-chizmalar).



2-chizma



3-chizma



4-chizma

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Ox o'qi parabolaning simmetriya o'qi bo'lib, uning uchi koordinatalar boshida yotadi. Parabola uchidan fokusigacha bo'lgan masofa 4 birlikka teng. Parabola va uning direktrisasi tenglamasini yozing.

Yechish: Dastlab, masala shartiga asosan, parabolaning p parametrini topamiz: $|OF| = 4 \Rightarrow \frac{p}{2} = 4 \Rightarrow p = 8$ p ning bu qiymatini parabolaning kanonik tenglamasiga qo'yib $y^2 = 2px = 2 \cdot 8 \cdot x = 16x$ ni topamiz. Bu parabola tenglamasidir. Direktrisa tenglamasi $x = -\frac{p}{2} = -\frac{8}{2} = -4$, ya'ni $x = -4$ dan iborat.

2. Parabola Ox o'qiga nisbatan simmetrik va $A(3; -6)$ nuqtadan o'tadi, uning tenglamasi tuzilsin.

Yechish: Parabolaning uchi koordinatalar boshida va u Ox o'qiga nisbatan simmetrik bo'lganligi uchun uning tenglamasi $y^2 = 2px$ yoki $y^2 = -2px$ dan iborat bo'ladi. Parabola musbat absissali nuqtadan o'tganligi uchun uning tenglamasi $y^2 = 2px$ ko'rinishda bo'lishi ravshan. Bu tenglamaga A nuqtaning koordinatalarini qo'yib, $36 = 2p \cdot 3$ ni hosil qilamiz. Undan esa $2p = 12$ kelib chiqadi. Demak, parabolaning izlangan tenglamasi: $y^2 = 2px = 12x$.

3. Uchi koordinatalar boshida bo'lgan parabolaning fokusi $F(0; -4)$ nuqtada yotadi. Bu parabolaning tenglamasini yozing.

Yechish: Masalaning shartiga asosan bu parabola Oy o'qqa nisbatan simmetrik, uning tarmoqlari pastga yo'nalgan. Shuning uchun izlanayotgan tenglama $x^2 = -2py$ dan topiladi. $\frac{p}{2} = 4$ bo'lgani uchun $p = 8$ bo'lib parabolaning tenglamasi $x^2 = -16y$ bo'ladi.

4. Parabolaning tenglamasi $y^2 = 20x$. Uning parametri, direktrisasi va absissasi 7 ga teng bo'lgan nuqtasining radius-vektori aniqlansin.

Yechish: Berilgan tenglamani parabolaning umumiy tenglamasi bilan solishtirib, $2p = 20$ ekanligini va undan $p = 10$ ni topamiz. Shuning uchun direktrisaning tenglamasi $x + 5 = 0$ va radius-vektori $r = 7 + 5 = 12$ bo'ladi.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. $y^2 = 6x$ parabola berilgan. Uning direktrisasi tenglamasi tuzilsin va fokusining koordinatalari topilsin.

Javob: $x = -\frac{3}{2}$; $F\left(\frac{3}{2}; 0\right)$.

2. $x + y = 0$ to'g'ri chiziq bilan $x^2 + y^2 + 4y = 0$ aylananing kesishgan nuqtalaridan o'tib, Oy o'qqa nisbatan simmetrik bo'lgan parabola va uning direktrisasi tenglamasi yozilsin. Aylana, to'g'ri chiziq va parabola yasalsin.

Javob: $y = -\frac{x^2}{2}$; $x = \frac{1}{8}$.

3. $(0; 0)$ va $(1; -3)$ nuqtalardan o'tuvchi va Oy o'qqa nisbatan simmetrik bo'lgan parabolaning tenglamasi yozilsin.

Javob: $y^2 = 9x$.

4. $(0; 0)$ va $(2; 4)$ nuqtalardan o'tuvchi va Oy o'qqa nisbatan simmetrik bo'lgan parabolaning tenglamasi yozilsin.

Javob: $y = x^2$.

5. $y^2 = -4x$ parabolaning fokusidan Ox o'q bilan 120° burchak hosil qiluvchi to'g'ri chiziq o'tkazilsin va uning tenglamasi yozilsin hamda hosil bo'lgan vatarning uzunligi topilsin.

Javob: $y = -\sqrt{3}(x + 1)$; $\frac{16}{3}$.

6. $y = 4$ to'g'ri chiziqdan va $F(0; 2)$ nuqtadan bir xil uzoqlikda joylashgan nuqtalar geometrik o'rining tenglamasi tuzilsin.

Javob: $y = 3 - \frac{x^2}{4}$.

7. Koordinata boshidan va $x = -4$ to'g'ri chiziqdan bir xil uzoqlikda joylashgan nuqtalar geometrik o'rining tenglamasi tuzilsin.

Javob: $y^2 = 8(x + 2)$.


8. $y^2 = 8x$ parabolaga o'tkazilgan urinma $x + y = 0$ to'g'ri chiziqqa parallel. Shu urinma tenglamasi tuzilsin.

Javob: $x + y + 2 = 0$.

§ 4. Koordinatalarni almashtirish. Ikkinchi tartibli chiziqlar klassifikatsiyasi va ularni kanonik ko'rinishga keltirish

Ko'p hollarda berilgan masala yechimini soddalashtirish, chiziq tenglamasini ixcham va qulay ko'rinishda yozish uchun berilgan xOy Dekart koordinatalar sistemasidan boshqa bir $x'O'y'$ Dekart koordinatalar sistemasiga o'tishga to'g'ri keladi. Bunda quyidagi uch hol bo'lishi mumkin.

1-hol. Koordinatalar sistemasini parallel ko'chirish. Bunda berilgan xOy koordinatalar sistemasining boshi $O(0; 0)$ biror $O'(x_0; y_0)$ nuqtaga parallel ko'chiriladi. Bunda Ox va Oy o'qlarning yo'nalishi va holati




Yechish
nisbat

shu sababli bu yangi hosil bo'lgan sistemani $x'O'y'$ (chizma).

sistemadagi x va y koordinatalar bilan yangi $x'O'y'$ va y' koordinatalar orasidagi bog'lanish

$$\begin{cases} x = x' + x_0 \\ y = y' + y_0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = x' - x_0 \\ y = y' - y_0 \end{cases} \quad \text{formulalar bilan ifodalanadi.}$$

II-hol. Koordinatalar sistemasini burish. xOy koordinatalar sistemasining boshi $O(0;0)$ nuqta o'zgarmasdan, Ox va Oy o'qlar bir xil α burchakka buriladi. Bunda hosil bo'lgan yangi sistemani $x'O'y'$ deb belgilaymiz (2-chizma).




2-chizma

Bunda eski xOy sistemadagi x va y koordinatalar bilan yangi $x'O'y'$ sistemadagi x' va y' koordinatalar orasidagi bog'lanish

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases} \quad \begin{cases} x' = x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ y' = -x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{cases}$$

formulalar bilan ifodalanadi.

III-hol. Koordinatalar sistemasini parallel ko'chirish va burish. Bunda dastlab berilgan xOy koordinatalar sistemasining boshi $O(0;0)$ biror $O'(x_0; y_0)$ nuqtaga parallel ko'chiriladi. So'ngra hosil bo'lgan $x'O'y'$ sistemaning o'qlari bir xil α burchakka buriladi. Natijada yangi hosil bo'lgan sistemada ham koordinata boshi, ham o'qlar o'zgaradi (3-chizma).



3-chizma

Bunda eski xOy sistemadagi x va y koordinatalar bilan yangi $x'O'y'$ sistemadagi x' va y' koordinatalar orasidagi bog'lanish

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha + x_0 \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha + y_0 \end{cases} \quad \begin{cases} x' = (x - x_0) \cos \alpha + (y - y_0) \sin \alpha \\ y' = (x - x_0) \sin \alpha + (y - y_0) \cos \alpha \end{cases}$$

formulalar bilan ifodalanadi.

xOy to'g'ri burchakli Dekart koordinatalar sistemasida ikkinchi darajali egri chiziqlar umumiy holda

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0, \quad A^2 + B^2 + C^2 \neq 0 \quad (1)$$

tenglama bilan beriladi.

Agar koordinatalar boshini $O(0;0)$ nuqtadan boshqa biror nuqtaga parallel ko'chirsak, yoki Ox va Oy o'qlarni biror α burchakka burish yoki parallel ko'chirish va burish orqali yangi koordinatalar sistemasiga o'tsak, u holda berilgan tenglama quyidagi tenglamalardan biriga keladi:

1. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Bu holda (1) tenglama ellipsni ifodalaydi.
2. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$. Bu holda (1) tenglamani birorta ham nuqta qanoatlantirmaydi. Ya'ni u bo'sh to'plamni ifodalaydi.
3. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$. Bu holda (1) tenglamani faqat $O(0;0)$ nuqta qanoatlantiradi va u ikkita mavhum kesishuvchi to'g'ri chiziqlarni ifodalaydi.
4. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$. Bu holda (1) tenglama kesishuvchi bir juft to'g'ri chiziqlarni ifodalaydi.
5. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Bu holda (1) tenglama giperbolani ifodalaydi.
6. $\frac{x^2}{a^2} = 1 \Rightarrow x^2 = a^2 \Rightarrow x = \pm a$. Bu holda (1) tenglama bir juft vertikal to'g'ri chiziqlarni ifodalaydi.
7. $\frac{x^2}{a^2} = -1 \Rightarrow x^2 = -a^2$. Bu holda (1) tenglamani birorta ham nuqta qanoatlantirmaydi.
8. $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$. Bu holda (1) tenglama bir juft ustma-ust tushgan vertikal to'g'ri chiziqlarni ifodalaydi.

9. $\frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y^2 = b^2 \Rightarrow y = \pm b$. Bu holda ① tenglama bir juft gorizontal to'g'ri chiziqlarni ifodalaydi.

10. $\frac{y^2}{b^2} = -1 \Rightarrow y^2 = -b^2$. Bu holda ① tenglamani birorta ham nuqta qanoatlantirmaydi.

11. $y^2 = 0 \Rightarrow y = 0$. Bu holda ① tenglama bir juft ustma-ust tushgan gorizontal to'g'ri chiziqlarni ifodalaydi.

12. $y^2 = 2px$. Bu holda ① tenglama parabolaning ifodalaydi.

① ko'rinishdagi umumiy tenglamaning A, B va C koeffitsientlaridan tuzilgan

$$\Delta = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2$$

determinant xarakteristik determinant deyiladi.

Agar ① tenglamada $\Delta > 0$ bo'lsa, u holda tenglama elliptik turdagi tenglama deyiladi va u yuqorida ko'rib o'tilgan 1-3 kanonik tenglamalardan biriga keltiriladi.

Agar ① tenglamada $\Delta < 0$ bo'lsa, u holda tenglamani giperbolik turdagi tenglamada deyiladi va u yuqorida ko'rib o'tilgan 4-5 kanonik tenglamalardan biriga keltiriladi.

Agar ① tenglamada $\Delta = 0$ bo'lsa, u holda tenglama parabolik turdagi tenglama deyiladi va u yuqorida ko'rib o'tilgan 6-12 kanonik tenglamalardan biriga keltiriladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Ushbu II tartibli tenglamalar bilan berilgan chiziqlar ko'rinishini aniqlang:

1) $36x^2 + 36y^2 - 36x - 24y - 23 = 0$;

2) $16x^2 + 25y^2 - 32x + 50y - 359 = 0$.

Yechish: 1) Tenglamani ko'rinishini o'zgartiramiz:

$$36x^2 + 36y^2 - 36x - 24y - 23 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 36(x^2 - x) + 36\left(y^2 - \frac{2}{3}y\right) - 23 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 36\left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right] + 36\left[\left(y - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}\right] - 23 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 36\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 9 + 36\left(y - \frac{1}{3}\right)^2 - 4 - 23 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 36\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 36\left(y - \frac{1}{3}\right)^2 = 36 \Rightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{3}\right)^2 = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[x' = x - \frac{1}{2}, y' = y - \frac{1}{3}\right] \Rightarrow x'^2 + y'^2 = 1.$$

Demak, berilgan tenglama markazi $M\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{3}\right)$ nuqtada joylashgan va radiusi $R = 1$ bo'lgan aylanani ifodalaydi.

2. Berilgan tenglamani ko'rinishini o'zgartiramiz:

$$16x^2 + 25y^2 - 32x + 50y - 359 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 16(x^2 - 2x) + 25(y^2 + 2y) - 359 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 16[(x - 1)^2 - 1] + 25[(y + 1)^2 - 1] - 359 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 16(x - 1)^2 + 25(y + 1)^2 = 400 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x' = x - 1, y' = y + 1) \Rightarrow 16(x')^2 + 25(y')^2 = 400 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{16(x')^2}{400} + \frac{25(y')^2}{400} = 1 \Rightarrow \frac{x'^2}{25} + \frac{y'^2}{16} = 1.$$

Demak, berilgan tenglama markazi $M(1; -1)$ nuqtada joylashgan va yarim o'qlari $a = 5$, $b = 4$ bo'lgan ellipsni ifodalaydi.

3. Chiziqning ushbu tenglamasi berilgan:

$$x^2 - y^2 = 2a(x - y + a).$$

Agar $M(a; a)$ nuqtani yangi sistemaning boshi deb faraz qilib, yangi o'qlar uchun koordinata burchaklarining bissektrisalariga parallel bo'lgan chiziqlar qabul qilinsa, tenglamaning ko'rinishi qanday bo'ladi?

Yechish: Bu masalada yangi sistema boshining eski sistemaga nisbatan koordinatalari $(a; a)$ va ikkala sistemaning abscissa o'qlari orasidagi burchak $\alpha = 45^\circ$ bo'ladi. Shuning uchun ushbu

$$x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha + x_0$$

$$y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha + y_0$$

formuladan foydalanamiz.

$$x = x' \cdot \cos 45^\circ - y' \cdot \sin 45^\circ + a = \frac{1}{2} x' \cdot \sqrt{2} - \frac{1}{2} y' \cdot \sqrt{2} + a$$

$y = x' \cdot \sin 45^\circ + y' \cdot \cos 45^\circ + a = \frac{1}{2} x' \cdot \sqrt{2} + \frac{1}{2} y' \cdot \sqrt{2} + a$
 yoki ularni berilgan tenglamaga qo'ysak,
 $(\frac{1}{2} x' \cdot \sqrt{2} - \frac{1}{2} y' \cdot \sqrt{2} + a)^2 - (\frac{1}{2} x' \cdot \sqrt{2} + \frac{1}{2} y' \cdot \sqrt{2} + a)^2 =$
 $= 2a(-y' \sqrt{2} + a)$ bo'ladi. Buni soddalashtirib,
 $(x' \sqrt{2} a)(-y' \sqrt{2} a) = 2a(-y' \sqrt{2} + a)$ yoki $x'y' = -a^2$ ni hosil qilamiz.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. $A(3; 1)$ nuqta, koordinata o'qlari parallel ko'chirish natijasida hosil bo'lgan yangi sistemada $A'(2; -1)$ nuqtaga o'tadi. Dastlabki va ko'chirilgan koordinatalar sistemasini yasang va A nuqtani belgilang.

Javob: $O'(1; 2)$.

2. Agar koordinata boshi $A(-1; 3)$ nuqtaga ko'chirilsa, $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$ aylana tenglamasi qanday ko'rinishda bo'ladi.

Javob: $x^2 + y^2 = 9$.

3. Koordinata o'qlarining yo'nalishini ma'lum bir o'tkir burchakka burganda, $A(2; 4)$ nuqtaning yangi sistemadagi absissasi 4 ga teng bo'ladi. O'sha burchak topilsin. Ikkala sistema va A nuqta yasalsin.

Javob: $\tan \varphi = \frac{3}{4}$.

4. Koordinata boshini ko'chirib

1) $x^2 + 4y^2 - 6x + 8y = 3$; 2) $y^2 - 8y = 4x$;

3) $x^2 - 4y^2 + 8x - 24y = 24$; 4) $x^2 + 6x + 5 = 2y$

tenglamalar soddalashtirilsin.

Javob: 1) $x^2 + 4y^2 = 16$; 2) $y^2 = 4x$;

3) $x^2 - 4y^2 = 4$; 4) $y = \frac{1}{2}x^2$.

5. Nuqtalari bo'yicha $xy = -4$ egri chiziq yasalsin va koordinata o'qlarini 45° ga burib, egri chiziq tenglamasi yangi sistemada yozilsin.

Javob: $x^2 - y^2 = 8$.

6. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan egri chiziqlarning ko'rinishini aniqlang:

1) $16x^2 + 25y^2 + 32x - 100y - 284 = 0$;

2) $16x^2 - 9y^2 - 64x - 18y - 89 = 0$;

3) $2y^2 - x - 12y + 14 = 0$;

4) $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 25 = 0$;

5) $2x^2 + 3y^2 - 4x + 6y - 7 = 0$;

6) $x^2 + 2y^2 + 4x - 8y + 12 = 0$.

7. Koordinata o'qlarini burib, ushbu

1) $5x^2 - 4xy + 2y^2 = 24$; 2) $2x^2 + 4xy - y^2 = 12$

egri chiziqlarning tenglamalari kanonik ko'rinishga keltirilsin va egri chiziqlar yasalsin.

Javob: 1) $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{4} = 1$; 2) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{6} = 1$.

8. Ushbu: 1) $x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0$;

2) $x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 4y + 3 = 0$ tenglamalar kanonik ko'rinishga keltirilsin va bu tenglamalar bilan ifodalanuvchi egri chiziqlar yasalsin.

Javob: 1) $y^2 = 4\sqrt{2}x$; 2) $x + y = 2 \pm 1$ to'g'ri chiziqlar.

§ 5. Qutb koordinatalar sistemasi

Tekislikda qutb deb ataluvchi O nuqta va qutb o'qi deb ataluvchi OP berilgan bo'lsin. U holda tekislikdagi M nuqtaning holati:

1) $\varphi = \angle MOP$ qutb burchagi;

2) $r = OM$ radius-vektor


lar bilan aniqlanadi (1-chizma).

r va φ lar orasidagi bog'lanishni ifodalovchi tenglamalarni o'rganishda musbat va manfiy qiymatlarni qabul qiladigan r va φ qutb koordinatalarni qarash mumkin.

Agar qutb sifatida to'g'ri burchakli Dekart koordinatalar sistemasining boshini, OP qutb o'qi uchun esa Ox o'qini qabul qilsak, u holda M nuqtaning Dekart koordinatalari $(x; y)$ va qutb koordinatalari $(r; \varphi)$ orasidagi bog'lanish quyidagicha bo'ladi:

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi,$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \varphi = \frac{y}{x}.$$



Agar ellips, giperbola va parabola fokusini qutb deb olib, qutb o'qi esa qutbga eng yaqin uchiga qaratilgan yo'nalishga teskari yo'naltirilgan fokus simmetriya o'qini olsak, bu egri chiziqlarning qutb koordinatalaridagi tenglamlari bir xil

$$r = \frac{P}{1 - \varepsilon \cos \varphi}$$

ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda ε - eksentrisitet, P - parametr. Ellips va giperbola uchun $P = \frac{b^2}{a}$ bo'ladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. To'g'ri burchakli Dekart koordinatalar sistemasida berilgan $M(1; -\sqrt{3})$ nuqtaning qutb koordinatalar sistemasidagi koordinatalari topilsin.

Yechish: Dekart koordinatalaridan qutb koordinatalariga o'tish formulasidan foydalanamiz:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = 2.$$

$$\cos \varphi = \frac{x}{r} = \frac{1}{2}, \sin \varphi = \frac{y}{r} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Demak, $\varphi = \frac{5}{3}\pi$. Shunday qilib, $M(\frac{5}{3}\pi; 2)$.

2. Nuqtaning qutb koordinatalari $(\frac{\pi}{3}; 4)$ ga teng. Bu nuqtaning to'g'ri burchakli Dekart koordinatalar sistemasidagi koordinatalari topilsin.

Yechish: Masala shartiga ko'ra $r = 4$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$. Bularni qutb koordinatalaridan Dekart koordinatalar sistemasiga o'tish formulasiga qo'yamiz:

$$x = r \cos \varphi = 4 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2;$$



$$y = r \sin \varphi = 4 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}. \text{ Demak, } M(2; 2\sqrt{3}).$$

3. $A(\frac{\pi}{3}; 2)$, $B(\frac{\pi}{6}; 5)$, $D(-\frac{\pi}{4}; 4)$ nuqtalarning o'rinlari topilsin.


Yechish: 1) AO nurni chizamiz va O nuqtadan bu nur bilan $\frac{\pi}{3}$ ga teng burchak hosil qiluvchi to'g'ri chiziqni o'tkazamiz hamda undan 2 birlik

nuqta ajratamiz. Natijada koordinatalari $(\frac{\pi}{3}; 2)$ bo'lgan B nuqta hosil bo'ladi (2-chizma).

2) O nuqta olib undan OA nur o'tkazamiz va O nuqtadan bu nur bilan $\frac{\pi}{6}$ ga teng burchak hosil qiluvchi to'g'ri chiziq o'tkazamiz hamda bu to'g'ri chiziqda 5 birlikka teng kesma ajratamiz. Bu kesmaning oxiri $B(\frac{\pi}{6}; 5)$ nuqtadan iborat bo'ladi (3-chizma).



3) O nuqtani olib undan OA nur o'tkazamiz va O nuqtadan bu nur bilan $-\frac{\pi}{4}$ ga teng burchak hosil qiluvchi to'g'ri chiziq o'tkazamiz hamda unda 4 birlikka teng kesma ajratamiz. Bu kesmaning oxiri $D(-\frac{\pi}{4}; 4)$ nuqtadan iborat bo'ladi (4-chizma).



4) Ushbu $x^2 - y^2 = a^2$ chiziq tenglamasini qutb koordinatalaridagi tenglama bilan almashtirilsin.

Yechish: Dekart koordinatalaridan qutb koordinatalariga o'tish formulasidan foydalanamiz. Buning uchun berilgan tenglamaga $x = r \cos \varphi$ va $y = r \sin \varphi$ larni qo'yamiz.

$$x^2 - y^2 = a^2, \quad (r \cos \varphi)^2 - (r \sin \varphi)^2 = a^2, \quad r^2(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = a^2, \quad r^2 \cos 2\varphi = a^2, \quad r^2 = \frac{a^2}{\cos 2\varphi}.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. Qutb koordinatalar sistemasida $A(0; 3)$, $B(\frac{\pi}{4}; 2)$, $C(\frac{\pi}{2}; 3)$ nuqtalarni tasvirlang.

2. $A(\frac{\pi}{2}; -2)$, $B(-\frac{\pi}{2}; 3)$, $C(-\frac{\pi}{4}; -4)$, $D(\frac{2\pi}{3}; -3)$ nuqtalarni tasvirlang.

3. $r = 2 + 2\cos\varphi$ chiziq yasalsin.

4. Quyidagi chiziqlar yasalsin:

1) $r = 3 + 2\cos 2\varphi$; 2) $r = 3 - \sin 3\varphi$; 3) $r = \cos 2\varphi$.

5. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan ikkinchi tartibli egri chiziqlarni kanonik tenglamalari yozilsin:

1) $r = \frac{1}{2 - \sqrt{3}\cos\varphi}$; 2) $r = \frac{1}{2 - \sqrt{5}\cos\varphi}$; 3) $r = \frac{1}{2 - 2\cos\varphi}$

Javob: 1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$; 2) $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$; 3) $y^2 = x$.

6. Ushbu

1) $x^2 + y^2 = a^2$; 2) $x\cos\alpha + y\sin\alpha - p = 0$;

3) $x^2 + y^2 = ax$; 4) $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$.


chiziqlarning tenglamalari qutb koordinatalaridagi tenglamalari bilan almashtirilsin.

Javob: 1) $r = a$; 2) $r = \frac{p}{\cos(\varphi - \alpha)}$; 3) $r = a\cos\varphi$; 4) $r^2 = a^2\cos 2\varphi$.

VI. BOB. FAZODA ANALITIK GEOMETRIYA

§ 1. Fazodagi ikki nuqta orasidagi masofa. Kesmani berilgan nisbatga bo'lish. Fazoda tekislik va uning xossalari

Ma'lumki, bizni o'rab turgan borliq - fazo uch o'lchovli fazo bo'lib, bizga ko'rinib turgan real jismlar shu fazoda ma'lum bir o'rinni egallaydi. Fazoda ularning holatini aniqlash uchun tekislikdagi kabi Dekart koordinatalar sistemasini kiritiladi. Bizga mashtab birligi bilan ta'minlangan o'zaro perpendikulyar hamda bitta O nuqtada kesishuvchi Ox, Oy, Oz to'g'ri chiziqlar



mashtab berilgan bo'lsin. Odatda bu sistema fazoda Dekart koordinatalar sistemasini deyiladi va $Oxyz$ bilan belgilanadi. O nuqta koordinatalar boshi, Ox - absissalar o'qi, Oy - ordinatalar o'qi, Oz esa applikatalar o'qi deyiladi.

Fazoda biror A nuqtaning holati uning Ox, Oy, Oz o'qlarga proyeksiyalari - (x, y, z) uchlik bilan to'la aniqlanadi (1-chizma).

Odatda (x, y, z) uchlik A nuqtaning koordinatalari deyilib, u $A(x, y, z)$ ko'rinishda yoziladi. Bu yerda x - A nuqtaning absissasi, y - ordinatasi, z - esa applikatasidir.

Fazoda Dekart koordinatalar sistemasini va $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ nuqtalar berilgan bo'lsin. U holda bu nuqtalar orasidagi AB masofa

$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ formula yordamida topiladi.

$A(x_1, y_1, z_1)$ va $B(x_2, y_2, z_2)$ nuqtalarni tutashtiruvchi AB kesmani $\frac{AC}{CB} = \lambda$ nisbatda bo'luvchi C nuqtaning koordinatalari

$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$, $y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$, $z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}$ formuladan topiladi.

Agar C nuqta AB kesmaning o'rtasi bo'lsa, unda $AC = CB$, ya'ni $\lambda = 1$ bo'lib, C nuqtaning koordinatalari

$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$, $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$, $z = \frac{z_1 + z_2}{2}$ bo'ladi.

$Ax + By + Cz + D = 0$ tenglamaga fazodagi tekislikning umumiy tenglamasi deyiladi. Bu yerda A, B, C, D o'zgarmas sonlar bo'lib, ular tekislikning fazodagi vaziyatini to'la aniqlaydi. x, y, z lar esa tekislikda yotuvchi ixtiyoriy M nuqtaning koordinatalaridir.

Tekislikning umumiy tenglamasining ba'zi xususiy hollarini ko'rib o'tamiz:

1. $A \neq 0, B \neq 0, C \neq 0, D = 0$ bo'lsin. U holda $Ax + By + Cz = 0$ bo'lib, bu tenglama bilan aniqlangan tekislik koordinatalar boshidan o'tadi.

2. $A \neq 0, B \neq 0, D \neq 0, C = 0$. Bu holda biz $Ax + By + D = 0$ tenglamaga ega bo'lamiz. Bu tenglama bilan aniqlangan tekislik Oxy koordinatalar tekisligidagi $Ax + By + D = 0$ to'g'ri chiziqdan o'tadi va Oz o'qiga parallel bo'ladi.

3. $B = 0, A \neq 0, C \neq 0, D \neq 0$ bo'lgan holda $Ax + Cz + D = 0$ tekislik Oxz tekisligidagi $Ax + Cz + D = 0$ to'g'ri chiziqdan o'tib, u Oy o'qiga parallel bo'ladi.

4. $A = 0, B \neq 0, C \neq 0, D \neq 0$. Bu holda tenglama $By + Cz + D = 0$ ko'rinishga kelib, u Oyz koordinatalar tekisligidagi $By + Cz + D = 0$ to'g'ri chiziqdan o'tuvchi hamda Ox o'qiga parallel tekislikdir.

5. $A = 0, B = 0, C \neq 0, D \neq 0$. Bu holda tenglama $Cz + D = 0$ ko'rinishga ega bo'lib, u Oxy koordinatalar tekisligiga parallel bo'ladi.

6. $A = C = 0, B \neq 0, D \neq 0$. Bu holda tenglama $By + D = 0$ ko'rinishga ega bo'lib, u Oxy koordinatalar tekisligiga parallel bo'ladi.

7. $B = C = 0, A \neq 0, D \neq 0$. Bu holda tenglama $Ax + D = 0$ ko'rinishda bo'lib, u Oyz tekisligiga parallel bo'ladi.

8. $A = B = D = 0, C \neq 0$. Bu holda tenglama $Cz = 0$ yoki $Z = 0$ ko'rinishga ega bo'lib, u Oxy tekisligini ifodalaydi.

9. $A = C = D = 0, B \neq 0$. Bu holda tenglama $By = 0$ yoki $y = 0$ ko'rinishga ega bo'lib, u Oxz koordinata tekisligini ifodalaydi.


10. $B = C = D = 0, A \neq 0$. Bu holda tenglama $Ax = 0$ yoki $x = 0$ ko'rinishga ega bo'lib, u Oyz koordinata tekisligini ifodalaydi.

11. $A \neq 0, B \neq 0, C \neq 0, D \neq 0$. Bu holda tekislik tenglamasini

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad \text{☆}$$

ko'rinishga keltirish mumkin. Bu yerda $a = -\frac{D}{A}, b = -\frac{D}{B}, c = -\frac{D}{C}$.

☆ tenglama tekislikning kesmalar bo'yicha tenglamasi deyiladi. Bu yerda a, b, c lar tekislikning koordinata o'qlaridan ajratgan kesmalari (2-chizma).



Fazoda $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ va $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ tenglamalar bilan berilgan tekisliklar parallel bo'lsa, $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ shart bajariladi. Agar ular perpendikulyar bo'lsa $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$ shart bajariladi.

Fazodagi ikkita tekislik orasidagi φ burchak

$$\cos \varphi = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

formula yordamida topiladi.

$M_0(x_0; y_0; z_0)$ nuqtadan $Ax + By + Cz + D = 0$ tekislikkacha bo'lgan masofa $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ formuladan topiladi.

$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$ tenglamaga tekislikning normal tenglamasi deyiladi.

Bu yerda

$$\cos \alpha = \pm \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \cos \beta = \pm \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

$$\cos \gamma = \pm \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, p = \pm \frac{D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

$\mu = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ soniga normallovchi ko'paytuvchi deyiladi. Agar tekislik tenglamasi $Ax + By + Cz + D = 0$ ko'rinishda bo'lsa, u holda uni normal tenglamaga keltirish uchun uni μ ga ko'paytiriladi. μ ni ishorasini D ning ishorasiga qarama-qarshi qilib olinadi.

Fazoda bir to'g'ri chiziqda yotmagan uchta $M_1(x_1; y_1; z_1), M_2(x_2; y_2; z_2)$ va $M_3(x_3; y_3; z_3)$ nuqtalardan o'tuvchi tekislik tenglamasi

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

ko'rinishda bo'ladi.

$M(x_1; y_1; z_1)$ nuqtadan o'tuvchi va $\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan tekislik tenglamasi

$$m(x - x_1) + n(y - y_1) + p(z - z_1) = 0 \quad \text{ko'rinishda bo'ladi.}$$

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $A(1; 2; 3)$ va $B(4; 2; -1)$ nuqtalar orasidagi masofa topilsin.

Yechish: AB masofani topish uchun

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ formuladan foydalanamiz:
Bu yerda $x_1 = 1, x_2 = 4, y_1 = 2, y_2 = 2, z_1 = 3$ va $z_2 = -1$. Bularni o'rinlariga qo'yamiz:

$$AB = \sqrt{(4-1)^2 + (2-2)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{9+0+16} = \sqrt{25} = 5.$$

Javob: 5.

2. Uchlari $A(2; 1; 3)$ va $B(3; 5; 4)$ nuqtalarda bo'lgan AB kesmaning o'rtasining koordinatalari topilsin.

Yechish: Agar AB kesmani o'rtasini C deb olsak, u holda uning koordinatalari $x = \frac{x_1+x_2}{2}, y = \frac{y_1+y_2}{2}, z = \frac{z_1+z_2}{2}$ formulalardan topiladi.
Demak, $x = \frac{2+3}{2} = 2.5; y = \frac{1+5}{2} = 3; z = \frac{3+4}{2} = 3.5$. Shunday qilib, $C(2.5; 3; 3.5)$.

3. $3x - 6y + 4z - 12 = 0$ tenglama bilan berilgan tekislikning koordinata o'qlaridan ajratgan kesmalari topilsin.

Yechish: Tekislikning koordinata o'qlaridan ajratgan kesmalarini topish uchun uning tenglamasini kesmalar bo'yicha tenglama ko'rinishida yozamiz.

$$3x - 6y + 4z - 12 = 0, \quad 3x - 6y + 4z = 12, \quad \frac{3x}{12} - \frac{6y}{12} + \frac{4z}{12} = 1, \quad \frac{x}{4} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1. \text{ Demak, } a = 4, b = -2, c = 3.$$

4. Ushbu $2x + y + Cz = 0$ tekislik C parametrning qanday qiymatlarida $4x + 2y + z = 0$ tekislika parallel va qanday qiymatlarida perependikulyar bo'lishini aniqlang.

Yechish: Berilgan tekisliklar uchun $A_1 = 2, B_1 = 1, C_1 = C, A_2 = 4, B_2 = 2, C_2 = 1$. Tekisliklarning parallellik shartiga asosan $\frac{2}{4} = \frac{1}{2} = \frac{C}{1}$ bo'lib, undan $C = \frac{1}{2}$ kelib chiqadi. Demak, $C = \frac{1}{2}$ bo'lganda tekisliklar parallel bo'ladi.

Ikkita tekislikning perpendikulyarlik sharti $A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$ ga asosan $2 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot C = 0$ yoki $C + 10 = 0$ bo'lib, undan

$C = -10$ kelib chiqadi. Demak, $C = -10$ bo'lganda tekisliklar perpendikulyar bo'ladi.

5. $x - 2y + 2z - 8 = 0$ va $x + z - 6 = 0$ tenglamalar bilan berilgan tekisliklar orasidagi burchak topilsin.

Yechish: Berilgan tenglamalardan $A_1 = 1, B_1 = -2, C_1 = 2, A_2 = 1, B_2 = 0, C_2 = 1$. Bularni ikki tekislik orasidagi burchakni topish formulasiga qo'yamiz:

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} = \frac{1 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + 2 \cdot 1}{\sqrt{1+4+4} \cdot \sqrt{1+1}} = \frac{3}{3 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Demak, $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Bunda esa $\varphi = 45^\circ$ kelib chiqadi.

6. $M_0(1; 2; 3)$ nuqtadan $2x - 2y + z - 3 = 0$ tekislikkacha bo'lgan masofa topilsin.

Yechish: Bizda $x_0 = 1, y_0 = 2, z_0 = 3, A = 2, B = -2, C = 1, D = -3$. Bularni nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofani topish formulasiga qo'yamiz.

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|2 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 + 1 \cdot 3 - 3|}{\sqrt{4+4+1}} = \frac{|-2|}{3} = \frac{2}{3}.$$

7. Tekislikning $2x - y + 2z - 5 = 0$ umumiy tenglamasini normal tenglama ko'rinishiga keltiring.

Yechish: Normallovchi ko'paytuvchini topamiz va uni berilgan tenglamaning har ikkala tomoniga ko'paytiramiz:

$$\mu = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{1}{\sqrt{4+1+4}} = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}; \quad \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}z - \frac{5}{3} = 0.$$

Bunda $D = -5 < 0$ bo'lgani uchun normallovchi ko'paytuvchi μ ning ishorasi musbat qilib olindi.

8. Quyidagi $M_1(0; 0; 1), M_2(0; 2; 0)$ va $M_3(3; 0; 0)$ nuqtalardan o'tuvchi tekislik tenglamasi tuzilsin.

Yechish: Berilganlarga asosan $x_1 = 0, y_1 = 0, z_1 = 1, x_2 = 0, y_2 = 2, z_2 = 0, x_3 = 3, y_3 = 0, z_3 = 0$. Bularni uch nuqta orqali o'tuvchi tekislik tenglamasini tuzish formulasiga qo'yamiz:

$$\begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z-1 \\ 0-0 & 2-0 & 0-1 \\ 3-0 & 0-0 & 0-1 \end{vmatrix} = 0, \quad -2x - 3y - 6z + 6 = 0,$$

Demak, berilgan nuqtalardan o'tuvchi tekislik tenglamasi

$$2x + 3y + 6z - 6 = 0.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. Quyidagi berilgan nuqtalar orasidagi masofa topilsin.

1) $M_1(2; 4; 3)$ va $M_2(3; -6; -8)$; 2) $M_3(-4; 0; 3)$ va $M_4(6; 0; -7)$;

3) $M_5(-2; -4; 0)$ va $M_6(4; -3; -2)$;

4) $M_7(6; -3; -5)$ va $M_8(2; -10; -4)$.

2. $A(3; 7; 6)$ va $B(2; 8; 4)$ nuqtalarni tutashtiruvchi AB kesmani $\frac{AC}{CB} = \frac{2}{3}$ nisbatda bo'luvchi C nuqtaning koordinatalarini toping.

Javob: $(\frac{13}{5}; \frac{37}{5}; \frac{26}{5})$.

3. $M(6; 8; 10)$ va $N(4; 12; -4)$ nuqtalarni birlashtiruvchi kesma o'rtasining koordinatalari topilsin.

Javob: $C(5; 10; 3)$.

4. Agar kesmaning bir uchi $A(3; 5; 7)$ nuqtaga va o'rtasi $C(5; 4; 2)$ nuqtaga bo'lsa, uning B uchini koordinatalarini toping.

Javob: $B(7; 3; -3)$.

5. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan tekisliklarning qanday joylashganini aniqlang.

1) $x + y + z - 1 = 0$; 2) $x + y - 1 = 0$; 3) $x + y + z = 0$;

4) $x + z - 3 = 0$; 5) $x - 3 = 0$.

6. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan tekisliklar yasalsin.

1) $5x - 2y + 3z - 10 = 10$; 2) $3x + 2y - z = 0$;

3) $3x + 2z = 6$; 4) $2z - 7 = 0$.

7. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan tekisliklarning koordinata o'qlaridan ajratgan kesmalari topilsin.

1) $2x + y - z + 6 = 0$; 2) $2x + 3y + 6z - 12 = 0$;

3) $3x + 2y - 4z - 24 = 0$; 4) $x + 3y - 5z - 30 = 0$.

Javob: 1) $-3; -6; 6$; 2) $6; 4; 2$; 3) $-3; -6; 6$; 4) $6; 4; 2$.

8. $2x - y + 3z - 9 = 0$; $x + 2y + 2z - 3 = 0$; $3x + y - 4z + 6 = 0$ tekisliklarning kesishish nuqtasi topilsin.

Javob: $(1; -1; 2)$.

9. $M_1(-1; -2; 0)$ va $M_2(1; 1; 2)$ nuqtalardan o'tuvchi hamda $x + 2y + 2z - 4 = 0$ tekislikka perpendikulyar bo'lgan tekislikning tenglamasi yozilsin.

Javob: $2x - 2y + z - 2 = 0$.

10. $(2; 2; -2)$ nuqtadan o'tuvchi va $x - 2y - 3z = 0$ tekislikka parallel bo'lgan tekislik tenglamasi yozilsin.

Javob: $x - 2y - 3z - 4 = 0$.

11. $A(4; 3; 0)$ nuqtadan $M_1(1; 3; 0)$, $M_2(4; -1; 2)$ va $M_3(3; 0; 1)$ nuqtalardan o'tuvchi tekislikkacha bo'lgan masofa topilsin.

Javob: $\sqrt{6}$.

12. $A(5; 1; -1)$ nuqtadan $x - 2y - 2z + 4 = 0$ tekislikkacha bo'lgan masofa topilsin.

Javob: 3.

13. $M_1(1; -1; 2)$, $M_2(2; 1; 2)$ va $M_3(1; 1; 4)$ nuqtalardan o'tuvchi tekislikning tenglamasi tuzilsin.

Javob: $2x - y + z - 5 = 0$.

14. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan tekisliklar orasidagi burchak topilsin.

1) $x + 2z - 6 = 0$ va $x + 2y - 4 = 0$;

2) $4x - 5y + 3z - 1 = 0$ va $x - 4y - z + 9 = 0$;

3) $3x - y + 2z + 15 = 0$ va $6x + 9y - 3z - 1 = 0$;

4) $6x + 2y - 4z + 17 = 0$ va $9x + 3y - 6z - 4 = 0$;

Javob: $78^\circ 30'$; $\arccos 0,7$; tekisliklar o'zaro parallel; tekisliklar o'zaro perpendikulyar.

15. $kx - 2y + 5z + 10 = 0$ va $6x - (1 + k)y + 10z - 2 = 0$ tekisliklar k parametrning qanday qiymatida parallel bo'ladi?

Javob: 3.

16. $4x + 3y - 5z - 8 = 0$ va $4x + 3y - 5z + 12 = 0$ parallel tekisliklar orasidagi masofa topilsin.

Javob: $2\sqrt{2}$.

17. $A(0; 0; 0)$ nuqtadan $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ tekislikkacha bo'lgan masofa topilsin.


Javob: $\frac{12}{\sqrt{61}}$.

§2. Fazoda to'g'ri chiziq tenglamalari

$A(a; b; c)$ nuqtadan o'tuvchi va $P(m; n; p)$ vektorga parallel bo'lgan to'g'ri chiziqning tenglamasi

$$\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$$

ko'rinishda bo'lib, unga to'g'ri chiziqning kanonik tenglamasi deyiladi. $P\{m; n; p\}$ vektor to'g'ri chiziqning yo'naltiruvchi vektori deyiladi (1-chizma).



Kanonik tenglamadagi har bir nisbatni t parametrga tenglab, to'g'ri chiziqning quyidagi

$$\begin{cases} x = mt + a, \\ y = nt + b, \\ z = pt + c \end{cases}$$

tenglamasini hosil qilamiz. Bu tenglamaga to'g'ri chiziqning parametrik tenglamasi deyiladi.

Fazodagi ikkita $A(x_1; y_1; z_1)$ va $B(x_2; y_2; z_2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

formuladan tuziladi.

Fazodagi to'g'ri chiziqni ikkita tekislikning kesishish chizig'i sifatida ham qarash mumkin. U holda bu chiziq tenglamasi

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

ko'rinishda bo'lib, unga fazodagi to'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi deyiladi.

Oxirgi sistemadan bir marta x ni, bir marta y ni yo'qotib va ba'zi bir bog'lanishlarni qilib,

$$\begin{cases} x = mz + a, \\ y = nz + b \end{cases}$$

ni hosil qilamiz. Bu tenglamaga to'g'ri chiziqning proeksiyalar bo'yicha tenglamasi deyiladi. Undan osongina

$$\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-0}{p}$$

kanonik tenglamani keltirib chiqarish mumkin.

$$\frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1} \text{ va } \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$$

to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak

$$\cos \varphi = \frac{m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

formuladan topiladi.

Agar berilgan to'g'ri chiziqlar parallel bo'lsa, u holda

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

shart, ular perpendikulyar bo'lsa

$$m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$$

shart bajariladi. Bu shartlarga fazodagi to'g'ri chiziqlarning parallel va perpendikulyarlik shartlari deyiladi.

$M(x_1, y_1, z_1)$ nuqtadan $\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$ to'g'ri chiziqqacha masofa

$$\rho^2 = \frac{\left| \frac{x_1-a}{m} - \frac{y_1-b}{n} \right|^2 + \left| \frac{y_1-b}{n} - \frac{z_1-c}{p} \right|^2 + \left| \frac{z_1-c}{p} - \frac{x_1-a}{m} \right|^2}{m^2 + n^2 + p^2}$$

formula yordamida topiladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Umumiy tenglamasi

$$\begin{cases} 2x + y - z + 1 = 0, \\ 3x - y + 2z - 3 = 0 \end{cases}$$

bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasini kanonik tenglama ko'rinishida yozilsin.

Yechish: Berilgan sistemani quyidagicha o'zgartiramiz:

$$\begin{cases} 2x + y = z - 1 \\ 3x - y = 3 - 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5x = 2 - z \\ 5y = 7z - 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{5}z + \frac{2}{5} \\ y = \frac{7}{5}z - \frac{9}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = \frac{x-0.4}{-0.2} \\ z = \frac{y+2.2}{1.4} \end{cases}$$

$$\frac{x-0.4}{-0.2} = \frac{y+2.2}{1.4} = \frac{z}{1}$$

2. $M_1(5; -1; 2)$ va $M_2(-3; 6; 4)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqli tenglamasi tuzilsin.

Yechish: Berilganlarga ko'ra $x_1 = 5, x_2 = -3, y_1 = -1, y_2 = 6, z_1 = 2$ va $z_2 = 4$. Bularni berilgan ikkita nuqta orqali o'tuvchi to'g'ri chiziqli tenglamasini tuzish formulasiga qo'yamiz:

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1} \Rightarrow \frac{x-5}{-3-5} = \frac{y+1}{6+1} = \frac{z-2}{4-2} \Rightarrow \frac{x-5}{-8} = \frac{y+1}{7} = \frac{z-2}{2}$$

3. Kanonik tenglamalari

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-0}{-4} = \frac{z+3}{1} \text{ va } \frac{x}{2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{-1}$$

bo'lgan to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak topilsin.

Yechish: Berilganlarga asosan $m_1 = 1, m_2 = 2, n_1 = -4, n_2 = -2, p_1 = 1$ va $p_2 = -1$. Bularni ikki to'g'ri chiziqli orasidagi burchakni topish formulasiga qo'yamiz:

$$\cos \varphi = \frac{m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}} = \frac{1 \cdot 2 + (-4) \cdot (-2) + 1 \cdot (-1)}{\sqrt{1+16+1} \cdot \sqrt{4+4+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \varphi = 45^\circ$$

4. Kanonik tenglamalari

$$\frac{x-1}{-3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-4}{4} \text{ va } \frac{x-5}{6} = \frac{y}{5} = \frac{z+7}{2}$$

bo'lgan to'g'ri chiziqlarni o'zaro perpendikulyar ekanligini isbotlang.

Isbot: Berilganlarga asosan, $m_1 = -3, m_2 = 6, n_1 = 2, n_2 = 5, p_1 = 4$ va $p_2 = 2$. Bularni ikki to'g'ri chiziqli perpendikulyarlik shartiga qo'yamiz:

$$m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0 \Rightarrow -3 \cdot 6 + 2 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = -18 + 10 + 8 = 0. \text{ Demak, to'g'ri chiziqlar o'zaro perpendikulyar.}$$

5. Kanonik tenglamalari

$$\frac{x-1}{-6} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-4}{8} \text{ va } \frac{x-5}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z+7}{4}$$

bo'lgan to'g'ri chiziqlarning o'zaro parallel ekanligi isbotlansin.

Isbot: Berilganlarga asosan, $m_1 = -6, m_2 = -3, n_1 = 4, n_2 = 2, p_1 = 0$ va $p_2 = 4$. Bularni to'g'ri chiziqlarning parallel shartiga qo'yamiz:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{-6}{-3} = 2, \frac{n_1}{n_2} = \frac{4}{2} = 2, \frac{p_1}{p_2} = \frac{0}{4} = 0$$

Demak, $\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2} = 2$. Ya'ni parallel sharti bajarilyapti.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z - 13 = 0, \\ 3x + y + 4z - 14 = 0. \end{cases}$$

to'g'ri chiziqli tenglamasi: 1) proeksiya bo'yicha; 2) kanonik ko'rinishda yozilsin.

Yechish: Berilgan sistemadan dastlab y ni yo'qotamiz. Buning uchun sistemaning ikkinchi tenglamasini har ikkala qismini hadma-had -2 ga ko'paytiramiz va birinchi tenglamaga qo'shamiz.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z - 13 = 0, \\ 3x + y + 4z - 14 = 0. \end{cases} \cdot (-2) : \begin{cases} x + 2y + 3z - 13 = 0, \\ -6x - 2y - 8z + 28 = 0 \end{cases}$$

$$-5x - 5z + 15 = 0, \quad x + z - 3 = 0$$

Undan esa $x = -z + 3$ ni hosil qilamiz.

Navbatda x ni yo'qotish uchun sistemaning birinchi tenglamasini har ikkala qismini hadma-had -3 ga ko'paytiramiz va ikkinchi tenglamaga qo'shamiz.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z - 13 = 0 \\ 3x + y + 4z - 14 = 0 \end{cases} \cdot (-3) : \begin{cases} -3x - 6y - 9z + 39 = 0 \\ 3x + y + 4z - 14 = 0 \end{cases}$$

$$-5y - 5z + 25 = 0, \quad y + z - 5 = 0$$

Bundan $y = -z + 5$ hosil qilamiz. Shunday qilib, biz Quyidagi proeksiyalar bo'yiga tenglamani hosil qilamiz.

$$\begin{cases} x = -z + 3 \\ y = -z + 5 \end{cases}$$

2) Berilgan tenglamani kanonik ko'rinishga keltirish uchun oxirgi sistemaning har bir tenglamasidan z ni aniqlaymiz. Ular $z = -x + 3$ va $z = -y + 5$ lardan iborat. Shunday qilib, biz $-x + 3 = -y + 5 = z$ yoki $\frac{x-3}{-1} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-0}{1}$ tenglamani hosil qildik. Bu tenglamani

$$\frac{-5}{1} = \frac{z}{-1} \text{ ko'rinishda ham yozish mumkin.}$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. Quyidagi nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqlarning tenglamalari tuzilsin.

$$M_1(3;-1;4) \text{ va } M_2(1;1;2); \quad M_3(2;4;6) \text{ va } M_4(3;-2;-4); \\ M_5(2;6;8) \text{ va } M_6(3;7;-2); \quad M_7(-4;-2;3) \text{ va } M_8(2;-4;-7).$$

2. Kanonik tenglamalari.

$$\frac{x-1}{a} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z+4}{\sqrt{2}} \text{ va } \frac{x+2}{2} = \frac{y+13}{a} = \frac{z-6}{\sqrt{2}}$$

bo'lgan to'g'ri chiziqlar a parametrning qanday qiymatida o'zaro perpendikulyar bo'ladi?

Javob: 2.

3. $M_1(3;-1;4)$ va $M_2(2;3;6)$; nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqlarning parametrlil tenglamasi tuzilsin.

$$\text{Javob: } \begin{cases} x = -t + 3 \\ y = 4t - 1 \\ z = 2t + 4 \end{cases}$$

4. $M(3;2;5)$ nuqtadan o'tuvchi va $N\{5;1;7\}$ vektorga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

$$\text{Javob: } \frac{x-3}{5} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{7}.$$

5. $M(5;1;7)$ nuqta orqali o'tuvchi va $3x + 2y + 5z = 0$ tekislikka perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

$$\text{Javob: } \frac{x-5}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-7}{5}.$$

6. $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{1}$ to'g'ri chiziqlarning $x = z + 1, y = 1 - z$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar ekanligi ko'rsatilsin.

7. $M(-4;3;0)$ nuqtadan o'tuvchi va

$$\begin{cases} x - 2y + z - 4 = 0 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$$

to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

$$\text{Javob: } \frac{x+4}{1} = \frac{y-3}{3} = \frac{z}{5}.$$

8. $M(2;-3;4)$ nuqtadan Oz o'qqa tushirilgan perpendikulyarning tenglamasi yozilsin.

$$\text{Javob: } 3x + 2y = 0, z = 4.$$

9. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{2}$ va $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{2}$ parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi masofa topilsin.

$$\text{Javob: } \frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

$$10. \begin{cases} 2x + y + 8z - 16 = 0, \\ x - 2y - z + 2 = 0. \end{cases}$$

to'g'ri chiziq tenglamasi: 1) proektsiyalari bo'yicha; 2) kanonik ko'rinishda yozilsin.

$$\text{Javob: } 1) x = 6 - 3z, y = -2z + 4, 2) \frac{x-6}{-3} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z}{1}$$

$$11. \begin{cases} 2x - y - 7 = 0 \\ 2x - z + 5 = 0 \end{cases} \text{ va } \begin{cases} 3x - 2y + 8 = 0 \\ z = 3x \end{cases}$$

to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak topilsin.

$$\text{Javob: } \cos \varphi = \frac{20}{21}.$$

12. $M(2;-1;3)$ nuqtadan $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{5}$ to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa topilsin.

$$\text{Javob: } 0,3\sqrt{38}.$$

13. $A(0;0;0)$ nuqtadan $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$ to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa topilsin.

$$\text{Javob: } \rho = \sqrt{\frac{3}{7}}.$$

14. $M(3;0;4)$ nuqtadan $y = 2x + 1, z = 2x$ to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa topilsin.

$$\text{Javob: } d = \sqrt{17}.$$

§3. To'g'ri chiziq va tekislik orasidagi munosabatlar

$\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$ to'g'ri chiziq bilan $Ax + By + Cz + D = 0$ tekislik orasidagi burchak:

$$\sin \alpha = \frac{|Am+Bn+Cp|}{NP} = \frac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2} \cdot \sqrt{m^2+n^2+p^2}}.$$

Ularining parallellik sharti;

$$Am + Bn + Cp = 0.$$

Ularining perpendikulyarlik sharti;

$$\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}.$$

To'g'ri chiziq bilan tekislikning kesishish nuqtasini topish uchun to'g'ri chiziq tenglamasini $x = mt + a, y = nt + b, z = pt + c$ parametrik ko'rinishda yozib, tekislikning $Ax + By + Cz + D = 0$ tenglamasidagi x, y, z larning o'rniga ularning t ga nisbatan yozilgan ifodalarini qo'yamiz. Hosil bo'lgan tenglamadan t_0 ni, so'ngra kesishgan nuqta koordinatalari x_0, y_0, z_0 ni topamiz.

$M(x_1; y_1; z_1)$ nuqta va $\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$ to'g'ri chiziqdan o'tgan tekislik tenglamasi

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ a-x_1 & b-y_1 & c-z_1 \\ m & n & p \end{vmatrix} = 0$$

dan topiladi.

$\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$ to'g'ri chiziqdan o'tib $Ax + By + Cz + D = 0$ tekislikka perpendikulyar bo'lgan tekislik tenglamasi

$$\begin{vmatrix} x-a & y-b & z-c \\ m & n & p \\ A & B & C \end{vmatrix} = 0$$

formula yordamida tuziladi. Berilgan $M_1(x_1; y_1; z_1)$ nuqtadan o'tib, berilgan $Ax + By + Cz + D = 0$ tekislikka perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi

$$\frac{x-x_1}{A} = \frac{y-y_1}{B} = \frac{z-z_1}{C}$$

dan iborat bo'ladi.

Berilgan $M_1(x_1; y_1; z_1)$ nuqtadan o'tib, berilgan $\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan tekislik tenglamasi

$$m(x-x_1) + n(y-y_1) + p(z-z_1) = 0$$

formula yordamida tuziladi.

Fazodagi ikkita $\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$ va $\frac{x-a_1}{m_1} = \frac{y-b_1}{n_1} = \frac{z-c_1}{p_1}$ to'g'ri

chiziqlarning bir tekislikda yotish sharti

$$\begin{vmatrix} a-a_1 & b-b_1 & c-c_1 \\ m & n & p \\ m_1 & n_1 & p_1 \end{vmatrix} = 0 \text{ dan iborat.}$$

Masluga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-2}$ to'g'ri chiziq bilan $2x + y - 2z - 6 = 0$ tekislik orasidagi burchak topilsin.

Yechish: Berilganlarga asosan $A = 2, B = 1, C = -2, m = 1, n = 2$ va $p = -2$. Bularni to'g'ri chiziq bilan tekislik orasidagi burchakni topish formulasiga qo'yamiz;

$$\sin \alpha = \frac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2} \cdot \sqrt{m^2+n^2+p^2}} = \frac{|2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-2) \cdot (-2)|}{\sqrt{4+1+4} \cdot \sqrt{1+4+4}} = \frac{8}{3 \cdot 3} = \frac{8}{9}.$$

Bundan $\varphi = \arcsin \frac{8}{9}$ kelib chiqadi.

2. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{3}$ to'g'ri chiziqni $2x + y - z = 0$ tekislikka parallel ekanligi isbotlansin.

Isbot: Berilganlarga asosan, $m = 2, n = -1, p = 3, A = 2, B = 1, C = -1$. Bularni to'g'ri chiziq bilan tekislikning parallellik shartiga qo'yamiz: Ya'ni,

$$Am + Bn + Cp = 0 \Rightarrow 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 = 0 \Rightarrow 4 - 1 - 3 = 0$$

3. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{n} = \frac{z+3}{-2}$ kanonik tenglamadagi n parametr qanday qiymat qabul qilganda, u umumiy tenglamsi $x - 3y + 6z + 7 = 0$ bo'lgan tekislikka parallel bo'ladi?

Yechish: Bizda $m = 3, n = n, p = -2, A = 1, B = -3, C = 6$. Bularni to'g'ri chiziq bilan tekislikning parallellik shartiga qo'yamiz:

$$Am + Bn + Cp = 0 \Rightarrow 1 \cdot 3 + (-3) \cdot n + 6 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow 3 - 3n -$$

$$-12 = 0 \Rightarrow -3n - 9 = 0 \Rightarrow n = -3.$$

4. $\frac{x-2}{m} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{-3}$ to'g'ri chiziq bilan $3x - 2y + cz + 1 = 0$ tekislik o'zaro perpendikulyar bo'lishi uchun c parametr qanday bo'lishi kerak?

Yechish: Berilganlarga asosan, $m = m, n = 4, p = -3, A = 3, B = -2, C = c$. Bularni to'g'ri chiziq bilan tekislikning perpendikulyarlik sharti

$$\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$$

ga qo'yamiz. U holda, $\frac{3}{m} = \frac{-2}{4} = \frac{c}{-3} \Rightarrow m = -6, C = \frac{3}{2}$.

Javob: $\frac{3}{2}$.

5. $M(1; 1; 1)$ nuqtadan va $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-7}{2}$ to'g'ri chiziqdan o'tgan tekislikning tenglamasi tuzilsin.

Yechish: Berilgan nuqta va tekislikdan o'tuvchi tekislikning tenglamasini tuzish formulasidan foydalanamiz.

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ a-x_1 & b-y_1 & c-z_1 \\ m & n & p \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 2-1 & 3-1 & 7-1 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 1 & 2 & 6 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 0,$$

$$4(x-1) + 5(z-1) + 18(y-1) - 6(z-1) - 30(x-1) -$$

$$-2(y-1) = 0, \quad 4x - 4 + 5z - 5 + 18y - 18 - 6z + 6 - 30x + 30 - 2y + 2 = 0,$$

$$-26x + 16y - z + 11 = 0, \quad 26x - 16y + z - 11 = 0.$$

6. $M_1(-2; 1; -5)$ nuqtadan o'tib, $3x - 4y + 6z + 1 = 0$ tekislikka perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziqning tenglamasi tuzilsin.

Yechish: $M_1(x_1; y_1; z_1)$ nuqtadan o'tib, berilgan $Ax + By + Cz + D = 0$ tekislikka perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasini tuzish formulasini $\frac{x-x_1}{A} = \frac{y-y_1}{B} = \frac{z-z_1}{C}$ dan foydalanamiz. Bizda $x_1 = -2, y_1 = 1, z_1 = -5, A = 3, B = -4, C = 6$ bo'lganligi uchun $\frac{x-(-2)}{3} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z-(-5)}{6}, \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+5}{6}$.

7. $M(5; 7; 4)$ nuqtadan o'tib, $\frac{x-3}{6} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-8}{3}$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan tekislik tenglamasi tuzilsin.

Yechish: Berilgan $M_1(x_1; y_1; z_1)$ nuqtadan o'tib, berilgan $\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan tekislik tenglamasini

tuzish formulasini $m(x-x_1) + n(y-y_1) + p(z-z_1) = 0$ dan foydalanamiz. Bizda $m = 6, n = 2, p = 3, x_1 = 5, y_1 = 7, z_1 = 4$ bo'lganligi uchun $6(x-5) + 2(y-7) + 3(z-4) = 0$ yoki $6x + 2y + 3z - 56 = 0$ bo'ladi.

8. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{2}$ to'g'ri chiziqdan o'tuvchi va $2x + 3y - z = 4$ tekislikka perpendikulyar tekislikning tenglamasi yozilsin.

Yechish: Berilgan to'g'ri chiziqdan o'tib, berilgan tekislikka perpendikulyar bo'lgan tekislikning tenglamasini tuzish formulasidan foydalanamiz. Bizda $m = 1, n = 2, p = 2, A = 2, B = 3, C = -1, a = 1, b = -1, c = -2$ bo'lgani uchun

$$\begin{vmatrix} x-a & y-b & z-c \\ m & n & p \\ A & B & C \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z+2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$-2(x-1) + 3(z+2) + 4(y+1) - 4(z+2) - 6(x-1) + y+1 = 0,$$

$$-2x + 2 + 3z + 6 + 4y + 4 - 4z - 8 - 6x + 6 + y + 1 = 0,$$

$$-8x + 5y - z + 11 = 0, \quad 8x - 5y + z - 11 = 0.$$

9. $\frac{x-2}{5} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-6}{4}$ va $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-5}{6}$ to'g'ri chiziqlar bir tekislikda yotadimi?

Yechish: Fazodagi ikki to'g'ri chiziqning bir tekislikda yotish shartini bajarilish yoki bajarilmasligini tekshiramiz. Bizda $a = 2, b = 3, c = 6, a_1 = 3, b_1 = 1, c_1 = 5, m = 5, n = 2, p = 4, m_1 = 2, n_1 = 3, p_1 = 6$ bo'lganligi uchun

$$\begin{vmatrix} a-a_1 & b-b_1 & c-c_1 \\ m & n & p \\ m_1 & n_1 & p_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-3 & 3-1 & 6-5 \\ 5 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 6 \end{vmatrix} =$$

$$-12 + 15 + 16 - 4 + 12 - 60 = -33. \quad -33 \neq 0.$$

Demak, berilgan ikki to'g'ri chiziq bir tekislikda yotmaydi.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. $\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+3}{\sqrt{2}}$ to'g'ri chiziq bilan $x + y + \sqrt{2}z - 4 = 0$ tekislik orasidagi burchak topilsin.

Javob: 30°

2. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{\sqrt{2}} = \frac{z-1}{1}$ to'g'ri chiziq bilan $x + y\sqrt{2} - z + 1 = 0$ tekislik orasidagi burchak topilsin.

Javob: 30°

3. $x = 1 + t, y = -1 - 2t, z = 6t$ to'g'ri chiziq bilan $2x + 3y + z - 1 = 0$ tekislikning kesishish nuqtasi topilsin.

Javob: $M_0(2; -3; 6)$

4. $\frac{x-3}{2} = \frac{y-5}{-3} = \frac{z+2}{-2}$ to'g'ri chiziq va $Ax + By + 3z - 5 = 0$ tekislik o'zaro perpendikulyar bo'lishi uchun A va B qanday qiymatlarni qabul qilishi kerak?

Javob: $A = -3, B = 4,5$.

5. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{n} = \frac{z+3}{-2}$ to'g'ri chiziq $x - 3y + 6z + 2 = 0$ tekislikka parallel bo'lishi uchun n parametr qanday qiymat qabul qilishi kerak?

Javob: -3.

6. $M_0(2; 5; -7)$ nuqtadan o'tuvchi va $\frac{x-3}{5} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{7}$ to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

Javob: $\frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+7}{-1}$.

7. $M_0(5; 1; 7)$ nuqtadan o'tuvchi va $3x + 2y + 5z = 0$ tekislikka perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziqning tenglamasi yozilsin.

Javob: $\frac{x-5}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-7}{5}$.

8. $\frac{x-3}{5} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{7}$ to'g'ri chiziq bilan $x + y - z + 3 = 0$ tekislikning kesishish nuqtasi topilsin.

Javob: $M_0(18; 5; 26)$.

9. $A(2; 1; 0)$ nuqtadan $x = 3z - 1; y = 2z$ to'g'ri chiziqqa tushirilgan perpendikulyarning tenglamasi yozilsin.

Javob: $\frac{x-2}{-9} = \frac{y-1}{8} = \frac{z}{11}$.

10. $\frac{x+3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{1}$ va $\begin{cases} x = 3z - 4 \\ y = z + 2 \end{cases}$ to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi topilsin.

Javob: $(-1; 3; 1)$.

11. $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$ to'g'ri chiziqning $x + 2y + 3z - 29 = 0$ tekislik bilan kesishgan nuqtasi topilsin.

Javob: $M_0(6; 4; 5)$.

12. $y = 3x - 1, z = -3x + 2$ to'g'ri chiziq bilan $x + y + z - 4 = 0$ tekislik orasidagi burchak topilsin.

Javob: $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{6}}$.

§ 4. Ikkinchi tartibli sirtlar


$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Kz + L = 0$ tenglamaga ikkinchi tartibli sirtlarning umumiy tenglamasi deyiladi. Bu yerda $A^2 + B^2 + C^2 + D^2 + E^2 + F^2 \neq 0$. Agar bu tenglamaning chap tomonini $F(x, y, z)$ orqali belgilasak, u holda uni $F(x, y, z) = 0$ ko'rinishida yozish mumkin.

Agar ikkinchi tartibli sirt tenglamasi $F(x, y, z) = 0$ da o'zgaruvchilardan birortasi qatnashmasa, bunday sirt silindrik sirtni ifodalaydi. Masalan, $F(x, y) = 0$ silindrik sirtni ifodalaydi. Uni geometrik tasvirlash uchun $F(x, y) = 0$ ning grafigi chizilib, uning har bir nuqtasidan oz o'qiga perpendikulyar chiziq o'tkaziladi. $F(x, y) = 0$ tenglama ko'rinishiga qarab ikkinchi tartibli silindrik sirtlar quyidagi turlarga bo'linadi:

1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ tenglama bilan aniqlangan sirt eliptik silindr deyiladi (1-chizma).

2. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ tenglama bilan aniqlangan sirt giperbolik silindr deyiladi (2-chizma).

3. $y^2 = 2px$ tenglama bilan aniqlangan sirt parabolik silindr deyiladi (3-chizma).



1-chizma


2-chizma

3-chizma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

tenglama bilan aniqlangan sirt konus deb ataladi.

Agar $P_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqta konusga tegishli bo'lsa, u holda shu nuqtadan o'tuvchi $x = x_0 t$, $y = y_0 t$, $z = z_0 t$ ($t \in R$) to'g'ri chiziqli ham konusga tegishli bo'ladi (4-chizma).



4-chizma

Odatda bu chiziqlar konus yasovchilari deyiladi.

Agar konusni $z = h$ tekislik bilan kessak, kesimda $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2}$ ellips hosil bo'ladi.

Konusni $x = h$ yoki $y = h$ tekisliklar bilan kesish yordamida kesimda giperbolalar hosil bo'ladi.

Fazodagi $M(a, b, c)$ nuqtadan bir xil r uzoqlikda joylashgan nuqtalarning geometrik o'rni sfera deyiladi. Bunda M nuqta sferaning markazi r esa sferaning radiusidir.


Sfera ta'rifiga asosan,

$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$ tenglamani hosil qilamiz. Bu markazi $M(a, b, c)$ nuqtada radiusi r ga teng bo'lgan sfera tenglamasidir. Agar sfera markazi koordinatalar boshida bo'lsa, ya'ni $a = b = c = 0$ bo'lsa u holda uning tenglamasi $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ ko'rinishda bo'ladi.

Sferani o'zaro perpendikulyar uchta yo'nalish bo'yicha tekis deformatsiyalash (cho'zish yoki siqish) natijasida hosil bo'lgan sirt ellipsoid deyiladi va uning tenglamasi

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

ko'rinishda bo'ladi. Bu tenglama ellipsoidning kanonik tenglamasi deyiladi. a, b, c sonlar ellipsoidning yarim o'qlari deyiladi (5-chizma).



5-chizma

Ellipsoid koordinata o'qlariga nisbatan simmetrikdir.

Ellipsoid Ox o'qini $(a; 0; 0)$ va $(-a; 0; 0)$ nuqtalarda, Oy o'qini $(0; b; 0)$ va $(0; -b; 0)$ nuqtalarda Oz o'qini $(0; 0; c)$ va $(0; 0; -c)$ nuqtalarda kesadi. Ellipsoidning $z = h$ tekislik bilan kesishmasi ellips bo'lib, uning tenglamasi

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}$$

ko'rinishda bo'ladi.

Oxz tengsizlikda $x^2 = 2pz$, $y = 0$ tenglama bilan berilgan parabolani Oz o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan sirt paraboloid deyiladi (6-chizma).

$x^2 + y^2 = 2pz$ tenglama paraboloidning kanonik tenglamasi deyiladi.


$2z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ tenglama bilan aniqlangan sirt elliptik paraboloid deyiladi.

$2z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ tenglama bilan berilgan sirtga giperbolik paraboloid deb ataladi.

$x^2 + y^2 = 2pz$ tenglama bilan berilgan aylanma paraboloid Oz o'qiga nisbatan simmetrikdir.

$2z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ elliptik paraboloidni $z = h > 0$ tekislik bilan kesish natijasida kesimda $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2h$ ellips hosil bo'ladi.

$2z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ giperbolik paraboloidni $z = h$ tekislik bilan kesilsa, kesimda $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2h$ giperbola hosil bo'ladi.



6-chizma

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ tenglama bilan aniqlangan sirt bir pallali giperboloid deb ataladi. Bu yerda a, b, c giperboloidning yarim o'qlaridir.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

tenglama bilan aniqlangan sirt ikki pallali giperboloid deb ataladi.

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ tenglama bilan berilgan bir pallali giperboloidni $z = h$ tekisligi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} + 1$ ellips bo'ylab kesadi.

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ giperbolani Oxz tekislikda Oz o'qi atrofida aylantirishdan $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ giperboloid hosil boladi.


$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ tenglama bilan berilgan bir pallali giperboloidni $y = |h| \neq b$ tekislik bilan kesish najasida giperbola hosil bo'ladi.

$y = |h| = b$ bo'lsa, u holda kesimda $\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 0$ va $\frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 0$ to'g'ri chiziqlar hosil bo'ladi.

Bir pallali giperboloidning har bir nuqtasidan ikkita to'g'ri chiziq o'tadi. Odatda, bu to'g'ri chiziqlar giperboloidning yasovchilari deyiladi (7-chizma).



7-chizma



8-chizma

Ikki pallali giperboloidni $z = h$ tekislik bilan kesish natijasida kesimda

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1$$

ellips hosil bo'ladi (8-chizma).

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Markazi $C(2; -5; 1)$ nuqtada radiusi $R = 3$ bo'lgan sfera tenglamasi yozilsin.

Yechish: C nuqtaning koordinatalari va radiusining qiymatini sferaning kanonik tenglamasi $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ ga qo'yamiz.

Bizda $a = 2, b = -5, c = 1$ va $R = 3$. Demak
 $(x-2)^2 + (y-(-5))^2 + (z-1)^2 = 3^2 \Rightarrow$
 $\Rightarrow (x-2)^2 + (y+5)^2 + (z-1)^2 = 9.$

2. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$ tenglama sfera tenglamasi ekanligi isbotlansin.

Isbot: Berilgan tenglamaning chap tomonini quyidagicha o'zgartiramiz:

$x^2 - 2x + 1 - 1 + y^2 + 4y + 4 - 4 + z^2 - 6z + 9 - 9 + 5 = 0$
 yoki $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 3^2$. Bu tenglama markazi $C(1; -2; 3)$ nuqtada va radiusi $R = 3$ bo'lgan sferaning kanonik tenglamasidir.

3. Birinchi sirt markazi $C(-1; -1; 0)$ nuqtada va radiusi $R_1 = 5$ ga, ikkinchi sirt markazi $C(1; 1; 3)$ nuqtada va radiusi $R_2 = 4$ ga teng bo'lgan sferadan iborat. Uchinchi sirt esa Oxz tekisligidan 3 birlik masofada yotadi va Oxy tekisligiga parallel. Bu sirlarning kesishish nuqtalari topilsin.

Yechish: Berilgan masala

$$\begin{cases} (x+1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 25, \\ (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 16, \\ z = 3 \end{cases}$$

sistemani yechishga keltiriladi. Dastlabki ikkita tenglamaga $z = 3$ ni qo'yib,

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2x + 2y = 14, \\ x^2 + y^2 - 2x - 2y = 14 \end{cases} \text{ ni hosil qilamiz. Sistemani birinchi}$$

tenglamasidan ikkinchi tenglamasini hadma-had ayirib, $x + y = 0$ tenglamani va birinchi tenglamasiga ikkinchi tenglamasini hadma-had qo'shib, $x^2 + y^2 = 14$ tenglamani hosil qilamiz. Hosil bo'lgan tenglamalarni yechib, ikkita $(\sqrt{7}; -\sqrt{7}; 3)$ va $(-\sqrt{7}; \sqrt{7}; 3)$ nuqtalarni topamiz.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. $x^2 + y^2 + z^2 - 3x + 5y - 4z = 0$ va $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ tenglamalar bilan berilgan sferalarning markazi va radiusi topilsin.

Javob: 1) $C(1,5; -2,5; 2), R = 3,5$; 2) $C(0; 0; a), R = a$

2. $3x - 2y + 6z - 18 = 0, x = 0, y = 0, z = 0$ tekisliklardan hosil bo'lgan tetraedrning ichiga chizilgan sferik sirtning tenglamasi yozilsin.

Javob: $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 1.$

3. $B(-4; 0; 0)$ nuqtaga nisbatan $A(2; 0; 0)$ nuqtaga ikki marta yaqinroq bo'lgan nuqtalar geometrik o'rnini tenglamasi yozilsin.

Javob: $x^2 + y^2 + z^2 = 8x.$

4. $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = a \end{cases}$ aylanadan va $(a; a; a)$ nuqtadan o'tuvchi sferik sirtning tenglamasi yozilsin.

Javob: $x^2 + y^2 + z^2 - a(x + y + z) = 0.$

5. $x = a, y = 0$ to'g'ri chiziqdan va yOz tekisligidan teng uzoqlashgan nuqtalar geometrik o'rnining tenglamasi yozilsin.

Javob: $y^2 = 2ax - x^2.$

6. $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax = 0$ sfera tashqarisida chizilgan, yasovchilari mos ravishda: 1) Ox o'qqa; 2) Oy o'qqa; 3) Oz o'qqa parallel uchta silindrik sirtning tenglamalari tuzilsin.

Javob: 1) $x^2 + y^2 = 2ax$; 2) $x^2 + z^2 = 2ax$; 3) $y^2 + z^2 = a^2$

7. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + y - 3z = 0$ sirtning markazi C dan o'tuvchi va OC to'g'ri chiziqqa perpendikulyar tekislikning tenglamasi yozilsin.

Javob: $2x - y + 3z - 7 = 0.$

8. $(0; -3; 0)$ nuqtaga nisbatan koordinatalar boshidan ikki barobar uzoqroq bo'lgan nuqtalar geometrik o'rnining tenglamasi yozilsin.

Javob: $x^2 + (y+4)^2 + z^2 = 4.$

9. Uchi koordinatalar boshida va yo'naltiruvchisi $x^2 + y^2 = a^2, z = c$ dan iborat konus sirt tenglamasi yozilsin.

Javob: $\frac{x^2 + y^2}{a^2} = \frac{z^2}{c^2}.$

10. $x^2 + (y-a)^2 - z^2 = 0$ konusning uchi va uning $z = a$ tekislikdagi yo'naltiruvchisi aniqlansin.

Javob: $(0; a; 0)$, yo'naltiruvchi aylana $z = a, x^2 + (y - a)^2 = a^2$.

11. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{c^2} = 1, y = 0$ ellipsning Oz o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirtning tenglamasi yozilsin.

Javob: $\frac{x^2+y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

12. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{25} = 1$ sirt yasalsin va uning: 1) $z = 3$, 2) $y = 1$ tekisliklar bilan kesimlarining yuzlari topilsin.

Javob: a) $3,84\pi$; b) $\frac{45}{4}\pi$.

13. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, y = 0$ egri chiziqning: a) Oz o'q; b) Ox o'q atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt tenglamasi yozilsin.

Javob: a) $\frac{x^2+y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (bir pallali giperboloid), $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2+z^2}{b^2} = 1$ (ikki pallali giperboloid).

14. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{36} = 1$ giperboloid yasalsin va uning $(4; 1; -3)$ nuqtadan o'tuvchi yasovchilari topilsin.

Javob: $\begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{z}{6} = \frac{1}{3}(1 + \frac{y}{2}) \\ \frac{x}{4} - \frac{z}{6} = 3(1 - \frac{y}{2}) \end{cases}$ va $\begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{z}{6} = 1 - \frac{y}{2} \\ \frac{x}{4} - \frac{z}{6} = 1 + \frac{y}{2} \end{cases}$

15. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} - \frac{3z^2}{25} = 1$ giperboloidning eng kichik doiraviy kesimlari topilsin.

Javob: $2y = \pm 3z$.

16. $z = \frac{3a}{2}$ tekislikdan va $F(0; 0; \frac{a}{2})$ nuqtadan teng uzoqlashgan nuqtalar geometrik o'rining tenglamasi yozilsin.

Javob: $z = a - \frac{x^2+y^2}{2a}$.

17. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = z$ elliptik paraboloidning koordinatalar boshidan o'tuvchi doiraviy kesimlari aniqlansin.

Javob: $4y = \pm 3z$.

§ 5. Vektorlar va ular ustida amallar. Vektorlarning skalyar ko'paytmasi

Sonli qiymatlari bilan to'liq aniqlanadigan kattaliklar skalyar kattaliklar deb ataladi.

Ham sonli qiymati, ham yo'nalishi bilan aniqlanadigan kattaliklar vektor kattaliklar deyiladi.

Skalyar kattaliklar $a, b, c, \dots$ kabi harflar bilan, vektor kattaliklar $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ yoki bu harflarni qalin bo'yalganlari $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots$ bilan belgilanadi.

Geometrik nuqtayi nazardan vektorlar yo'naltirilgan kesmalar singari qaraladi. Boshi A nuqtada va oxiri B nuqtada bo'lgan yo'naltirilgan kesma bilan aniqlanadigan vektor $\overrightarrow{AB}$ kabi belgilanadi. Bunda A nuqta vektorning boshi, B nuqta esa vektorning uchi (oxiri) deyiladi. Bu yerda AB kesmaning uzunligi vektorning modulini ifodalaydi, ya'ni $|AB| = |\overrightarrow{AB}|$.

Har qanday a vektorning sonli qiymati uning moduli yoki uzunligi deyiladi va $|a|$ kabi belgilanadi.

Boshi va uchi bitta nuqtadan iborat bo'lgan vektor nol vektor deyiladi. Uning moduli $|0| = 0$ boladi.

Bir to'g'ri chiziqda yoki parallel to'g'ri chiziqlarda joylashgan vektorlar kollinear vektorlar deyiladi.


Nol vektor har qanday a vektorga kollinear deb hisoblanadi.

Quyidagi uchta shartlar bajarilganda a va b larng teng vektorlar deyiladi:

1. $a \parallel b$, ya'ni bu vektorlar kolliniyar;
2. $|a| = |b|$, ya'ni bu vektorlar bir xil uzunlikka ega;
3. a va b vektorlar bir xil yo'nalishga ega.

$\vec{a}$ vektor OX o'q bilan φ burchak tashkil etsin (1-chizma). U holda vektorning bu o'qdagi proyeksiyasi shu vektor uzunligini φ burchakning kosinusiga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ya'ni $pr_x = |a| \cdot \cos \varphi = |a| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{OX})$.

Bir necha vektor yig'indisining o'qdagi proyeksiyasi qo'shiluvchi vektorlar proyeksiyalarini yig'indisiga teng:



$$pr_x(\vec{a} + \vec{b}) = pr_x \vec{a} + pr_x \vec{b}.$$

Bitta yoki parallel tekisliklarda joylashgan uch va undan ortiq vektorlar *komplanar vektorlar* deyiladi.

$\vec{a}$ vektorni λ songa ko'paytmasi deb quyidagi uchta shart bilan aniqlanadigan yangi bir $\vec{c}$ vektorga aytiladi:

1. $|\vec{c}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}|$, ya'ni $\vec{a}$ vektorning uzunligi $|\lambda|$ marta o'zgaradi.

2. $\vec{c} \parallel \vec{a}$, ya'ni bu vektorlar kollinear;


3. $\lambda > 0$ bo'lsa, $\vec{c}$ va $\vec{a}$ vektorlar bir xil yo'nalgan, $\lambda < 0$ bo'lsa, $\vec{c}$ va $\vec{a}$ qarama-qarshi yo'nalgan.

Vektorlarning songa ko'paytmasi quyidagi xossalarga ega:

1) $\lambda(\beta \vec{a}) = \beta(\lambda \vec{a})$. 2) $(\lambda \pm \beta)\vec{a} = \lambda\vec{a} \pm \beta\vec{a}$. 3) $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$.


$(-1)\vec{a}$ vektor $\vec{a}$ vektorga qarama-qarshi vektor deyiladi va $-\vec{a}$ kabi belgilanadi.

$\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlarning yig'indisi deb ABCD parallelogrammning A uchidan chiquvchi diagonalidan hosil qilingan $\vec{AC}$ vektorga aytiladi va $\vec{a} + \vec{b}$ kabi belgilanadi (parallelogramm qoidasi) (2-chizma).



2-chizma

Bu yig'indini uchburchak qoidasi deb ataladigan quyidagi usulda ham topish mumkin. Bunda dastlab parallel ko'chirish orqali $\vec{b}$ vektorning boshi $\vec{a}$ vektorning uchi ustiga keltiriladi (3-chizma). So'ngra $\vec{a}$ ning boshidan chiqib $\vec{b}$ ning uchida tugaydigan vektor hosil qilinadi va u $\vec{a} + \vec{b}$ yig'indini ifodalaydi.



3-chizma

Bir nechta $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_n$ ($n \geq 3$) vektorlarning yig'indisi parallelogramm qoidasini bir necha marta ketma-ket qo'llash bilan topiladi.

Vektorlarni qo'shish amali quyidagi xossalarga ega:

$$1. \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}.$$


$$2. (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{c}) + \vec{b}.$$

$$3. \lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}.$$

$$4. \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}.$$


$\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlarning ayirmasi deb $\vec{a}$ va $-\vec{b}$ vektorlarning yig'indisiga aytiladi va u $\vec{a} - \vec{b}$ kabi belgilanadi.

$\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlarning ayirmasini ular asosida qurilgan ABCD parallelogrammning kichik BD diagonali sifatida ham qarash mumkin (4-chizma).



4-chizma

Tekislikda XOY to'g'ri burchakli Dekart koordinatalar sistemasini olamiz. Bu tekislikda berilgan har qanday $\vec{a}$ vektorni sonlar juftligi orqali ifodalash mumkin. Buning uchun mos ravishda OX va OY koordinata o'qlarida joylashgan musbat yo'nalishga ega hamda uzunliklari birga teng bo'lgan i va j vektorlarni kiritamiz (5-chizma).



5-chizma

Kiritilgan $\vec{i}$ va $\vec{j}$ vektorlar birlik ortlar deyiladi. a_x va a_y lar $\vec{a}$ vektorning koordinata o'qlaridagi proyeksiyalari bo'lib, $\vec{a}$ vektorni ular orqali $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} = x\vec{i} + y\vec{j}$ ko'rinishda yozish mumkin.

$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$ ga $\vec{a}$ vektorning birlik ortlar bo'yicha yoyilmasi, x va y sonlari esa uning koordinatalari deyiladi.

Tekislikda boshi $A(x_1; y_1)$ va oxiri $B(x_2; y_2)$ nuqtada bo'lgan $\overline{AB}$ vektorning koordinatalari $\{x_2 - x_1; y_2 - y_1\}$ bo'lib, u $\overline{AB} = \{x_2 - x_1; y_2 - y_1\}$ kabi yoziladi.

Fazoda $XOYZ$ to'g'ri burchakli Dekart koordinatalar sistemasida berilgan $\vec{a}$ vektorning koordinatalarini aniqlash uchun kiritilgan $\vec{i}$ va $\vec{j}$ ortlarga qo'shimcha OZ o'qida uzunligi birga teng bo'lgan $\vec{k}$ vektorni olamiz. U holda $\vec{a}$ vektorni

$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

ko'rinishda yozish mumkin. Bu yerda x, y, z sonlar uchligi fazodagi $\vec{a}$ vektorning koordinatalari bo'lib uni $\vec{a} = \{x; y; z\}$ kabi yoziladi.

Fazoda boshi $A(x_1; y_1; z_1)$ va oxiri $B(x_2; y_2; z_2)$ nuqtada bo'lgan $\overline{AB}$ vektor $\overline{AB} = \{x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1\}$ ko'rinishda yoziladi.

$\vec{a} = \{x_1; y_1; z_1\}$ va $\vec{b} = \{x_2; y_2; z_2\}$ vektorlar teng bo'lishi uchun $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$ va $z_1 = z_2$ bo'lishi zarur va yetarlidir. Koordinatalari bilan berilgan vektorlarning yig'indisi, ayirmasi va songa ko'paytmasi quyidagicha aniqlanadi.

$$\vec{a} = \{x_1; y_1; z_1\} \pm \vec{b} = \{x_2; y_2; z_2\} = \vec{c} = \{x_1 \pm x_2; y_1 \pm y_2; z_1 \pm z_2\}, \quad \lambda \vec{a} = \{\lambda x_1; \lambda y_1; \lambda z_1\}.$$

Fazodagi $XOYZ$ to'g'ri burchakli Dekart koordinatalar sistemasida boshi $O(0;0;0)$ nuqtada va oxiri $M(x; y; z)$ nuqtada bo'lgan $\overline{OM}$ vektorni qaraymiz. U holda uni M nuqtaning $r = \overline{OM}$ radius vektori deyiladi (6-chizma).

Uning uzunligi $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ formula bilan aniqlanadi va $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lar orqali

$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ kabi yoziladi. Boshi

$A(x_1; y_1; z_1)$ va oxiri $B(x_2; y_2; z_2)$ nuqtada bo'lgan $\overline{U} = \overline{AB}$ vektorning koordinata o'qlaridagi proyeksiyalari mos ravishda $X = x_2 - x_1$, $Y = y_2 - y_1$, $Z = z_2 - z_1$ bo'ladi. Uning uzunligi esa $U = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ ga teng bo'ladi. Bu holda ham $\overline{U} = \overline{AB} = X\vec{i} + Y\vec{j} + Z\vec{k}$ deb yozish mumkin.

Agar $\overline{U} = \overline{AB}$ vektor koordinata o'qlari bilan α, β , va γ burchaklar hosil qilinsa, u holda

$$\cos \alpha = \frac{x}{U}, \quad \cos \beta = \frac{y}{U}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{U}$$

bo'ladi va ular uchun

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

o'rinli bo'ladi. Bu yerdagi $\cos \alpha, \cos \beta$ va $\cos \gamma$ larni $\overline{AB}$ vektorning yo'naltiruvchi kosinuslari deyiladi.


Ikkita $\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlarning skalyar ko'paytmasi deb ularning modullari bilan ular orasidagi burchak kosinusining ko'paytmasiga aytiladi.

$\vec{a}$ va $\vec{b}$ larning skalyar ko'paytmasi $\vec{a} \cdot \vec{b}$ yoki (a, b) kabi belgilanadi. Demak, ta'rifga asosan,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

Skalyar ko'paytma quyidagi xossalarga ega:

1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$.
2. $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$.
3. $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$.



6-chizma

$$4. \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$

5. Agar $\vec{a} \perp \vec{b}$ bo'lsa, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ bo'ladi.

Agar vektorlar $\vec{a} \{a_x; a_y; a_z\}$ va $\vec{b} \{b_x; b_y; b_z\}$ koordinatalar orqali berilgan bo'lsa, u holda skalyar ko'paytma quyidagicha bo'ladi:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$


Koordinatalari bilan berilgan ikki vektor orasidagi burchak quyidagi formuladan topiladi:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

$\frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}$ ga ikki vektorning parallellik sharti va $a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$ ga ikki vektorning perpendikulyarlik sharti deyiladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $OACB$ to'g'ri to'rtburchakning (7-chizma) OA va OB tomonlariga i va j birlik vektorlar qo'yilgan. Agar OA ning uzunligi 3 ga,



7-chizma

OB ning uzunligi 4 ga teng bo'lsa, $\vec{OA}$, $\vec{AC}$, $\vec{CB}$, $\vec{BO}$, $\vec{OC}$, va $\vec{BA}$, vektorlar i va j orqali ifodalansin.

Yechish: OA ning uzunligi 3 ga teng bo'lgani uchun $\vec{OA} = 3i$ bo'ladi. AC ning uzunligi 4 ga teng bo'lgani uchun $\vec{AC} = 4j$ bo'ladi. Lekin $\vec{CB}$ vektor $\vec{OA}$ vektorga qarama-qarshi yo'nalgan bo'lgani uchun $\vec{CB} = -3i$ bo'ladi. Xuddi shunday $\vec{BO} = -4j$ bo'ladi. $\vec{OC}$ vektor esa $\vec{OA}$ va $\vec{AC}$

vektorlar yig'indisidan iborat. Demak, $\vec{OC} = 3i + 4j$ bo'ladi. $\vec{BA}$ vektor esa $\vec{OA}$ va $\vec{OB}$ vektorlarning ayirmasidan iborat bo'lgani uchun $\vec{BA} = 3i - 4j$ bo'ladi.

2. Boshi $A(5; -4; 2)$ va oxiri $B(7; 1; 0)$ nuqtaga joylashgan vektorning koordinatalari topilsin.

Yechish: Ma'lumki, boshi $A(x_1; y_1; z_1)$, oxiri $B(x_2; y_2; z_2)$ nuqtada bo'lgan $\vec{AB}$ vektorning koordinatalari $x = x_2 - x_1$, $y = y_2 - y_1$, $z = z_2 - z_1$ bo'lar edi. Demak, $x = 7 - 5 = 2$, $y = 1 - (-4) = 5$, $z = 0 - 2 = -2$ bo'lib $\vec{AB}(2; 5; -2)$ bo'ladi.

3. Uzunligi 6 ga teng bo'lgan $\vec{a}$ vektor l o'q bilan $\frac{2\pi}{3}$ ga teng bo'lgan burchak hosil qiladi. Shu vektorning l o'qdagi proyeksiyasi topilsin.

Yechish: Vektorni o'qdagi proyeksiyasini topish formulasidan foydalanamiz. Bizda $|\vec{a}| = 6$, $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ bo'lganligi uchun

$$\text{pr}_l \vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos \varphi = \left| 6 \cdot \cos \frac{2\pi}{3} \right| = \left| -6 \cdot \sin \frac{\pi}{6} \right| = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3.$$

4. $\vec{a}\{1; -3; 5\}$ va $\vec{b}\{x; 6; z\}$ vektorlar kollinear bo'lsa, noma'lum koordinatalar topilsin.

Yechish: Ikki vektorning kollinearlik sharti $\frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z} = m$ dan foydalanamiz. Bizda $a_x = 1$, $a_y = -3$, $a_z = 5$, $b_x = x$, $b_y = 6$, $b_z = z$. Bularni o'rinlariga qo'yamiz. U holda $\frac{x}{1} = \frac{6}{-3} = \frac{z}{5}$ bo'lib, undan $x = -2$ va $z = -10$ kelib chiqadi.

5. $\vec{a}\{4; -2; 1\}$ va $\vec{b}\{5; 9; 0\}$ vektorlar uchun $\vec{a} + \vec{b}$ va $\vec{a} - \vec{b}$ lar yozilsin.

Yechish: Ma'lumki, $\vec{a}\{x_1; y_1; z_1\}$ va $\vec{b}\{x_2; y_2; z_2\}$ lar uchun

$\vec{a} \pm \vec{b} = \vec{c}\{x_1 \pm x_2; y_1 \pm y_2; z_1 \pm z_2\}$ edi. Bunga asosan,

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}\{4+5; -2+9; 1+0\} = \vec{c}\{9; 7; 1\};$$

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{c}\{4-5; -2-9; 1-0\} = \vec{c}\{-1; -11; 1\}.$$

6. $\vec{a}\{3; -4; 1\}$ va $\lambda = 4$ bo'lsa, $\lambda \vec{a}$ ni koordinatalari topilsin.

Yechish: $\vec{a}\{x; y; z\}$ vektorni λ soniga ko'paytmasi $\lambda \vec{a}\{\lambda x; \lambda y; \lambda z\}$ bo'lganligi uchun $\lambda \vec{a} = 4\vec{a}\{4 \cdot 3; 4 \cdot (-4); 4 \cdot 1\} = 4\vec{a}\{12; -16; 4\}.$

7. $\vec{a}\{3; 4; 12\}$ vektorning moduli topilsin.

Yechish: $\vec{a}\{x; y; z\}$ vektorning moduli $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ formuladan topilar edi. Bizda $x=3, y=4, z=12$. Demak $|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$.

8. $\vec{a}\{1; 0; 1\}$ va $\vec{b}\{0; 1; 1\}$ vektorlar orasidagi φ burchak topilsin.

Yechish: Bizda $x_1=1, x_2=0, y_1=0, y_2=1, z_1=1, z_2=1$. Bularni ikki vektor orasidagi burchakni topish formulasiga qo'yamiz:

$$\cos \varphi = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}} = \frac{1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1}{\sqrt{1+0+1} \cdot \sqrt{1+0+1}} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = 60^\circ.$$

9. $\vec{a}\{3; -2; 1\}$ va $\vec{b}\{5; 7; -1\}$ vektorlar o'zaro perpendikulyar ekanligi isbotlansin.

Isbot: Bizda $x_1=3, x_2=5, y_1=-2, y_2=7, z_1=1, z_2=-1$. Bularni ikki vektorning perpendikulyarlik shartiga qo'yamiz:

$$x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2 = 3 \cdot 5 + (-2) \cdot 7 + 1 \cdot (-1) = 15 - 14 - 1 = 0.$$

Demak, $a \perp b$ ekan.

10. Uchburchakning uchlari $A(1; 2), B(3; 4)$, va $C(6; 2)$ nuqtalarda. Uning A uchidagi ichki burchagi hisoblansin.

Yechish: Uchburchakning A uchidagi ichki burchagi φ $\vec{AB}$ va $\vec{AC}$ vektorlar orasidagi burchakdan iborat. $\vec{AB}$ va $\vec{AC}$ vektorlarning koordinatalarini topamiz.

$\vec{AB} \{3 - 1; 4 - 2\} = \vec{AB} \{2; 2\}$; $\vec{AC} \{6 - 1; 2 - 2\} = \vec{AC} \{5; 0\}$. Bularni ikki vektor orasidagi burchakni topish formulasiga qo'yamiz:

$$\cos \varphi = \frac{a_x b_x + a_y b_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2}} = \frac{2 \cdot 5 + 2 \cdot 0}{\sqrt{4+4} \cdot \sqrt{25+0}} = \frac{10}{2\sqrt{2} \cdot 5} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Demak, $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$ bo'lib, undan $\varphi = 45^\circ$ kelib chiqadi.

Mustaqil yechish uchun masalalar:

1. Koordinatalar sistemasida $M(5; -3; 4)$ nuqta tasvirlansin va uning radius-vektori uzunligi hamda yo'nalishi aniqlansin.

Javob: $OM = r = 5\sqrt{2}$; $\cos \alpha = 0,5\sqrt{2}$; $\cos \beta = -0,3\sqrt{2}$; $\cos \gamma = 0,4\sqrt{2}$.

2. $r = \vec{OM} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k}$ vektor yasalsin va uning radius-vektori uzunligi hamda yo'nalishi aniqlansin. ($\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ formula bo'yicha tekshirilsin).

Javob: $r = 7$; $\cos \alpha = \frac{2}{7}$.

3. $A(1; 2; 3)$ va $B(3; -4; 6)$ nuqtalar berilgan. $U = \vec{AB}$ vektor va uning koordinata o'qlaridagi proeksiyalari yasalsin hamda uning uzunligi aniqlansin. U vektorning koordinata o'qlari bilan hosil qilgan burchaklari topilsin.

Javob: $U = 2\vec{i} - 6\vec{j} + 3\vec{k}$, $U = 7$.

4. $\vec{a}\{3; 2; 7\}$ va $\vec{b}\{4; 1; -5\}$ vektorlar yig'indisi topilsin.

Javob: $\vec{c}\{7; 3; 2\}$.

5. $\vec{a}\{3; 4; 5\}$ va $\vec{b}\{2; 6; 8\}$ vektorlar ayirmasi topilsin.

Javob: $\vec{c}\{1; -2; -3\}$.

6. $\vec{a}\{2; 5; 2\sqrt{5}\}$ vektorning uzunligi topilsin.

Javob: 7.

7. $\vec{a}\{2; 5; 2\sqrt{5}\}$ vektorning yo'naltiruvchi kosinuslari topilsin.

Javob: $\frac{2}{7}, \frac{5}{7}, \frac{2\sqrt{5}}{7}$.

8. $\vec{a}\{2; 5; 2\sqrt{5}\}$ va $\vec{b}\{1; 1; 1\}$ vektorlarni skalyar ko'paytmasi topilsin.

Javob: $7 + 2\sqrt{5}$.

9. $\vec{a} = -\vec{i} + \vec{j}$ va $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$ vektorlarning skalyar ko'paytmasi topilsin.

Javob: -3.

10. $\vec{a} = -\vec{i} + \vec{j}$ va $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$ vektorlar orasidagi burchak topilsin.

Javob: 135° .

11. Uchlari $A(2; -1; 3)$, $B(1; 1; 1)$ va $C(0; 0; 5)$ nuqtalarda bo'lgan ABC uchburchakning burchaklari aniqlansin.

Javob: $B = C = 45^\circ$, $A = 90^\circ$.

12. $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j}$ va $\vec{b} = -2\vec{j} + \vec{k}$ vektorlarda yasalgan parallelogramm diagonallari orasidagi burchak topilsin.

Javob: 90° .

13. $(2\vec{i} - \vec{j}) \cdot \vec{j} + (\vec{j} - 2\vec{k}) \cdot \vec{k} + (\vec{i} - 2\vec{k})^2$ ifodadagi qavslar ochilsin.

Javob: 2.

14. 1) Agar m va n o'zaro 30° burchak tashkil etuvchi birlik vektorlar bo'lsa, $(m + n)^2$ hisoblansin.


2) Agar $a = 2\sqrt{2}$ va $b = 4$ hamda $(\vec{a}, \vec{b}) = 135^\circ$ bo'lsa, $(a - b)^2$ hisoblansin.

15. $\vec{a}\{2; 5; 2\sqrt{5}\}$ va $\{1; 1; 1\}$ vektorlar orasidagi burchak topilsin.

Javob: $\cos \varphi = \frac{7+2\sqrt{5}}{7\sqrt{3}}$.

§6. Ikki vektorning vektor ko'paytmasi

Fazodagi $\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlarning vektorial ko'paytmasi deb, quyidagi uchta shart bilan aniqlanuvchi yangi $\vec{c}$ vektorga aytiladi (1-chizma).



1-chizma

1. $\vec{c}$ vektorning mo'duli $\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlarga kurilgan parallelogramm yuziga teng bo'lib, $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$ formula bilan aniqlanadi. Bunda φ berilgan $\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlar orasidagi burchakni ifodalaydi.

2. $\vec{c}$ vektor $\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlar yotgan tekislikka perpendikulyar, ya'ni $c \perp a$ va $c \perp b$ bo'ladi.

3. $\vec{c}$ vektor shunday yo'nalganki, uning uchidan qaraganda $\vec{a}$ vektordan $\vec{b}$ vektorga eng qisqa burilish soat mili harakatiga teskari bo'ladi.

$\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlarning vektorial ko'paytmasi $a \times b$ yoki $[a, b]$ kabi belgilanadi.

Vektorial ko'patma quyidagi xossalarga ega:

$$1. \vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{a}$$

$$2. \lambda \vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \lambda \vec{b} = \lambda (\vec{a} \times \vec{b})$$

$$3. \vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$$

4. Agar $\vec{a}$ va $\vec{b}$ kollinear vektorlar bo'lsa, ularning vektorial ko'paytmasi $\vec{a} \times \vec{b} = 0$ bo'ladi. Aksincha, noldan farqli $\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlar uchun $\vec{a} \times \vec{b} = 0$ bo'lsa, bu vektorlar kollinear bo'ladi.

5. Ixtiyoriy $\vec{a}$ vektor uchun $\vec{a} \times \vec{a} = 0$

6. Birlik ortlar uchun $\vec{i} \times \vec{i} = 0$, $\vec{j} \times \vec{j} = 0$, $\vec{k} \times \vec{k} = 0$, $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$, $\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$, $\vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}$, $\vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$.

7. $\vec{a}\{x_1; y_1; z_1\}$ va $\vec{b}\{x_2; y_2; z_2\}$ vektorlarning vektorial ko'paytmagini determinant orqali.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \text{ formula yordamida topiladi.}$$

$\vec{a}\{x_1; y_1; z_1\}$ va $\vec{b}\{x_2; y_2; z_2\}$ vektorlardan hosil qilingan parallelogrammning yuzi

$$S = |\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}^2}$$

formuladan, uchburchakning yuzi esa $S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$ dan topiladi.

$\vec{a}\{x_1; y_1; z_1\}$ va $\vec{b}\{x_2; y_2; z_2\}$ vektorlar kollinear bo'lishi uchun $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$ shart bajarilishi kerak.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $(\vec{a} - 2\vec{b}) \times (2\vec{a} + \vec{b})$ ko'paytmani soddalashtiring.

$$\text{Yechish: } (\vec{a} - 2\vec{b}) \times (2\vec{a} + \vec{b}) = 2\vec{a} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{b} - 4\vec{b} \times \vec{a} - 2\vec{b} \times \vec{b} = 2 \cdot 0 + \vec{a} \times \vec{b} - 4 \cdot \vec{b} \times \vec{a} - 0 = \vec{a} \times \vec{b} + 4\vec{a} \times \vec{b} = 5\vec{a} \times \vec{b}$$

2. $\vec{a}\{2; 3; -1\}$ va $\vec{b}\{3; -1; -4\}$ vektorlarning vektorial ko'paytmagini toping.

Yechish: $\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlarning vektorial ko'paytmasining determinanti orqali ifodasidan foydalanamiz. Bizda $x_1 = 2$, $y_1 = 3$, $z_1 = -1$, $x_2 = 3$, $y_2 = -1$, $z_2 = 4$ bo'lgani uchun

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix} = -12\vec{i} - 2\vec{k} - 3\vec{j} -$$

$$-9\vec{k} - \vec{i} + 8\vec{j} = -13\vec{i} + 5\vec{j} - 11\vec{k}.$$

Demak, $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}(-13; 5; -11)$

3. $\vec{a}\{2; 3; -1\}$ va $\vec{b}\{3; -1; -4\}$ vektorlarga yasalgan parallelogrammning yuzini toping.

Yechish: Yuqoridagi misoldan $\vec{a} \times \vec{b} = -13\vec{i} + 5\vec{j} - 11\vec{k}$ ekanligi ma'lum. $\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlarga yasalgan parallelogrammning yuzi

$$S = |\vec{a} \times \vec{b}| = |-13\vec{i} + 5\vec{j} - 11\vec{k}| = \sqrt{169 + 25 + 121} = \sqrt{315} = 3\sqrt{35}$$

4. $\vec{a}\{m; 3; 2\}$ va $\vec{b}\{4; 6; n\}$ vektorlar m va n parametrlarning qanday qiymatlarda kollinear bo'lishini aniqlang.

Yechish: Koordinatalari bilan berilgan $\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlarning kollinearlik sharti $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$ dan foydalanamiz.

Bizda $x_1 = m$, $x_2 = 4$, $y_1 = 3$, $y_2 = 6$, $z_1 = 2$, $z_2 = n$ bo'lganligi uchun $\frac{m}{4} = \frac{3}{6} = \frac{2}{n} \Rightarrow m = 2, n = 4$.

5. Uchlari $A(1; 1; 0)$, $B(1; 0; 1)$ va $C(0; 1; 1)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning yuzi topilsin.

Yechish: ABC uchburchakning S yuzi $\vec{AB}$ va $\vec{AC}$ vektorlarda yasalgan parallelogramm yuzining yarmiga teng. $\vec{AB}$ va $\vec{AC}$ vektorlarning koordinatalarini aniqlaymiz.

$$\vec{AB}\{x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1\} = \vec{AB}\{1 - 1; 0 - 1; 1 - 0\} = \vec{AB}\{0; -1; 1\};$$

$$\vec{AC}\{x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1\} = \vec{AC}\{0 - 1; 1 - 1; 1 - 0\} = \vec{AC}\{-1; 0; 1\}$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -\vec{i} + 0 - \vec{j} - \vec{k} - 0 - 0 = -\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}.$$

$$\text{Shunday qilib } S = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2} |\sqrt{1 + 1 + 1}| = \frac{1}{2} \sqrt{3}.$$

6. Agar $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$ va $\vec{a} \perp \vec{b}$ bo'lsa, $(2\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b})$ vektorining uzunligi topilsin.

Yechish: Vektor ko'paytmaning xossasidan foydalanamiz. Unga asosan,

$$(\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b}) =$$

$$\vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} - \vec{b} \times \vec{a} - \vec{b} \times \vec{b} = 0 + 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{b} - 0 = 3\vec{a} \times \vec{b}.$$

Shunday

$$\text{qilib } |(2\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b})| = 3|\vec{a} \times \vec{b}| = 3|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin 90^\circ = 3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 6.$$

Mustaqil yechish uchun masalalar:

1. Agar 1) $\vec{a} = 3\vec{j}$, $\vec{b} = 2\vec{k}$; 2) $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j}$;

3) $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{j} + 2\vec{k}$ bo'lsa, $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ vektor aniqlansin va yasalsin. Har bir hol uchun berilgan vektorlarda yasalgan parallelogrammning yuzi hisoblansin.

Javob: $\vec{a} \times \vec{b}$ teng: 1) $-6\vec{j}$; 2) $-2\vec{k}$; 3) $6\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k}$; 1) $S_1 = 6$;

2) $S_2 = 2$; 3) $S_3 = 2\sqrt{22}$.

2. Uchlari $A(7; 3; 4)$, $B(1; 0; 6)$ va $C(4; 5; -2)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning yuzi hisoblansin.

Javob: 24,5.

3. $\vec{a} = 2\vec{j} + \vec{k}$ va $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{k}$ vektorlarda parallelogramm yasalsin hamda uning yuzi va balandligi aniqlansin.

Javob: $\sqrt{21}$ kv. birlik. $h = \sqrt{4,2}$.

4. Ushbu

$$1) \vec{i} \times (\vec{j} + \vec{k}) - \vec{j} \times (\vec{i} + \vec{k}) + \vec{k} \times (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k});$$

$$2) (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \times \vec{c} + (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \times \vec{b} + (\vec{b} - \vec{c}) \times \vec{a};$$

$$3) (2\vec{a} + \vec{b})(\vec{c} - \vec{a}) + (\vec{b} + \vec{c}) \times (\vec{a} + \vec{b});$$

$$4) 2\vec{i} \cdot (\vec{j} \times \vec{k}) + 3\vec{j}(\vec{i} \times \vec{k}) + 4\vec{k} \cdot (\vec{i} \times \vec{j});$$

Ifodalar qavslarini ochib soddalashtirilsin.

Javob: 1) $2(\vec{k} - \vec{i})$; 2) $2\vec{a} \times \vec{c}$; 3) $\vec{a} \times \vec{c}$; 4) 3.

5. $\vec{a} = 3\vec{k} - 2\vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ va $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ vektorlar yasalsin. $\vec{c}$ vektorning moduli hamda $\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlarda yasalgan uchburchakning S yuzi topilsin.

Javob: $3\sqrt{17}$, $S = \frac{3\sqrt{17}}{2}$ kv. bir.

6. Uchlari $A(1; -2; 8)$, $B(0; 0; 4)$ va $C(6; 2; 0)$ nuqtalarga bo'lgan uchburchak yasalsin. Uning yuzi va BD balandligi topilsin.

Javob: $7\sqrt{5}$ kv. birlik., $BD = \frac{2\sqrt{21}}{3}$.

7. $\vec{a} = \vec{k} - \vec{j}$ va $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ vektorlarda yasalgan parallelogramning yuzi hisoblansin.

Javob: $\sqrt{6}$ kv. birlik.

8. $\vec{a}$ va $\vec{b}$ vektorlar o'zaro 45° burchak hosil qiladi. Agar $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 5$ bo'lsa, $\vec{a} - 2\vec{b}$ va $3\vec{a} + 2\vec{b}$ vektorlarga yasalgan uchburchakning yuzi topilsin.

Javob: $50\sqrt{2}$.

9. $\vec{m}$ va $\vec{n}$ o'zaro 45° burchak hosil qiluvchi birlik vektorlar. Diagonallari $2\vec{m} - \vec{n}$ va $4\vec{m} - 5\vec{n}$ vektorlardan iborat bo'lgan parallelogramning yuzi topilsin.

Javob: $1,5\sqrt{2}$.

10. Uchlari $A(4; -2; 6)$, $B(2; 8; 4)$, $C(6; -2; -2)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakning yuzi topilsin.

Javob: $30\sqrt{2}$.

11. $\vec{a} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ vektorlarda yasalgan uchburchakning yuzi aniqlansin.

Javob: $\frac{5}{2}\sqrt{3}$.

§7. Uch vektorning aralash ko'paytmasi

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektorlarning aralash ko'paytmasi deb dastlabki ikkita vektorlarning $\vec{a} \times \vec{b}$ vektorial ko'paytmasining uchinchi $\vec{c}$ vektorga skalyar ko'paytmasi kabi aniqlanadigan songa aytiladi.

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ larning aralash ko'paytmasi $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$ kabi belgilanadi. Demak, $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$. $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$ aralash ko'paytma geometrik jihatdan $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektorlar asosida qurilgan parallelogramning hajmini bildiradi.

Ya'ni $V = S_{asos} \cdot H = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| = |\vec{a}\vec{b}\vec{c}|$.

Aralash ko'paytma quyidagi xossalarga ega:

$$1. (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}).$$

2. Aralash ko'paytmada ko'paytuvchilar o'rni soat miliga teskari yo'nalish bo'yicha doiraviy ravishda almashtirilsa, uning qiymati o'zgarmasdan qoladi. Ya'ni

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \vec{c}\vec{a}\vec{b} = \vec{b}\vec{c}\vec{a} = \vec{a}\vec{b}\vec{c}.$$

3. Agar ko'paytmada yonma-yon turgan vektorlarning o'rni almashtirilsa, uning ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Ya'ni

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = -\vec{b}\vec{a}\vec{c} = \vec{b}\vec{c}\vec{a} = -\vec{c}\vec{b}\vec{a}$$

Aralash ko'paytma quyidagi hollarda nolga teng bo'ladi:

- 1) Ko'paytuvchi vektorlardan kamida bittasi nol vector;
- 2) Ko'paytuvchi vektorlardan kamida ikkitasi kollinear;
- 3) Ko'paytuvchi vektorlar komplanar bo'lsa.

Agar $\vec{a}, \vec{b}$ va $\vec{c}$ vektorlar o'zlarining koordinatalari bilan berilgan bo'lsa, u holda aralash ko'paytmani determinant orqali quyidagicha yozish mumkin.

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0 \text{ ga uch vektorning komplanarlik sharti deyiladi}$$

Fazoda berilgan to'rtta $M_1(x_1; y_1; z_1)$, $M_2(x_2; y_2; z_2)$, $M_3(x_3; y_3; z_3)$, $M_4(x_4; y_4; z_4)$ nuqtalarning bir tekislikda yotish sharti

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} = 0 \text{ dan iborat.}$$

Koordinatalari bilan berilgan $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektorlar asosida yasalgan piramidaning hajmi

$$V = \frac{1}{6} |\vec{a} \vec{b} \vec{c}| = \pm \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \text{ formuladan topiladi.}$$

Agar $\vec{a}, \vec{b}$ va $\vec{c}$ vektorlar o'zaro komplanar bo'lsa, $\vec{a} \vec{b} \vec{c} = 0$, va aksincha, so'nggi tenglik bajarilsa, berilgan uch vektor o'zaro komplanar bo'ladi. Bundan tashqari, $\vec{a}, \vec{b}$ va $\vec{c}$ orasida $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$ ko'rinishidagi chiziqli bog'lanish mavjud bo'ladi.

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0 \text{ ga uch vektorning kamplanarlik sharti deb ataladi.}$$

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $\vec{a}\{m; -12; -2\}$, $\vec{b}\{0; m; 1\}$ va $\vec{c}\{1; 2; 3\}$ vektorlar m parametrning qanday qiymatlarida komplanar bo'lishini toping.

Yechish: Bizda $x_1 = m, y_1 = -12, z_1 = -2$; $x_2 = 0, y_2 = m, z_2 = 1, x_3 = 1, y_3 = 2, z_3 = 3$. Bularni uch vektorning kamplanarlik shartiga qo'yamiz:

$$\vec{a} \vec{b} \vec{c} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m & -12 & -2 \\ 0 & m & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 3m^2 - 12 + 2m - 2m = 0 \Rightarrow m = \pm 2.$$

2. $\vec{a}\{3; -1; 2\}$, va $\vec{b}\{0; 3; 1\}$ va $\vec{c}\{1; 2; 3\}$ vektorlardan yasalgan parallelepipedning hajmini toping.

Yechish: Parallelepipedning hajmini topish formulasidan foydalanamiz

$$V = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 27 + 0 - 1 - 6 - 6 - 0 = 14$$

1. $M_1(1; m; -1), M_2(0; 1; 2m + 1), M_3(-1; m; 1)$ va $M_4(2; 1; 3)$ nuqtalar m parametrning qanday qiymatlarida bir tekislikda yotishini toping.

Yechish: Koordinatalari bilan berilgan to'rtta nuqtaning bir tekislikda yotish shartidan foydalanamiz:

$$\begin{vmatrix} x_1 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 1 - m & 2m + 2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 - m & 4 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$-2(1 - m)(2m + 2) + 2(1 - m) + 2(1 - m) + 8(1 - m) = 0 \Rightarrow$$

$$-4m^2 - 4 + 12(1 - m) = 0 \Rightarrow 4m^2 - 4 + 12 - 12m = 0 \Rightarrow$$

$$4m^2 - 12m + 8 = 0 \Rightarrow m^2 - 3m + 2 = 0 \Rightarrow m = 1, m = 2.$$

Demak, $m = 1$ yoki $m = 2$ bo'lganda, yuqoridagi to'rtta nuqta bir tekislikda yotadi.

4. Fazoda to'rtta $A(1; 1; 1), B(4; 4; 4), C(3; 5; 5)$, va $D(2; 4; 7)$ nuqtalar berilgan. Uchlari shu nuqtalarda bo'lgan piramidaning hajmini toping.

Yechish: $ABCD$ piramidaning hajmi $\vec{AB}, \vec{AC}$ va $\vec{AD}$ vektorlar asosida yasalgan parallelepiped hajmining oltidan bir qismiga, ya'ni

$V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$ ga teng. Demak, biz dastlab $\vec{AB}, \vec{AC}$ va $\vec{AD}$ vektorlarning koordinatalarini topishimiz kerak.

$$\vec{AB}\{4 - 1; 4 - 1; 4 - 1\} = \vec{AB}\{3; 3; 3\}; \vec{AC}\{3 - 1; 5 - 1; 5 - 1\} = \vec{AC}\{2; 4; 4\}; \vec{AD}\{2 - 1; 4 - 1; 7 - 1\} = \vec{AD}\{1; 3; 6\}.$$

$$V_{\text{piramida}} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} (72 + 18 + 12 - 12 - 36 - 36) =$$

$$= \frac{1}{6} \cdot 18 = 3.$$

Mustaqil yechish uchun masalalar:

1. $\vec{a} = 3\vec{i} + 4\vec{j}, \vec{b} = -3\vec{j} + \vec{k}, \vec{c} = 2\vec{j} + 5\vec{k}$ vektorlarda parallelepiped yasalsin hamda uning hajmi hisoblansin.

Javob: $V = 51$.

2. Uchlari $O(0; 0; 0), A(5; 2; 0), B(2; 5; 0)$ va $C(1; 2; 4)$ nuqtalarda bo'lgan piramida yasalsin hamda uning hajmi, ABC yog'ining yuzi va shu yoqqa tushirilgan balandligi hisoblansin.

$$\text{Javob: } V = 14 \text{ kub. b. } S_{ABC} = 6\sqrt{3}, \quad H = \frac{7\sqrt{3}}{3};$$

3. $A(2; -1; -2), D(1; 2; 1), C(2; 3; 0)$ va $D(5; 0; -6)$ nuqtalarning bir tekislikda yotishi ko'rsatilsin.

4. $\vec{a} = -\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}, \vec{b} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 4\vec{k}, \vec{c} = -3\vec{i} + 12\vec{j} + 6\vec{k}$ vektorlar ning o'zaro komplanar ekani ko'rsatilsin.

$$5. 1) (\vec{a} + \vec{b}) \cdot [(\vec{a} + \vec{c}) \times \vec{b}] = -\vec{a}\vec{b}\vec{c};$$

$$2) (\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c})[(\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b} - \vec{c})] = 3\vec{a}\vec{b}\vec{c} \text{ ekanligi isbotlansin.}$$

6. Uchlari $A(2; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; 6)$ va $D(2; 3; 8)$ nuqtalarda bo'lgan piramida yasalsin hamda uning hajmi va ABC yog'iga tushirilgan balandligi hisoblansin.

$$\text{Javob: } V = 14 \text{ kub. bir. } H = \sqrt{14};$$

7. $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}, \vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j}$ va $\vec{c} = 3\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$ vektorlar yasalsin va ular o'zaro komplanar ekanligi ko'rsatilsin.

8. Uzunliklari 2 ga teng bo'lgan va koordinatalar burchaklarining bissektrisalari bo'yicha yo'nalgan $\vec{OA}, \vec{OB}$ va $\vec{OC}$ vektorlarda yasalgan tetraedrning hajmi topilsin.

$$\text{Javob: } \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

VII. BOB. CHIZIQLI ALGEBRA ELEMENTLARI

§1. Determinantlar va ularning xossalari

Ikkinchi tartibli determinant deb $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ ko'rinishda yozilgan va qiymati $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ songa teng bo'lgan jadvalga aytiladi. Demak, ta'rifga asosan,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

$a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ sonlar determinantning elementlari deyiladi. a_{11} va a_{12} determinantning birinchi satr (yo'l) elementlari deyiladi, a_{21} va a_{22} determinantning ikkinchi satr elementlari, a_{11} va a_{21} determinantning birinchi ustun elementlari, a_{12} va a_{22} ikkinchi ustun elementlari deyiladi. a_{11} va a_{22} determinantning bosh diagonal elementlari, a_{21} va a_{12}

yordamchi diagonal elementlari deyiladi. Ikkinchi tartibli determinantni hisoblash uchun uning bosh diagonal elementlari ko'paytmasidan yordamchi diagonal elementlari ko'paytmasi ayiriladi.

Uchinchi tartibli determinant deb $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ ko'rinishda yozilgan va qiymati quyidagicha aniqlangan

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{31} -$$

$$- a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{21}a_{12}a_{33} \text{ jadvalga aytiladi.}$$

Ikkinchi tartibli determinantda aytilgan satr ustun terminlari bu yerda ham o'z kuchini saqlaydi. a_{11}, a_{22} va a_{33} determinantning bosh diagonal elementlari deyiladi.

Uchinchi tartibli determinantni hisoblash uchun bir necha usul mavjud bo'lib, ulardan eng qulayi Sarrus qoidasidir. Uchinchi tartibli determinantni bu qoida bo'yicha hisoblash uchun eng avval uning birinchi va ikkinchi satrlari determinantning ostiga yoziladi (1-shakl); so'ngra determinantning bosh diagonalini tashkil qilgan a_{11}, a_{22}, a_{33} elementlari va bu diagonalga parallel bo'lgan diagonallarning har biridagi elementlar o'zaro ko'paytiriladi. Buning natijasida $a_{11}a_{22}, a_{33}$ $a_{21}a_{32}a_{13}, a_{12}a_{23}a_{31}$ ko'paytmalar hosil bo'ladi. Shunga o'xshash o'ngdan chapga qarab ketgan uchta parallel diagonallardagi elementlar ko'paytirilsa, natijada $a_{31}a_{22}a_{13}, a_{32}a_{23}a_{11}, a_{21}a_{12}a_{33}$ ko'paytmalar hosil bo'ladi. Chiqqan ko'paytmalardan avvalgi uchta (+) ishora bilan, keyingi uchta (-) ishora bilan olganda, ularning algebraik yig'indisi uchchi tartibli determinantning qiymati bo'ladi.

1-shakl.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

n -tartibli determinant deb quyidagi jadvalga aytiladi.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

To'rtinchi va undan yuqori tartibli determinantlarni hisoblashning umumiy usuli mavjud emas. Ular determinantlarning xossalariidan foydalanib, ikkinchi va uchinchi tartibli determinantlarga keltiriladi va hisoblanadi.

Determinantlar bir qator xossalarga ega:

1-xossa. Determinantning biror satrini unga mos ustun bilan almashtirilsa, determinant qiymati o'zgarmaydi.

2-xossa. Determinantning ixtiyoriy ikkita satri yoki ustunini o'zaro almashtirilsa, determinantning qiymati qarama-qarshisiga o'zgaradi.

3-xossa. Determinantning ixtiyoriy satrida (ustunida) turgan elementlar biror k songa ko'paytirilsa, determinantning qiymati ham k marta ortadi.

4-xossa. Determinantning biror satridagi (ustunidagi) barcha elementlar nol bo'lsa, determinantning qiymati nolga teng bo'ladi.

5-xossa. Determinantning ixtiyoriy ikkita satri (ustuni) o'zaro proporsional bo'lsa, determinantning qiymati nolga teng bo'ladi.

6-xossa. Agar determinantning biror satri yoki ustuni elementlari ikkita qo'shiluvchidan iborat bo'lsa, u holda, uni ikkita determinant yig'indisi sifatida yozish mumkin. Bunda bu determinantlarning ikkita qo'shiluvchidan iborat bo'lgan satrlari yoki ustunlari birinchi va ikkinchi elementlardan iborat bo'lib, qolgan satrlari berilgan determinantniki singari bo'ladi.

7-xossa. Agar determinantning biror satr yoki ustun elementlarini biror songa ko'paytirib boshqa bir satr yoki ustun elementlariga qo'shilsa, determinant qiymati o'zgarmaydi.

8-xossa. Agar determinantning bosh diagonal elementlaridan yuqorida yoki pastda joylashgan elementlari noldan iborat bo'lsa, u holda determinantning qiymati bosh diagonal elementlari ko'paytmasiga teng bo'ladi.

Ixtiyoriy n -tartibli determinantning a_{ij} ($i, j = 1, 2, 3, \dots, n$) elementining minori deb, bu determinantdan shu element joylashgan satr va ustunni o'chirishdan hosil bo'lgan $(n-1)$ -tartibli determinant qiymatiga aytiladi va u M_{ij} bilan belgilanadi.

Ixtiyoriy n -tartibli determinantning a_{ij} elementini algebraik kofaktor deb $(-1)^{i+j} M_{ij}$ kabi aniqlangan songa aytiladi va u A_{ij} kabi belgilanadi.

Determinantning ixtiyoriy bir i -satrida joylashgan a_{ij} ($j = 1, 2, 3, \dots, n$) elementlari ularning A_{ij} ($j = 1, 2, 3, \dots, n$) algebraik kofaktorlariga ko'paytmalarining yig'indisi, shu determinantning qiymatiga teng bo'ladi. (Laplas teoremasi).

Bu teorema uchunchi tartibli determinantning birinchi satri uchun quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = A.$$

Bunga determinantning satrlar bo'yicha yoyilmasi deyiladi.

Shunga o'xshash determinantning ustunlar bo'yicha yoyilmasini ham hosil qilish mumkin. U quyidagicha bo'ladi:

$$a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31} = A.$$

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Quyidagi determinantlar hisoblansin:

$$1) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & -10 \end{vmatrix}; \quad 2) \begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha \\ -\cos \alpha & \sin \alpha \end{vmatrix}; \quad 3) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\text{Yechish: } 1) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & -10 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-10) - 6 \cdot 3 = -20 - 18 = -38.$$

$$2) \begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha \\ -\cos \alpha & \sin \alpha \end{vmatrix} = \sin \alpha \cdot \sin \alpha - (-\cos \alpha) \cdot \cos \alpha = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

$$3) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot 3 + 5 \cdot 2 \cdot 4 + 3 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot (-2) \cdot 4 - 2 \cdot 1 \cdot 2 - 5 \cdot 3 \cdot 3 = -12 + 40 + 3 + 8 - 4 - 45 = 51 - 61 = -10.$$

$$2. \begin{vmatrix} x^2 & 4 & 9 \\ x & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ tenglama yechilsin.}$$

$$\text{Yechish: } \begin{vmatrix} x^2 & 4 & 9 \\ x & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow x^2 \cdot 2 \cdot 1 + x \cdot 1 \cdot 9 + 4 \cdot 3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \cdot 9 - 1 \cdot 3 \cdot x^2 - x \cdot 4 \cdot 1 = 0 \Rightarrow 2x^2 + 9x + 12 - 18 - 3x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 3.$$

$$3. D = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 \\ 2 & -3 & 7 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} \text{ determinant ikkinchi satr elementlarining minorlari yozilsin va hisoblansin.}$$

Yechish: M_{21} ni topish uchun 2 element turgan satr va ustundagi elementlarni o'chiramiz va qolgan elementlardan determinantni tuzamiz:

$$M_{21} = \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -5 \cdot 1 - (-2) \cdot 2 = -5 + 4 = -1.$$

M_{22} ni topish uchun -3 element turgan satr va ustun elementlarini o'chirishdan qolgan elementlardan tuzilgan determinantni hisoblaymiz:

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 2 = 1 - 0 = 1.$$

M_{23} ni hisoblash uchun 7 element turgan satr va ustun elementlarini o'chirishdan hosil bo'lgan determinantni hisoblaymiz.

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & -5 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) - 0 \cdot (-5) = -2 + 0 = -2.$$

$$4. D = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 5 & 3 & -2 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix} \text{ determinantning birinchi satr elementlarini}$$

algebraik to'ldiruvchilari hisoblansin.

Yechish:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot M_{11} = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 9 - (-2) \cdot (-2) = 9 - 4 = 5;$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot M_{12} = - \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -(5 \cdot 3 - 4 \cdot (-2)) = -(15 + 8) = -23;$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 5 \cdot (-2) - 4 \cdot 3 = -10 - 12 = -22;$$

$$5. \begin{vmatrix} -3 & 2 & 4 & -5 \\ 0 & 5 & 11 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \text{ determinant hisoblasin.}$$

Yechish: Bosh diagonaldagi elementlardan pastda joylashgan barcha elementlar nollardan iborat bo'lganligi uchun determinantning qiymati bosh diagonal elementlari ko'paytmasidan iborat. Ya'ni:

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 & 4 & -5 \\ 0 & 5 & 11 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-3) \cdot 5 \cdot 2 \cdot (-1) = 30.$$

$$6. \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & 10 \\ 6 & 7 & 5 & -2 \\ 3 & 0 & 9 & 1 \end{vmatrix} \text{ determinant hisoblasin.}$$

Yechish: Berilgan determinant to'rtinchi tartibli determinant bo'lganligi uchun hisoblashning umumiy formulasi mavjud emas. Uni biror satr yoki ustun elementlari bo'yicha yoyilmasi yordamida hisoblash mumkin. Bu determinantning 2-ustun elementlari bo'yicha yoyilmasidan foydalanib hisoblash qulaydir. Chunki bu ustunda 2 ta element noldan iborat.

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & 10 \\ 6 & 7 & 5 & -2 \\ 3 & 0 & 9 & 1 \end{vmatrix} = -3 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 10 \\ 6 & 5 & -2 \\ 3 & 9 & 1 \end{vmatrix} +$$

$$+ 7 \cdot (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 10 \\ 3 & 9 & 1 \end{vmatrix} = 3(5 + 540 - 12 - 150 + 18 - 12) - 7(4 + 45 + 120 - 30 - 180 - 4) = 3 \cdot 389 + 7 \cdot 45 = 1452.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

Quyidagi ikkinchi tartibli determinantlar hisoblansin:

$$1) \begin{vmatrix} -3 & 7 \\ 6 & -8 \end{vmatrix}; 2) \begin{vmatrix} 24 & 16 \\ -12 & 8 \end{vmatrix}; 3) \begin{vmatrix} \sqrt{a} & -1 \\ a & \sqrt{a} \end{vmatrix}; 4) \begin{vmatrix} 2n+1 & n+3 \\ n-2 & 2n+3 \end{vmatrix}.$$

2. Quyidagi uchinchi tartibli determinantlar hisoblansin.

$$1) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}; 2) \begin{vmatrix} a & 1 & a \\ -1 & a & 1 \\ a & -1 & a \end{vmatrix}; 3) \begin{vmatrix} -x & 1 & x \\ 0 & -x & -1 \\ x & 1 & -x \end{vmatrix}$$

Javob: 1) -10; 2) $4a$; 3) $-2x$.

3. Quyidagi determinantlar soddalashtirilsin va hisoblansin:

$$1) \begin{vmatrix} a & -a & a \\ a & a & -a \\ a & -a & -a \end{vmatrix}; 2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -4 & 7 \\ -3 & 12 & -15 \end{vmatrix}; 3) \begin{vmatrix} 12 & 6 & -4 \\ 6 & 4 & 4 \\ 3 & 2 & 8 \end{vmatrix}$$

Javob: 1) $-4a^3$; 2) 144; 3) 72.

$$4. \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 6 & -6 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

determinant berilgan. Uning uchinchi satr elementlari va ikkinchi ustun elementlari minorlari yozilsin.

5. Quyidagi tenglamadan x topilsin va topilgan qiymatlarni determinantga qo'yib tekshirilsin.

$$1) \begin{vmatrix} x-1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0; 2) \begin{vmatrix} x^2 & 4 & 9 \\ x & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0; 3) \begin{vmatrix} x^2 & 3 & 2 \\ x & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

Javob: 1) 7; 2) $x_1=2, x_2=3$; 3) $x_1=0, x_2=-2$.

§2. Matritsalar va ular ustida amallar. Teskari matritsa

m ta satr va n ta ustundan iborat to'g'ri to'rtburchak shaklidagi $m \cdot n$ ta sondan tashkil topgan jadval $m \times n$ tartibli matritsa, uni tashkil etgan sonlar esa matritsaning elementlari deyiladi. Matritsa quyidagi ko'rinishda yoziladi.

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Agar $A_{m \times n}$ matritsa $m=n \neq 1$ bo'lsa, u kvadrat matritsa; $m \neq n$ ($m \neq 1, n \neq 1$) bo'lsa, to'g'ri burchakli matritsa deyiladi. Masalan:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 12 \\ 0 & 7 & -1 \end{pmatrix}$$

Matritsa 2×3 tartibli matritsadir.

Agar A va B matritsalar bir xil tartibli va ularning mos elementlari teng bo'lsa, ya'ni $a_{ij} = b_{ij}$ shart bajarilsa, ular teng matritsalar deyiladi va uni $A=B$ kabi yoziladi. Masalan,

$$A = \begin{pmatrix} a+a & a-a \\ a & a \cdot a \end{pmatrix} \text{ va } B = \begin{pmatrix} 2a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix} \text{ matritsalar o'zaro tengdir.}$$

Diagonal elementlaridan boshqa barcha elementlari nolga teng bo'lgan kvadrat matritsa diagonal matritsa deyiladi.

$$\text{Masalan: } A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; B_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 15 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \text{ matritsalar}$$

diagonal matritsaga misol bo'la oladi.

Barcha diagonal elementlari 1 ga teng bo'lgan n -tartibli diagonal matritsa n -tartibli birlik matritsa deyiladi va u E bilan belgilanadi. Masalan:

$$E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ va } E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

matritsalar mos ravishda ikkinchi va uchinchi tartibli birlik matritsalaridir.

Barcha elementlari nolga teng bo'lgan ixtiyoriy $m \times n$ tartibli matritsa nol matritsa deb ataladi va u 0 bilan belgilanadi.

Demak,

$$O_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; O_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; O_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Agar $m \times n$ tartibli matritsada $m=1$ bo'lsa, u holda

$$A = (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n})$$

bo'lib, unga satr matritsa deyiladi. Agar $n=1$ bo'lsa u holda $B = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$

bo'lib, unga ustun matritsa deyiladi.

Ikkita $m \times n$ tartibli.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \text{ va } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

matritsalar mos elementlari yig'indilaridan (ayirmalaridan) tashkil topuvchi $m \times n$ tartibli matritsa A va B matritsalar yig'indisi (ayirmasi) deb ataladi va $A+B$ ($A-B$) kabi belgilanadi.

$$\begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & \dots & a_{1n} \pm b_{1n} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & \dots & a_{2n} \pm b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} \pm b_{m1} & a_{m2} \pm b_{m2} & \dots & a_{mn} \pm b_{mn} \end{pmatrix}$$

Yuqorida aytilganlardan

$$1^\circ A + 0 = 0 + A = A;$$

$$2^\circ A + B = B + A;$$

$$3^\circ A + (B + C) = (A + B) + C;$$

$$4^\circ A + A = 2A$$

bo'lishi ravshan.

Biror $\lambda \neq 0$ son va $A_{m \times n}$ matritsani qaraymiz. λA matritsa quyidagidan iborat bo'ldi.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}; \quad \lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

A va B matritsalar hamda ixtiyoriy λ va μ sonlar uchun

$$1^\circ \lambda(\mu A) = \lambda\mu A;$$

$$2^\circ \lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B;$$

$$3^\circ (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A.$$

$A_{m \times n} = (a_{ij})$ va $B_{p \times n} = (b_{ij})$ matritsalarining ko'paytmasi deb shunday $C_{m \times n} = (c_{ij})$ matritsaga aytiladiki, uning c_{ij} elementlari ushbu

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} \cdot b_{kj}, \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad j = 1, 2, \dots, n$$

yig'indilar kabi aniqlanadi va AB kabi yoziladi.

Ko'paytma matritsa mavjud bo'lishi uchun A matritsaning ustunlari soni B matritsaning satrlari soniga teng bo'lishi kerak. Aytaylik,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

bo'lsin. U holda AB matritsa quyidagicha aniqlanadi.

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} \end{pmatrix}$$

Aytaylik A va B matritsalar quyidagi ko'rinishda bo'lsin:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

U holda AB ko'paytma quyidagicha aniqlanadi.

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} & a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} + a_{13}b_{33} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} & a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32} & a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} + a_{33}b_{33} \end{pmatrix}$$

Matritsalar ko'paytmasi va yig'indisi quyidagi qonunlarga bo'ysunadi

hamda ushbu xossalarga ega bo'ladi:

$$I. \quad A(BC) = (AB)C, \quad (\lambda A)B = A(\lambda B).$$

$$II. \quad A(B+C) = AB+AC, \quad (A+B)C = AC+BC.$$

$$III. \quad AE = EA = A, \quad 0 \cdot A = 0, \quad A \cdot 0 = 0, \quad 0 \cdot A = 0.$$

A kvadrat matritsani o'zaro m marta ($m > 1, m \in \mathbb{N}$) ko'paytirish natijasida hosil bo'lgan kvadrat matritsa A matritsaning m darajasi deyiladi va A^m kabi yoziladi.

Uning uchun quyidagilar o'rinlidir:

$$1. \quad A^m \cdot A^k = A^{m+k}, \quad 2. \quad (A^m)^k = A^{mk}.$$

$$3. \quad (\lambda A)^m = \lambda^m A^m, \quad 4. \quad E^m = E, \quad 5. \quad 0^m = 0.$$

Berilgan n -tartibli A kvadrat matritsaga teskari matritsa deb A^{-1} bilan belgilanuvchi va $AA^{-1} = A^{-1}A = E$ (E — n -tartibli birlik matritsa) shartni qanoatlantiruvchi n -tartibli kvadrat matritsaga aytiladi.

Berilgan A matritsaga teskari matritsa mavjud bo'lishi uchun uning determinanti nolga teng bo'lmasligi kerak.

Berilgan n -tartibli A kvadrat matritsaga teskari matritsa quyidagidek aniqlanadi.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} \cdots & A_{n2} \\ \cdots \cdots & \cdots \cdots & \cdots \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Berilgan 3- tartibli A-kvadrat matritsaga teskari matritsa quyidagicha aniqlanadi:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

Ikkinchi tartibli.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

kvadrat matritsa uchun teskari matritsa quyidagicha aniqlanadi.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

Bu yerda $|A|$ yozuv A matritsaning determinant ekanligini bildiradi.

A matritsaga qarama – qarshi matritsa deb $(-1) \cdot A$ matritsaga aytiladi. Ya'ni,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \text{ bo'lsa, } -A = \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & -a_{22} & -a_{23} \end{pmatrix} \text{ bo'ladi.}$$

$B=(b_{ij})$ matrisa $A=(a_{ij})$ matrisaning transponirlangani deyiladi, agar i va j indekslarning barcha mumkin bo'lgan qiymatlarida $a_{ij} = b_{ji}$ shart bajarilsa.

A matritsaning transponirlangani A^T kabi belgilanadi. Agar A matritsa $m \times n$ tartibli bo'lsa, uning transponirlangan $n \times m$ tartibli bo'ladi.

Matritsani transponirlanganini topish transponirlash amali deyiladi. Quyida A va A^T matritsalar keltirilgan:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Demak, A matrictsaga transponirlangan matrictsani topish uchun A matrictsaning satrlarini mos ustunlari bilan almashtirish kerak ekan.

Har qanday $A_{m \times n}$ matritsaning ixtiyoriy ravishda tanlangan k ta satr
(m, n) va ustunlarning kesishmasida joylashgan elementlari dan
tashqari k -tartibli determinant bu matritsaning k -tartibli minori deyiladi.

berilgan A matritsaning rangi deb uning noldan farqli minorining eng katta tartibiga aytiladi.

Matritsaning rangi $R(A)$ yoki $r(A)$ bilan belgilanadi.

U to $x_1, x_2, \dots, x_n$ noma'lumli n ta chiziqli tenglamalardan iborat

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

sistemani qaraymiz. Bu sistemaning koeffitsientlaridan tuzilgan $A_{m \times n}$

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \cdots & a_{2n} \\ \dots \dots & \dots \dots & \dots \dots \\ a_{m1} & a_{m2} \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

matritsani hamda ozod hadlardan iborat ustun qo'shilgan $A_{m \times (n+1)}$ tartibli kengaytirilgan

$$\bar{A} = A_{m \times (n+1)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_m \end{pmatrix},$$

matritsalarini qaraymiz. Berilgan sistemaning yechimi yuqoridagi matritsalarining rangiga bog'liqdir.

Teorema (Kroneker–Kapelli teoremasi). Berilgan sistema birgalikda bo'lishi uchun A matritsa va kengaytirilgan $\bar{A}$ matritsalarining ranglari bir xil bo'lishi zarur va yetarlidir. Ya'ni, $\text{rang } A = \text{rang } \bar{A}$.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 \\ 0 & 7 & 2 \end{pmatrix}$ va $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$

matritsalar berilgan $A + B$ va $A - B$ lar topilsin.

Yechish : $A+B = \begin{pmatrix} 5+1 & 3+0 & -1+1 \\ 0+2 & 7+(-3) & 2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$;

$$A - B = \begin{pmatrix} 5-1 & 3-0 & -1-1 \\ 0-2 & 7-(-3) & 2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -2 \\ -2 & 10 & -2 \end{pmatrix}.$$

2. $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix}$ matritsa berilgan. $6A$ matritsa topilsin.

$$\text{Yechish: } 6A = 6 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \cdot 5 & 6 \cdot 4 & 6 \cdot (-1) \\ 6 \cdot 0 & 6 \cdot 2 & 6 \cdot 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & 24 & -6 \\ 0 & 12 & 42 \end{pmatrix}$$

3. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ va $B = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ matritsalar berilgan $A \cdot B$ matritsa topilsin.

$$\begin{aligned} \text{Yechish: } A \cdot B &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3 \cdot 6 + 1 \cdot 1 & 3 \cdot (-4) + 1 \cdot 2 \\ 0 \cdot 6 + (-2) \cdot 1 & 0 \cdot (-4) + (-2) \cdot 2 \\ 4 \cdot 6 + 5 \cdot 1 & 4 \cdot (-4) + 5 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & -10 \\ -2 & -4 \\ 29 & -6 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4. $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & -5 \end{pmatrix}$ matritsani transponirlanganini toping.

$$\text{Yechish: } A_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & -5 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 0 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}.$$

5. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 3 & 4 & -2 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ va $B = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 4 \\ 4 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \end{pmatrix}$ matritsalar berilgan. $A \cdot B$ matritsa yozilsin.

$$\begin{aligned} \text{Yechish: } A \cdot B &= \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 3 & 4 & -2 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -3 & 4 \\ 4 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -4 + 12 - 12 & -6 + 6 - 8 & 8 - 9 + 16 \\ -6 + 16 - 6 & -9 + 8 - 4 & 12 - 12 + 8 \\ -6 + 8 + 12 & -9 + 4 + 8 & 12 - 6 - 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -8 & 15 \\ 4 & -5 & 8 \\ 14 & 3 & -10 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

8. $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ va $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ matritsalar berilgan AB matritsa topilsin.

$$\text{Yechish: } AB = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 4 \\ 3 \cdot 3 + 5 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \\ 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 \\ 27 \\ 28 \end{pmatrix}$$

9. $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ matritsa berilgan. A^{-1} matritsa topilsin.

Yechish: A matritsaning determinantini hisoblaymiz.

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 \cdot 4 + (-2) \cdot (-1) \cdot 0 + (-1) \cdot 1 \cdot 2 -$$

$$2 \cdot 1 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 \cdot 3 - (-2) \cdot (-1) \cdot 4 = 12 - 2 + 3 - 8 = 5 \neq 0.$$

Demak, berilgan A matritsaga teskari matritsa mavjud. Uni topish uchun $|A|$ determinantning barcha algebraik to'ldiruvchilarini topamiz.

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 4 + 1 = 5; \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 10;$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0;$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = -(-4 + 0) = 4; \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 12;$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1.$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1; \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -3;$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 1;$$

Topilganlarni teskari matritsani topish formulasiga qo'yamiz:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & 10 & -1 \\ 10 & 12 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4/5 & -1/5 \\ 2 & 12/5 & -3/5 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \end{pmatrix}$$

8. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ matritsa berilgan. Bu matritsaga teskari matritsa topilsin.

Yechish: A matritsaning determinantini hisoblaymiz.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 4 \cdot (-1) = 6 + 4 = 10.$$

Demak, $|A| = 10 \neq 0$. Bu esa berilgan matritsa uchun teskari matritsa mavjud bo'lishini bildiradi. Uni topish uchun determinantning ba'zi algebraik to'ldiruvchilarini topamiz.

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot 3 = 3; \quad A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot (-1) = 1; \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot 4 = -4;$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot 2 = 2.$$

Topilganlarni ikkinchi tartibli matritsa uchun teskari matritsani topish formulasiga qo'yamiz.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/10 & 1/10 \\ -2/5 & 1/5 \end{pmatrix}$$

$$9. A_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & -5 \end{pmatrix} \text{ matritsaning transponirlanganini toping}$$

Yechish: A matritsani transponirlangani A^T ni topish qoidasidan foydalanamiz.

$$A^T = A_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 0 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Ava B matritsalar yig'indisi topilsin.

$$1) A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 4 & -5 \end{pmatrix};$$

$$2) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

$$3) A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ -1 & 3 & 8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 6 \\ 4 & 3 & 0 \\ 7 & 10 & 0 \end{pmatrix};$$

$$4) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix};$$

2. A va B matritsalar ayirmasi topilsin.

$$1) A = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 9 & -4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ -3 & -7 \end{pmatrix};$$

$$2) A = \begin{pmatrix} 4 & 9 & -6 \\ -5 & 2 & 4 \\ 6 & -5 & 6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -7 & -4 & 2 \\ 4 & -5 & 3 \\ 2 & -6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$1) A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -10 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -4 & 9 & 7 \\ 6 & -5 & -4 \end{pmatrix}$$

2. A matritsa va $\gamma \neq 0$ son berilgan. γA matritsa topilsin.

$$1) A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}, \gamma = -3;$$

$$2) A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & -4 & 5 \\ 2 & 3 & -6 & -9 \end{pmatrix}, \gamma = -2;$$

$$3) A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -5 \\ 1 & -4 & 6 \\ 6 & 2 & -7 \end{pmatrix}, \gamma = 2.$$

4. A = $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ matritsaga qarama-qarshi matritsa topilsin.

5. Quyida berilgan A va B matritsalar ko'paytmasi topilsin.

$$1) A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix};$$

$$2) A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$3) A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & -4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & -3 \end{pmatrix};$$

$$4) A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix};$$

$$5) A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 5 \\ 2 & -4 & 3 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix};$$

$$6) A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$6. A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -7 & 4 \\ 5 & -3 \end{pmatrix};$$

bo'lsa, $C = A^2 + 2B$ ni aniqlang.

$$7. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ va } B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ bo'lsa, } AB - BA \text{ topilsin.}$$

$$8. A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ va } B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \text{ bo'lsa, } 3A \cdot 2B \text{ topilsin.}$$

9. Quyida berilgan matritsalar uchun teskari matritsalar topilsin.

$$1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}; 2) \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}; 3) \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix};$$

$$4) \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix}; 5) \begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}; 6) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

§3. Chiziqli tenglamalar sistemasi

Ikkita x_1 va x_2 noma'lumli chiziqli tenglamalardan iborat ushbu

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

sistema ikki noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasi deyiladi. Bunda $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ — sistemaning koeffitsientlari, b_1, b_2 — berilgan sonlardir.

x_1 va x_2 larning sistemani har bir tenglamasini to'g'ri tenglikka aylantiradigan x'_1, x'_2 qiymatlariga sistemaning yechimi deyiladi.

Berilgan sistemani o'rganishda ushbu

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}; \Delta x_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1a_{22} - b_2a_{12};$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = a_{11}b_2 - a_{21}b_1;$$

determinantlar muhim ahamiyatga ega.

Berilgan sistemani, yuqoridagi determinantlarni hisobga olgan holda,

$$\begin{cases} \Delta \cdot x_1 = \Delta x_1 \\ \Delta \cdot x_2 = \Delta x_2 \end{cases}$$

ko'rinisda yozish mumkin. Bundan berilgan sistemaning yechimi Δ, x_1 va Δx_2 larga bog'liq ekanligi kelib chiqadi. Bunda bir necha hollar bo'lishi mumkin:

1-hol. $\Delta \neq 0$ bo'lsin. Bu holda berilgan sistemadan $x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta}, x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta}$ bo'lishi kelib chiqadi. Sistemaning yechimini topishning bu usuli Kramer usuli deyiladi va formulaning o'ziga Kramer formulasi deyiladi.

1-hol. $\Delta \neq 0$ bo'lib, Δx_1 va Δx_2 lardan hech bo'lmaganda bittasi nolga farqli bo'lsin. Bu holda sistema yechimga ega bo'lmaydi va uni yechimda bo'lmagan sistema deyiladi.

2-hol. $\Delta = 0, \Delta x_1 = 0, \Delta x_2 = 0$. Bu holda berilgan sistema yoki shartli ko'p yechimga ega bo'ladi yoki yechimga ega bo'lmaydi. Shuning uchun sistema bu holda noaniq deyiladi.

Uchta x_1, x_2, x_3 noma'lumli chiziqli tenglamalardan iborat ushbu

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

sistema uch noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasi deyiladi. Bunda $a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{31}, a_{32}, a_{33}$ — sistemaning koeffitsientlari, b_1, b_2, b_3 — berilgan sonlar. Berilgan sistemaning yechimi quyidagi determinantlarning qiymatlariga bog'liq bo'ladi.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}; \Delta x_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix};$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}; \Delta x_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

Berilgan sistemani bu determinantlar orqali quyidagicha yozish mumkin:

$$\begin{cases} \Delta \cdot x_1 = \Delta x_1 \\ \Delta \cdot x_2 = \Delta x_2 \\ \Delta \cdot x_3 = \Delta x_3 \end{cases}$$

Bunda ham quyidagi hollar bo'lishi mumkin.

1-hol. $\Delta \neq 0$, bo'lsin. Bu holda berilgan sistemadan $x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta}, x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta}, x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta}$ bo'lishini aniqlaymiz. Bu holda sistema (x_1, x_2, x_3) yagona yechimga ega. Bu holda sistema birgalikda deyiladi va

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta}, x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta}, x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta}$$

munosabatlar Kramer formulalari deyiladi.

2-hol. $\Delta = 0$ bo'lib, $\Delta x_1, \Delta x_2, \Delta x_3$ lardan hech bo'lmaganda bittasi nolga farqli bo'lsin. Bunda berilgan sistema yechimga ega bo'lmaydi.

3-hol. $\Delta = 0$ bo'lib, $\Delta x_1 = \Delta x_2 = \Delta x_3 = 0$ bo'lsin. Bu holda sistemada yoki cheksiz ko'p yechimlarga ega bo'ladi yoki bitta ham yechimga ega bo'lmaydi.

n ta $x_1, x_2, \dots, x_n$ noma'lumli chiziqli tenglamalardan iborat ushbu

[illegible]

sistema n ta noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasi deyiladi.

Bunda $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}, \dots, a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn}$ sistema koeffitsientlari, $b_1, b_2, \dots, b_n$ lar ozod hadlar (berilgan sonlar). Bu sistema uchun ham yuqoridagidek hollar bo'lishi mumkin.

Bir jinsli uch noma'lumli ikkita tenglama sistemasi

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = 0, \\ a_2x + b_2y + c_2z = 0 \end{cases}$$

ko'rinishda bo'lib, u quyidagi formulalar bilan aniqlanuvchi yechimlarga ega.

$$x = k \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}, \quad y = -k \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}, \quad z = k \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}.$$

bu yerda k ixtiyoriy son.

Bir jinsli uch noma'lumli uchta tenglama sistemasi

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = 0, \\ a_2x + b_2y + c_2z = 0, \\ a_3x + b_3y + c_3z = 0. \end{cases}$$

ko'rinishga ega bo'lib, u

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

bo'lganda nolga teng bo'lmagan yechimlarga ega bo'ladi va aksincha. Ikki noma'lumli uchta chiziqli tenglama sistemasi

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2, \\ a_3x + b_3y = c_3 \end{cases}$$

ko'rinishda bo'lib, u

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

ganda va uning hech qaysi ikkita tenglamasi o'zaro zid bo'lmasa, α_3 va β_3 ning barcha qiymatlarida bo'ladi.

Aytaylik, quyidagi chiziqli tenglamalar sistemasi berilgan bo'lsin.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

Systemadagi noma'lumlarning koeffitsientlaridan A matritsani, noma'lumlardan X matritsani va ozod hadlardan B matritsani tuzamiz:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

U holda matritsalarining ko'paytirish qoidasidan va matritsalarining tenglik shartidan foydalanib, berilgan sistemani

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \text{ yoki } AX = B$$

ko'rinishda yozamiz. Bu tenglama eng sodda matritsaviy tenglama deyiladi.

Bu tenglama quyidagicha yechiladi. Dastlab A matritsaning determinanti hisoblanadi. Agar $|A| \neq 0$ bo'lsa, u holda berilgan A matritsaga teskari A^{-1} matritsa mavjud bo'ladi. Matritsaviy tenglamaning har ikkala qismini hadma-had A^{-1} ga ko'paytirib

$$A^{-1} \cdot (AX) = A^{-1} \cdot B$$

iii) hosil qilamiz. Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossasidan foydalanib

$$(A^{-1}, A)X = A^{-1} \cdot B$$

ni hosil qilamiz. Bu yerda $A^{-1} \cdot A = E$ va $EX = X$ bo'lgani uchun $X = A^{-1} \cdot B$. Bu berilgan sistemaning matritsaviy yechimi bo'ladi. Xuddi shu usul bilan ikki noma'lumli sistema ham matritsaviy ko'rinishda yoziladi va yechiladi.

Ba'zi hollarda chiziqli tenglamalar sistemasini Gaus usuli deb ataluvchi usul bilan ham yechiladi. Tenglamalar sistemasi bu usul bilan

yechilganda noma'lumlar ketma-ket yo'qotib boriladi, va sistemaning tenglamalaridan biri bir noma'lumli tenglamaga keltiriladi. Undan esa noma'lum topiladi va topilgan qiymatni qolgan tenglamalarga qo'yib qolgan noma'lumlar topiladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 = -1 \\ 2x_1 - x_2 = 5 \end{cases}$ sistemani yeching.

Yechish: Avvalo, bu sistemaning determinantini hisoblaymiz.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 = -1 - 6 = -7 \neq 0$$

Demak, berilgan sistema yagona yechimga ega. Uni Kramer formulasidan foydalanib topamiz: Buning uchun Δx_1 va Δx_2 larni topamiz.

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 1 - 15 = -14; \quad \Delta x_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 5 + 2 = 7;$$

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{-14}{-7} = 2, \quad x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{7}{-7} = -1.$$

Demak, berilgan sistemaning yechimi $(2; -1)$ bo'ladi.

2. $\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ 3x_1 + 6x_2 = 1 \end{cases}$ sistemani yeching.

Yechish: Bu sistema uchun

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 6 - 6 = 0, \quad \Delta x_1 = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 18 - 2 = 16,$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 9 = -8$$

bo'ladi. Demak, berilgan sistema birgalikda emas, ya'ni uning yechimi mavjud emas.

3. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 1 \\ 4x_1 + 6x_2 = 2 \end{cases}$ sistemani yeching.

Yechish: Bu sistema uchun

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 12 - 12 = 0, \quad \Delta x_1 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 6 - 6 = 0,$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0.$$

bo'ladi. Ixtiyoriy $(t, \frac{1-2t}{3})$ ko'rinishdagi juftlik berilgan sistemaning yechimi ekani ravshan. Demak, berilgan sistema noaniq sistema bo'lib, u cheksiz ko'p yechimga ega.

4. Quyidagi $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 4, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = -3. \end{cases}$ sistemani yeching.

Yechish: Bu sistemaning determinantini hisoblaymiz:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -8 + 3 + 1 - 2 + 2 - 6 = -10 \neq 0.$$

Demak, berilgan sistema yagona yechimga ega. Berilgan sistema uchun

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -16 + 1 - 3 + 6 + 4 - 2 = -10;$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & -2 \end{vmatrix} = -4 - 9 - 4 - 1 - 6 + 24 = 0;$$

$$\Delta x_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -12 + 12 - 1 - 8 - 2 - 9 = -20.$$

bo'ladi.

Kramer formulasidan foydalanib

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{-10}{-10} = 1, \quad x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{0}{-10} = 0, \quad x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta} = \frac{-20}{-10} = 2$$

bo'lishini topamiz. Demak, berilgan sistemaning yechimi $(1; 0; 2)$ dan iborat.

5. Quyidagi $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 4. \end{cases}$

sistemani yeching.

Yechish: Bu sistema uchun $\Delta, \Delta x_1, \Delta x_2$, va Δx_3 larni topamiz:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 6 + 9 + 8 - 8 - 6 - 9 = 0;$$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 12 + 3 + 8 - 8 - 12 - 3 = 0;$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 3 + 12 + 16 - 4 - 8 - 18 = 1;$$

$$\Delta x_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 8 + 18 + 4 - 16 - 3 - 12 = -1;$$

bo'lgani sababli berilgan sistema yechimga ega emas.

6. Quyidagi
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8, \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9, \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5, \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$$

chiziqli tenglamalar sistemasini yeching.

Yechish: Bu sistemaning determinantini hisoblaymiz:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -3 & 0 & 6 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} -$$

$$- \begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 \\ -3 & 0 & -6 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 27 \neq 0.$$

Demak, berilgan tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega.

Endi $\Delta x_1, \Delta x_2, \Delta x_3$ va Δx_4 larni topamiz.

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 8 \cdot A_{11} + 9 \cdot A_{21} - 5 \cdot A_{31} + 0 \cdot A_{41} =$$

$$= 8 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 0 & -6 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} - 9 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} - 5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 \\ -3 & 0 & -6 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 81.$$

Sodd shu kabi $\Delta x_2 = -81, \Delta x_3 = -27, \Delta x_4 = 27$ larni topamiz. Demak,

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = 3, x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = -4, x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta} = -1, x_4 = \frac{\Delta x_4}{\Delta} = 1.$$

7. Ushbu sistemani Gauss usulida eching:

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 20 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -11 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 9 \end{cases}$$

Yechish: Bu sistemadan noma'lumlarni birin-ketin yo'qotamiz.

1-qadam. Sistemaning ikkinchi va uchinchi tenglamalaridan x_1 noma'lumni yo'qotamiz. Kasr sonlarga kelmaslik va bu orqali hisoblashlarni soddalashtirish maqsadida buni Quyidagicha amalga oshiramiz. Dastlab 1-tenglamani ikkala tomonini -3 soniga, 2-tenglamani esa 2 soniga ko'paytirib, ularni o'zaro qo'shamiz. So'ngra 1-tenglamani ikkala tomonini -2 soniga ko'paytirib, hosil bo'lgan tenglamani 3-tenglamaga qo'shamiz. Natijada, berilgan sistemaga ekvivalent bo'lgan quyidagi sistemaga kelamiz:

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 20, \\ 17x_2 - 16x_3 = -82, \\ 8x_2 - 5x_3 = -31. \end{cases}$$

2-qadam. Oldingi qadamda hosil qilingan sistemaning ikkinchi tenglamasini -8 soniga, uchinchi tenglamasini 17 soniga ko'paytirib ozaro qo'shamiz:

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 20, \\ 17x_2 - 16x_3 = -82, \\ 43x_3 = 129. \end{cases}$$

Dastlab hosil bo'lgan sistemaning uchinchi tenglamasidan $x_3 = 3$ ekanligini topamiz. So'ngra bu qiymatni sistemaning ikkinchi tenglamasiga qo'yib, undan $x_2 = -2$ ekanligini topamiz. yakuniy qadamda $x_2 = -2$, va $x_3 = 3$ larni sistemaning birinchi tenglamasiga qo'yib, undan $x_1 = 1$ ekanligini topamiz. Demak, berilgan sistemaning yagona yechimi $x_1 = 1, x_2 = -2, x_3 = 3$ ekan.

$$8. \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 10 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 23 \\ x_2 + 2x_3 = 13 \end{cases} \text{ sistema matritsa usuli bilan yechilsin.}$$

$$\text{Yechish: } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 10 \\ 23 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

bo'lgani uchun berilgan sistema $AX = B$ matritsaviy tenglama ko'rinishiga keladi. Uni Yechish uchun dastlab A matritsaning determinantini hisoblaymiz.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 0 + 0 - 0 - 1 - 12 = -9 \neq 0.$$

Demak, A matritsa uchun teskari matritsa mavjud. Uni aniqlash uchun A matritsa determinantining barcha algebraik to'ldiruvchilarini aniqlaymiz;

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3; \quad A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(4 - 0) = -4;$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 0 = 2; \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -(6 - 0) = -6;$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 0 = 2; \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -(1 - 0) = -1;$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3; \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1;$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 6 = -4;$$

Bularni A matritsaga teskari matritsani aniqlash formulasiga qo'yamiz.

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -6 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Buni $X = A^{-1} \cdot B$ ga qo'yamiz:

$$X = A^{-1} \cdot B = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -6 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 23 \\ 13 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 \cdot 10 - 4 \cdot 23 + 2 \cdot 13 \\ -6 \cdot 10 + 2 \cdot 23 - 1 \cdot 13 \\ 3 \cdot 10 - 1 \cdot 23 - 4 \cdot 13 \end{pmatrix} = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} -36 \\ -27 \\ -45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Demak,

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ bo'lib, undan } x_1 = 4, x_2 = 3 \text{ va } x_3 = 5 \text{ lar}$$

kelib chiqadi. Bular berilgan sistemaning yechimidan iborat.

$$9. \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 7 \\ 3x_1 + 4x_2 = 17 \end{cases} \text{ sistema yechilsin.}$$

$$\text{Yechish: } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \end{pmatrix} \text{ bo'lgani uchun berilgan}$$

sistemaning matritsaviy yozuvi $AX = B$ ko'rinishda boladi. Undan esa

$X = A^{-1} \cdot B$ ni yozishimiz mumkin. Demak, berilgan sistemaning yechimi A matritsaga teskari matritsa bilan B matritsaning ko'paytmasidan iborat ekan. Ma'lumki, A matritsaga teskari matritsa mavjud bo'lishi uchun uning determinanti noldan farqli bo'lishi kerak. Ya'ni

$$|A| = \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2 \neq 0.$$

A matritsaning barcha algebraik to'ldiruvchilarini topamiz:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot 4 = 4; \quad A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot 2 = -2;$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot 3 = -3; \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot 1 = 1.$$

Bularni teskari matritsani topish formulasiga qo'yamiz:

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 + 17 \\ \frac{21}{2} - \frac{17}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad x_1 = 3, \quad x_2 = 2.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Determinantlar yordamida quyidagi tenglamalar sistemasi yechilsin:

$$1) \begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 4x - 5y = 40 \end{cases}; 2) \begin{cases} ax - 3y = 1 \\ ax - 2y = 2 \end{cases}; 3) \begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ 7x + 4y = 8 \end{cases};$$

$$\begin{aligned}
 &4) \begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x - 5y = 2 \end{cases}; 5) \begin{cases} 2x + 5y = 3 \\ 4x + 10y = 6 \end{cases}; 6) \begin{cases} 5x + 3y = 7 \\ 10x + 6y = 2 \end{cases} \\
 &7) \begin{cases} 5x + 8y + z = 2 \\ 3x - 2y + 6z = -7 \end{cases}; 8) \begin{cases} 2x - 3y + z = -7 \\ x + 4y + 2z = -1 \end{cases}; \\
 &\quad \begin{cases} 2x + y - z = -5 \\ x - 4y = -5 \end{cases} \\
 &9) \begin{cases} 2x - 7y + z = -4 \\ 3x + y - z = 17 \\ x - y + 3z = 3 \end{cases}; 10) \begin{cases} 2x - 4y + 3z = 1 \\ x - 2y + 4z = 3 \\ 3x - y + 5z = 2 \end{cases} \\
 &11) \begin{cases} x + 2y + 3z = 4 \\ 2x + y - z = 3 \\ 3x + 3y + 2z = 10 \end{cases}; 12) \begin{cases} 2x - y + z = 2 \\ 3x + 2y + 2z = -2 \\ x - 2y + z = 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Javob: 1) (5; -4); 2) $(\frac{4}{3}; 1)$; 3) (0; 2); 4) $(\frac{41}{22}; \frac{12}{11})$; 5) cheksiz ko'p yechimlarga ega; 6) yechimga ega emas; 7) (-3; 2; 1); 8) (-1; 1; -2); 9) (5; 2; 0); 10) (-1; 0; 1); 11) (1; -1; 2); 12) (2; -1; -3).

2. Quyidagi sistema yechilsin:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 = 20 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 11 \\ 2x_1 + 10x_2 + 9x_3 + 9x_4 = 40 \\ 3x_1 + 8x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 37 \end{cases}$$

Javob: (1; 2; 2; 0)

3. Quyidagi sistemalarni Gauss usuli bilan yechilsin.

$$\begin{aligned}
 &1) \begin{cases} 5x_1 - 5x_2 - 4x_3 = -3 \\ x_1 - x_2 - 5x_3 = 11 \\ 4x_1 - 3x_2 - 6x_3 = -9 \end{cases}; 2) \begin{cases} x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 - 6x_3 = -21 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = -4 \end{cases} \\
 &3) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_4 = 2, \\ 3x_1 - x_3 + x_4 = -3, \\ 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 5x_4 = -6. \end{cases}; 4) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 10, \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 5, \\ x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 2, \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = -1. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Javob: 1) (0; -1; 2); 2) (-2; -3; 5); 3) $(0; 2; \frac{5}{3}; \frac{-4}{3})$; 4) (1; 0; 1; 2).

4. Quyidagi tenglamalar sistemasi matritsa usuli bilan yechilsin:

$$1) \begin{cases} 3x_1 - 5x_2 = 13, \\ 2x_1 + 7x_2 = 81, \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = -6, \\ 3x_1 + 4x_2 = 18, \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 3x_1 + 8x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 + 6x_3 = -7 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -5 \end{cases}; 4) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -7 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 4x_2 = -5 \end{cases}$$

Javob: 1) (16; 7); 2) (2; 3); 3) (-3; 2; 1); 4) (-1; 1; -2);

VIII.BOB. SONLI KETMA-KETLIK VA FUNKSIYANING LIMITI

§1. Sonli ketma-ketlik va uning limiti

Agar har bir $n \in N$ natural songa biror qonun-qoida asosida ma'lum bir $a_n \in R$ haqiqiy son mos qo'yilgan bo'lsa, unda $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ sonli ketma-ketlik deb ataladi. Bunda a_i ($i \in N$) sonli ketma-ketlikning hadlari, a_n esa umumiy hadi deyiladi.

Masalan,

- 1) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$, umumiy hadi $a_n = \frac{1}{n}$;
- 2) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots$, umumiy hadi $a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$;
- 3) $-1, 1, -1, -1, \dots, (-1)^n, \dots$, umumiy hadi $a_n = (-1)^n$;
- 4) $3, 3, 3, \dots, 3, \dots$, umumiy hadi $a_n = 3$.

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ sonli ketma-ketlik qisqacha $\{a_n\}$ kabi belgilanadi.

Sonli ketma-ketlik bir necha usullarda berilishi mumkin.

1. Ketma-ketlik umumiy hadi formulasi bilan berilishi mumkin. Bunda n — hadining qiymatini shu hadning tartib nomeri bilan bog'lovchi formula beriladi. Umumiy had formulasi yordamida istalgan hadni topish mumkin. Bunga misol sifatida $a_n = \frac{1}{n^2}$ ni olish mumkin.

2. Ketma-ketlik o'z hadining tartib nomeri bilan shu hadning qiymati orasidagi moslikni sonlar orqali ifodalash yordamida berilishi mumkin. Masalan, har bir toq natural songa 3 ni, har bir juft natural songa esa 5 ni mos keltiramiz: Natijada $3; 5; 3; 5; 3; 5, \dots$ ketma-ketlikka ega bo'lamiz. Uning umumiy hadini $a_n = 4 + (-1)^n$ ko'rinishda yozish mumkin.

3. Ketma-ketlik rekurrent formula yordamida berilishi mumkin. Agar ketma-ketlikning dastlabki bitta yoki bir nechta hadlari berilgan bo'lib, keyingi hadlarni shu berilgan hadlar yordamida topish imkonini beruvchi formula (rekurrent formula) ko'rsatilgan bo'lsa, ketma-ketlik rekurrent usulda berilgan deyiladi. Masalan, $a_1 = 3$, $a_n = 2^n \cdot a_{n-1} - 4$ ($n \geq 2$) bo'lsa, $\{a_n\}$ ketma-ketlikning a_2, a_3, a_4 hadlarini topishimiz mumkin,

$$a_2 = 2^2 \cdot 3 - 4 = 12 - 4 = 8,$$

$$a_3 = 2^3 \cdot 8 - 4 = 64 - 4 = 60,$$

$$a_4 = 2^4 \cdot 60 - 4 = 960 - 4 = 954.$$

4. Ketma-ketlik jadval yoki grafik usulda ham berilishi mumkin.

5. Sonlar ketma-ketligi so'z ifodasi bilan ham beriladi. Ketma-ketlik bu usulda berilganda, istalgan n nomerga mos kelgan hadni topish qoidasi so'z bilan ifodlangan bo'ladi. Masalan, $\sqrt{2}$ ning 0.1; 0.01; 0.001 va hokazo aniqlikda kami bilan olingan taqribiy qiymatlaridan tuzilgan ketma-ketlik 1.4; 1.41; 1.414; ... dan iborat.

Agar shunday $M(m)$ soni mavjud bo'lsaki, $\{a_n\}$ ketma-ketlikning barcha hadlari uchun $a_n \leq M$ ($a_n \geq m$) shart bajarilsa, unda bu ketma-ketlik yuqoridan (quyidan) chegaralangan deyiladi.

Ham yuqoridan, ham quyidan chegaralangan ketma-ketlik chegaralangan ketma-ketlik deb ataladi.

Ixtiyoriy $M > 0$ soni uchun $\{a_n\}$ ketma-ketlikning kamida bitta hadi $|a_n| > M$ tengsizlikni qanoatlantirsa, bu ketma-ketlik chegaralanmagan deyiladi.

Hamma hadlari bir xil a songa teng bo'lgan ketma-ketlik o'zgarmas ketma-ketlik deyiladi.

Agar $\{a_n\}$ ketma-ketlik berilgan bo'lib, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ soni uchun unga bog'liq shunday N_ε son topilsaki, $n > N_\varepsilon$ shartni qanoatlantiruvchi barcha natural sonlar va biror chekli A haqiqiy son uchun $|a_n - A| < \varepsilon$ tengsizlik bajarilsa, bu A son $\{a_n\}$ ketma-ketlikning chekli limiti deyiladi. A soni $\{a_n\}$ ketma-ketlikning chekli limiti ekanligi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$$

yoki $a_n \rightarrow A$ kabi yoziladi.

Ixtiyoriy $M > 0$ soni uchun bu songa bog'liq shunday N_M soni topilsaki, $\{a_n\}$ ketma-ketlik tartib raqami $n > N_M$ shartni qanoatlantiruvchi barcha hadlar uchun $|a_n| > M$ tengsizlik bajarilsa, unda bu ketma-ketlik cheksiz limitga ega deyiladi.

$\{a_n\}$ ketma-ketlikning limiti cheksiz ekanligi $\lim a_n = \infty$ yoki $\lim a_n = \pm \infty$ kabi ifodalanadi.

Agar $\{a_n\}$ ketma-ketlik chekli limitga ega bo'lsa, u yaqinlashuvchi, aks holda esa uzoqlashuvchi ketma-ketlik deyiladi.

Agar ixtiyoriy $n = 1, 2, 3, \dots$ uchun $a_{n+1} > a_n$ ($a_{n+1} < a_n$) tengsizlik o'rinli bo'lsa, unda $\{a_n\}$ ketma-ketlik monoton o'suvchi (kamayuvchi) deyiladi.

Agar $\{a_n\}$ va $\{b_n\}$ ketma-ketlikning ikkalasi ham yaqinlashuvchi va $\lim a_n = A$, $\lim b_n = B$ bo'lsa, unda quyidagi tengliklar o'rinli bo'ladi:

$$\lim(a_n \pm b_n) = \lim a_n \pm \lim b_n = A \pm B;$$

$$\lim(a_n \cdot b_n) = \lim a_n \cdot \lim b_n = A \cdot B;$$

$$\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim a_n}{\lim b_n} = \frac{A}{B},$$

$$\lim c = c,$$

$$\lim C a_n = C \lim a_n = C A.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha = \begin{cases} 0, & \alpha < 0 \\ 1, & \alpha = 0 \\ \infty, & \alpha > 0 \end{cases}$$

Agar $\{a_n\}$ va $\{b_n\}$ ketma-ketliklar yaqinlashuvchi bo'lib, $\forall n \in N$ da $a_n \leq b_n$ ($a_n \geq b_n$) bo'lsa, u holda

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \text{ bo'ladi.}$$

Agar $\{a_n\}$, $\{c_n\}$ ketma-ketliklar yaqinlashuvchi va

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$$

bo'lib $n \in N$ da $a_n \leq b_n \leq c_n$ bo'lsa u holda $\{b_n\}$ ketma-ketlik ham yaqinlashuvchi va

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$$

bo'ladi.

Agar $\{a_n\}$ ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo'lib,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

bo'lsa, u holda $a_n = a + \alpha_n$ bo'ladi va aksincha. Bu yerda α_n cheksiz kichik miqdor.

Sonli ketma-ketliklarining limitlarini hisoblashda ajoyib limit deb ataladigan quyidagi limitlardan ham foydalanish mumkin.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \text{ yoki } \lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e$$

Bu yerda $e = 2.718281 \dots$ ga teng irratsional son bo'lib, u logarifmning asosi bo'lganda, u natural logarifm deyiladi va $\ln$ kabi yoziladi.

Agar $\{a_n\}$ ketma-ketlikning limiti 0 ga teng bo'lsa, ya'ni

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

bo'lsa, u holda $\{a_n\}$ cheksiz kichik (ketma-ketlik) miqdor deyiladi.

Agar $\{a_n\}$ ketma-ketlikning limiti cheksiz, ya'ni

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

bo'lsa, u holda $\{a_n\}$ cheksiz katta (ketma-ketlik) miqdor deyiladi.

Agar $\{a_n\}$ ketma-ketlik o'suvchi bo'lib, yuqoridan chegaralangan bo'lsa, u holda u yaqinlashuvchi bo'ladi.

Agar $\{a_n\}$ ketma-ketlik kamayuvchi bo'lib, quyidan chegaralangan bo'lsa, u holda u yaqinlashuvchi bo'ladi.

Agar $\forall \varepsilon > 0$ son olinganda han shunday $n_0 \in \mathbb{N}$ topilsaki, barcha $n > n_0$ va barcha $m > n_0$ lar uchun

$$|x_n - x_m| < \varepsilon$$

tengsizlik bajarilsa, $\{a_n\}$ ketma-ketlik fundamental ketma-ketlik deyiladi.

Agar $\{a_n\}$ ketma-ketlik fundamentantel ketma-ketlik bo'lsa u yaqinlashuvchi bo'ladi.

$(a_n \pm b_n), (a_n \cdot b_n)$ va $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ ko'rinishdagi ketma-ketliklarning limitlarini topishda $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty$ ko'rinishdagi ifodalar hosil bo'lib qolishi mumkin. Bu ifodalar aniqmas ifodalar deb ataladi.

Bunday hollarda $\{a_n\}$ va $\{b_n\}$ ketma-ketliklarning o'zgarish qonunlarini e'tiborga olib, bizni qiziqitiruvchi ifodani bevosita tekshirishga to'g'ri keladi. Bunday tekshirish aniqmasliklarni ochish deyiladi.

Ko'pincha, limiti izlanayotgan ifodada ayniy almashtirishlar bajarish aniqmasliklarni ochishni osonlashtiradi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Umumiy hadi $a_n = \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{k}$ bo'lgan sonli ketma-ketlikning dastlabki 5 ta hadi yozilsin.

Yechish: Umumiy haddagi n o'rniga ketma-ket 1, 2, 3, 4, 5 sonlarini qo'yamiz:

$$x_1 = \frac{\sin \frac{\pi}{1}}{1} = \frac{1}{1} = 1;$$

$$x_2 = \frac{\sin \frac{2\pi}{2}}{2} = \frac{\sin \pi}{2} = \frac{0}{2} = 0;$$

$$x_3 = \frac{\sin \frac{3\pi}{3}}{3} = \frac{-1}{3} = -\frac{1}{3};$$

$$x_4 = \frac{\sin \frac{4\pi}{4}}{4} = \frac{\sin 2\pi}{4} = \frac{0}{4} = 0;$$

$$x_5 = \frac{\sin \frac{5\pi}{5}}{5} = \frac{\sin \pi}{5} = \frac{1}{5}.$$

Demak, $\frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{k}$ ning dastlabki 5 ta hadlari 1, 0, $-\frac{1}{3}$, 0, $\frac{1}{5}$ lardan iborat.

2. Dastlabki bir nechta hadlari bilan berilgan $\frac{2}{3}, \frac{5}{8}, \frac{10}{13}, \frac{17}{18}, \frac{26}{23}$ ketma-ketlikning umumiy hadi yozilsin:

Yechish: Berilgan ketma-ketlikning har bir hadining surati shu hadning nomerini bildiruvchi raqamning kvadrati bilan 1 soni yig'indisidan iborat ekanligini ko'ramiz. Ya'ni u n^2+1 ga teng. Ketma-ketlik hadlarining maxrajlarini ayirmasi 5 ga va birinchi hadi 3 ga teng bo'lgan arifmetik progressiya hadlaridan iborat. Ya'ni:

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 3 + 5(n-1) = 5n-2.$$

$$\text{Demak, } a_n = \frac{n^2+1}{5n-2}.$$

3. Ketma-ketlikning ta'rifidan foydalanib,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n+1} = 1$$

bo'lishini isbotlang.

Yechish: $\varepsilon > 0$ son uchun shunday $N(\varepsilon)$ ning mavjudligi ko'rsatishimiz kerakki, har qanday $n > N(\varepsilon)$ uchun $|a_n - 1| < \varepsilon$ tengsizlik bajarilishi kerak. Buning uchun $|a_n - 1|$ ni aniqlashimiz kerak.

$$|a_n - 1| = \left| \frac{2n-1}{2n+1} - 1 \right| = \left| \frac{2n-1-2n-1}{2n+1} \right| = \left| \frac{-2}{2n+1} \right| = \frac{2}{2n+1}.$$

Bundan esa $\frac{2}{2n+1} < \varepsilon$ tengsizlik kelib chiqadi. Undan $n > \frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{2}$ ni yoki $N = E(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{2})$ ni aniqlaymiz. Shunday qilib, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun shunday N topiladiki $n > N$ tengsizlikdan $|a_n - 1| < \varepsilon$ tengsizlik kelib chiqadi. Bu esa $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n+1} = 1$ ekanligini bildiradi.

4. $x_1=1, x_2=2$, bo'lib $n > 2$ bo'lganda $x_n = x_{n-1} - x_{n-2}$ bo'ladi. Bu ketma-ketlikning dastlabki bir nechta hadlari yozilsin.

Yechish: $x_3 = x_2 - x_1 = 2 - 1 = 1$; $x_4 = x_3 - x_2 = 1 - 2 = -1$; $x_5 = x_4 - x_3 = -1 - 1 = -2$; $x_6 = x_5 - x_4 = -2 - (-1) = -2 + 1 = -1$; $x_7 = x_6 - x_5 = -1 - (-2) = -1 + 2 = 1$ va hokazo.

Demak, izlanayotgan ketma-ketlik

$$1; 2; 1; -1; -2; -1; 1; \dots$$

dan iborat.

5. $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \dots, \frac{(-1)^n}{n}, \dots$ ketma-ketlikning chegaralangan ekanligi isbotlansin.

$$\text{Isbot: } |a_n| = \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n} \leq 1$$

Demak, ketma-ketlik chegaralangan.

6. Umumiy hadi $a_n = \frac{n+1}{n}$ bo'lgan sonlar ketma-ketligi kamayuvchi ketma-ketlik ekanligi isbotlansin.

Isbot: $a_n = \frac{n+1}{n}, n=1, 2, 3, \dots$, y holda $a_{n+1} = \frac{n+2}{n+1}$ bo'lib, $a_{n+1} - a_n = \frac{n+2}{n+1} - \frac{n+1}{n} = \frac{n^2 + 2n - n^2 - 2n - 1}{n(n+1)} = -\frac{1}{n(n+1)} < 0$ bo'ladi. Bundan $a_{n+1} - a_n > 0$ va ixtiyoriy nomer uchun $x_{n+1} < x_n$

Bu esa berilgan ketma-ketlikning kamayuvchi ekanligini bildiradi.

$$7. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n^3 + n)^2} \text{ ni hisoblang.}$$

Yechish: Agar biz bu yerda limitlar haqidagi teoremlarni qo'llasak, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n^3 + n)^2} = \frac{\infty}{\infty}$ bo'lib berilgan ifoda $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi aniqmaslikdan iborat bo'ladi. Shuning uchun berilgan ifodada ayniy almashtirish bajaramiz. Natijada

$$\frac{n^2}{(n^3 + n)^2} = \frac{n^2}{[n^3(1 + \frac{1}{n^2})]^2} = \frac{n^2}{n^6(1 + \frac{1}{n^2})^2} = \frac{1}{n^4(1 + \frac{1}{n^2})^2} = \frac{1}{n^4} \cdot \frac{1}{(1 + \frac{1}{n^2})^2} \text{ hosil bo'ladi.}$$

Huquq ko'paytma, bo'linma va yig'indining limiti haqidagi teoremlarni qo'llab quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n^3 + n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^4} \cdot \frac{1}{(1 + \frac{1}{n^2})^2} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{n^2})^2} = 0 \cdot 1 = 0.$$

$$8. \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) \text{ hisoblansin.}$$

Yechish: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n+2} = \infty$ va $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$ bo'lgani uchun berilgan ifoda $\infty - \infty$ shakldagi aniqmaslikdir. Bu ifodada ayniy almashtirishlar qilamiz. Buning uchun berilgan ifodani unga qo'shma ifodaga ko'paytiramiz va bo'lamiz:

$$\sqrt{n+2} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+2} - \sqrt{n})(\sqrt{n+2} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} = \frac{n+2-n}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} + \sqrt{n}) = \infty \text{ bo'lgani uchun}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} = \frac{2}{\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} + \sqrt{n})} = \frac{2}{\infty} = 0.$$

$$9. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) \text{ ni hisoblang.}$$

Yechish: Yuqoridagi misolda $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) = 0$ ekanligini topdik. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$ bo'lgani uchun berilgan ifoda $0 \cdot \infty$ ko'rinishdagi aniqmaslikdir. Uni ochish uchun ayniy almashtirish qilamiz.

$$\sqrt{n}(\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) = \frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} = \frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n}(\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1)} = \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1};$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1} = \frac{2}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$10. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 + 2n^2 - 3n + 7}{4n^3 - 2n + 1} \text{ ni hisoblang.}$$

Yechish: Agar limitlar haqidagi teoremlarni qo'llasak yangi aniqlaslikka duch kelamiz. Shuning uchun bu yerda ham almashtirishlar qilamiz. Ya'ni kasrning surat va maxrajidan n^3 ni qavadar tashqariga chiqaramiz.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 + 2n^2 - 3n + 7}{4n^3 - 2n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3(5 + \frac{2}{n} - \frac{3}{n^2} + \frac{7}{n^3})}{n^3(4 - \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^3})} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (5 + \frac{2}{n} - \frac{3}{n^2} + \frac{7}{n^3})}{\lim_{n \rightarrow \infty} (4 - \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^3})} =$$

$$= \frac{5 + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} + 7 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3}}{4 - 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3}} = \frac{5 + 2 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 7 \cdot 0}{4 - 2 \cdot 0 + 0} = \frac{5}{4}.$$

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{3}{n})^{2n}$ ni hisoblang.

Yechish: Berilgan limitni hisoblash uchun $\frac{3}{n} = \alpha$ almashtirish qilamiz. Bunda $n \rightarrow \infty$ da $\alpha \rightarrow 0$ va $n = \frac{3}{\alpha}$ bo'ladi. Demak,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{3}{n})^{2n} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{6}{\alpha}} = \left[\lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} \right]^6 = e^6.$$

12. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n+5}{n+2})^n$ ni hisoblang.

Yechish: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n+5}{n+2})^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{n+5}{n}}{\frac{n+2}{n}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \frac{5}{n}}{1 + \frac{2}{n}} \right)^n = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{5}{n})^n}{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{2}{n})^n} =$

$$= \left\{ \begin{array}{l} \frac{5}{n} = \alpha, n = \frac{5}{\alpha} \\ n \rightarrow \infty, \alpha \rightarrow 0 \\ \frac{2}{n} = \beta, n = \frac{2}{\beta} \\ n \rightarrow \infty, \beta \rightarrow 0 \end{array} \right\} = \frac{\lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{5}{\alpha}}}{\lim_{\beta \rightarrow 0} (1 + \beta)^{\frac{2}{\beta}}} = \frac{\left[\lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} \right]^5}{\left[\lim_{\beta \rightarrow 0} (1 + \beta)^{\frac{1}{\beta}} \right]^2} = \frac{e^5}{e^2} = e^3.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Umumiy hadi quyidagi formulalar bilan berilgan ketma-ketliklarning dastlabki bir nechta hadlari yozilsin.

1) $a_n = \sin \frac{n\pi}{3}$; 2) $a_n = 2^{-n} \cdot \cos n\pi$; 3) $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$

Javob: 1) $\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \dots$ 2) $-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$

3) 2; 2.25; $2\frac{10}{27}$; $2\frac{113}{256}$;

2. Quyidagi ketma-ketliklarning dastlabki beshta hadini yozing.

1) $a_n = 2^{n-1}$; 2) $a_n = 2^n - \frac{1}{2^n}$; 3) $a_n = \frac{1 + (-1)^n}{2}$;

Javob: 1) 1, 2, 4, 6, 8, 16; 2) $\frac{3}{2}, \frac{15}{4}, \frac{63}{8}, \frac{255}{16}, \frac{1023}{32}$; 3) 0, 1, 0, 1, 0.

4) $a_n = \frac{1}{n(n+2)}$ ketma-ketliklarning $a_{10}, a_{n-1}, a_{n+1}, a_{2n+1}$ hadlari

topilsin.

Javob: $a_{10} = \frac{1}{120}$; $a_{n-1} = \frac{1}{(n-1)(n+1)}$; $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)(n+3)}$;

$a_{2n+1} = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}$.

4. Quyidagi ketma-ketlikning qaysilari monoton bo'ladi?

1) $\frac{1}{n+1}$; 2) $\frac{4n+3}{2n+1}$; 3) $\frac{2n}{n^2+1}$; 4) $\frac{\sin n}{n}$.

Javob: 1) o'suvchi; 2) kamayuvchi; 3) kamayuvchi; 4) o'zgarmas ketma-ketlik.

5. Quyidagi ketma-ketlikni chegaralangan ekanligi isbotlansin.

1) $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \dots, \frac{(-1)^n}{n}, \dots$;

2) $a_n = (-1)^n \cdot \frac{3n}{n+1} \sin 3n$;

3) 1.4; 1.41; 1.414; 1.4142; ...

6. Quyidagi ketma-ketliklar qaysi tomondan chegaralangan?

1) $a_n = 3n - 1$; 2) $a_n = \frac{1}{n^4}$; 3) $a_n = \frac{n(n+2)}{3}$; 4) $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.

Javob: 1) $a_n \geq 2$ (quyidan chegaralangan); 2) $0 < a_n \leq 1$ (chegaralangan); 3) $a_n \geq 1$ (quyidan chegaralangan); 4) $a_n \geq 2$ (quyidan chegaralangan).

7. Umumiy hadi

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{agar } n \text{ juft bo'lsa,} \\ 0, & \text{agar } n \text{ toq bo'lsa;} \end{cases}$$

ko'rinishda berilgan ketma-ketlikning limiti 0 ga tengligini isbotlang.

8. 0.3; 0.33; 0.333; ... 0.33...3; ... ketma-ketlikning limiti $\frac{1}{3}$ ga tengligi isbotlansin.

9. Quyidagi ketma-ketliklarning limiti topilsin.

1) $\frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{5} + \frac{1}{n^2}$; 2) $(\frac{1}{n(n+1)} + \frac{1000}{n^2})$;

$$3) 0.1; \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{11}{16}, \dots, \frac{2}{3} \left(1 + \frac{(-1)^n}{2^{n-1}}\right) + \dots$$

Javob: 1) 0; 2) 0; 3) $\frac{e}{3}$.

10. Quyida berilgan limitlar hisoblansin.

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5(1+n)(2-n)}{8n^2-n+3}; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-11}{4n^2+n-5};$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^2+5n-3}{3-2n+4n^2}; \quad 4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9n^2-5n+11}{n^3+5n}.$$

Javob: 1) $-\frac{5}{9}$; 2) 0; 3) 2; 4) 0.

11. Quyidagi ketma-ketliklar limitga egami? Agar limitga ega bo'lsa, ularni toping.

$$1) \frac{2}{5}, \frac{4}{7}, \frac{6}{9}, \frac{8}{11}, \dots, \frac{2n}{2n+3}, \dots$$

$$2) \frac{7}{3}, \frac{11}{5}, \frac{15}{7}, \frac{19}{9}, \dots, \frac{4n+3}{2n+1}, \dots$$

Javob: 1) 1; 2) 2.

12. $\{\sqrt{n^2+1} - n\}$ ketma-ketlik limitga ega ekanligi isbotlansin va u limit topilsin.

Javob: 0.

13. Quyidagi limitlar topilsin.

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-9}{n-3}; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-64}{n^2-3n-4}; \quad 3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{1+3n-1}};$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{\sqrt{3n^2+1}}; \quad 5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n^2+1}}{2n-1}; \quad 6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+(2n-1)}{1+2+3+\dots+n}$$

Javob: 1) 6; 2) $\frac{48}{5}$; 3) $\frac{2}{3}$; 4) $\sqrt{3}$; 5) $\frac{1}{\sqrt{2}}$; 6) 2.

14. Quyidagi ketma-ketliklar limitga egami? Agar limitga ega bo'lsa, ularni toping.

$$1) \frac{2}{5}, \frac{4}{7}, \frac{6}{9}, \frac{8}{11}, \dots, \frac{2n}{2n+3}, \dots;$$

$$2) \frac{7}{3}, \frac{11}{5}, \frac{15}{7}, \frac{19}{9}, \dots, \frac{4n+3}{2n+1}, \dots$$

Javob: 1) 1; 2) 2.

15. $\{\sqrt{n^2+1} - n\}$ ketma-ketligining limitga ega ekanligi isbotlansin va u limit topilsin.

Javob: 0

16. Quyidagi limitlar topilsin.

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-9}{n-3}; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-64}{n^2-3n-4}; \quad 3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{1+3n-1}};$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{\sqrt{3n^2+1}}; \quad 5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n^2+1}}{2n-1}; \quad 6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3+5+\dots+(2n-1)}{1+2+3+\dots+n}$$

Javob: 1) 6; 2) $\frac{48}{5}$; 3) $\frac{2}{3}$; 4) $\sqrt{3}$; 5) $\frac{1}{\sqrt{2}}$; 6) 2

17. Quyidagi limitlar hisoblansin.

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{n}\right)^{n+3}; \quad 3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{3n};$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-3}{n}\right)^{n/2}; \quad 5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n; \quad 6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-1}{2n+1}\right)^{2n}.$$

Javob: 1) $e^{-\frac{1}{3}}$; 2) e^4 ; 3) e^6 ; 4) $\frac{1}{e\sqrt{e}}$; 5) e^{-1} ; 6) e^{-2}

§2. Funksiyaning limiti

Agar ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ sonni topish mumkin bo'lsaki, $x \neq a$ va $|x - a| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning barcha qiymatlari uchun $|f(x) - A| < \varepsilon$ tengsizlik bajarilsa, x argument a ga intilganda, $f(x)$ funksiya A songa teng limitga ega deyiladi va

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

ko'rinishda yoziladi.

A son $f(x)$ funksiyaning $x = a$ nuqtadagi limiti deb ham aytiladi.

$|x-a| < \delta$ tengsizlik $a - \delta < x < a + \delta$ qo'sh tengsizlikka teng kuchli. δ ixtiyoriy musbat son bo'lganda $(a - \delta; a + \delta)$ oraliq a nuqtaning δ atrofi deyiladi.

Agar x argument a ga intilganda, $f(x)$ funksiyaning limiti A ga teng, ya'ni $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ bo'lsa, u holda $x = a$ nuqtadagi $f(x)$ funksiyaning A limit qiymati bilan $f(a)$ xususiy qiymati orasida quyidagi hollar bo'lishi mumkin.

1. $x \rightarrow a$ da $f(x)$ funksiyaning limiti A ga teng bo'lib, bu paytda $f(x)$ funksiyaning $f(a)$ xususiy qiymati mavjud bo'lmashligi mumkin.

2. $x \rightarrow a$ da $f(x)$ funksiya A limitga ega va $f(x)$ funksiyaning $f(a)$ xususiy qiymati mavjud, lekin $f(a)$ xususiy qiymat funksiyaning A limiti qiymatiga teng emas.

3. $x \rightarrow a$ da $f(x)$ funksiyaning limiti A ga teng, $f(x)$ funksiyaning $f(a)$ xususiy qiymati mavjud va u funksiyaning A limit qiymatiga teng.

Agar ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ sonni topish mumkin bo'lsaki, $0 < x - a < \delta$ (yoki $a < x < a + \delta$) tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning barcha qiymatlari uchun

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

tengsizlik bajarilsa, x argument a ga o'ng tomondan intilganda $f(x)$ funksiya A songa teng o'ng limitga ega deyiladi va

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A \text{ yoki } \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = A$$

ko'rinishda yoziladi.

Agar ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ sonni topish mumkin bo'lsaki,

$$0 < x - a < \delta \quad (a - \delta < x < a)$$

tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning barcha qiymatlari uchun

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

tengsizlik bajarilsa, x argument a ga chap tomondan intilganda, $f(x)$ funksiya A songa teng chap limitga ega deyiladi va

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A \text{ yoki } \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = A$$

kabi yoziladi.

Chap va o'ng limitlar bir tomonlama limitlar deyiladi.

Agar $x \rightarrow a$ $f(x)$ funksiyaning chap va o'ng limitlari mavjud bo'lib, ular bir-biriga teng bo'lsa, $f(x)$ funksiyaning $x = a$ nuqtadagi limiti ham mavjud va bu limit ham o'sha limitga teng bo'ladi.

Agar ixtiyoriy katta $E > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ sonni topish mumkin bo'lsaki, $x \neq a$ va $|x - a| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning barcha qiymatlari uchun

$$|f(x)| > E \quad (f(x) > E)$$

tengsizlik bajarilsa, u holda x argument a ga intilganda, $f(x)$ funksiya ∞ limitga ega deyiladi va

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad (\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty)$$

kabi yoziladi.

Agar ixtiyoriy $E > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ sonni topish mumkin bo'lsaki, $x \neq a$ va $|x - a| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning barcha qiymatlari uchun $f(x) < -E$ tengsizlik bajarilsa, u holda x argument a ga intilganda, $f(x)$ funksiya $-\infty$ limitga ega deyiladi va

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

kabi yoziladi.

Agar ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun shunday $k > 0$ sonni topish mumkin bo'lsaki, $|x| > k$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning barcha qiymatlari uchun

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

tengsizlik bajarilsa, u holda x argument ∞ ga intilganda, $f(x)$ funksiya A songa teng limitga ega deyiladi va

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$$

kabi yoziladi. A funksiyaning cheksizlikdagi limiti deyiladi.

Agar ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun shunday $k > 0$ sonni topish mumkin bo'lsaki, $x > k$ ($x < k$) tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning barcha qiymatlari uchun

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

tengsizlik bajarilsa, u holda x argument $+\infty$ ($-\infty$) ga intilganda, $f(x)$ funksiya A songa teng limitga ega deyiladi va

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \quad (\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A)$$

kabi yoziladi.

Agar $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$ bo'lsa, $\alpha(x)$ funksiya cheksiz kichik funksiya deyiladi. (α - ixtiyoriy son)

Agar $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ bo'lsa, $f(x)$ funksiya cheksiz katta funksiya deyiladi.

Agar ixtiyoriy katta $E > 0$ son uchun shunday k sonni topish mumkin bo'lsaki, $x > k$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning barcha qiymatlar uchun $|f(x)| > E$ tengsizlik bajarilsa, u holda $f(x)$ funksiya $x \rightarrow +\infty$ cheksiz katta funksiya deyiladi va $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$ kabi yoziladi.

Agar x argument a ga intilganda $f(x)$ funksiyaning limiti mavjud bo'lsa, bu limit yagona bo'ladi.

Agar x argument a ga intilganda $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalarning limiti mavjud bo'lsa, u holda quyidagi limitlar ham mavjud bo'ladi.

1. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.
3. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ ($\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$).
4. $\lim_{x \rightarrow a} k \cdot f(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (k - o'zgarmas son).

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ limit muhim limit deb ataladi va u muhim tatbiqlarga ega.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Funksiya limitining „ $\varepsilon - \delta$ “ tilidagi ta'rifidan foydalanib, $\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 8) = -5$ ekanligi isbotlasin.

Isbot: Buning uchun ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ soni bo'yicha shunday $\delta > 0$ sonni topish kerakki, $|x - 1| < \delta$ va $x \neq 1$ shartlarni qanoatlantiruvchi barcha x lar uchun

$|f(x) - (-5)| = |f(x) + 5| = |3x - 8 + 5| = |3x - 3| = 3|x - 1| < \varepsilon$ shart bajarilishini ko'rsatishimiz kerak. Bundan shart bajarilishini ko'rsatishimiz kerak. Bundan $|x - 1| < \frac{\varepsilon}{3} = \delta$ bo'lganda $|f(x) + 5| < \varepsilon$ tengsizlikni bajarilishi kelib chiqadi.

Demak, $\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 8) = -5$.

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1, & \text{agar } x \leq 1, \\ 2x + 2, & \text{agar } x > 1. \end{cases}$$

funksiyaning $x=1$ nuqtadagi o'ng limiti 4 ga va chap limiti nolga tengligi isbotlanadi.

Isbot: Buning uchun ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son bo'yicha $\delta > 0$ topiladi, $0 < x - 1 < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha x lar uchun $|f(x) - 4| < \varepsilon$ tengsizlikni bajarilishini ko'rsatish kifoya. $x > 1$ bo'lganda $|f(x) - 4| = |2x + 2 - 4| = |2x - 2| = 2|x - 1|$.

Demak,

$2|x - 1| < \varepsilon$ bo'lganda $|f(x) - 4| < \varepsilon$ tengsizlik bajariladi.

$2|x - 1| < \varepsilon$ tengsizlikdan $0 < x - 1 < \frac{\varepsilon}{2}$ kelib chiqadi.

Agar $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ deb olinsa, $0 < x - 1 < \delta$ bo'lganda $|f(x) - 4| < \varepsilon$ tengsizlik bajariladi. Shuning uchun $\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = 4$.

Endi berilgan funksiyaning $x = 1$ nuqtadagi chap limitini nolga teng ekanligini ko'rsatamiz. Bu holda $x < 1$ va $|f(x)| = |-x + 1| = 1 - x$. Agar $0 < x - 1 < \varepsilon$ bo'lishi talab qilinsa, u holda $|f(x) - 0| < \varepsilon$ tengsizlik bajariladi.

Bu yerda $\delta = \varepsilon$ deb olinsa, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun $0 < x - 1 < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning barcha qiymatlarida $|f(x)| < \varepsilon$ tengsizlik bajariladi. Demak,

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = 0.$$

3. $f(x) = \frac{1}{(x-1)^3}$ funksiya uchun $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$ bo'lishini isbotlang.

Isbot: Ixtiyoriy $E > 0$ son uchun $\delta = \frac{1}{\sqrt[3]{E}}$ deb olinsa, u holda $0 < |x - 1| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha x larda

$$|f(x)| = \left| \frac{1}{(x-1)^3} \right| > E$$

tengsizlik bajariladi. Demak, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^3} = \infty$.

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \frac{1}{x^3}) = 1$ ekanligini isbotlang.

Isbot: $\varepsilon > 0$ ixtiyoriy son bo'lsin. Shunday x larni topish kerakki natijada

$$\left| \left(1 - \frac{1}{x^3}\right) - 1 \right| < \varepsilon \text{ yoki } \frac{1}{|x|^3} < \varepsilon \text{ bo'lsin. Bundan}$$

$\frac{1}{|x|^3} = \frac{1}{x^3} < \varepsilon$ yoki $x > \frac{1}{\sqrt[3]{\varepsilon}}$ bo'ladi. Agar $k = \frac{1}{\sqrt[3]{\varepsilon}}$ deb olinsa, u holda $x > k$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning barcha qiymatlarida

$$\left| \left(1 - \frac{1}{x^3}\right) - 1 \right| < \varepsilon$$

tengsizlik bajariladi. Shuning uchun

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x^3}\right) = 1$$

5. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 3x + 7}{x + 3}$ hisoblansin.

$$\begin{aligned} \text{Yechish: } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 3x + 7}{x + 3} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 3x + 7)}{\lim_{x \rightarrow 3} (x + 3)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 3} x^2 - \lim_{x \rightarrow 3} 3x + \lim_{x \rightarrow 3} 7}{\lim_{x \rightarrow 3} x + \lim_{x \rightarrow 3} 3} = \\ &= \frac{9 - 3 \cdot 3 + 7}{3 + 3} = \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

6. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 7x + 12}{x - 3}$ hisoblansin.

Yechish: Agar biz limitlar haqidagi teoremlarni qo'llaydigan bo'lsak, u holda $\frac{0}{0}$ aniqmaslikka kalamiz. Shuning uchun biz dastlab berilgan kasrning suratini ko'paytuvchilarga ajratamiz:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 7x + 12}{x - 3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x - 4)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x - 4) = \lim_{x \rightarrow 3} x - \lim_{x \rightarrow 3} 4 = \\ &= 3 - 4 = -1. \end{aligned}$$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{3x}$ hisoblansin.

$$\begin{aligned} \text{Yechish: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{3x} &= \left\{ \begin{array}{l} 5x = \alpha, \quad x = \frac{\alpha}{5} \\ x \rightarrow 0, \quad \alpha \rightarrow 0 \end{array} \right\} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha}{3 \cdot \frac{\alpha}{5}} = \frac{5}{3} \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha}{\alpha} = \\ &= \frac{5}{3} \cdot 1 = \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$ hisoblansin.

$$\text{Yechish: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x}{x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2.$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

1. Limit ta'rifidan foydalanib quyidagilar isbotlansin.

$$1) \lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7; \quad 2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4; \quad 3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x} \right) = 1;$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 1} (3x - 2) = 1; \quad 5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = 2; \quad 6) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{3x+2} = \frac{2}{3}.$$

2. $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{3}{x-2}$ va $\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{3}{x-2}$ topilsin va jadvallar bilan tushuntirilsin.

$$\text{Javob: } \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{3}{x-2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{3}{x-2} = -\infty.$$

3. $\lim_{x \rightarrow 0+0} 2^{\frac{1}{x}}$ va $\lim_{x \rightarrow 0-0} 2^{\frac{1}{x}}$ topilsin va jadvallar bilan tushuntirilsin.

$$\text{Javob: } \lim_{x \rightarrow 0+0} 2^{\frac{1}{x}} = \infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0-0} 2^{\frac{1}{x}} = 0.$$

4. Ushbu: 1) $\frac{2}{\infty} = 0$; 2) $\frac{2}{0} = \pm\infty$; 3) $3^\infty = \infty$; 4) $3^{-\infty} = 0$ "shartli"

qizishlarning aniq ma'nolari tushuntirilsin.

$$\text{Javob: } 1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = 0; \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{2}{x} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{2}{x} = -\infty;$$

$$3) \lim_{x \rightarrow \infty} 3^x = \infty; \quad 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 3^x = 0.$$

5. Quyidagi limitlar topilsin:

$$1) \lim_{x \rightarrow 1-0} 2^{\frac{1}{x-1}}; \quad 2) \lim_{x \rightarrow 1+0} 2^{\frac{1}{x-1}}; \quad 3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}-0} 3^{\tan 2x}; \quad 4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \frac{2}{1 + 2^{\tan x}}.$$

$$\text{Javob: } 1) 0; \quad 2) \infty; \quad 3) \infty \quad 4) 0.$$

6. Quyidagi limitlar hisoblansin:

$$1) \lim_{x \rightarrow 3} (5x^2 - 6x + 7); \quad 2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^5 + 9x + 7}{3x^6 + x^3 + 1};$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + x^2 - 11}{8x^2 + 5}; \quad 4) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 5x + 10}{3x + 2}.$$

$$\text{Javob: } 1) 34; \quad 2) 4; \quad 3) -\frac{11}{13}; \quad 4) 3.$$

7. Quyidagi limitlar hisoblansin.

$$1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}; \quad 2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 2x^2 - 3}{x^2 - 3x + 2}; \quad 3) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3 + 27}{x + 3};$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}; \quad 5) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2 x}{1 + \cos^2 x}; \quad 6) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x};$$

$$7) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + x^2 + 5}{3x^2 + x - 1}; \quad 8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 1}{5x^2 + 2x}; \quad 9) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 5})$$

$$10) \lim_{x \rightarrow \infty} x(\sqrt{x-2} - \sqrt{x}); \quad 11) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}; \quad 12) \lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \sqrt{x-3}}{x^2 - 49}.$$

$$\text{Javob: } 1) -1; 2) -8; 3) 27; 4) \frac{m}{n}; 5) \frac{2}{3}; 6) \frac{1}{2}; 7) \frac{2}{3}; 8) \frac{3}{5}; 9) -\frac{5}{2};$$

$$10) -\infty; 11) 1; 12) -\frac{1}{56}.$$

8. Quyidagi limitlar hisoblansin:

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^{7x}; \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{3x}}; \quad 3) \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{x}{1+x})^x;$$

$$4) \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{k}{x})^{mx}; \quad 5) \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{4}{x})^{x+3}; \quad 6) \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{2x-1}{2x+1})^x.$$

$$\text{Javob: } 1) e^7; 2) e^{\frac{1}{3}}; 3) e^{-1}; 4) e^{mk}; 5) e^4; 6) e^{-1}.$$

9. Quyidagi limitlar topilsin:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x}; \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{x}; \quad 3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}; \quad 4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2}; \quad 5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x};$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}; \quad 7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg x}{x}; \quad 8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}; \quad 9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^2};$$

$$10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{x}; \quad 11) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1}; \quad 12) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x}{\sec x - 1}.$$

$$\text{Javob: } 1) 4; 2) \frac{1}{2}; 3) 1; 4) \frac{1}{4}; 5) 2; 6) 6\sqrt{2}; 7) 1; 8) 2; 9) \frac{1}{2}; 10) -\sqrt{2}; 11) 8; 12) 4.$$

§3. Funksiyaning uzluksizligi va uzilishi

Agar x va x_0 lar argumentning funksiyaning aniqlanish sohasi D dan olingan ikkita qiymati bo'lsa, u holda $x - x_0$ argumentning orttirmasi deyiladi va Δx bilan belgilanadi. Demak,

$$\Delta x = x - x_0 \text{ yoki } x = x_0 + \Delta x.$$

Funksiyaning $f(x_0 + \Delta x)$ qiymati bilan $f(x_0)$ boshlang'ich qiymati orasidagi farq f funksiyaning x_0 nuqtadagi orttirmasi deyiladi va $\Delta f(x_0)$ bilan belgilanadi. Demak,

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

$\Delta f(x_0)$ ko'pincha Δf yoki Δy bilan ham belgilanadi.

Agar x argument a ga intilganda $f(x)$ funksiyaning limiti mavjud bo'lib, u funksiyaning $x = a$ nuqtadagi $f(a)$ xususiy qiymatiga teng, ya'ni $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ bo'lsa, u holda $x = a$ nuqtada $f(x)$ funksiyaning uzluksizligi

deyiladi; agar yuqoridagi tenglik bajarilmasa, $x = a$ nuqtada $f(x)$ funksiya uzilishga ega deyiladi.

Uzluksizlikning ta'rifidan quyidagi to'rtta uzluksizlik shartini aniqlash mumkin;

1) $f(x)$ funksiya a nuqtaning qandaydir atrofida aniqlangan bo'lishi kerak;

2) Chekli $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ va $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ limitlar mavjud bo'lishi kerak;

3) Bu chap va o'ng limitlar bir xil bo'lishi kerak.

4) Bu limitlar $f(a)$ ga teng bo'lishi kerak.

Agar funksiya $[a; b]$ kesmaning har bir ichki nuqtasida uzluksiz va kesma chegaralarida $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$, $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = f(b)$ bo'lsa, u holda funksiyaning kesmada uzluksizligi deyiladi.

Funksiya uzluksizligining bir qancha ta'riflari mavjud.

Ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ sonni topish mumkin bo'lsaki, $|x - a| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning barcha qiymatlarida $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ tengsizlik bajarilsa, $x = a$ nuqtada $f(x)$ funksiya uzluksiz deyiladi.

Berilgan $f(x)$ funksiya a nuqtada uzluksiz bo'lishi uchun funksiyaning bu nuqtadagi orttirmasi argument orttirmasi bilan birga nolga intilishi zarur va yetarlidir, ya'ni

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$$

Agar $f(x)$ funksiyaning a nuqtadagi o'ng(chap) limiti funksiyaning a nuqtadagi $f(a)$ xususiy qiymatiga teng, ya'ni $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$ ($\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a)$) bo'lsa, u holda $f(x)$ funksiya a nuqtada o'ngdan (chapdan) uzluksiz deyiladi.

Agar $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$ va $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a)$ lar o'rinli bo'lmasa, u holda funksiyaning mos ravishda o'ngdan yoki chapdan uzilishga ega deyiladi.

Agar $f(x)$ va $g(x)$ funksiya a nuqtada uzluksiz bo'lsa, u holda $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ va $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(a) \neq 0$) lar ham a nuqtada

uzluksiz bo'ladi.

Barcha asosiy elementlar funksiyalar o'zlarining aniqlanish sohalarida uzluksizdir.

$[a; b]$ kesmada uzluksiz bo'lgan $f(x)$ funksiya quyidagi xossalarga ega bo'ladi:

1. $[a; b]$ kesmada uzluksiz bo'lgan funksiya shu kesmada chegaralangan bo'ladi, ya'ni shunday $k > 0$ son topiladiki, $a \leq x \leq b$ bo'lganda $|f(x)| \leq k$ bo'ladi.

2. $[a; b]$ kesmada uzluksiz bo'lgan $f(x)$ funksiya shu kesmada eng kichik m va eng katta M qiymatga ega bo'ladi.

3. Agar $f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada uzluksiz bo'lib, a nuqtada musbat (manfiy), b nuqtada esa manfiy (musbat) bo'lsa, $f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmaning hech bo'lmaganda bitta nuqtasida nolga aylanadi.

Funksiyaning a nuqtada uzulishiga ega ekanligini quyidagicha talqin qilish mumkin.

Agar funksiya a dan o'ngda va chapda aniqlangan bo'lsa, ammo a nuqtada uzluksizlikning to'rtta shartidan aqalli bittasi bajarilmasa, $f(x)$ funksiya $x = a$ nuqtada uzulishga ega bo'ladi. Uzulishlarni ikki asosiy turga ajratadilar.

1. Birinchi tur uzilish—chekli $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ va $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ limitlar mavjud, ya'ni uzluksizlik shartlaridan ikkinchisi bajariladi va qolganlari (yoki ulardan aqalli bittasi) bajarilmaydi.

2. Ikkinchi tur uzilish - $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ o'ngdan yoki chapdan $\pm \infty$ ga teng.

Agar x_0 nuqta uzilish nuqtasi bo'lsa, u holda u nuqtadagi o'ng va chap limitlar ayirmasiga $f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi sakrashi deyiladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar:

1. $f(x) = x^2 + x + 1$ funksiya haqiqiy sonlar to'plamining barcha nuqtalarida uzluksiz ekanligi isbotlansin.

Isbot. Aytaylik, $\forall a \in R$ bo'lsin. U holda $f(a) = a^2 + a + 1$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} (x^2 + x + 1) = a^2 + a + 1$. Demak,

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ shart bajarilyapti. Bu esa funksiyaning a nuqtada uzluksiz ekanligini bildiradi.

2. $f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ funksiyaning $x = 2$ nuqtada uzluksizligini ko'rsating.

Yechish: Birinchidan, $x \rightarrow 2$ da $f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ funksiyaning limiti mavjud. Ya'ni, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x^2 + 5} = \sqrt{4 + 5} = 3$.

Ikkinchidan, bu limit berilgan funksiyaning $x_0 = 2$ nuqtadagi qiymatiga teng: Yani $f(2) = \sqrt{2^2 + 5} = \sqrt{4 + 5} = \sqrt{9} = 3$. Demak, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$. Bu esa funksiyaning $x = 2$ nuqtada uzluksizligini bildiradi.

$$3. f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2, & \text{agar } x \leq 2 \text{ bo'lsa,} \\ x, & \text{agar } x > 2 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

funksiyaning $x = 2$ nuqtada chapdan uzluksiz ekanligi ko'rsatilsin.

Yechish: Berilgan funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan. Funksiyaning $x = 2$ nuqtadagi o'ng va chap limitlarini hisoblaymiz:

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-0} \left(-\frac{1}{2} \cdot x^2\right) = -\frac{1}{2} \cdot 4 = -2;$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+0} x = 2.$$

Agar $f(2) = -\frac{1}{2} \cdot 2^2 = -2$ bo'lishini e'tiborga olsak, unda

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = f(2), \quad \lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) = 2 \neq f(2)$$

ekanligini ko'ramiz. Demak, berilgan funksiya $x = 2$ nuqtada chapdan uzluksiz, o'ngdan esa uzluksiz emas.

$$4. f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{agar } x \geq 0 \text{ bo'lsa,} \\ 2x - 1, & \text{agar } x < 0 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

funksiyaning $x = 3$ nuqtada o'ngdan uzluksiz ekanligi ko'rsatilsin.

$$\text{Yechish: } \lim_{x \rightarrow 3+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+0} (2x + 1) = 2 \cdot 3 + 1 = 7;$$

$$f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7. \text{ Demak, } \lim_{x \rightarrow 3+0} f(x) = f(3). \text{ Bu esa funksiyaning}$$

$x = 3$ nuqtada o'ngdan uzluksiz ekanligini bildiradi.

$$5. f(x) = \begin{cases} |x|, & \text{agar } x \neq 0 \text{ bo'lsa,} \\ 1, & \text{agar } x = 0 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

funksiyaning $x = 0$ nuqtada uzulishga ega ekanligi ko'rsatilsin.

Yechish: Berilgan funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan. Funksiyaning $x = 0$ nuqtadagi o'ng va chap limitlarini hamda $f(0)$ ni hisoblaymiz:

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} |x| = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-0} |x| = 0; \quad f(0) = 1.$$

Demak, funksiyaning $x = 0$ nuqtadagi o'ng va chap limitlari mavjud, ular o'zaro teng, ammo ular funksiyaning $x = 0$ nuqtadagi qiymati $f(0) = 1$ ga teng emas. Bu esa berilgan funksiyaning $x = 0$ nuqtada uzulishga ega ekanini bildiradi.

$$6. f(x) = \text{sign}(x) = \begin{cases} -1, & \text{agar } x < 0 \text{ bo'lsa,} \\ 0, & \text{agar } x = 0 \text{ bo'lsa.} \\ 1, & \text{agar } x > 0 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

funksiyaning $x = 0$ nuqtada uzulishga ega ekanligini ko'rsating.

Yechish: Bu funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan. Uning $x = 0$ nuqtadagi o'ng va chap limitlarini topamiz:

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} 1 = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-0} (-1) = -1. \quad \text{Berilgan}$$

funksiyaning $x = 0$ nuqtadagi o'ng va chap limitlari mavjud, lekin ular o'zaro teng emas. Bu esa berilgan funksiyaning $x = 0$ nuqtada 1-tur uzulishiga ega ekanligini bildiradi.

$$7. f(x) = 2^{\frac{1}{x}} \text{ funksiyaning uzluksizlikka tekshiring.}$$

$$\text{Yechish: } \lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} 2^{\frac{1}{x}} = \infty \text{ va } \lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-0} 2^{\frac{1}{x}} = 0.$$

bo'lganligi uchun funksiya $x = 0$ nuqtada ikkinchi tur uzulishga ega.

8. $\sin x - x + 1 = 0$ tenglamaning $[0; \frac{3\pi}{2}]$ kesmada ildizi bor yoki yo'qligi aniqlansin.

Yechish: $f(x) = \sin x - x + 1$ funksiya $(-\infty; +\infty)$ da uzluksizdir. Bundan tashqari, $f(0) = \sin 0 - 0 + 1 = 1$ va $f(\frac{3\pi}{2}) = \sin \frac{3\pi}{2} - \frac{3\pi}{2} + 1 = -\frac{3\pi}{2}$, $[0; \frac{3\pi}{2}]$ kesmaning chetlarida funksiya turli ishorali qiymatlarni qabul qilganligi uchun kesmada uzluksiz funksiyaning xossasiga asosan, u bu kesmada hech bo'lmaganda, bitta ildizga ega bo'ladi.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

$$1. f(x) = \begin{cases} 1 + 3x, & \text{agar } x < -1 \text{ bo'lsa,} \\ -x^2, & \text{agar } x \geq -1 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

funksiya $x = -1$ nuqtada uzluksizlikka tekshirilsin.

2. Quyida berilgan funksiyalar x_0 ning ko'rsatilgan qiymatlarida uzluksiz bo'ladimi?

$$1) y = x^2 + 2, x_0 = 3;$$

$$2) y = \frac{1-x^2}{1+x^2}, x_0 = 1;$$

$$3) y = \begin{cases} \frac{1}{x-2}, & \text{agar } x \neq 2 \text{ bo'lsa,} \\ 5, & \text{agar } x = 2 \text{ bo'lsa.} \end{cases} x_0 = 2;$$

$$4) y = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & \text{agar } x \neq 0 \text{ bo'lsa,} \\ 2, & \text{agar } x = 0 \text{ bo'lsa.} \end{cases} x_0 = 0;$$

Javob: 1) ha; 2) ha; 3) yo'q; 4) yo'q;

3. $y = \frac{4}{x-2}$ funksiyaning uzilish nuqtasi ko'rsatilsin, $\lim_{x \rightarrow 2-0} y$; $\lim_{x \rightarrow 2+0} y$; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y$ lar topilsin va $x = -2; 0; 1; 3; 4; 6$ nuqtalar bo'yicha egri chiziq yasalsin.

4. 1) $y = -\frac{6}{x}$; 2) $y = \frac{4}{4-x^2}$ funksiyalarning uzulish nuqtalari topilsin va grafiklari yasalsin.

Javob: 1) $x = 0$; 2) $x = \pm 2$.

$$5. y = \begin{cases} \frac{x}{2}, & \text{agar } x \neq 2 \text{ bo'lsa,} \\ 0, & \text{agar } x = 2 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

funksiyaning grafigi yasalsin va uning uzilish nuqtasi ko'rsatilsin. Nuqtadagi uzluksizlikning to'rtta shartidan qaysilari bajariladi va qaysilari bajarilmaydi?

Javob: $x = 2$ bo'lganda birinchi uchta shart bajariladi va to'rtinchi shart bajarilmaydi.

$$6. f(x) = \begin{cases} 0.5x^2, & \text{agar } |x| < 2 \text{ bo'lsa,} \\ 2.5, & \text{agar } |x| = 2 \text{ bo'lsa.} \\ 3, & \text{agar } |x| > 2 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

funksiyaning grafigi yasalsin va uning uzulish nuqtalari ko'rsatilsin.

Javob: $x = \pm 2$.

7. $y = \frac{x}{x+2}$ funksiyaning uzulish nuqtasi ko'rsatilsin. $\lim_{x \rightarrow -2+0} y$; $\lim_{x \rightarrow -2-0} y$ lar topilsin va $x = -6; -4; -3; -1; 0; 2$ nuqtalar bo'yicha grafigi chizilsin.

Javob: $x = -2$ bo'lganda, ikkinchi tur uzulish, $\lim_{x \rightarrow -2-0} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -2+0} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1$.

8. Quyidagi funksiyalarning graflari yasalsin. Bu funksiyalar qaysi nuqtalarda uzluksiz va qaysi nuqtalarda uzlukli ekani aniqlansin. Uzulish nuqtasidagi funksiyaning qiymati hisoblansin.

$$1) f(x) = \begin{cases} 2x^2, & \text{agar } x \leq 1 \text{ bo'lsa,} \\ 1 - 2x, & \text{agar } x > 1 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

$$2) f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x}, & \text{agar } x \leq -2 \text{ bo'lsa,} \\ x + 2, & \text{agar } x > -2 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

$$3) f(x) = \begin{cases} 3 - x, & \text{agar } x < 1 \text{ bo'lsa,} \\ \lg x, & \text{agar } x \geq 1 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

$$4) f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{agar } x < \frac{1}{2} \text{ bo'lsa,} \\ \frac{1}{x} - 1, & \text{agar } x \geq \frac{1}{2} \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

$$9. f(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{agar } x < 2 \text{ bo'lsa,} \\ x^2 - 1, & \text{agar } x \geq 2 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

funksiya $x_0 = 2$ nuqtada qanday turdagi uzulishga ega?

Javob: 1) birinchi tur uzulish.

10. $x^5 - 18x + 2 = 0$ tenglama $[-1; 1]$ kesmada ildizga ega bo'ladimi?

$$11. [-2; 2] \text{ kesmada } f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & \text{agar } -2 \leq x < 0 \text{ bo'lsa,} \\ -(x^2 + 2), & \text{agar } 0 \leq x \leq 2 \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

funksiya berilgan. Berilgan kesmada $f(x) = 0$ bo'ladigan nuqta mavjudmi?

Javob: yo'q, funksiya $x = 0$ nuqtada uzulishga ega.

IX. BOB. FUNKSIYANING HOSILASI VA DIFFERENSIALI

§ 1. Funksiyaning hosilasi. Hosilaning geometrik va mexanik ma'nolari

$y = f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi deb, $f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi Δy orttirmasining argument orttirmasi Δx ga nisbatining Δx nolga intilgandagi limitiga aytiladi va $u, y', y'(x_0), f'(x_0), \frac{dy}{dx}$ lardan biri bilan belgilanadi.

Hosilaning ta'rifiga ko'ra, funksiyaning ixtiyoriy x nuqtadagi hosilasini topish uchun quyidagi algoritmnı ko'rsatish mumkin.

1) x ga Δx orttirma beriladi, u holda $y = f(x)$ funksiya ham Δy orttirma oladi va

$$y + \Delta y = f(x + \Delta x)$$

bo'ladi;

2) Funksiyaning Δy orttirmasi topiladi;

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x);$$

3) Funksiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbati topiladi;

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x};$$

4) Bu nisbatning Δx nolga intilgandagi limiti topiladi;

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$$

Berilgan $f(x)$ funksiyaning $f'(x)$ hosilasini topish amaliga funksiyani differensialash deyiladi.

$f'(x_0)$ ga funksiya hosilasining x_0 nuqtadagi qiymati deyiladi.

$y = f(x)$ egri chiziqning $M_0(x_0; y_0)$ nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning k burchak koeffisienti $y = f(x)$ funksiya hosilasining $x = x_0$ nuqtadagi qiymatiga teng:

$$k = f'(x_0).$$

$y = f(x)$ egri chiziqning $M_0(x_0; y_0)$ nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning tenglamasi

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

ko'rinishida bo'ladi. Bu yerda $y_0 = f(x_0)$.

Nuqta Ox o'qi bo'yicha harakat qilib, vaqtning t paytida $x = f(t)$ koordinataga ega bo'lsin, u holda vaqtning t paytida

$$V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt},$$


$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{d^2 x}{dt^2},$$

bo'ladi.

Har qanday funksiyaning hosilasini hosilani hisoblash algoritmi bo'yicha aniqlash har doim ham oson emas va ancha murakkab hisoblashlarni talab etadi. Shu sababli amalda $y = f(x)$ funksiyaning hosilasi quyidagi qoidalarini qo'llash yordamida topiladi.

1. $(c)' = 0$ (c -o'zgarmas son).
2. $(cf)' = c \cdot f'$ (c -o'zgarmas son).
3. $(f \pm g)' = f' \pm g'$,
4. $(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f$.
5. $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - g' \cdot f}{g^2}$ ($g(x) \neq 0$).

Bu yerda f va g lar x nuqtada hosilaga ega bo'lgan funksiyalardir. Egri chiziqning $M_0(x_0; y_0)$ nuqtasiga o'tkazilgan normal tenglamasi $y - y_0 = -\frac{1}{k}(x - x_0)$ dan iborat bo'ladi (1-chizma).



1-chizma.

$TA = y_0 \cdot ctg \varphi$, $AN = y_0 \cdot tg \varphi$ kesmalar mos ravishda urinma osti va normal osti deyiladi. Ularning uzunliklari urinma va normal uzunliklari deyiladi.

Hosilani hisoblash (qoidalar) algoritmi yordamida bir qator funksiyalarni hosilalarini topib quyidagi jadvalni tuzamiz:

Funksiya	Hosilasi	Funksiya	Hosilasi
$y = c$	$y' = 0$	$y = \cos x$	$y' = -\sin x$
$y = x$	$y' = 1$	$y = \operatorname{tg} x$	$y' = \frac{1}{\cos^2 x}$
$y = x^2$	$y' = 2x$	$y = \operatorname{ctg} x$	$y' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
$y = \sqrt{x}$	$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$y = \sec x$	$y' = \sec x \cdot \operatorname{tg} x$
$y = x^n$	$y' = nx^{n-1}$	$y = \operatorname{cosec} x$	$y' = -\operatorname{cosec} x \cdot \operatorname{ctg} x$
$y = x^r$	$y' = rx^{r-1}$		
$y = a^x$	$y' = a^x \ln a$	$y = \arcsin x$	$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$y = e^x$	$y' = e^x$	$y = \arccos x$	$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$y = \frac{1}{x}$	$y' = -\frac{1}{x^2}$	$y = \operatorname{arctg} x$	$y' = \frac{1}{1+x^2}$
$y = \ln x$	$y' = \frac{1}{x}$	$y = \operatorname{arccot} x$	$y' = -\frac{1}{1+x^2}$
$y = \log_a x$	$y' = \frac{1}{x} \log_a e$		
$y = \sin x$	$y' = \cos x$		

Agar $y = f(x)$ funksiyaning hosilasi $f'(x)$ o'z navbatida hosilaga ega bo'lgan funksiya bo'lsa, u holda uning hosilasi ikkinchi tartibli hosila deyiladi va $f''(x)$ deb belgilanadi.

Agar $f''(x)$ ikkinchi tartibli hosila yana hosilaga ega bo'lgan funksiya bo'lsa, u holda uning hosilasi uchunchi tartibli hosila deyiladi va $f'''(x)$ kabi yoziladi.

Xuddi shunday to'rtinchi, beshinchi va xakazo n -tartibli hosilalarga ta'rif berish mumkin.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar:

1. $y = x^3$ funksiyaning $x = 1$ nuqtadagi hosilasi topilsin.

Yechish: 1) x ga Δx ortirma beramiz. U holda $y \Delta y$ ortirma oladi.
 $y + \Delta y = (x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2 \cdot \Delta x + 3x \cdot (\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$;

2) Δy ni topamiz:

$$\Delta y = (x + \Delta x)^3 - x^3 = x^3 + 3x^2 \cdot \Delta x + 3x \cdot (\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 - x^3 = [3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2] \cdot \Delta x;$$

3) $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ni topamiz:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{[3x^2 + 3x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2] \cdot \Delta x}{\Delta x} = 3x^2 + 3x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2;$$

4) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ni topamiz: Agar bu limit mavjud bo'lsa, u holda y berilgan funksiyaning hosilasidan iborat bo'ladi.

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [3x^2 + 3x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2] = 3x^2.$$

$$y'(1) = 3 \cdot 1^2 = 3.$$

2. $y = 2x^2 - 2$ parabolaning absissasi $x_0 = -2$ bo'lgan nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning tenglamasi tuzilsin.

Yechish: Parabola tegishli bo'lgan va absissasi $x_0 = -2$ bo'lgan nuqtaning ordinatasini topamiz:

$$y_0 = y(x_0) = y(-2) = 2 \cdot (-2)^2 - 2 = 2 \cdot 4 - 2 = 6.$$

$y = f(x)$ egri chiziqning $M_0(x_0; y_0)$ nuqtasiga o'tkazilgan urinma tenglamasi $y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$ dan iborat bo'lgani uchun dastlab y' ni so'ngra $y'(x_0) = y'(2)$ ni topamiz.

$$y' = (2x^2 - 2)' = (2x^2)' - (2)' = 4x - 0 = 4x;$$

$$y'(-2) = 4 \cdot (-2) = -8.$$

Demak urinma tenglamasi

$$y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0), \quad y - 6 = -8(x + 2), \quad y = -8x - 10 \text{ dan iborat.}$$

3. $y = x^2 - \cos x + 2$ funksiyaning hosilasi topilsin.

Yechish: Funktsiyalar yig'indisining hosilasini topish formulasidan foydalanamiz:

$$y' = (x^2 - \cos x + 2)' = (x^2)' - (\cos x)' + (2)' = 2x + \sin x + 0 = 2x + \sin x.$$

4. Quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin:

$$1) y = (2x + 1)(3x - 1); \quad 2) y = x \cdot \cos x; \quad 3) y = \frac{3+2x}{1+x}.$$

Yechish:

1)

$$y' = [(2x + 1)(3x - 1)]' = (2x + 1)' \cdot (3x - 1) + (3x - 1)' \cdot (2x + 1) = 2 \cdot (3x - 1) + 3 \cdot (2x + 1) = 6x - 2 + 6x + 3 = 12x + 1;$$

$$2) y' = (x \cos x)' = (x)' \cdot \cos x + (\cos x)' \cdot x = \cos x - x \cdot \sin x;$$

$$3) y' = \left(\frac{3+2x}{1+x} \right)' = \frac{(3+2x)' \cdot (1+x) - (1+x)' \cdot (3+2x)}{(1+x)^2} = \frac{2 \cdot (1+x) - 1 \cdot (3+2x)}{(1+x)^2} =$$

$$\frac{2+2x-3-2x}{(1+x)^2} = -\frac{1}{(1+x)^2}.$$

5. To'g'ri chiziqli harakat qonuni

$$S = 4t^3 - t^2 + 1 \text{ (m)}$$

formula bilan berilgan. Bu harakatning $t = 4$ bo'lgan paytdagi tezlanishi topilsin.

Yechish: Harakatning t paytdagi tezligi:

$$v(t) = s'(t) = (4t^3 - t^2 + 1)' = (12t^2 - 2t) \frac{m}{c},$$

t paytdagi tezlanishi esa

$$a(t) = v'(t) = (12t^2 - 2t)' = (24t - 2) \frac{m}{c^2};$$

ga teng bo'lib undan $a(4) = 24 \cdot 4 - 2 = 96 - 2 = 94 \frac{m}{c^2},$

6. $y = \frac{1}{3}x^6 + 2x^5 - 4x + 10$ funksiyaning beshinchi tartibli hosilasi topilsin.

$$\text{Yechish: } y^I = \left(\frac{1}{3}x^6 + 2x^5 - 4x + 10 \right)' = 2x^5 + 10x^4 - 4;$$

$$y^{II} = (2x^5 + 10x^4 - 4)' = 10x^4 + 40x^3;$$

$$y^{III} = (10x^4 + 40x^3)' = 40x^3 + 120x^2;$$

$$y^{IV} = (40x^3 + 120x^2)' = 120x^2 + 240x;$$

$$y^V = (120x^2 + 240x)' = 240x + 240 = 240(x + 1).$$

7. $y = \cos x$ funksiyaning to'rtinchi tartibli hosilasi topilsin.

$$\text{Yechish: } y' = (\cos x)' = -\sin x; \quad y'' = (-\sin x)' = -\cos x;$$

$$y''' = (-\cos x)' = \sin x; \quad y^{IV} = (\sin x)' = \cos x.$$

8. $f(x) = x^3 + 5x^2 - 1$ funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi topilsin va $f''(0.5)$ hisoblansin.

$$\text{Yechish: } f'(x) = (x^3 + 5x^2 - 1)' = 3x^2 + 10x;$$

$$f''(x) = (3x^2 + 10x)' = 6x + 10;$$

$$f''(0.5) = 6 \cdot 0.5 + 10 = 3 + 10 = 13.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Hosilaning ta'rifidan foydalanib, quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin:

- 1) $y = x^3$; 2) $y = x^4$; 3) $y = \frac{1}{x^2}$; 4) $y = 4x^2 - 5$; 5) $y = 2\sin^4 x$
 6) $y = 3x^2 + 2x + 5$; 7) $y = \sqrt[3]{x}$; 8) $y = 2\cos^2 x$.

Javob: 1) $3x^2$; 2) $4x^3$; 3) $-\frac{2}{x^3}$; 4) $8x$; 5) $2\sin 2x$; 6) $6x + 2$;
 7) $\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$; 8) $-2\sin 2x$.

2. Hosilani hisoblash qoidalaridan va hosilalar jadvalidan foydalanib, quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin:

- 1) $y = 2 + x - x^2$; 2) $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + 7$;
 3) $y = (x+1)(x+2)^2(x+3)^3$;
 4) $y = (x\sin\alpha + \cos\alpha)(x\cos\alpha - \sin\alpha)$;
 5) $y = \frac{2x}{1-x^2}$; 6) $y = \frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$; 7) $y = x + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x}$;
 8) $y = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$; 9) $y = \sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{\sqrt{x}}$; 10) $y = (2-x^2) \cdot \cos x + 2x\sin x$;
 11) $y = \frac{\sin x - x\cos x}{\cos x + x\sin x}$; 12) $y = \frac{\ln 3 \cdot \sin x + \cos x}{3^x}$;
 13) $y = \frac{\cos x}{1-\sin x}$; 14) $y = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$; 15) $y = \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{3x^3}$; 16) $y = \frac{8}{\sqrt[4]{x}} - \frac{6}{\sqrt[3]{x}}$.

Javob: 1) $1 - 2x$; 2) $x^2 + x - 2$;

- 3) $2(x+2)(x+3)^2(3x^2+11x+9)$; 4) $x\sin 2\alpha + \cos 2\alpha$; 5) $\frac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2}$;
 6) $\frac{2(1-2x)}{(1-x+x^2)^2}$; 7) $1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$; 8) $-\frac{1}{x^2} - \frac{1}{2x\sqrt{x}} - \frac{1}{3x\sqrt[3]{x}} (x > 0)$;
 9) $\frac{2}{3\sqrt[3]{x}} + \frac{1}{x\sqrt{x}} (x > 0)$; 10) $x^2 \sin x$; 11) $\frac{x^2}{(\cos x + x\sin x)^2}$; 12) $-\frac{1+\ln^2 3}{3^x} \cdot \sin x$;
 13) $\frac{1}{1-\sin x}$; 14) $\frac{1}{2\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)^2}$; 15) $\frac{1-x}{x^4}$; 16) $\frac{2}{x} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$.

3. Quyidagi berilgan funksiyalarning hosilalari topilsin va ko'rsatilgan nuqtalardagi qiymatlari hisoblansin:

- 1) $f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 + x$; $f'(0)$, $f'(1)$, $f'(-1)$;
 2) $f(x) = x^2 - \frac{1}{2x^2}$; $f'(2) - f'(-2)$;
 3) $f(x) = \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{x}$; $0.01 \cdot f'(0.01)$;
 4) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$; $f'(-8)$;
 5) $f(x) = \frac{x}{2x-1}$; $f(0)$, $f'(2)$, $f'(-2)$.

Javob: 1) 1; 0; 4; 2) 8.25; 3) -90; 4) $-\frac{1}{3}$; 5) -1; $-\frac{1}{9}$; $-\frac{1}{25}$.

4. Quyidagi masalalarda egri chizilarga o'tkazilgan urinmalarning tenglamalari yozilsin va egri chiziqlar hamda urinmalar yasalsin.

1) $y = \frac{x^3}{3}$ egri chiziqqa $x = -1$ nuqtada;

2) $y^2 = x^3$ egri chiziqqa $x_1 = 0$ va $x_2 = 1$ nuqtalarga;

3) $y = \frac{8}{4+x^2}$ lokonga (zulfga) $x = 2$ nuqtada;

4) $y = \sin x$ sinusoidaga $x = \pi$ nuqtada.

Javob: 1) $y = x + \frac{2}{3}$; 2) $y = 0$ va $y = \pm \frac{1}{2}(3x-1)$;

3) $y = -\frac{x}{2} + 2$; 4) $y = -x + \pi$.

5. $xy = 4$ giperbolaga $x_1 = 1$ va $x_2 = -4$ nuqtalarda o'tkazilgan urinmalarning tenglamalari yozilsin va urinmalar orasidagi burchak topilsin. Egri chiziq va urinmalar yasalsin.

Javob: $y = -4x + 8$, $y = -\frac{1}{4}x - 2$; $\varphi = \arctg \frac{15}{8}$.

6. $y = x^2 + 4x$ parabolaga qaysi nuqtada o'tkazilgan urinma Ox o'qqa parallel bo'ladi?

Javob: $(-2; -4)$.

7. Quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin.

- 1) $y = x^2 + 3^x$; 2) $y = x^2 \cdot 2^x$; 3) $y = x^2 \cdot e^x$; 4) $y = \frac{1+e^x}{1+e^{2x}}$; 5) $y = \frac{\sin x + \cos x}{e^x}$;
 6) $y = x - \operatorname{actg} x$; 7) $y = \operatorname{arctg} x - \frac{1}{x}$;

Javob: 1) $2^x + 3^x \cdot \ln 3$; 2) $x \cdot 2^x(2 + x \ln 2)$; 3) $x e^x(x+2)$;

- 4) $\frac{2e^{2x}}{(1+e^x)^2}$; 5) $-\frac{2\sin x}{e^x}$; 6) $\frac{x^2}{1+x^2}$; 7) $-\frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)}$.

8. Quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin:

- 1) $y = \arcsin x + \arccos x$; 2) $y = \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} x$.

Javob: 1) 0; 2) 0.

9. Quyidagi funksiyalarning uchinchi tartibli hosilalari topilsin.

- 1) $y = x^2 \ln x$; 2) $y = x \cos x$.

Javob: 1) $\frac{2}{x}$; 2) $x \sin x - 3 \cos x$.

10. Quyidagi funksiyalarning n-tartibli hosilalari topilsin.

1) $y = \ln x$; 2) $y = \sin x$; 3) $y = \sqrt{x}$; 4) $y = \cos^2 x$

Javob: 1) $\frac{(-1)^{n-1} \cdot (n-1)!}{x^n}$; 2) $\sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$;

3) $\frac{(-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)}{2^n \sqrt{x^{2n-1}}}$; 4) $2^{n-1} \cdot \cos(2x + n \cdot \frac{\pi}{2})$.

11. Jism $x(t) = \frac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t$ qonuniga asosan Ox to'g'ri chiziqli bo'yicha harakat qiladi. Harakat tezligi va tezlanishi aniqlansin.

Javob: $\frac{dx}{dt} = t^2 - 4t + 3$; $\frac{d^2x}{dt^2} = 2t - 4$.

12. Qandaydir kimyoviy reaksiya natijasida hosil qilinadigan jism miqdori x bilan t vaqt orasidagi bog'lanish $x = A(1 - e^{-kt})$ tenglama bilan ifodalanadi. Reaksiya tezligi aniqlansin.

Javob: kAe^{-kt} .

13. Jism qo'zg'almas o'q atrofida

$$\varphi(t) = 3t^2 - 4t + 2 \text{ (rad).}$$

qonun bo'yicha aylanadi. Jismning $t = 4c$ dagi burchak tezligi va burchak tezlanishi topilsin.

Javob: $w(4) = \varphi'(4) = 20$; $a(t) = w'(t) = 6$.

14. Nuqta $S(t) = 2t^3 + t - 1$ qonun bo'yicha to'g'ri chiziqli harakat qilmoqda. Nuqtaning t momentdagi tezligi va tezlanishini toping.

Javob: $v(t) = 6t^2 + 1$; $a(t) = 12t$.

15. Jismning T temperaturasi t vaqtga bog'liq holda $T(t) = 0.5t^2 - 2t$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Vaqtning $t = 5(c)$ momentida bu jism qanday tezlik bilan isiydi?

Javob: $v(5) = 3$.

§ 2. Murakkab va oshkormas funksiyalarning hosilalari. Parametrik shaklda berilgan funksiyaning hosilasi. Teskari funksiyaning hosilasi. Giperbolik funksiyalarning hosilalari

Agar: 1) $u = g(x)$ funksiya biror x_0 nuqtada $U'_x = g'(x_0)$ hosilaga ega; 2) $y = f(u)$ funksiya esa tegishli $U_0 = g(x_0)$ nuqtada $y'_u = f'(U_0)$ hosilaga ega bo'lsa, u holda $y = f[g(x)]$ murakkab funksiya ham x_0

nuqtada hosilaga ega va bu hosila $f(u)$ va $g(x)$ funksiyalar hosilalarining ko'paytmasiga tengdir. Ya'ni,

$$[f(g(x))]' = f'_u(g(x_0)) \cdot g'(x_0) = f'_u(u_0) \cdot U'_x(x_0) \text{ yoki qisqacha } y'_x = y'_u \cdot U'_x$$

$y = [f(x)]^{\varphi(x)}$ ko'rinishdagi funksiyaning hosilasini topish uchun darajali funksiyaning yoki ko'rsatkichli funksiyaning hosilasini topish formulasini qo'llab bo'lmaydi. Chunki bu funksiyaning asosi ham, daraja ko'rsatkichi ham x o'zgaruvchining funksiyasidir. Shuning uchun berilgan funksiyaning hosilasini topish uchun tenglikning har ikkala qismini e asosga ko'ra logarifmlaymiz va

$$\ln y = \varphi(x) \cdot \ln f(x)$$

ni hosil qilamiz. $\ln y$ ni x ning murakkab funksiyasi sifatida qarab oxirgi tenglikning har ikkala qismidan hosila olamiz:

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \varphi'(x) \ln f(x) + \varphi(x) \cdot \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x). \text{ Bu tenglikdan } y' \text{ ni topamiz:}$$

$$y' = y \left[\varphi'(x) \ln f(x) + \varphi(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right] = [f(x)]^{\varphi(x)} \left[\varphi'(x) \ln f(x) + \varphi(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right].$$

Agar: 1) $y = f(x)$ funksiya $x = x_0$ nuqtada chekli va noldan farqli $f'(x_0)$ hosilaga ega; 2) bu funksiya uchun $y_0 = f(x_0)$ nuqtada $x = g(y)$ uzluksiz teskari funksiya mavjud bo'lsa, u holda $x = g(y)$ teskari funksiya uchun $y_0 = f(x_0)$ nuqtada $\frac{1}{f'(x_0)}$ ga teng $g'(y_0)$ hosila mavjud bo'ladi, ya'ni $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$, $g'(y_0) = \frac{1}{f'[g(y_0)]}$.

Buni boshqacha $x'_y = \frac{1}{y'_x}$ ko'rinishda yozish mumkin.

Agar x va y o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish bevosita emas, balki uchinchi bir t o'zgaruvchi yordamida biror $x = \varphi(t)$ va $y = \psi(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$, funksiyalar orqali bevosita berilgan bo'lsa, unda x argumentning y funksiyasi parametrik ko'rinishda berilgan, t esa parametrl deyiladi.

Masalan, $x = t^3 = \varphi(t)$, $y = t^6 = \psi(t)$, $t \in (-\infty; +\infty)$ parametrik ko'rinishda bevosita berilgan funksiya $y = f(x) = x^2$, $x \in (-\infty; +\infty)$, ko'rinishdagi bevosita berilgan funktsiyani ifodalaydi.

Parametrik ko'rinishda berilgan funktsiyani x bo'yicha hosilasini topish uchun dastlab uni $y = f(x)$ ko'rinishda yozib, so'ngra uning hosilasini topish mumkin. Ammo har doim ham bu usul qulay bo'lmaydi, chunki parametrik shaklda berilgan funktsiyani $y = f(x)$ ko'rinishda yozish qiyin yoki $y = f(x)$ funksiya ko'rinishi juda murakkab bo'lib, undan hosila olish noqulay bo'lishi mumkin. Shu sababli parametrik ko'rinishda berilgan funktsiyaning hosilasi to'g'ridan-to'g'ri $x = \varphi(t)$ va $y = \psi(t)$ funktsiyalar orqali

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

formula yordamida topiladi.

Agar erkli o'zgaruvchi x va y funksiya orasidagi bog'lanish $f(x, y) = 0$ tenglama bilan berilgan bo'lsa, u holda y ni x ning oshkormas funktsiyasi deyiladi.

$f(x, y) = 0$ tenglama y ga nisbatan echilmagan bo'lsa ham, y dan x bo'yicha hosila olish mumkin. Buning uchun $f(x, y) = 0$ ning har ikkala qismidan y ni x ning funktsiyasi deb qarab, x bo'yicha hosila olinadi va hosil qilingan tenglamadan y' topiladi.

Matematik analizning ko'plab tadbirlarida $y = e^x$ va $y = e^{-x}$ ko'rsatkichli funktsiyalardan tuzilgan $\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ va $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ funktsiyalar uchraydi. Bunday funktsiyalarga yangi funktsiyalar sifatida qaraladi va quyidagicha belgilanadi.

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Bulardan birinchisi giperbolik sinus, ikkinchisi esa giperbolik kosinus deb ataladi. Bu funktsiyalar yordamida yana ikkita $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$ va $\operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$ funktsiyalar aniqlanadi. Ular:

$\operatorname{th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ - giperbolik tangens va $\operatorname{cth} x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ - giperbolik kotangenslardir.

$\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{th} x$ funktsiyalar x ning har qanday qiymatlarida aniqlangan. $\operatorname{cth} x$ funksiya esa $x = 0$ nuqtadan farqli har qanday nuqtalarda aniqlangan.

Giperbolik funktsiyalar orasida quyidagi munosabatlar o'rinaldir.

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1;$$

$$\operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch} 2x;$$

$$\operatorname{ch}(\alpha + \beta) = \operatorname{ch} \alpha \cdot \operatorname{ch} \beta + \operatorname{sh} \alpha \cdot \operatorname{sh} \beta;$$

$$\operatorname{sh}(\alpha + \beta) = \operatorname{sh} \alpha \cdot \operatorname{ch} \beta + \operatorname{ch} \alpha \cdot \operatorname{sh} \beta.$$

$\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{th} x$ va $\operatorname{cth} x$ larning e^x va e^{-x} lar orqali ifodalaridan hosila olib quyidagilarni hosil qilamiz:

$$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x, \quad (\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x},$$

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x, \quad (\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}.$$

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $y = (5x^2 + 7x + 2)^3$ funktsiyaning hosilasi topilsin.

Yechish: $y = U^3$, $U = 5x^2 + 7x + 2$ deb belgilab, murakkab funktsiyani hosilasini topish formulasidan foydalanamiz:

$$y' = (U^3)' \cdot U'_x = 3U^2 \cdot (5x^2 + 7x + 2)' = 3(5x^2 + 7x + 2)^2 \cdot (10x + 7).$$

2. $y = \sqrt{x^2 + 2}$ funktsiyaning hosilasi topilsin.

Yechish: $U = x^2 + 2$ deb olsak, $y = \sqrt{U}$ hosil bo'ladi. Murakkab funktsiyaning hosilasini topish formulasidan foydalanamiz.

$$y' = (\sqrt{U})' = \frac{1}{2\sqrt{U}} \cdot U' = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 2}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}.$$

3. $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}}$ funktsiyaning hosilasi topilsin.

Yechish: $U = x^2 + x + 1$ deb olsak,

$$y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} = (x^2 + x + 1)^{-\frac{1}{2}} = U^{-\frac{1}{2}} \quad \text{hosil bo'ladi. Murakkab}$$

funktsiyaning hosilasini topish formulasidan foydalanamiz:

$$y' = (U^{-\frac{1}{2}})' = -\frac{1}{2} U^{-\frac{3}{2}} \cdot U'_x = -\frac{1}{2\sqrt{(x^2 + x + 1)^3}} \cdot (2x + 1) = -\frac{2x + 1}{2\sqrt{(x^2 + x + 1)^3}}.$$

4. $y = \sqrt[3]{x}$ funktsiyaga tesakari funktsiyaning hosilasi topilsin.

Yechish: Berilgan funksiyaga teskari funksiya $x = y^3$ bo'lib, uning hosilasi $y'_x = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{3y^2} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$ ga teng.

5. $y = x + x^3$, $x \in \mathbb{R}$ funksiyaga teskari bo'lgan funksiyaning hosilasi topilsin.

Yechish: Berilgan funksiya $(-\infty; +\infty)$ da uzluksiz va qat'iy o'suvchi. Uning hosilasi

$$\frac{dy}{dx} = 1 + 3x^2$$

hech bir nuqtada nolga aylanmaydi. Shuning uchun

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{1+3x^2}$$

6. $y = f(x)$ funksiya $x = a \cos^3 t$, $y = b \sin^3 t$, $t \in (0; \frac{\pi}{2})$ formulalar bilan parametrik shaklda berilgan. y'_x topilsin.

Yechish: $x(t)$ va $y(t)$ funksiyalar t ning har qanday qiymatlarida hosilaga ega va $(0; \frac{\pi}{2})$ oraliqda $x'_t = -3a \cos^2 t \cdot \sin t \neq 0$. Bundan tashqari, $y'_t = 3b \sin^2 t \cdot \cos t$. U holda parametrik shaklda berilgan funksiyaning hosilasini topish formulasiga asosan

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{3b \sin^2 t \cdot \cos t}{-3a \cos^2 t \cdot \sin t} = -\frac{b}{a} \operatorname{tg} t, \quad t \in (0; \frac{\pi}{2}).$$

7. $y = (\sin x)^{\cos x}$ ($0 < x < \pi$) funksiyaning hosilasi topilsin.

Yechish: Tenglikning har ikkala qismini hadma-had e asosga ko'ra logarifmlaymiz va

$$\ln y = \cos x \cdot \ln \sin x$$

ni hosil qilamiz. $\ln y$ ni murakkab funksiya deb qarab, oxirgi tenglikning har ikkala qismidan x bo'yicha hosila olamiz. Natijada

$$\frac{1}{y} \cdot y' = -\sin x \cdot \ln \sin x + \cos x \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x$$

ni hosil qilamiz. Bundan esa y' ni aniqlaymiz:

$$y' = (\sin x)^{\cos x} [-\sin x \ln \sin x + \frac{\cos^2 x}{\sin x}]$$

8. Oshkormas holda berilgan quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin:

$$1) 5x + 3y - 7 = 0; \quad 2) x^2 + y^2 - 25 = 0.$$

Yechish: 1) Berilgan tenglikning har ikkala tomonidan x bo'yicha hosila olamiz. Natijada $5 + 3y' = 0$ yoki $3y' = -5$ hosil bo'ladi. Undan esa $y' = -\frac{5}{3}$ kelib chiqadi.

2) Tenglikning har ikkala tomonidan x bo'yicha hosila olamiz va $x + 2y \cdot y' = 0$ ga ega bo'lamiz. Undan esa

$$y' = -\frac{x}{y}$$

kelib chiqadi.

9. $y = th^3 x^2$ funksiyaning hosilasi topilsin.

Yechish: Murakkab funksiyaning hosilasini topish formulasi va giperbolik funksiyaning hosilasidan foydalanamiz:

$$y' = (th^3 x^2)' = 3th^2 x^2 \cdot \frac{1}{ch^2 x^2} \cdot 2x = \frac{6x \cdot th^2 x^2}{ch^2 x^2}.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Quyida berilgan murakkab funksiyalarning hosilalari topilsin.

- 1) $y = (5x^3 + 4x^2 + 8)^4$; 2) $y = (5x^2 + 7)^3$;
 3) $y = (1 + 5x - 8x^2)^5$; 4) $y = (1 + 2\sqrt{x} - \frac{3}{x^2})^4$;
 5) $Q = \sqrt[3]{3t - 2t^2}$; 6) $y = (\frac{2}{3x^3} + \frac{28}{27x})\sqrt{7x^2 - 9}$;
 7) $y = \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}$; 8) $y = \sqrt[3]{(4 + 3x)^2}$;
 9) $y = \sin \sqrt{x}$; 10) $f(x) = \sqrt{x + 2\sqrt{x}} f'(1)$ topilsin.

$$11) y = \sin^4 x + \cos^4 x; \quad 12) y = \ln \sqrt{\frac{\sin 2x}{1 - \sin 2x}};$$

$$13) y = \ln(1 + \sec x); \quad 14) y = \ln \cos x - \frac{1}{2} \cos^2 x.$$

Javob: 1) $y' = 4(5x^3 + 4x^2 + 8)^3 \cdot (15x^2 + 8x)$;

$$2) 30x(5x^2 + 7)^2; \quad 3) 5(1 + 5x - 8x^2)^4 \cdot (5 - 16x);$$

$$4) 4(1 + 2\sqrt{x} - \frac{6}{x^2})^3 \cdot (\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{6}{x^2}); \quad 5) \frac{3-4t}{3\sqrt[3]{(3t-2t^2)^2}}; \quad 6) \frac{1}{x^2\sqrt{3x+x^2}};$$

$$7) \frac{1}{2}(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}); \quad 8) \frac{2}{\sqrt[3]{4+3x}}; \quad 9) \frac{\cos \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}; \quad 10) \frac{1}{\sqrt{3}}; \quad 11) -\sin 4x;$$

$$12) \frac{\operatorname{ctg} 2x}{1 - \sin 2x}; \quad 13) \frac{\operatorname{tg} x}{1 + \cos x}; \quad 14) -\operatorname{tg} x \cdot \sin^2 x.$$

2. $y = x^x$ ($x > 0$) funksiyaning hosilasi topilsin.

Javob: $x^x(\ln x + 1)$.

3. $y = x^{\frac{1}{x}}$ ($x > 0$) funksiyaning hosilasi topilsin.

Javob: $x^{\frac{1}{x}-2} \cdot (1 - \ln x)$.

4. Quyidagi funksiyalarga teskari bo'lgan funksiyalar hosilalarining ko'rsatilgan nuqtalardagi qiymatlari topilsin:

1) $y = x + \frac{1}{5}x^5$, $y = 0$, $y = \frac{6}{5}$;

2) $y = 2x - \frac{\cos x}{2}$, $y = -\frac{1}{2}$;

3) $y = 0.1x + e^{0.1x}$, $y = 0$;

4) $y = 2x^2 - x^4$, $x > 1$, $y = 0$;

5) $y = 2x^2 - x^4$, $0 < x < 1$, $y = \frac{3}{4}$.

Javob: 1) $x'(0) = 1$, $x'(\frac{6}{5}) = \frac{1}{2}$; 2) $x'(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$; 3) $x'(0) = 0$;

4) $x'(0) = -\frac{\sqrt{2}}{8}$; $x'(\frac{3}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

5. Parametrik shaklda berilgan quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin:

1) $x = \sin^2 t$, $y = \cos^2 t$, $0 < t < \frac{\pi}{2}$;

2) $x = e^{-t}$, $y = t^3$, $-\infty < t < +\infty$;

3) $x = acost$, $y = bsint$, $0 < t < \pi$;

4) $x = acht$, $y = bsht$, $-\infty < t < 0$;

5) $x = t^2 + 6t + 5$, $y = \frac{t^3 - 54}{t}$, $0 < t < +\infty$;

6) $x = a(t - sint)$, $y = a(1 - cost)$, $-\infty < t < +\infty$.

Javob: 1) $y'_x = -1$, $0 < x < 1$; 2) $y'_x = -3t^2 e^6$; 3) $y'_x = -\frac{b}{a} ctgt$; 4) $y'_x = \frac{b}{a} ctgt$; 5) $y'_x = 1 - \frac{3}{t} + \frac{9}{t^2}$; 6) $y'_x = ctg \frac{t}{2}$.

6. Quyidagi funksiyalarning hosilalari topilsin:

1) $y = sh^2 x$; 2) $y = x - thx$; 3) $y = 2\sqrt{chx - 1}$; 4) $y = \ln(thx)$;

5) $y = \arcsin(thx)$; 6) $y = \sqrt{1 + sh^2 x}$.

Javob: 1) $sh 2x$; 2) $th^2 x$; 3) $\sqrt{chx + 1}$; 4) $\frac{2}{sh 2x}$; 5) $\frac{1}{chx}$; 6) $4sh 4x$.

7. $y = shx$ egri chiziqqa absissasi $x = -2$ bo'lgan nuqtada o'tkazilgan normala tenglamasi yozilsin.

Javob: $y = 3.76x + 3.89$.

8. $f(x) = sh \frac{x}{2} + ch \frac{x}{2}$ funksiya berilgan. $f'(0) + f(0)$ topilsin.

Javob: 1.5.

9. Quyidagi tenglamalardan y' topilsin:

1) $x^2 + y^2 = a^2$; 2) $x^2 + xy + y^2 = 6$;

3) $x^2 + y^2 - xy = 0$; 4) $e^y - e^{-x} + xy = 0$.

10. $e^{xy} - x^2 + y^3 = 0$, $y'(0)$ topilsin.

Javob: $\frac{1}{3}$.

11. $thx - x \ln t = 1$, $x'(1)$ topilsin.

Javob: $e(e - 1)$.

§3. Funksiyaning differensial

Agar $y = f(x)$ funksiya x nuqtada differensiallanuvchi bo'lsa, ya'ni α shu nuqtada chekli y' hosilaga ega bo'lsa, u holda

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = y' + \alpha$$

bo'ladi, bunda $\Delta x \rightarrow 0$ da $\alpha \rightarrow 0$. Bundan

$$\Delta y = y' \cdot \Delta x + \alpha \cdot \Delta x.$$

Demak, funksiya orttirmasi ikkita qo'shiluvchidan iborat bo'lib, uning birinchi qo'shiluvchisi Δx ga nisbatan chiziqli ifoda, ikkinchi qo'shiluvchi esa yuqori tartibli cheksiz kichik miqdor ekan.

Funksiya orttirmasi Δy ning Δx ga nisbatan chiziqli bo'lgan bosh qismi $y' \cdot \Delta x$ funksiyaning differensial deyiladi va dy bilan belgilanadi. Ya'ni

$$dy = y' \cdot \Delta x$$

Agar bu formulada $y = x$ deb olsak, u holda $dx = x' \cdot \Delta x = 1 \cdot \Delta x = \Delta x$ ga ega bo'lamiz. Shuning uchun ham

$$dy = y' \cdot dx$$

$\Delta y = y' \cdot \Delta x + \alpha \cdot \Delta x$ tenglikdan $\Delta y \approx dy$ ekani, ya'ni yetarlicha kichik $dx = \Delta x$ uchun funksiya orttirmasi uning differensialiga teng ekani kelib chiqadi.

Funksiya orttirmasini funksiya differensial bilan almashtirganda absolyut xatolik $|\Delta y - dy|$ ga va nisbiy xatolik

$$\left| \frac{\Delta y - dy}{\Delta y} \right|$$

ga teng bo'ladi.

Har qanday differensiallanuvchi u va v funksiyalar uchun quyidagilar o'rinaldir:

$$1. d(u + v) = du + dv;$$

$$2. d(uv) = u dv + v du.$$

$$3. d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, v \neq 0.$$

Funksiya differensialining $dy = f'(x)dx$ ifodasidan foydalanib ko'p uchrab turadigan funksiyalarning differensiallari jadvalini keltiramiz:

$$1. dc = 0;$$

$$2. dx = dx;$$

$$3. d(\sqrt{x}) = \frac{dx}{2\sqrt{x}};$$

$$4. d(x^r) = r \cdot x^{r-1} \cdot dx;$$

$$5. d(x^n) = nx^{n-1} \cdot dx;$$

$$6. d(a^x) = a^x \ln a \cdot dx;$$

$$7. d(e^x) = e^x \cdot dx;$$

$$8. d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{dx}{x^2};$$

$$9. d(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e \cdot dx;$$

$$10. d(\ln x) = \frac{dx}{x};$$

$$11. d(\sin x) = \cos x dx;$$

$$12. d(\cos x) = -\sin x dx;$$

$$13. d(\operatorname{tg} x) = \frac{dx}{\cos^2 x}$$

$$(x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k = 0, 1, \pm 2);$$

$$14. d(\operatorname{ctg} x) = -\frac{dx}{\sin^2 x}$$

$$(x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots);$$

$$15. d(\arcsin x) = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(-1 < x < 1);$$

$$16. d(\arccos x) = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(-1 < x < 1);$$

$$17. d(\operatorname{arctg} x) = \frac{dx}{1+x^2};$$

$$18. d(\operatorname{arcctg} x) = -\frac{dx}{1+x^2};$$

$$19. d(\operatorname{sh} x) = \operatorname{ch} x dx;$$

$$20. d(\operatorname{ch} x) = \operatorname{sh} x dx.$$

$f(x)$ funksiyaning differensiali dy ning $x \in (a, b)$ nuqtadagi differensial berilgan funksiyaning ikkinchi tartibli differensial deb ataladi

yoki d^2y kabi belgilanadi. Demak,

$$d^2y = d(dy) = d(f'(x)dx) = f''(x)dx^2.$$

Funksiyaning uchinchi, to'rtinchi va hokazo tartibli differensiallari ham shu shunga o'xshash ta'riflanadi. Ya'ni,

$$d^3y = d^3y = f'''(x)dx^3, \dots, d(d^{n-1}y) = d^n y = f^{(n)}(x)dx^n.$$

Funksiyaning differensialidan taqribiy hisoblashlarda foydalanish mumkin. Bunda biz argument orttirmasi Δx juda kichik son bo'lganda funksiya differensial dy va funksiya orttirmasi qiymatlari bir-biriga teng, ya'ni

$$\Delta f \approx df$$

ko'rishidan foydalanamiz. Ya'ni,

$$\Delta f \approx df, f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x) \cdot \Delta x, f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x$$

$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x$ formula yordamida, funksiyaning ma'lum yoki oson hisoblanadigan $f(x)$ qiymatidan foydalanib, uning no'malum yoki hisoblanishi qiyin bo'lgan $f(x + \Delta x)$ qiymati taqribiy hisoblanadi.

Differensial yordamida funksiyalar uchun taqribiy formulalar ham hosil qilish mumkin. Bu maqsadda oxirgi formulada $x = 0$ deb olib, Δx ning kichik qiymatlari uchun

$$f(\Delta x) \approx f(0) + f'(0) \Delta x$$

taqribiy formulaga ega bo'lamiz. Masalan, x yetarlicha kichik son bo'lganda,

$$\sin x \approx x, (1+x)^a \approx 1+ax, e^x \approx x, \ln(1+x) \approx x, \operatorname{tg} x \approx x$$

taqribiy formulalardan foydalanish mumkin.

Bulardan tashqari quyidagi taqribiy formulalardan ham foydalanish mumkin.

$$\sqrt{a^2 + x} \approx a + \frac{x}{2a} \quad (a > 0), |x| \ll a \quad (\ll \text{belgi } x \text{ } a \text{ ga nisbatan o'ta}$$

kichik ekanligini bildiradi);

$$\sqrt{a^2 + x} \approx a + \frac{x}{2a} - r \quad (a > 0, x > 0), 0 < r < \frac{x^2}{8a^3};$$

$$\sqrt[n]{a^n + x} \approx a + \frac{x}{na^{n-1}} \quad (a > 0, |x| \ll a).$$

Agar $y = F(u)$, $u = \varphi(x)$ murakkab funksiya berilgan bo'lsa, u ning uning differensiali quyidagicha bo'ladi: $dy = F'_u \cdot du$.

Berilgan funksiyaning ikkinchi tartibli differensiali esa quyidagicha bo'ladi.

$$d^2y = F''_{uu}(u)(du^2) + F'_u(u)d^2u, \quad d^2u = \varphi''(x)(dx)^2.$$

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $y = x - 3x^2$ funksiyaning $x = 2$ nuqtadagi differensialini topilsin.

Yechish: Berilgan funksiya hosilasining $x = 2$ nuqtadagi qiymatini topamiz: $y' = (x - 3x^2)' = 1 - 6x$, $y'(2) = 1 - 6 \cdot 2 = -11$. Bu funksiyaning berilgan nuqtadagi differensialini topish formulasiga qo'yamiz:

$$df(x_0) = dy(x_0) = dy(2) = y'(x_0) \cdot dx = -11 \cdot dx = -11dx.$$

2. $y = x\sqrt{64 - x^2}$ funksiyaning differensialini topilsin.

$$\begin{aligned} \text{Yechish: } dy &= y' \cdot dx = (x \cdot \sqrt{64 - x^2})' \cdot dx = \\ &= \left(\sqrt{64 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{64 - x^2}} \right) dx = \frac{64 - x^2 - x^2}{\sqrt{64 - x^2}} dx = \frac{64 - 2x^2}{\sqrt{64 - x^2}} dx. \end{aligned}$$

3. $y = \sin u$, $u = \sqrt{x}$ murakkab funksiyaning birinchi va ikkinchi tartibli differensiallari topilsin.

$$\begin{aligned} \text{Yechish: } dy &= F'_u(u)du = \cos u \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \cos u \cdot du \\ d^2y &= -\sin u(du)^2 + \cos u d^2u = -\sin u (du)^2 + \cos u \cdot u''(dx)^2 = \\ &= -\sin u \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right)^2 (dx)^2 + \cos u \left(-\frac{1}{4x^{3/2}} \right) (dx)^2 = -\sin \sqrt{x} \cdot \frac{1}{4x} (dx)^2 - \\ &- \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{4x^{3/2}} (dx)^2. \end{aligned}$$

4. $y = \frac{x^2}{x^2 + 4}$ funksiyaning differensialini topilsin.

$$\begin{aligned} \text{Yechish: Bu funksiyaning differensialini bo'linmaning differensialini topish formulasidan yoki funksiya differensialini formulasidan foydalanib topish mumkin.} \\ dy = y' \cdot dx = \left(\frac{x^2}{x^2 + 4} \right)' dx = \frac{2x(x^2 + 4) - 2x \cdot x^2}{(x^2 + 4)^2} dx = \\ = \frac{8x}{(x^2 + 4)^2} dx. \end{aligned}$$

5. $y = \ln(1 + e^{10x}) + \arctg e^{5x}$ funksiyaning differensialini toping

Agar $x = 0$; $dx = 0,2$ bo'lgandagi qiymatini hisoblang.

$$\begin{aligned} \text{Yechish: } dy &= [\ln(1 + e^{10x}) + \arctg e^{5x}]' \cdot dx = \\ &= \left(\frac{10 \cdot e^{10x}}{1 + e^{10x}} + \frac{5e^{5x}}{1 + e^{10x}} \right) dx = \frac{5e^{5x}(2e^{5x} + 1)}{1 + e^{10x}} dx. \end{aligned}$$

Shuning bu ifodasidagi x va dx larning o'rnlariga ularning qiymatlarini qo'yamiz.

$$dy|_{x=0} = \frac{5e^0 \cdot (2e^0 + 1)}{1 + e^0} \cdot 0,2 = \frac{15}{2} \cdot 0,2 = 1,5$$

6. $y = 3x^3 + x - 1$ funksiyaning $x = 1$ va $\Delta x = 0,1$ bo'lgandagi absolyut va nisbiy xatosi topilsin.

Yechish: Absolyut xatolik $|\Delta y - dy|$ va nisbiy xatolik $\left| \frac{\Delta y - dy}{\Delta y} \right|$ ga teng bo'lgani uchun berilgan funksiyaning $x = 1$ va $\Delta x = 0,1$ dagi orttirmasi differensialini topamiz.

$$\begin{aligned} \Delta y &= [3(x + \Delta x)^3 + (x + \Delta x) - 1] - (3x^3 + x - 1) = 9x^2 \cdot \Delta x + \\ &+ 9x \cdot \Delta x^2 + 3(\Delta x)^3 + \Delta x; \\ dy &= (9x^2 + 1)\Delta x. \quad dy = (9 \cdot 1^2 + 1) \cdot 0,1 = 10 \cdot 0,1 = 1. \end{aligned}$$

Bulardan $\Delta y - dy = 9x \cdot (\Delta x)^2 + 3(\Delta x)^3$ kelib chiqadi.

$x = 1$ va $\Delta x = 0,1$ bo'lganda $\Delta y - dy = 0,09 + 0,003 = 0,093$.
 $dy = 1$; $\Delta y = 1,093$. Demak, absolyut xatolik $|\Delta y - dy| = 0,093$ va nisbiy xatolik $\left| \frac{\Delta y - dy}{\Delta y} \right| = \frac{0,093}{1,093} \approx 0,085$ yoki 8,5%.

7. Quyida berilganlarning taqribiy qiymatlari topilsin:

1) $\cos 31^\circ$; 2) $\sqrt[5]{33}$.

Yechish: 1) $\cos 31^\circ = \cos(30^\circ + 1^\circ) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{180}\right)$ bo'lgani uchun $x = \frac{\pi}{6}$ va $\Delta x = \frac{\pi}{180}$. Bularni taqribiy hisoblash formulasiga $f(x + \Delta x) = f(x) + f'(x)\Delta x$ ga qo'yamiz. Bizda $f(x) = \cos x = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ va

$$\begin{aligned} f'\left(\frac{\pi}{6}\right) &= -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}. \text{ Demak,} \\ \cos 31^\circ &= \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{180}\right) \approx \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{180} \approx 0,851. \end{aligned}$$

2) $x = 32; \Delta x = 1$ deb olsak, yuqoridagi formulaga asosan
 $\sqrt[5]{33} = \sqrt[5]{32} + \frac{1}{5\sqrt[5]{32^4}} = 2 + \frac{1}{5\sqrt[5]{32^4}} = 2 + \frac{1}{5 \cdot 2^4} = 2 + \frac{1}{80} = 2,0125.$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Quyidagi funksiyalarning differensiallari topilsin:

1) $y = x^3 - 3x^2 + 3x;$ 2) $r = 2\varphi - \sin 2\varphi;$

3) $y = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2};$ 4) $y = \arctg \sqrt{4x-1};$

5) $y = \frac{1}{a} \arctg \frac{x}{a} (a \neq 0);$ 6) $y = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|;$

7) $y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}};$ 8) $y = \sin x - x \cos x;$

Javob: 1) $(3x^2 - 6x + 3)dx;$ 2) $(2 - 2 \cos 2\varphi)d\varphi;$ 3) $\frac{(2-x)dx}{x^3};$

4) $\frac{dx}{2x\sqrt{4x-1}};$ 5) $\frac{dx}{a^2+x^2};$ 6) $\frac{dx}{x^2-a^2} (|x| \neq |a|)$ 7) $\frac{dx}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}};$ 8) $x \sin x dx.$

2. $y = x^3$ bo'lsa, Δy hamda dy lar aniqlansin va ular x ning qiymati 2 dan 1,98 gacha o'zgarganda hisoblansin.

Javob: $\Delta y = 3x^2 \cdot \Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 = -0,2376,$
 $dy = 3x^2 dx = -0,24.$

3. Mayatnik tebranishining davri $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ c., bundagi l — santimetr bilan o'lchangan mayatnik uzunligi. Tebranish davri 0,1 sekunda kamayishi uchun mayatnik uzunligi $l = 20$ sm ni qanday o'zgartirish kerak?

Javob: $dl = \frac{14}{\pi} \approx 4,46$ sm.

4. $f(x) = x^3 - 2x + 1$ funksiya berilgan. $\Delta f(1)$ va $df(1)$ lar topilsin.

Javob: $\Delta f(1) = \Delta x + 3(\Delta x)^2 + 3(\Delta x)^3; df(1) = \Delta x.$

5. x argumentning qiymati 5 dan 5,01 gacha o'zgarganda $y = x^3 - 7x^2 + 8$ funksiyaning orttirmasi qanday o'zgaradi?

Javob: $\Delta y \approx dy = 0,05.$

6. Differensial tushunchasidan foydalanib $y = \sqrt[5]{\frac{2-x}{2+x}}$ funksiyaning $x = 0,15$ bo'lgandagi taqribiy qiymati topilsin.

Javob: 0,972

7. $y = \sqrt{\ln^2 x - 4}$ funksiya berilgan. $d^2 y$ topilsin.

Javob: $d^2 y = \frac{4 \ln x - 4 - \ln^2 x}{x^2 \sqrt{(\ln^2 x - 4)^3}} dx;$

8. $y = \sin^2 x$ funksiya berilgan. $d^3 y$ topilsin.

Javob: $d^3 y = -4 \sin 2x dx^3.$

9. Kubning qirrasi $x = 5m \pm 0,01m$. Kub hajmini hisoblashdagi taqribiy va nisbiy xatolar aniqlansin.

Javob: $dv = 3x^2 dx = 0,75; \frac{dv}{v} = 0,006$ yoki 0,6%.

10. Telegraf simining uzunligi $s = 2b \left(1 + \frac{2f^2}{3b^2}\right)$, bundagi $2b$ simning o'tun biriktirilgan nuqtalari orasidagi masofa, f esa simning eng katta egilishi. Issiqlik ta'sirida sim uzunligi ds ga ortsa, egilish qanchaga ortadi?

Javob: $df = \frac{3b ds}{8f}.$

11. 1) Doiraviy halqaning yuzi; 2) sferik qatlamning (ikkita konsetrik sfera orasidagi qatlamning) hajmi taqribiy hisoblansin. Ular aniq qiymatlar bilan taqqoslansin.

Javob: $S = \pi R^2, \Delta S \approx ds = 2\pi R dR; 2) v = \frac{4}{3} \pi R^3,$

$\Delta v \approx dv = 4\pi R^2 dR.$

§4. Differensial hisobning asosiy teoremlari. Teylor formulasi

Roll teoremasi. Agar $f(x)$ funksiya: 1) $[a; b]$ kesmada uzluksiz;

2) shu kesmaning ichki nuqtalarida hosilaga ega; 3) $f(a) = f(b)$ bo'lsa, u holda a bilan b orasida shunday $x = c$ nuqta mavjud bo'ladiki, unda

$$f'(c) = 0$$

bo'ladi.

Lagranj teoremasi. Agar $f(x)$ funksiya: 1) $[a; b]$ kesmada uzluksiz; 2) shu kesmaning ichki nuqtalarida hosilaga ega bo'lsa, u holda a va b orasida shunday $x = c$ nuqta topiladiki, unda

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

bo'ladi.

Koshi teoremasi. Agar $f(x)$ va $\varphi(x)$ funksiya: 1) $[a; b]$ kesmada uzluksiz; 2) shu kesmaning ichki nuqtalarida har ikkala funksiya ham hosilaga ega, shuning bilan birga, $\varphi'(x) \neq 0$ bo'lsa, u holda a bilan b orasida shunday $x = c$ nuqta mavjud bo'ladi, unda

$$\frac{f(b) - f(a)}{\varphi(b) - \varphi(a)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)}$$

bo'ladi.

Bu teoremlarda a bilan b orasida qandaydir o'rta $x = c$ qiymat haqida so'z borganligi uchun, ular o'rta qiymat haqidagi teoremlar deb ataladi.

Ferma teoremasi. $f(x)$ funksiya $(a; b)$ oraliqda berilgan bo'lib, u shu oraliqning biror c nuqtasida o'zining eng katta (kichik) qiymatiga erishsin. Agar funksiya c nuqtada chekli hosilaga ega bo'lsa, u holda bu nuqtada

$$f'(c) = 0$$

bo'ladi.

$f(x)$ funksiya $x_0 \in R$ nuqtaning biror atrofi $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ da aniqlangan bo'lib, bu atrofda $f'(x), f''(x), \dots, f^{(n+1)}(x)$ hosilalarga ega va $f^{(n+1)}(x)$ hosila x_0 nuqtada uzluksiz bo'lsa, u holda quyidagi

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$
 formula o'rinli bo'ladi. Bunda $\xi = x_0 + \theta(x - x_0), 0 < \theta < 1$.

Bu formula Teylor formulasi deyiladi.

$R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$ ni Lagranj ko'rinishidagi qoldiq had deyiladi.

Teylor formulasida $x_0 = 0$ bo'lgan hol alohida ahamiyatga ega:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_{n+1}(x)$$

Odatda, bu formula Makloren formulasi deyiladi. Bu formuladan funksiya limitini topishda, taqribiy hisoblash masalalarida foydalaniladi.

Quyida ba'zi bir elementar funksiyalar uchun Makloren formulasini keltiramiz:

$f(x) = e^x$ bo'lsin. Bu funksiya uchun $f^{(n)}(x) = e^x$, $f(0) = 1$, $f^{(n)}(0) = 1$, ($n = 1, 2, \dots$). U holda quyidagi formulani yozish mumkin:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + R_{n+1}(x), \quad R_{n+1}(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{\theta x} \quad (0 < \theta < 1)$$

Agar $n \rightarrow \infty$ da $R_{n+1} \rightarrow 0$ bolishini etiborga olsak, $f(x) = e^x$ uchun $e^x \approx 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ taqribiy formulaga ega bo'lamiz.

2. $f(x) = \sin x$ bo'lsin. Bu funksiyaning n -tartibli hosilasi uchun $f^{(n)}(x) = (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$ formula orinli ekanini topish qiyin emas.

$f(0) = \sin 0 = 0$ ekanligi ravshan. $f^{(n)}(0)$ ni aniqlaymiz:

$$f^{(n)}(0) = \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & \text{agar } n - \text{juft bo'lsa,} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}, & \text{agar } n - \text{toq bo'lsa.} \end{cases}$$

Demak $f(x) = \sin x$ funksiya uchun Makloren formulasi

$$\sin x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{n+1}),$$

ko'rinishda yozamiz.

3. $f(x) = \cos x$ bolsin. Funksiyaning n -tartibli hosilasi uchun

$$f^{(n)}(x) = (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

formula o'rinlidir. $f(0) = 1$ bo'lishi ravshan.

$$f^{(n)}(0) = \cos \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & \text{agar } n - \text{toq son bo'lsa,} \\ (-1)^{\frac{n}{2}}, & \text{agar } n - \text{juft bo'lsa.} \end{cases}$$

Demak, $f(x) = \cos x$ funksiya uchun Makloren formulasi

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{n+1}),$$

ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda $o(x^{n+1})$, qoldiq had.

4. $f(x) = \ln(1+x)$ bo'lsin. Bu funksiyaning n -tartibli hosilasini topamiz:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}, \quad f''(x) = (-1)(1+x)^{-2},$$

$f'''(x) = (-1)(-2)(1+x)^{-3}$, $f^{IV}(x) = (-1)(-2)(-3)(1+x)^{-4}$
bulardan foydalanib, n -tartibli hosilani topish uchun quyidagi formulani
hosil qilamiz:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1}(n-1)!(1+x)^{-n} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$$

$f(0) = \ln(1+0) = \ln 1 = 0$ va $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1}(n-1)!$ ekanligini
e'tiborga olsak, $f(x) = \ln(1+x)$ funksiya uchun Makloren formulasi:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1}),$$

ko'rinishda bo'ladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $f(x) = 3x^2 - 1$ funksiya $[1; 2]$ kesmada Ferma teoremasining
shartlarini qanoatlantiradimi?

Yechish: Berilgan funksiya $[1; 2]$ kesmada monoton o'suvchi bo'lib, u
o'zining eng katta yoki eng kichik qiymatiga kesmaning chetlarida, ya'ni
 $x = 1$ nuqtada o'zining eng kichik qiymatiga va $x = 2$ nuqtada o'zining
eng katta qiymatiga erishadi. Bu esa berilgan funksiya $[1; 2]$ kesmada
Ferma teoremasining shartlarini qanoatlantirmasligini bildiradi.

2. $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}$ funksiya $[-1; 1]$ kesmada Roll teoremasi
shartlarini qanoatlantiradimi?

Yechish: Funksiya $[-1; 1]$ kesmada uzluksiz va $f(-1) = f(1) = 0$.
Demak, berilgan funksiya Roll teoremasining ikkita shartini
qanoatlantiryapti. Funksiya'ning hosilasi

$$f'(x) = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

bo'lib, u $x = 0$ dan farqli nuqtalarda mavjud. Bu nuqta ichki nuqta bo'lib,
u nuqtada Roll teoremasining uchinchi sharti bajarilmayapti. Bu esa
berilgan funksiyaga Roll teoremasini qo'llab bo'lmasligini bildiradi.

3. $f(x) = 3x^2 - 5$ funksiya $[-2; 0]$ kesmada Lagranj teoremasining
shartlarini qanoatlantiradimi? Agar qanoatlantirsa, $f(b) - f(a) =$
 $f'(c)(b-a)$ formulada muhim o'rin tutuvchi c nuqtani toping.

Yechish: Berilgan funksiya $[-2; 0]$ kesmada uzluksiz va uning barcha
nuqtalarida chekli hosilaga ega bo'lgani uchun Lagranj teoremasini
qanoatlantiradi. c nuqtani aniqlash uchun

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b-a) \text{ ni } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \text{ ko'rinishda yozamiz.}$$

$$f(0) - f(-2) = -5 - (-5) = 0, f'(c) = 6c \text{ bo'lgani uchun}$$

$$0 = 6c, \quad 6c = 0, \quad c = 0.$$

Demak, $c = 0$ bo'lar ekan.

4. $f(x) = x^2 - 2x + 3$ va $\varphi(x) = x^3 - 7x^2 + 20x - 5$ funksiyalar
 $[1; 4]$ kesmada Koshi teoremasi shartlarini qanoatlantirishini tekshiring va
unga mos c ning qiymatini toping.

Yechish: $f(x)$ va $\varphi(x)$ funksiyalar $[1; 4]$ kesmada uzluksiz hamda ular
 $f'(x) = 2x - 2$ va $\varphi'(x) = 3x^2 - 14x + 20$ chekli hosilalarga ega.
Shundan tashqari, $\varphi'(x)$ x ning (hech) har qanday qiymatlarida noldan
farqli. Demak, berilgan funksiyalar uchun $[1; 4]$ kesmada Koshi
teoremasini qo'llash mumkin. Ya'ni,

$$\frac{f(4) - f(1)}{\varphi(4) - \varphi(1)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)}, \quad \frac{11 - 2}{27 - 9} = \frac{2c - 2}{3c^2 - 14c + 20}, \quad (1 < c < 4).$$

Oxirgi tenglamani yechib, $c_1 = 2$ va $c_2 = 4$ larni topamiz. Bulardan
 $c_1 = 2$ uchki nuqta hisoblanadi. Demak, bu nuqta izlanayotgan nuqta ekan.
5. $P(x) = x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1$ ko'phadni Teylor formulasi
yordamida $x - 1$ ning darajalari bo'yicha yoying.

Yechish: Ko'phadni $x - 1$ darajalari bo'yicha yoyish uchun ko'phadni
va uning hosilalarini $x = 1$ nuqtadagi qiymatlarini topish kerak.

$$P(x) = 1 - 2 + 1 - 1 + 2 - 1 = 0.$$

$$P'(x) = 5x^4 - 8x^3 + 3x^2 - 2x + 2; \quad P''(x) = 20x^3 - 24x^2 + 6x - 2;$$

$$P'''(x) = 60x^2 - 48x + 6; \quad P^{IV}(x) = 120x - 48; \quad P^V(x) = 120;$$

$$P^{VI}(x) = 0.$$

$$P'(1) = 5 - 8 + 3 - 2 + 2 = 0; \quad P''(1) = 20 - 24 + 6 - 2 = 0;$$

$$P'''(1) = 60 - 48 + 6 = 18; \quad P^{IV}(1) = 120 - 48 = 72; \quad P^V(1) = 120;$$

$$P^{VI}(1) = 0; \dots, \quad P^{(n)}(x) = 0 \quad (n \geq 6).$$

Topilganlarni Teylor formulasiga qo'yamiz:

$$P(x) = \frac{18}{3!}(x-1)^3 + \frac{72}{4!}(x-1)^4 + \frac{120}{5!}(x-1)^5 \text{ yoki}$$

$$P(x) = x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1 = 3(x-1)^3 + 3(x-1)^4 + (x-1)^5$$

6. $\cos 5^\circ$ ning 10^{-6} gacha aniqlikdagi taqribiy qiymati aniqlansin.

Yechish: $\cos 5^\circ$ ning qiymatini taqribiy hisoblash uchun $f(x) = \cos x$ funksiya uchun yozilgan formuladan foydalanamiz:

Bu formulaga 5° ni radian o'lchovini qo'yamiz va

$$\cos 5^\circ = \cos \frac{\pi}{36} \approx 1 - \frac{\pi^2}{2! \cdot 36^2} + \frac{\pi^4}{4! \cdot 36^4} - \dots \pm \frac{\pi^{2n}}{(2n)! \cdot 36^{2n}}$$

$\cos 5^\circ$ ni 10^{-6} gacha aniqlikdagi taqribiy qiymatini hisoblash uchun yozilgan formulada nechta hadni olish kerakligini aniqlaymiz:

$$|R_1| \leq \frac{x^2}{2!} = \frac{\pi^2}{2! \cdot 36^2} < 0.004,$$

$$|R_3| \leq \frac{x^4}{4!} = \frac{\pi^4}{4! \cdot 36^4} < 0.000003,$$

$$|R_5| \leq \frac{x^6}{6!} = \frac{\pi^6}{6! \cdot 36^6} < 0.00000003.$$

Demak, $|R_5| \leq 10^{-4}$. Shuning uchun berilgan aniqlikdagi qiymatni hosil qilish uchun formuladagi dastlabki uchta hadni olish kifoya.

$$\cos 5^\circ \approx 1 - \frac{\pi^2}{2 \cdot 36^2} + \frac{\pi^4}{24 \cdot 36^4} = 1 - 0.0038077 + 0.0000024 \approx 0.96195$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. $f(x) = \ln \sin x$ funksiya $[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}]$ kesmada Roll teoremasi shartlarini qanoatlantiradimi?

Javob: Qanoatlantiradi.

2. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ funksiya ildizlari orasida uning hosilasining ham ildizi bor ekani tekshirilsin. Bu grafik usulda tushuntirilsin.

Javob: Funksiyaning ildizlari 1; 3. $f'(x) = 2x - 4$ hosilanig ildizi 2 ga teng; $1 < 2 < 3$.

3. $y = |\sin x|$ egri chiziqning $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ segmentdagi $\overline{AB}$ yoyi yasalsin. Nima uchun bu yoyda AB vatarga parallel urunma yo'q? Roll teoremasining qaysi sharti bu yerda bajarilmaydi?

Javob: Chunki $x = 0$ sinish nuqtasi (urunma ikkita).

4. $[1; e]$ kesmada $f(x) = \ln x$ funksiya uchun Lagranj formulasi yozilsin va formuladagi c ning qiymati topilsin.

Javob: $c = e - 1$.

5. Quyidagi funksiyalar uchun Lagranj formulasi yozilsin va c topilsin.

1) $[0; 1]$ kesmada $f(x) = \arctg x$;

2) $[0; 1]$ kesmada $f(x) = \arcsin x$;

$$\text{Javob: 1) } \sqrt{\frac{4}{\pi} - 1}; \quad 2) \sqrt{1 - \frac{4}{\pi^2}}$$

7. $f(x) = x^3$ va $\varphi(x) = x^2$ funsiyalar uchun Koshining

$$\frac{f(b) - f(a)}{\varphi(b) - \varphi(a)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)}$$

formulasi yozilsin hamda c topilsin.

$$\text{Javob: } \frac{b^3 - a^3}{b^2 - a^2} = \frac{3c^2}{2c}; \quad c = \frac{2(a^2 + ab + b^2)}{3(a+b)}$$

8. Quyidagi funksiyalar uchun Koshi formulasi yozilsin va c topilsin:

1) $[0; \frac{\pi}{2}]$ kesmada $\sin x$ va $\cos x$;

2) $[1; 4]$ kesmada x^2 va $\sqrt{x}$;

$$\text{Javob: 1) } \frac{\pi}{4}; \quad 2) \sqrt[3]{(\frac{15}{4})^2}.$$

9. $[-3; 3]$ kesmada $f(x) = e^x$ va $g(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$ funsiyalar Koshi teoremasi shartlarini qanoatlantiradimi?

Javob: Yo'q, chunki $g(-3) \neq g(3)$.

10. Quyida berilgan funksiyalar uchun Makloren formulasi qoldiq hadigacha yozilsin.

$$1) f(x) = e^{\frac{1}{2}x+2}; \quad 2) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}; \quad 3) f(x) = \frac{1}{2x+3};$$

$$4) f(x) = \ln(5-4x); \quad 5) f(x) = \sin(2x+3); \quad 6) f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

§5. Aniqmasliklarni ochish. Lopital qoidasi

Agar $x \rightarrow a$ da $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar cheksiz kichik miqdorlar, ya'ni, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ bo'lsa, u holda ularning $\frac{f(x)}{g(x)}$ nisbat $x \rightarrow a$ da $\frac{0}{0}$ ko'rinishdagi aniqmaslik deb ataladi.

Agar $x \rightarrow a$ da $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar cheksiz katta miqdorlar bo'lsa, ya'ni $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$ bo'lsa, u holda $\frac{f(x)}{g(x)}$ nisbat $x \rightarrow a$ da $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi aniqmaslik deyiladi.

Berilgan $\frac{0}{0}$ yoki $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi $\frac{f(x)}{g(x)}$ aniqmaslikning $x \rightarrow a$ dagi limitini topish shu aniqmaslikni ochish deyiladi.

Lopitalning birinchi qoidasi. $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar $x = a$ nuqta atrofida aniqlangan, diferensiyallanuvchi va $g'(x) \neq 0$ bo'lsin. Bundan tashqari $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar $x \rightarrow a$ shartda cheksiz kichik miqdorlar bo'lsin, ya'ni

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

tengliklar bajarilsin. Bu holda, agar $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ mavjud bo'lsa, u holda $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ ham mavjud bo'lib,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

tenglik o'rinli bo'ladi.

Lopitalning bu qoidalaridan foydalanib, muhim limitlar deb ataluvchi ushbu limitlarni isbotlash qiyin emas.

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad 2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \alpha. \quad 3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha.$$

Lopitalning ikkinchi qoidasi. $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar $x = a$ nuqta atrofida aniqlangan, differensiyallanuvchi va $g'(x) \neq 0$ bo'lsin. Bundan tashqari, $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar $x \rightarrow a$ shartga cheksiz katta miqdorlar bo'lsin, ya'ni

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty,$$

bo'lsin. Bu holda, agar $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ mavjud bo'lsa, u holda $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ ham mavjud bo'ladi va quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Lopitalning birinchi yoki ikkinchi qoidasidagi $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ nisbat $x \rightarrow a$ da $\frac{0}{0}$ yoki $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi aniqmasliklardan iborat bo'lib, $f'(x)$ va $g'(x)$ funksiyalar yana Lopitalning birinchi va ikkinchi qoidalari shartlarini qanoatlantirsa, hamda

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)}$$

mavjud bo'lsa, u holda, quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)}$$

shunday qilib, aniqmaslikni ochish uchun Lopital qoidasini bir necha marta ketma-ket qo'llash mumkin ekan. Buning uchun har gal Lopital qoidasi shartlarining bajarilishini tekshirish kerak bo'ladi.

Lopital qoidasiga teskari tasdiq ham doimo o'rinli bo'lmasligi mumkin. Ya'ni

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \text{ mavjud, ammo } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ mavjud bo'lmasligi mumkin.}$$

Agar $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ bo'lsa, $f(x) \cdot g(x)$ ko'paytma $x \rightarrow a$ da $0 \cdot \infty$ ko'rinishdagi aniqmaslik deyiladi. Bunday aniqmasliklarni ochish uchun ularni

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \text{ yoki } f(x) \cdot g(x) = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$$

ko'rinishda yozib, $\frac{0}{0}$ yoki $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi aniqmaslikka keltiriladi va Lopital qoidasi qo'llaniladi.

Agar $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ bo'lsa, $f(x)^{g(x)}$ ($f(x) > 0$) ifoda $x \rightarrow a$ da 1^∞ ko'rinishdagi aniqmaslik deyiladi. Bunday ko'rinishdagi

aniqmasliklarni ochish uchun $u = f(x)^{g(x)}$ deb belgilaymiz va uning logaritmik ifodasi $\ln u = \ln f(x)^{g(x)}$ ni hosil qilamiz. Bu ifoda ko'rinishdagi aniqmaslik bo'lib, uni ochishni yuqorida ko'rib o'tdik.

Agar berilgan $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar uchun $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ yoki $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ bo'lsa, u holda $f(x)^{g(x)}$ ($f(x) > 0$) ifoda $x \rightarrow a$ da 0^0 yoki ∞^0 ko'rinishdagi aniqmaslik deyiladi. Bunday ko'rinishdagi aniqmasliklar yuqorida 1^∞ ko'rinishdagi aniqmasliklar uchun ko'rib o'tilgan usulda ochiladi.

Agar berilgan $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar uchun $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ bo'lsa, u holda, $f(x) - g(x)$ ayirma $x \rightarrow a$ da $\infty - \infty$ ko'rinishdagi aniqmaslik deb ataladi. Bunday aniqmasliklarni ochish uchun ularni

$$f(x) - g(x) = f(x) \left[1 - \frac{g(x)}{f(x)} \right]$$

ko'rinishda yoziladi. Bunda ikki hol bo'lishi mumkin.

1-hol. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = A \neq 1$.

Bu holda,

$$f(x) - g(x) = f(x) \left[1 - \frac{g(x)}{f(x)} \right]$$

ifodani $x \rightarrow a$ da sartli ravishda $(1 - A) \cdot \infty$ ko'rinishda deb qarash mumkin va shu sababli

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \pm \infty.$$

2-hol. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = A = 1$.

Bu holda, $f(x) - g(x) = f(x) \left[1 - \frac{g(x)}{f(x)} \right]$ ifoda $x \rightarrow a$ da $0 \cdot \infty$ ko'rinishdagi aniqmaslik bo'ladi va uni yuqorida ko'rilgan usulda ochish mumkin.

Umuman olganda $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, 1^∞ , 0^0 , ∞^0 , $\infty - \infty$

ko'rinishdagi aniqmasliklar mavjud bo'lib, ular Lopital qoidasidan va boshqa bir qo'shimcha formulalardan foydalanib ochiladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Lopitalning birinchi qoidasidan foydalanib,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

to'g'ri isbotlansin.

Isbot. Bu yerda $f(x) = \sin x$ va $g(x) = x$ bo'lib, ular Lopital qoidasi shartlarini qanoatlantiradi. Demak,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1.$$

2. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 5x^2 + 2x + 8}{x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 2x + 15}$ limit hisoblansin.

Yechish: Agar berilgan kasrda x o'rniga -1 ni qo'ysak, u holda $\frac{0}{0}$ ko'rinishdagi aniqmaslik paydo bo'ladi. Berilgan kasrning surat va maxrajlari Lopital qoidasi shartlarini qanoatlantiradi. Demak,

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 5x^2 + 2x + 8}{x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 2x + 15} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 - 10x + 2}{4x^3 - 6x^2 - 32x + 2} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8}.$$

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x^2)}{\ln(1-x)}$ hisoblansin.

Yechish: Bu $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi aniqmaslikdir.

Bu yerda $f(x) = \ln(1-x^2)$ va $g(x) = \ln(1-x)$ bo'lib ular Lopitalning ikkinchi qoidasi shartlarini qanoatlantiradi. Demak,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x^2)}{\ln(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{-2x}{1-x^2}}{\frac{-1}{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x(1-x)}{1-x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{1+x} = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{\ln x}$ ($\alpha > 0$) hisoblansin.

Yechish: Bu ham $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi aniqmaslikdir. Unga Lopital qoidasini qo'llaymiz:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^\alpha)'}{(\ln x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{\frac{1}{x}} = \alpha \lim_{x \rightarrow \infty} x^\alpha = \infty.$$

5. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} 5x}$ ni hisoblang.

Yechish: $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ da $\operatorname{tg} 3x$ va $\operatorname{tg} 5x$ lar cheksiz katta miqdorlar bo'lgani uchun bu holda ham $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi aniqmaslikka kelamiz. Uni ochish uchun Lopital qoidasini qo'llaymiz:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} 5x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{3}{\cos^2 3x}}{\frac{5}{\cos^2 5x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{3 \cos^2 5x}{5 \cos^2 3x} = \frac{3}{5} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos 5x}{\cos 3x} \right)^2 = \\ &= \frac{3}{5} \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-5 \sin 5x}{-3 \sin 3x} \right)^2 = \frac{3}{5} \cdot \frac{25}{9} \cdot \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 5x}{\sin 3x} \right)^2 = \frac{5}{3} \left(\frac{1}{-1} \right)^2 = \frac{5}{3}.\end{aligned}$$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln|x|$ ni hisoblang.

Yechish: $f(x) \cdot g(x) = x \cdot \ln|x|$ bo'lib, bu $0 \cdot \infty$ ko'rinishdagi aniqmaslikdir. Uni ochish uchun $f(x) \cdot g(x)$ ning ko'rinishini o'zgartiramiz:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln|x| (0 \cdot \infty) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln|x|}{\frac{1}{x}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln|x|)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0.\end{aligned}$$

7. $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x}$ ni hisoblang.

Yechish: $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$ bo'lgani uchun $x \rightarrow \infty$ da $x e^{-x}$ ifoda $0 \cdot \infty$ ko'rinishdagi aniqmaslikdan iborat. $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ bo'lgani uchun

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} (0 \cdot \infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x)'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

8. $\lim_{x \rightarrow 0+0} x^x$ hisoblansin.

Yechish: x^x ifoda 0^0 ko'rinishidagi ko'rinishidagi aniqmaslikdir. Uni ochish uchun $x^x = e^{x \ln x}$ dan foydalanamiz. Demak,

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} x^x (0^0) = \lim_{x \rightarrow 0+0} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x}.$$

Buni hisoblash uchun dastlab $\lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x$ ni topamiz:

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x (0 \cdot \infty) = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = -\lim_{x \rightarrow 0+0} x = 0.$$

Demak, $\lim_{x \rightarrow 0+0} x^x = e^{\lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x} = e^0 = 1$.

9. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + mx)^{\frac{1}{x}}$ hisoblansin.

Yechish: $(1 + mx)^{\frac{1}{x}}$ ifoda 1^∞ ko'rinishdagi aniqmaslikdir. Uni ochish uchun $(1 + mx)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln(1+mx)}$ tenglikdan foydalanamiz.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + mx)^{\frac{1}{x}} (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln(1+mx)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+mx)}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1 + mx) (0 \cdot \infty) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + mx)}{x} \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{m}{1+mx}}{1} = m.$$

Bu qiymatni o'z o'rniga qo'yamiz va $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + mx)^{\frac{1}{x}} (0 \cdot \infty) = e^m$ ni hosil qilamiz.

10. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\cos x} - \operatorname{tg} x \right)$ hisoblansin.

Yechish: $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ da $\frac{1}{\cos x} - \operatorname{tg} x$ ifoda $\infty - \infty$ ko'rinishdagi aniqmaslikdir. Aniqmaslikni ochish uchun $\frac{1}{\cos x} - \operatorname{tg} x$ ifodani shakl almashtirish yordamida o'zgartiramiz.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\cos x} - \operatorname{tg} x \right) (\infty - \infty) &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos x} (1 - \cos x \cdot \operatorname{tg} x) (0 \cdot \infty) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin x)'}{(\cos x)'} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos x}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \operatorname{ctg} x = 0.\end{aligned}$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Quyidagi limitlar topilsin:

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 2x^2 + 2x - 1};$

2) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 8x^2 + 17x - 10}{x^4 - 5x^3 - 2x^2 + 11x - 5};$

3) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 5x^2 + 1}{x^4 - 3x^2 - 4};$

4) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^4 - 5x^2 + 4}{x^4 - 3x^2 - 4};$

5) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 - 8x + 12}{x^3 - x^2 + x + 6};$

6) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{a+x} - \sqrt{2a}}{\sqrt{a+2x} - \sqrt{3a}};$

7) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x^3 - a^3}}{\sqrt{x-a}};$

8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x};$

Javob: 1) 2; 2) $\frac{3}{29}$; 3) $\frac{3}{5}$; 4) $\frac{3}{5}$; 5) 0; 6) $\sqrt{\frac{3}{8}}$; 7) $a\sqrt{3}$; 8) $\ln \frac{1}{2}$

2. Quyidagi limitlar topilsin.

$$\begin{aligned} 1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{-1}}{\operatorname{ctg} x}; & \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\ln \operatorname{tg} x}{\ln \operatorname{tg} 2x}; \\ 3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{x}; & \quad 4) \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{\ln(1-\frac{x}{a})}{\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{a}}; \end{aligned}$$

Javob: 1) 1; 2) 1; 3) $+\infty$; 4) 0;

3. Quyidagi limitlar hisoblansin.

$$\begin{aligned} 1) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x^2-1} - \frac{1}{x-1} \right); & \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right); \\ 3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2x \operatorname{tg} x} \right); & \quad 4) \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \operatorname{tg} x - \frac{\pi}{2} \sec x \right). \end{aligned}$$

Javob: 1) $-\frac{1}{2}$; 2) 0; 3) $\frac{1}{6}$; 4) -1;

4. Quyidagi limitlar topilsin.

$$\begin{aligned} 1) \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{2} x; & \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0+0} x^n \ln x \quad (n > 0); \\ 3) \lim_{x \rightarrow 1-0} (1-x) \ln(1-x); & \quad 4) \lim_{x \rightarrow 1} \sec \frac{\pi}{2} x \cdot \ln \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

Javob: 1) $\frac{2}{\pi}$; 2) 0; 3) 0; 4) $\frac{2}{\pi}$.

5. Quyidagi limitlar hisoblansin.

$$\begin{aligned} 1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctg x \right)^{\frac{1}{x}}; & \quad 2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctg x \right)^x; \\ 3) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos ax)^{\frac{1}{x^2}}; & \quad 4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x}. \end{aligned}$$

Javob: 1) 1; 2) $e^{-\frac{2}{\pi}}$; 3) $\left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{a^2}{2}}$; 4) e^{-1} .

6§. Funksiyaning o'sishi va kamayishi. Funksiyaning ekstremumlari

Teorema. Differensiyallanuvchi $y = f(x)$ funksiya biror (a, b) oraliqda o'suvchi (kamayuvchi) bo'lsa, u holda bu oraliqda uning hosilasi $f'(x) \geq 0$ [$f'(x) \leq 0$] shartni qanoatlantiradi.

Teorema. Agar differensiyallanuvchi $y = f(x)$ funksiyaning hosilasi biror (a, b) oraliqda $f'(x) > 0$ [$f'(x) < 0$] shartni qanoatlantirsa,

unda bu oraliqda funksiya o'suvchi (kamayuvchi) bo'ladi.

Teoremaning birinchi qismi (a, b) oraliq $y = f(x)$ funksiyaning monotonlik oralig'i bo'lishining zaruriy, ikkinchi qismi esa yetarli shartini atalaydi.

Teorema. Berilgan $y = f(x)$ funksiya x_0 nuqta va uning biror atrofida aniqlangan bo'lib, bu atrofdagi ixtiyoriy x nuqta uchun $f(x_0) \geq f(x)$ [$f(x_0) \leq f(x)$] shartni qanoatlantirsa, u shu x_0 nuqtada maksimumga (minimumga) ega deb ataladi.

Funksiyaning maksimum va minimum qiymatlari uning ekstremumlari deyiladi.

Teorema. Ferma teoremasi. Agar $y = f(x)$ funksiya x_0 nuqtada differensiallanuvchi va ekstremumga ega bo'lsa, unda bu nuqtada funksiyaning hosilasi nolga aylanadi. Ya'ni, $f'(x_0) = 0$ bo'ladi.

Funksiya ekstremumga ega bo'lgan nuqtada uning hosilasi nolga teng yoki mavjud bo'lmaydi.

Teorema. Funksiya hosilasi nolga teng yoki mavjud bo'lmagan nuqtalar kritik yoki statsionar nuqtalar deyiladi.

Teorema. (Ekstremumning birinchi yetarli sharti). Agar $y = f(x)$ funksiya x_0 kritik nuqtaning biror atrofida differensiyallanuvchi bo'lib, bu kritik nuqtani chapdan o'ngga qarab bosib o'tishda $f'(x)$ hosila o'z ishorasini musbatdan (manfiyga) manfiydan (musbatga) o'zgartirsa, unda x_0 kritik nuqtada $f(x)$ funksiya maksimumiga (minimumiga) ega bo'ladi.

Teorema. Agar $y = f(x)$ funksiyaning hosilasi x_0 kritik nuqtaning chap va o'ng atrofida ishorasini o'zgartirmasa, unda bu nuqtada funksiya ekstremumga ega bo'lmaydi.

Teorema. (Ekstremumning ikkinchi yetarli sharti). Agar x_0 kritik nuqtada $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$ va chekli bo'lsa, unda bu nuqtada $y = f(x)$ funksiya ekstremumga ega bo'ladi. Jumladan, $f''(x_0) < 0$ [$f''(x_0) > 0$] bo'lsa, $f(x_0)$ funksiyaning maksimumi (minimumi) bo'ladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $f(x) = x^3 - 12x + 11$ funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlari topilsin.

Yechish: Funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan. Uning hosilasini topamiz. $f'(x) = (x^3 - 12x + 11)' = 3x^2 - 12$. Funksiyaning o'sish oraliqlarini topish uchun $3x^2 - 12 > 0$ tengsizlikni yechamiz.

$$3x^2 - 12 > 0, \quad x^2 - 4 > 0, \quad x^2 > 4. \text{ Bundan } x < -2 \text{ va } x > 2.$$

Demak, berilgan funksiya $(-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$ da o'suvchi. Funksiyaning kamayish oraliq'ini topish uchun $3x^2 - 12 < 0$ yoki $x^2 - 4 < 0$ tengsizlikni yechamiz. Undan $x^2 < 4$ yoki $-2 < x < 2$. Demak, funksiya $(-2; 2)$ oraliqda kamayuvchi.

2. $y = \ln(1 - x^2)$ funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlari topilsin.

Yechish: Berilgan funksiyaning hosilasini topamiz.

$$y' = [\ln(1 - x^2)]' = \frac{1}{1-x^2} (-2x) = -\frac{2x}{1-x^2} = \frac{2x}{x^2-1}.$$

$y' = \frac{2x}{x^2-1}$ hosila $(-1; 0)$ va $(1; +\infty)$ da musbat, $(0; 1)$ va $(-\infty; -1)$ da manfiy. Berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi $(-1; 1)$ oraliqdan iborat ekanligini etiborga olib, funksiyaning $(-1; 0)$ oraliqda o'suvchi va $(0; 1)$ oraliqda kamayuvchi ekanligini aniqlaymiz.

$$3. f(x) = \begin{cases} \frac{1}{e}, & \text{agar } x < e \text{ bo'lsa,} \\ \frac{\ln x}{x}, & \text{agar } x \geq e \text{ bo'lsa} \end{cases}$$

funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlari topilsin.

Yechish: Funksiya $(-\infty; +\infty)$ da differensiallanuvchi va

$$f'(x) = \begin{cases} 0, & \text{agar } x < e \text{ bo'lsa,} \\ \frac{1 - \ln x}{x^2}, & \text{agar } x \geq e \text{ bo'lsa.} \end{cases}$$

x ning barcha qiymatlarida $f'(x) \leq 0$. Demak, berilgan funksiya doimo o'smovchi funksiya ekan. $(-\infty; e)$ oraliqda o'zgarmas va $(e; +\infty)$ oraliqda qat'iy kamayuvchi.

4. $f(x) = 2 - x^4$ funksiya x ning qanday qiymatida maksimumga erishadi.

Yechish: Bu yerda $f(0) = 2$ va $x \neq 0$ qiymatlar uchun $f(x) - f(0) = (2 - x^4) - 2 = 2 - x^4 - 2 = -x^4 < 0$.

Demak, $x = 0$ nuqtaning ixtiyoriy atrofida $f(0) > f(x)$ tengsizlik bajariladi. Shuning uchun funksiya $x = 0$ nuqtada $f(0) = 2$ maksimumga erishadi.

5. $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - x^2 - 4x + 1$ funksiyaning ekstremumlari topilsin:

Yechish: 1) Hosilani topamiz: $f'(x) = 2x^2 - 2x - 4$;

2) Hosilani nolga tenglab, tenglamaning ildizlarini topamiz:

$$2x^2 - 2x - 4 = 0, \quad x^2 - x - 2 = 0, \quad x_1 = -1; \quad x_2 = 2.$$

Demak, kritik nuqtalar: $x_1 = -1, x_2 = 2$;

3) Hosila mavjud bo'lmagan nuqtalar yo'q. Berilgan funksiyaning hosilasi barcha joyda aniqlangan va uzluksiz;

4) Hosila o'qini kritik nuqtalar bilan $(-\infty; -1)$, $(-1; 2)$ va $(2; +\infty)$ oraliqlariga ajratamiz;

5) Endi -1 nuqtadan chapdagi, ya'ni $(-\infty; -1)$ oraliqdagi nuqtani, masalan, $x = -2$ nuqtani olamiz. Bu nuqtada $f'(-2) = 8 > 0$. Demak, $x = -1$ nuqtaning chap tomonida hosila musbat; endi $x = -1$ ning o'ng tomonida yotuvchi, ya'ni $(-1; 2)$ oraliqda yotuvchi nuqtani, masalan, $x = 0$ nuqtani olamiz. Bu nuqtada $f'(0) = -4 < 0$. Demak, $(-1; 2)$ oraliqda hosila manfiy.

Shunday qilib, hosila $x = -1$ kritik nuqtaning chap tomonida musbat, o'ng tomonida esa, ya'ni $(-1; 2)$ oraliqda manfiy. Shuning uchun ham $x = -1$ nuqtada funksiya maksimumga ega bo'lib, u $f_{\max}(-1) = 3\frac{1}{3}$ ga teng.

Endi $x = 2$ kritik nuqtaga o'tamiz.

6) $x = 2$ nuqtaning chap tomonidagi $(-1; 2)$ oraliqda manfiy bo'lishini ko'rdik. $x = 2$ nuqtaning o'ng tomonidagi nuqtani, ya'ni $(2; +\infty)$ oraliqdagi nuqtani, masalan, $x = 3$ nuqtani olamiz. $f'(3) = 8 > 0$. Demak, $x = 2$ nuqtada funksiya minimumga ega bo'lib, u $f_{\min}(2) = -5\frac{2}{3}$ ga teng.

6. $f(x) = 3\sqrt[3]{x^2}$ funksiyaning ekstremumlari aniqlansin.

Yechish: 1) Funksiyaning hosilasini topamiz:

$$f'(x) = (3\sqrt[3]{x^2})' = 3 \cdot (x^{\frac{2}{3}})' = 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{2}{3}-1} = 2x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{\sqrt[3]{x}};$$

2) Bu hosila x ning hech bir haqiqiy qiymatida nolga teng bo'lmaydi.
 3) Hosila $x = 0$ nuqtada mavjud emas. Shu bilan birga, $x = 0$ nuqtada berilgan funksiya uzluksiz bo'lib, bu nuqta funksiya aniqlanish sohasining ichki nuqtasi bo'ladi. Shuning uchun $x = 0$ nuqtada funktsiya ekstremumga ega bo'lishi mumkin.

4) Koordinatalar (sonlar) to'g'ri chizig'ini $x = 0$ nuqta yordamida ikki ($-\infty; 0$) va $(0; +\infty)$ oraliqlarga ajratamiz.

5) 0 nuqtadan chapdagi, ya'ni $(-\infty; 0)$ oraliqdagi nuqtani, masalan, $x = -1$ nuqtani olamiz. Bu nuqtada

$$f'(-1) = \frac{2}{\sqrt[3]{-1}} = -2 < 0.$$

Demak, 0 nuqtaning chap tomonida hosila manfiy bo'ladi. 0 nuqtaning o'ng tomonida yotuvchi, ya'ni $(0; +\infty)$ oraliqda yotuvchi, masalan, $x = 1$ nuqtani olamiz. Bu nuqtada

$$f'(1) = \frac{2}{\sqrt[3]{1}} = 2 > 0.$$

Demak, hosila 0 nuqtadan o'tishda o'z ishorasini manfiydan musbatga o'zgartiradi. Bundan berilgan funksiyaning $x = 0$ nuqtada minimumga ega ekanligi kelib chiqadi va u

$$f_{\min}(0) = 0$$

dan iborat bo'ladi.

8. $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x - 14$ funksiyaning ekstremumlari topilsin

Yechish: $f'(x) = 6x^2 - 30x + 36 = 6(x-2)(x-3)$ bo'lib undan $x_1 = 2$ va $x_2 = 3$ kritik nuqtalarni topamiz. $x_1 = 2$ nuqtadan o'tishda hosila ishorasini musbatdan manfiyga almashtiradi. Demak, bu nuqtada funksiya maksimumga ega. $x_2 = 3$ nuqtadan o'tishda esa funksiyaning hosilasi o'z ishorasini manfiydan musbatga almashtiradi. Demak, bu nuqtada funksiya minimumga ega bo'ladi. $x_1 = 2$ va $x_2 = 3$ nuqtalardagi funksiyaning qiymatlarini hisoblab ekstremumlarini topamiz. Ular:

$$f_{\max}(2) = 2 \cdot 2^3 - 15 \cdot 2^2 + 36 \cdot 2 - 14 = 14;$$

$$f_{\min}(3) = 2 \cdot 3^3 - 15 \cdot 3^2 + 36 \cdot 3 - 14 = 13.$$

Bundan berilgan funksiyaning ekstremumlarini ikkinchi tartibli hosila yordamida topamiz. Buning uchun $f''(x)$ ni topamiz va uni $x_1 = 2$ va $x_2 = 3$ nuqtalardagi qiymatlarini hisoblaymiz.

$$f''(x) = (6x^2 - 30x + 36)' = 12x - 30,$$

$$f''(2) = 12 \cdot 2 - 30 = -6 < 0 \quad \text{va} \quad f''(3) = 12 \cdot 3 - 30 = 6 > 0.$$

Demak, funksiya $x_1 = 2$ nuqtada maksimumga va $x_2 = 3$ nuqtada minimumga ega ekan. Ularni biz yuqorida topganmiz.

9. $x = \frac{t^3}{t^2+1}$, $y = \frac{t^3-2t^2}{t^2+1}$ parametrik tenglamalar bilan berilgan

$y = f(x)$ funksiyaning ekstremumga tekshirilsin:

Yechish: $x(t)$ va $y(t)$ funksiyalar t parametrlarining har qanday qiymatlarida differensiallanuvchi, hamda

$$x' = \left(\frac{t^3}{t^2+1} \right)' = \frac{(t^3)'(t^2+1) - (t^2+1)' \cdot t^3}{(t^2+1)^2} = \frac{3t^2(t^2+1) - 2t \cdot t^3}{(t^2+1)^2} = \frac{3t^4+3t^2-2t^4}{(t^2+1)^2} =$$

$\frac{t^4+3t^2}{(t^2+1)^2}$ bo'lib, u $t \neq 0$ da doimo musbat. Shuning uchun $t \neq 0$ bo'lganda y_x' ni

$y'_t = \frac{y'_t}{x'_t}$ formula yordamida topish mumkin.

$$y'_t = \left(\frac{t^3-2t^2}{t^2+1} \right)' = \frac{(t^3-2t^2)'(t^2+1) - (t^2+1)'(t^3-2t^2)}{(t^2+1)^2} = \frac{(3t^2-4t)(t^2+1) - 2t(t^3-2t^2)}{(t^2+1)^2} = \frac{3t^4+3t^2-4t^3-4t-2t^4+4t^3}{(t^2+1)^2} = \frac{t^4+3t^2-4t}{(t^2+1)^2} =$$

$$\frac{t(t^3+3t-4)}{(t^2+1)^2} = \frac{t(t-1)(t^2+t+4)}{(t^2+1)^2}.$$

Demak, $y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{t(t-1)(t^2+t+4)}{t(t^2+1)}$, $t \neq 0$.

$t^2 + t + 4$ ifoda doimo musbat bo'lgani uchun y'_x hosila faqat $t = 1$ bo'lgandagina nolga teng bo'ladi. Demak, berilgan funksiya $t = 1$ bo'lganda $x_1 = \frac{1}{2}$ va $t = 0$ bo'lganda $x_2 = 0$ bo'lgan ikkita kritik nuqtaga ega.

Agar x argument $x = 0$ nuqtaning chap tomonida bo'lsa, t parameter ham $t = 0$ nuqtaning chap tomonida bo'ladi va bu holda $y'_x > 0$ bo'ladi hamda $x = 0$ nuqtaning o'ng atrofida $y'_x < 0$ bo'ladi. Shuning uchun ham funksiya $x = 0$ nuqtada minimumga ega bo'ladi.

Yuqoridagidek mulohaza yuritib, x ning $x = 1$ ga mos keluvchi x qiymatidan o'tishda y'_x hosila ishorasini manfiydan musbatga almashtirishini ko'rish mumkin. Demak, $x = \frac{1}{2}$ nuqtada funktsiya $f(\frac{1}{2}) = y(1) = -\frac{1}{2}$ qiymatga ega.

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Quyidagi funksiyalarning monotonlik oraliqlari topilsin:

- 1) $y = x^4 - x^2$;
- 2) $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x - 5$
- 3) $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x - 7$;
- 4) $y = 5x^2 - 3x + 1$;
- 5) $y = \frac{3}{2-x}$;
- 6) $y = x^2(x - 3)$;
- 7) $y = \ln|x|$;
- 8) $f(x) = 4x^3 - 21x^2 + 18x + 20$;
- 9) $f(x) = e^x + 5x$;
- 10) $f(x) = 2x^2 - \ln x$.

Javob: 1) $(-\infty; -1)$ va $(-1; 0)$ da kamayadi;
 $(0; 1)$ va $(1; +\infty)$ da o'sadi;

- 2) $(-\infty; -1)$ va $(2; +\infty)$ da o'sadi; $(-1; 2)$ da kamayadi;
- 3) $(-\infty; -1)$ va $(-2; +\infty)$ da o'sadi; $(-1; 2)$ da kamayadi;
- 4) $(-\infty; \frac{3}{10})$ da kamayadi; $(\frac{3}{10}; +\infty)$ da o'sadi;
- 5) $(-\infty; 2)$ va $(2; +\infty)$ da o'sadi;
- 6) $(-\infty; 0)$ va $(2; +\infty)$ da o'sadi; $(0; 2)$ da kamayadi;
- 7) $(-\infty; 0)$ da kamayadi va $(0; +\infty)$ da o'sadi;
- 8) $(-\infty; \frac{1}{2})$ va $(3; +\infty)$ da o'sadi; $(\frac{1}{2}; 3)$ da kamayadi;
- 9) $(-\infty; +\infty)$ da o'sadi;
- 10) $(0; \frac{1}{2})$ da kamayadi; $(\frac{1}{2}; +\infty)$ da o'sadi.

2. Quyidagi funksiyalarning ekstremumlari topilsin:

- 1) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 - 24x$;
- 2) $f(x) = x^4 - 2x^2$;
- 3) $f(x) = 4x^2 + \frac{1}{x}$;
- 4) $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$;
- 5) $f(x) = \frac{x^2}{x^2+3}$;
- 6) $f(x) = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$;
- 7) $y = \frac{1+\ln x}{x}$;
- 8) $y = x\sqrt{1-x}$.

Javob: 1) $f_{\max}(-1) = 13$; $f_{\min}(4) = -56$. 2) $f_{\min}(-1) = -1$;

$f_{\max}(0) = 0$. 3) $f_{\min}(\frac{1}{2}) = 3$. 4) $f_{\min}(0) = 0$; 5) $f_{\min}(0) = 0$. 6)

$f_{\min}(0) = -2$; $f_{\max}(2) = 2$; 7) $y_{\max}(1) = 1$. 8) $y_{\max}(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

3. Quyidagi funksiyalarning ekstremumlari ikkinchi tartibli hosila yordamida topilsin:

- 1) $y = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2$;
- 2) $f(x) = x^4 e^{-x^2}$;
- 3) $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 18x^2 + 60$;
- 4) $y = 2 \sin x + \cos 2x$.

Javob: 1) $y_{\min}(0) = 0$; 2) $f_{\max}(\pm\sqrt{2}) = \frac{4}{e^2}$;

3) $f_{\min}(-3) = -75$; $f_{\max}(0) = 60$. $f_{\min}(1) = 53$;

4) $f_{\max}(\frac{\pi}{6}) = \frac{3}{2}$; $y_{\min}(\frac{\pi}{2}) = 1$; $y_{\max}(\frac{5\pi}{6}) = \frac{3}{2}$; $y_{\min}(\frac{3\pi}{2}) = -3$.

4. Parametrik shaklda berilgan

$$\begin{cases} x = \varphi(t) = t^5 - 5t^3 + 20t + 7 \\ y = \psi(t) = 4t^3 - 3t^2 - 18t + 3 \end{cases} \quad (-2 < t < 2)$$

$y = f(x)$ funksiyani ekstremumlari topilsin.

Javob: $y_{\max}(-\frac{1033}{32}) = -17,25$.

§7. Funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlari

$y = f(x)$ funksiya biror $[a; b]$ kesmada aniqlangan va uzluksiz bo'lsin. Unda, Veyershtass teoremasiga asosan, funksiya bu kesmadagi qandaydir x_1 va x_2 nuqtalarda o'zining eng katta $f(x_1) = M$ va eng kichik $f(x_2) = m$ qiymatlarini qabul qiladi.

Veyershtass teoremasida kesmada uzluksiz funksiyalar uchun eng katta va eng kichik qiymatlar mavjudligi tasdiqlanadi, ammo ularni qanday topish masalasi qaralmaydi. Agar $y = f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesma ichida differensiallanuvchi bo'lsa, bu masala quyidagi algoritim (ketma-ketlik) asosida amalga oshiriladi.

1. Berilgan funksiyaning $f'(x)$ hosilasi topiladi.

2. $f'(x) = 0$ tenglamani yechib $x_1, x_2, \dots, x_n$ kritik nuqtalar topiladi va ulardan $[a; b]$ kesmaga tegishli bo'lganlari ajratiladi.

3. Berilgan funksiyaning $[a; b]$ kesmaga tegishli kritik nuqtalarning kesmaning chetlaridagi $f(a)$, $f(b)$ qiymatlari topiladi.

4. Yuqorida hisoblangan funksiya qiymatlari orasidan eng katta va eng kichigi ajratiladi. Ular biz izlayotgan m va M qiymatlar bo'ladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada monoton o'suvchi bo'lsa, u holda $f(a) = m$ va $f(b) = M$ bo'ladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada monoton kamayuvchi bo'lsa, u holda $f(a) = M$ va $f(b) = m$ bo'ladi.

Agar $f(x)$ funksiya biror (chekli yoki cheksiz) oraliqda uzluksiz va bitta ekstremumga ega bo'lib u maksimum (minimum) bo'lsa, u holda $f(x)$ funksiyaning berilgan oraliqdagi eng katta (eng kichik) qiymati bo'ladi.

Juda ko'plab geometrik, fizik va texnik masalalarni Yechish qandaydir funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini topishga olib keladi. Amaliyotda bunday masalalarning ko'pligi va ularning muhimligi matematik analizning rivojlanishi uchun muhim turtki bo'lgan.

Bunday masalalarni Yechishda ko'pincha masala shartiga asosan erkin o'zgaruvchini tanlash va tekshirilishi kerak bo'lgan miqdorni u orqali ifodalash (funksiyaning tuzish) keyin esa hosil qilingan funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatini topish kerak bo'ladi. Bunda erkin o'zgaruvchining o'zgarish oralig'i (chekli yoki cheksiz) ham masala shartidan aniqlanadi.

Ba'zi bir masalalarda tekshirilishi kerak bo'lgan funksiya tayyor holda berilishi ham mumkin.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ funksiyaning $[-3; 2]$ kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari topilsin.

Yechish: 1) Berilgan funksiyaning hosilasini topamiz:

$$f'(x) = (x^4 - 2x^2 + 3)' = 4x^3 - 4x;$$

2) $f'(x) = 0$ tenglamani yechib kritik nuqtalarni topamiz: $4x^3 - 4x = 0$, $x(x^2 - 1) = 0$, $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$;

3) Kritik nuqtalarning har uchasi $[-3; 2]$ kesmaga tegishli. Berilgan funksiyaning kritik nuqtalardagi va kesmaning chetlaridagi qiymatlarini topamiz.

$$f(-3) = (-3)^4 - 2 \cdot (-3)^2 + 3 = 81 - 18 + 3 = 66, \quad f(-1) = f(1) = 1^4 - 2 \cdot 1^2 + 3 = 2, \quad f(0) = 0 - 0 + 3 = 3, \quad f(2) = 2^4 - 2 \cdot 2^2 + 3 = 11.$$

Bu qiymatlarni taqqoslab $f(-3) = 66$ eng katta qiymat $f(\pm 1) = 2$ eng kichik qiymat ekanligini aniqlaymiz.

2. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ funksiyaning $[1; 3]$ kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari topilsin.

Yechish: 1) Berilgan funksiyaning hosilasini topamiz:

$$f'(x) = (x^3 - 3x^2 + 1)' = 3x^2 - 6x;$$

2) Kritik nuqtalarni topamiz: $3x^2 - 6x = 0$, $x(x - 2) = 0$, $x_1 = 0$, va $x_2 = 2$;

Demak, kritik nuqta ikkita bo'lib, ulardan biri, ya'ni $x_1 = 0$ nuqta berilgan kesmaning ichki nuqtasi bo'lmaydi. Shuning uchun $x_2 = 2$ kritik nuqtanigina olamiz. Shunday qilib, biz $f(1)$, $f(2)$ va $f(3)$ larni topamiz.

$$f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1^2 + 1 = -1; \quad f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 1 = -3;$$

$$f(3) = 3^3 - 3 \cdot 3^2 + 1 = 1.$$

Demak, $f(3) = 1$ eng katta qiymat va $f(2) = -3$ eng kichik qiymat bo'ladi.

3. $y = x^2 \ln x$ funksiyaning $[1; e]$ kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari topilsin.

Yechish: 1) Berilgan funksiyaning hosilasini topamiz:

$$y' = (x^2 \ln x)' = 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x = x(1 + 2 \ln x);$$

2) $y' = 0$ tenglamani yechib kritik nuqtalarni topamiz:

$$x(1 + 2 \ln x) = 0, \quad x_1 = 0, \quad 1 + 2 \ln x = 0, \quad \ln x = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = e^{-\frac{1}{2}}.$$

Demak, $x_1 = 0$ va $x_2 = e^{-\frac{1}{2}}$ kritik nuqtalar bo'lib, ularning har ikkalasi $[1; e]$ kesmaga tegishli emas. Bundan tashqari, $x_1 = 0$ nuqta funksiyaning aniqlanish sohasiga kirmaydi;

3) Funksiyaning kesma chegaralaridagi qiymatlarini hisoblaymiz.
 $y(1) = 1^2 \ln 1 = 0$; $y(e) = e^2 \ln e = e^2$.

Demak, $y(1) = 0$ funksiyaning $[1; e]$ kesmadagi eng kichik qiymati va $y(e) = e^2$ funksiyaning eng katta qiymati ekan.

4. $y = \arctg x^2$ funksiyaning eng katta va eng kichik qiymati topilsin.

Yechish: Bu yerda x argumentning o'zgarishi biror kesma bilan chegaralanmagan va funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan. Shuning uchun biz funksiyaning qiymatlarini x ning $(-\infty; +\infty)$ dagi qiymatlarida qaraymiz.

1) y' hosilani topamiz: $y' = (\arctg x^2)' = \frac{2x}{1+x^4}$;

2) Kritik nuqtalarni topamiz:

$$\frac{2x}{1+x^4} = 0, x = 0.$$

Demak, $x = 0$ nuqta kritik nuqta. Boshqa kritik nuqtalar mavjud emas. Chunki y' hosila x ning har qanday qiymatlarida mavjud.

3) $x = 0$ nuqtaning atrofida hosilani ishorasini tekshiramiz.

$$x < 0 \text{ da } y' = \frac{2x}{1+x^4} < 0 \text{ va } x > 0 \text{ da } y' = \frac{2x}{1+x^4} > 0$$

bo'lishi ma'lum. Demak, berilgan funksiya $x = 0$ nuqtada minimumga ega va bu minimum funksiyaning eng kichik qiymati bo'ladi. U quyidagiga teng. $y(0) = \arctg 0^2 = \arctg 0 = 0$.

5. Perimetri $2p$ bo'lgan to'g'ri to'rtburchaklar ichidan yuzi eng katta bo'lganini toping.

Yechish: Biz tekshiradigan funksiya to'g'ri to'rtburchakning yuzidan iborat bo'ladi. Bu funksiya $S = xy$ ko'rinishda bo'ladi. Masalaning shartiga asosan $2x + 2y = 2p$ yoki $x + y = p$. Bundan y ni x orqali ifodasini aniqlaymiz va uni S ga qo'yamiz: $y = p - x$ bo'lganligi uchun $S = x \cdot (p - x)$ yoki $S(x) = px - x^2$ bo'ladi. Bu yerda $0 \leq x \leq p$ bo'lishi ravshan. Shunday qilib, berilgan masala

$$S(x) = px - x^2$$

funksiyaning $[0; p]$ kesmadagi eng katta qiymatini topishga keltirildi. Uni aniqlaymiz:

1) Funksiya hosilasini aniqlaymiz: $S'(x) = p - 2x$.

2) Kritik nuqtalarni topamiz: $p - 2x = 0, x = \frac{p}{2}$.

3) $x = \frac{p}{2}$ kritik nuqtadagi funksiyaning qiymatini topamiz:

$$S\left(\frac{p}{2}\right) = p \cdot \frac{p}{2} - \left(\frac{p}{2}\right)^2 = \frac{p^2}{2} - \frac{p^2}{4} = \frac{p^2}{4}.$$

4) $[0; p]$ kesmaning chegaralarida funksiyaning qiymatlarini topamiz:

$$S(0) = 0, S(p) = 0.$$

Demak, funksiyaning $[0; p]$ kesmadagi eng katta qiymati

$$S\left(\frac{p}{2}\right) = \frac{p^2}{4} \text{ bo'ladi.}$$

Endi y ni topamiz: $y = p - x = p - \frac{p}{2} = \frac{p}{2}$, Demak, $x = y$.

Shunday qilib, izlanayotgan to'g'ri to'rtburchak tomoni $\frac{p}{2}$ dan iborat

bo'lgan kvadrat bo'ladi.

6. a musbat sonni ikkita qo'shiluvchiga shunday ajratingki, bu qo'shiluvchilarning ko'paytmasi eng katta bo'lsin.

Yechish: Qo'shiluvchilardan biri x bo'lsin: u holda ikkinchi qo'shiluvchi $a - x$ bo'ladi. Bu qo'shiluvchilarning ko'paytmasi o'zgaruvchi miqdor bo'ladi. Agar biz uni y bilan belgilasak, u $(a - x)x$ ga teng bo'ladi. Bu yerda $0 \leq x \leq a$ ekani ravshan.

Shunday qilib, berilgan masala $y = ax - x^2$ funksiyaning $[0; a]$ kesmadagi eng katta qiymatini topishga keltirildi. Uni topamiz:

1) Funksiyaning hosilasini topamiz:

$$y' = (ax - x^2)' = a - 2x;$$

2) Kritik nuqtalarni topamiz:

$$a - 2x = 0, x = \frac{a}{2};$$

3) $x = \frac{a}{2}$ kritik nuqtadagi funksiyaning qiymatini topamiz:

$$y\left(\frac{a}{2}\right) = a \cdot \frac{a}{2} - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{4} = \frac{a^2}{4};$$

4) $[0; a]$ kesmaning chegaralarida funksiyaning qiymatlarini topamiz:

$$y(0) = 0, y(a) = a \cdot a - a^2 = a^2 - a^2 = 0.$$

Demak, funksiyaning $[0; a]$ kesmadagi eng katta qiymati $y\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{a^2}{4}$

bo'ladi.

Birinchi qo'shiluvchi $x = \frac{a}{2}$ bo'lib, ikkinchi qo'shiluvchi ham $a - x = a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2}$ bo'lsa, qo'shiluvchilarning ko'paytmasi eng katta bo'lar ekan.

7. Jism $S(t) = -t^3 + 9t^2 + 24t$ qonun bo'yicha to'g'ri chiziqli harakat qiladi, bunda $S(t)$ -yo'l (metr hisobida) va t vaqt (sekund hisobida). Vaqtning qanday paytida jism harakatining tezligi eng katta bo'ladi va tezlikning miqdori qancha bo'ladi?

Yechish: Jism harakatining tezligi yo'ldan vaqt bo'yicha olingan hosilaga teng: Ya'ni,

$$V(t) = S'(t) = (-t^3 + 9t^2 + 24t)' = -3t^2 + 18t + 24.$$

Shunday qilib, berilgan masalani Yechish $V(t) = -3t^2 + 18t + 24$ funksiyani ekstremumini topish masalasiga keltiriladi.

1) Funksiyaning hosilasini olamiz: $V'(t) = -6t + 18$;

2) Kritik nuqtalarini topamiz: $-6t + 18 = 0$, $t = 3$.

Demak, funksiya birgina kritik nuqtada ega.

3) $t = 3$ ning chap va o'ng tomonidagi hosila ishorasini aniqlaymiz: $t < 3$ bo'lganda $V'(3) > 0$ va $t > 3$ bo'lganda $V'(3) < 0$.

Shunday qilib, hosila $t = 3$ nuqtadan o'tishda o'z ishorasini musbatdan manfiyga o'zgartirdi. Shuning uchun $t = 3$ s. bo'lganda jismning tezligi eng katta bo'ladi va uning miqdori

$$V(t) = -3 \cdot 3^2 + 18 \cdot 3 + 24 = 51 \frac{m}{s} \text{ bo'ladi.}$$

8. Tubi kvadrat shaklida va hajmi $32m^3$ bo'lgan usti ochiq cho'milish havzasining devorlari hamda tubini qoplash uchun sarflanadigan material eng kam bo'lishi uchun cho'milish havzasining o'lchamlari qanday bo'lishi kerak?

Yechish: Asosi tomonini x bilan, chuqurligini y bilan belgilaymiz. U holda cho'milish havzasining hajmi

$$V = x^2y$$

bo'ladi. Suv havzasining material bilan qoplanadigan yuzasi

$$S = x^2 + 4xy$$

bo'ladi. $V = x^2y$ dagi y ni x orqali ifodalaymiz va uni S ga qo'yamiz. Natijada

$$y = x^2 + 4x \frac{v}{x^2} = x^2 + \frac{4v}{x} = x^2 + \frac{128}{x}$$

aniqlaymiz. Hosil bo'lgan bu funksiyani $(0; +\infty)$ da ekstremumga erishamiz.

$$y' = (x^2 + \frac{128}{x})' = 2x - \frac{128}{x^2}; 2x - \frac{128}{x^2} = 0; x - \frac{64}{x^2} = 0; x = 4.$$

$x = 4$ nuqtaning chap va o'ng tomonlarida $S'(x)$ ning ishorasini aniqlaymiz.

$$S'(x)|_{x < 4} < 0 \text{ va } S'(x)|_{x > 4} > 0$$

Demak, funksiya $x = 4$ nuqtada minimumga ega va bu minimum funksiyani eng kichik qiymati bo'ladi. Suv havzasining chuqurligi

$$y = \frac{v}{x^2} = \frac{32}{16} = 2.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1) Quyidagi funksiyalarni ko'rsatilgan kesmalardagi eng katta va eng kichik qiymatlari topilsin.

1) $y = -3x^4 + 6x^2 - 1$, $[-2; 2]$;

2) $y = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 4$, $[-1; 5]$;

3) $y = \frac{x-1}{x+1}$, $[0; 4]$;

4) $y = \sin 2x - x$, $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$;

5) $y = x^3 - 9x^2 + 24x - 10$, $[0; 3]$;

6) $y = 2\sin x + \cos 2x$, $[0; \frac{\pi}{2}]$;

7) $y = \sin x \cdot \sin 2x$, $(-\infty; +\infty)$;

8) $y = \sqrt{4 - x^2}$, $[-2; 2]$;

Javob: 1) $x = \pm 1$ da $y = 2$ eng katta qiymat, $x = \pm 2$ da $y = -25$ eng kichik qiymat;

2) $x = 5$ da $y = \frac{23}{3}$ eng katta qiymat, $x = -1$ da $y = -\frac{13}{3}$ eng kichik

qiymat;

3) $x = 4$ da $y = \frac{3}{5}$ eng katta qiymat, $x = 0$ da $y = -1$ eng kichik

qiymat;

4) $x = -\frac{\pi}{2}$ da $y = \frac{\pi}{2}$ eng katta qiymat, $x = \frac{\pi}{2}$ da $y = -\frac{\pi}{2}$ eng kichik qiymat;

5) $x = 2$ da $y = 10$ eng katta qiymat, $x = 0$ da $y = -10$ eng kichik qiymat;

6) $x = \frac{\pi}{6}$ da $y = \frac{3}{2}$ eng katta qiymat, $x = 0$ va $x = \frac{\pi}{2}$ da $y = 1$ eng kichik qiymat;

7) $x = 0$ da $y = \frac{\pi}{2}$ eng katta qiymat, $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ da $y = \frac{\pi}{3}$ eng kichik qiymat;

8) $x = 0$ da $y = 2$ eng katta qiymat, $x = \pm 2$ da $y = 0$ eng kichik qiymat;

2. Uzunligi 120 metrlik panjara bilan bir tomondan uy bilan chegaralangan eng katta yuzaga ega to'g'ri to'rtburchak shaklidagi maydon o'rab olinishi kerak. To'g'ri to'rtburchakli maydon o'lchovlari aniqlansin.

Javob: 30 va 60

3. Asosi a va balandligi h bo'lgan uchburchakka eng katta yuzli to'g'ri to'rtburchak ichki chizilgan. To'g'ri to'rtburchakning yuzi aniqlansin.

Javob: $\frac{ah}{4}$.

4. Tunelning kesimi bir tomoni yarim doiradan iborat to'g'ri to'rtburchak shakliga ega. Kesim perimetri 18m. Yarim doira radiusi qanday bo'lsa, kesim yuzi eng katta bo'ladi?

Javob: $\frac{18}{\pi+4} \approx 2.5$

5. Ikkita yorug'lik manbalari bir-biridan 30m masofada joylashgan. Agar bu manbalarining yorug'lik kuchlari 27:8 nisbatda bo'lsa, ularni tutashtiruvchi to'g'ri chiziqda eng sust yoritilgan nuqta topilsin.

Javob: Kuchliroq yorug'lik manbaidan 18m uzoqlikda.

6. Shar hajmi unga ichki chizilgan eng katta silindr hajmidan necha marta katta bo'ladi?

Javob: $\sqrt{3} \approx 1.7$ marta.

7. Berilgan S yuzaga ega bo'lgan barcha to'g'ri to'rtburchaklar ichida eng katta perimetrga ega bo'lganini toping.

Javob: Kvadrat.

8. Berilgan V hajmga ega bo'lgan barcha silindrlar ichidan to'la sirti eng kichik bo'lganini toping.

Javob: $H = 2R$.

9. Jismning to'g'ri chiziqli harakat qonuni $S(t) = -t^3 + 3t^2 + 9t + 3$ tenglama bilan berilgan. Jism harakatining eng katta tezligi topilsin.

Javob: $12 \frac{m}{s}$.

10. Yuqoriga tik otilgan jismning harakat qonuni $s(t) = 19,6t - 4,9t^2$ tenglama bilan berilgan (S -metr bilan, t -sekund bilan). Vaqtning qanday paytida jism eng yuqori balandlikda bo'ladi va bu balandlik necha metr bo'ladi?

Javob: $S(2)=19,6m$.

11. $A(0;6)$ va $B(4;5)$ nuqtalar berilgan. OX o'qda shunday P nuqta topilsinki, $S = AP + PB$ masofa eng kichik bo'lsin.

Javob: $P(1,5;0)$.

12. Balkani uzunligi bo'yicha kesganda ko'rsatadigan qarshiligi ko'ndalang kesimi yuziga proporsional bo'ladi. Diametri D bo'lganda yumaloq yog'ochdan kesib olingan balkaning o'lchovlarini shunday aniqlangki, u eng katta qarshilikka ega bo'lsin.

Javob: Kesim-tomoni $\frac{D}{\sqrt{2}}$ bo'lgan kvadrat.

13. Tomoni a bo'lgan kvadrat shaklidagi tunukaning chetlaridan tomonining uzunligi bir xil bo'lgan kvadratchalar qirqib tashlandi va qolgan qismining chetlarini bukib, usti ochiq quti yasaldi. Qutining hajmi eng katta bo'lishi uchun qirqib tashlanadigan kvadratchaning tomoni qanday bo'lishi kerak?

Javob: $\frac{a}{6}$.


14. Trapetsiyaning kichik asosi va yon tomonlarining har biri 10 sm ga teng. Uning katta asosi shunday aniqlansinki, trapetsiya'ning yuzi eng katta bo'lsin.

Javob: 20 sm.


§8. Funksiya grafigining qavariqlik va botiqlik intervallari.
Burilish nuqta. Funksiya grafigining asimptotalari. Funksiyaning tekshirishning umumiy sxemasi

Ta'rif. Agar $y = f(x)$ funksiya (a, b) oraliqda differensiallanuvchi va uning grafigi bu oraliqdagi har bir $M(x; y(x))$ nuqtada o'tkazilgan urinmasidan pastda (yuqorida) joylashgan bo'lsa, u shu oraliqda qavariq (botiq) deyiladi (1-2-chizma).

Ta'rif. Agar $y = f(x)$ funksiya (a, b) oraliqning har bir nuqtasida ikki marta differensiallanuvchi va barcha $x \in (a, b)$ nuqtalarda $f''(x) > 0$ ($f''(x) < 0$) shart bajarilsa, u holda funksiya grafigi bu oraliqda botiq (qavariq) deyiladi.




1-chizma



2-chizma

Ta'rif. Funksiya grafigi biror $M(x_0, f(x_0))$ nuqtadan o'tayotganda botiqlikdan qavariqlikka yoki, aksincha qavariqlikdan botiqlikka o'zgarsa, u holda bu nuqta uning burilish(egilish) nuqtasi deyiladi.

Ta'rif. (Burilish nuqtasi mavjudligining zaruriy sharti): Agar $y = f(x)$ funksiya uchun $M_0(x_0, f(x_0))$ burilish nuqtasi va x_0 nuqta hamda uning biror atrofida $y = f(x)$ funksiya ikki marta differensiallanuvchi bo'lsa, unda $f''(x_0) = 0$ tenglik o'rinli bo'ladi.



3-chizma

Ta'rif. (Burilish nuqtasi mavjudligining yetarli sharti): Agar biror x_0 nuqtada $y = f(x)$ funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi $f''(x_0) = 0$ yoki mavjud bo'lmasa va bu nuqta biror atrofining chap va o'ng tomonida $f''(x)$ turli ishorali qiymatlarga ega bo'lsa, unda $M(x_0, f(x_0))$ nuqta funksiya grafigining burilish nuqtasi bo'ladi.

Egri chiziqning asimptotasi deb shunday to'g'ri chiziqqa aytiladiki, egri chiziqning nuqtasi, egri chiziq bo'yicha cheksiz uzoqlashganda, u to'g'ri chiziqqa cheksiz yaqinlashib boradi (3-chizma).

Asimptota vertikal, og'ma va gorizontal bo'lishi mumkin.

Ta'rif. Agar $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ limitlardan biri yoki ikkalasi cheksiz bo'lsa, u holda $x = a$ to'g'ri chiziq $f(x)$ funksiya grafigining vertikal asimptotasi deyiladi.

Ta'rif. Shunday k va b sonlari mavjud bo'lib, $x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$) da $f(x)$ funksiya $f(x) = kx + b + \alpha(x)$ ko'rinishda ifodalansa ($\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \alpha(x) = 0$), u holda $y = kx + b$ to'g'ri chiziq $y = f(x)$ funksiya grafigining og'ma asimptotasi deyiladi ($k=0$ bo'lsa, gorizontal asimptotasi deyiladi).

Ta'rif. $f(x)$ funksiya grafigi $y = kx + b$ og'ma asimptotaga ega bo'lishi uchun

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = b$$

munosabatlarning o'rinli bo'lishi zarur va yetarlidir.

Yuqorida ko'rib o'tilgan va olingan natijalar bo'yicha $y = f(x)$ funksiya xususiyatlarini quyidagi ketma-ketlikda aniqlash hamda ular asosida grafisini yasash mumkin:

1. Funksiyaning $D\{f\}$ aniqlanish soxasi topiladi.
2. Funksiyaning $E\{f\}$ qiymatlar soxasi topiladi.
3. Funksiyaning juft yoki toqlikka tekshiriladi.
4. Funksiya davriylikka tekshiriladi va u davriy bo'lsa, uning davri topiladi.
5. Funksiya uzluksizlikka tekshiriladi. Agar u uzilishga ega bo'lsa, uzilish turlari aniqlanadi.
6. $f(x) = 0$ tenglamadan funksiya nollari topiladi va ular orqali funksiya o'z ishorasini o'zgartirmaydigan oraliqlarni hamda funksiya grafisini Oy o'qi bilan kesishish nuqtalari topiladi.
7. Funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlari topiladi.
8. Funksiyaning ekstremumlari topiladi.
9. Funksiya grafining qavariqlik va botiqlik oraliqlari topiladi.
10. Funksiya grafining burilish nuqtalari topiladi.
11. Funksiya grafining asimptotalari topiladi (agar ular mavjud bo'lsa).
12. Argument $x \rightarrow \pm\infty$ da funksiya limiti aniqlanadi.
13. Oldingi qadamlarda olingan natijalar yordamida funksiya grafisi chiziladi.

Funksiyalarni tekshirishning bu ketma-ketligi qat'iy emas. Ba'zi bir funksiylarni tekshirishda ayrim qadamlar bajarilmasligi mumkin.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $f(x) = x^4 - 6x^2 - 6x + 1$ funksiyaning qavariqlik va botiqlik oraliqlarini toping.

Yechish: Funksiyaning birinchi va ikkinchi tartibli hosilalarini topamiz:

$$f'(x) = (x^4 - 6x^2 - 6x + 1)' = 4x^3 - 12x - 6,$$

$$f''(x) = (4x^3 - 12x - 6)' = 12x^2 - 12 = 12(x^2 - 1),$$

$$f'''(x) = 0 \text{ tenglamani yechib, } x_1 = -1 \text{ va } x_2 = 1 \text{ larni topamiz.}$$

Endi biz ikkinchi tartibli hosilaning ishorasini $(-\infty; -1)$, $(-1; 1)$ va $(1; +\infty)$ oraliqlarda tekshiramiz.

$$f''(x) \Big|_{x < -1} > 0, \quad f''(x) \Big|_{-1 < x < 1} < 0, \quad f''(x) \Big|_{x > 1} > 0$$

Demak, $(-1; 1)$ oraliqda berilgan funksiyaning grafisi qavariq, $(-\infty; -1)$ va $(1; +\infty)$ oraliqlarda esa botiq bo'ladi.

2. $f(x) = xe^{-x^2}$ funksiya grafining egilish nuqtasi bor yoki yo'qligini aniqlang.

Yechish: Funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasini topamiz va uni nolga tenglab yechamiz:

$$f'(x) = (xe^{-x^2})' = e^{-x^2} - 2x^2e^{-x^2};$$

$$f''(x) = (e^{-x^2} - 2x^2e^{-x^2})' = -2xe^{-x^2} - 4xe^{-x^2} + 4x^3e^{-x^2} =$$

$$= 4x^3e^{-x^2} - 6xe^{-x^2} = 2xe^{-x^2}(2x^2 - 3). \text{ Demak, } 2xe^{-x^2}(2x^2 - 3) =$$

$= 0$ bo'lib undan $x_1 = 0$ va $2x^2 - 3 = 0$. Bu tenglamadan $x_{2,3} = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$ ni topamiz. Demak, biz ikkinchi tartibli hosilaning ishorasini $(-\infty; -\sqrt{\frac{3}{2}})$,

$(-\sqrt{\frac{3}{2}}; 0)$, $(0; \sqrt{\frac{3}{2}})$ va $(\sqrt{\frac{3}{2}}; +\infty)$ oraliqlarda tekshiramiz. Tekshirish

natijasida $(-\infty; -\sqrt{\frac{3}{2}})$ va $(0; \sqrt{\frac{3}{2}})$ oraliqlarda $f''(x) < 0$, $(-\sqrt{\frac{3}{2}}; 0)$ va

$(\sqrt{\frac{3}{2}}; +\infty)$ oraliqlarda $f''(x) > 0$ ekanligini aniqlaymiz. Bundan esa

$x_1 = -\sqrt{\frac{3}{2}}$, $x_2 = 0$ va $x_3 = \sqrt{\frac{3}{2}}$ lar burilish nuqtalarining absissalari ekanligi kelib chiqadi. Bularni berilgan funksiylarga qo'yib, burilish nuqtalarining koordinatalarini topamiz. Ular,

$y_1 = -\sqrt{\frac{3}{2}}e^{-\frac{3}{2}}$, $y_2 = 0$ va $y_3 = \sqrt{\frac{3}{2}}e^{-\frac{3}{2}}$ dan iborat. Demak, burilish nuqtalar

$$A(-\sqrt{\frac{3}{2}}; -\sqrt{\frac{3}{2}}e^{-\frac{3}{2}}); \quad B(0; 0); \quad C(\sqrt{\frac{3}{2}}; \sqrt{\frac{3}{2}}e^{-\frac{3}{2}}).$$

3. $f(x) = \frac{2x^2+x-2}{x-1}$ funksiya grafigining og'ma asimptotalarini toping.

$$\text{Yechish: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x^2+x-2}{x-1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+x-2}{x(x-1)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+x-2}{x^2-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(2+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2})}{x^2(1-\frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}}{1-\frac{1}{x}} = 2. \text{ Demak, } k = 2.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2+x-2}{x-1} - 2x \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+x-2-2x^2+2x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(3-\frac{2}{x})}{x(1-\frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3-\frac{2}{x}}{1-\frac{1}{x}} = 3.$$

Demak, $b = 3$. Shunday qilib, og'ma asimptota tenglamasi $y = kx + b = 2x + 3$ dan iborat.

4. $y = \frac{x}{1+x^2}$ funksiya tekshiring va grafigini yasang.

Yechish: 1) Funksiyaning aniqlanish sohasi $(-\infty; +\infty)$ oraliqdan iborat. Bundan tashqari, $x < 0$ da $y < 0$ va $x > 0$ da $y > 0$ bo'lishini ta'kidlaymiz;

2) Funksiya $(-\infty; +\infty)$ oraliqda uzluksiz;

3) Funksiyaning qiymatlar sohasi $(-\infty; +\infty)$ dan iborat;

4) $x = 0$ da $y = 0$;

5) Funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlarini topamiz. Buning uchun $y' > 0$ va $y' < 0$ tengsizliklarni yechamiz:

$$y' = \left(\frac{x}{1+x^2} \right)' = \frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}; \quad \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} > 0, \quad 1-x^2 > 0, \quad x^2 < 1,$$

$|x| < 1, \quad -1 < x < 1$. Demak, funksiya $(-1; 1)$ oraliqda o'suvchi.

$$\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} < 0, \quad 1-x^2 < 0, \quad x^2 > 1, \quad x < -1, \quad x > 1.$$

Demak, funksiya $(-\infty; -1)$ va $(1; +\infty)$ da kamayuvchi.

6) Funksiyaning ekstremumlarini topamiz. Buning uchun $y' = 0$ tenglamani yechamiz.

$$\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = 0, \quad 1-x^2 = 0, \quad x^2 = 1, \quad x_1 = -1, \quad x_2 = 1.$$

Demak, $x_1 = -1$ va $x_2 = 1$ nuqtalar kritik nuqtalardir.

U kritik nuqtalar yordamida $(-\infty; -1)$, $(-1; 1)$ va $(1; +\infty)$ oraliqlarini hosil qilamiz.

U oraliqlarning har birida hosilaning ishorasini tekshiramiz.

$(-\infty; -1)$ da $y' < 0$; $(-1; 1)$ da $y' > 0$ va $(1; +\infty)$ da $y' < 0$.

Shunday qilib, $x_1 = -1$ nuqtada funksiya minimumga ega va $x_2 = 1$ nuqtada funksiya maksimumga ega. Ularni topamiz.

$$y_{\min}(-1) = -0.5; \quad y_{\max}(1) = 0.5;$$

7) Egri chiziqning qavariqlik va botiqlik intervallarini va burilish nuqtalarini topamiz. Buning uchun $y'' = 0$ tenglamani yechamiz.

$$y'' = \left(\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} \right)' = \frac{-2x(1+x^2)^2 - 4x(1+x^2)(1-x^2)}{(1+x^2)^4} = \frac{-2x(1+x^2)(1+x^2+2-2x^2)}{(1+x^2)^4} =$$

$$= \frac{-2x(3-x^2)}{(1+x^2)^3}; \quad \frac{-2x(3-x^2)}{(1+x^2)^3} = 0, \quad 2x(x^2-3) = 0. \quad \text{Bundan}$$

$$x_1 = -\sqrt{3}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = \sqrt{3} \text{ lar kelib chiqadi.}$$

Navbatda $(-\infty; -\sqrt{3})$, $(-\sqrt{3}; 0)$, $(0; \sqrt{3})$ va $(\sqrt{3}; +\infty)$ oraliqlarda y'' ishorasini aniqlaymiz.

$-\infty < x < -\sqrt{3}$ da $y'' < 0$ bo'lib, egri chiziq qavariq,

$-\sqrt{3} < x < 0$ da $y'' > 0$ bo'lib, egri chiziq botiq,

$0 < x < \sqrt{3}$ da $y'' < 0$ bo'lib, egri chiziq qavariq,

$\sqrt{3} < x < +\infty$ da $y'' > 0$ bo'lib, egri chiziq botiq.


$(-\sqrt{3}; -\frac{\sqrt{3}}{4})$, $(0; 0)$ va $(\sqrt{3}; \frac{\sqrt{3}}{4})$ nuqtalar burilish nuqtalardir;

8) Egri chiziqni asimptotalarini topamiz:

$x \rightarrow +\infty$ da $y \rightarrow 0$ $x \rightarrow -\infty$ da $y \rightarrow 0$

Demak, $y = 0$ to'g'ri chiziq yagona asimptota bo'ladi.

Topilganlar asosida funksiya grafigini yasaymiz:



Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Quyidagi funksiyalarni qavariqlik va botiqlik oraliqlari hamda bukilish nuqtalari topilsin.

- 1) $y = e^{-x^2}$; 2) $y = x^4$; 3) $y = (x-1)^{\frac{1}{3}}$;
4) $y = x^5$; 5) $y = 1 - x^2$; 6) $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 9$.

Javob: 1) $(-\infty; -\frac{1}{\sqrt{2}})$ va $(\frac{1}{\sqrt{2}}; +\infty)$ da botiq; $(-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}})$ da qavariq;
 $(-\frac{1}{\sqrt{2}}; e^{-\frac{1}{2}})$ va $(\frac{1}{\sqrt{2}}; e^{-\frac{1}{2}})$ burilish nuqtalardir.

- 2) $(-\infty; +\infty)$ da botiq, burilish nuqta mavjud emas;
3) $(-\infty; 1)$ da botiq, $(1; +\infty)$ da qavariq; $(1; 0)$ burilish nuqta;
4) $x < 0$ da qavariq va $x > 0$ da botiq; $(0; 0)$ burilish nuqta;
5) $(-\infty; +\infty)$ da qavariq; burilish nuqta mavjud emas;
6) $(1; 2)$ burilish nuqta; $x < 1$ da qavariq, $x > 1$ da botiq.

2. Quyidagi egri chiziqlarning asimptotalari topilsin:

- 1) $y = \frac{1}{x-1}$; 2) $y = \frac{1}{(x+2)^3}$; 3) $y = e^{\frac{1}{x}} - 1$;
4) $y^3 = 6x^2 + x^3$; 5) $y^2 = \frac{x^2}{2a-x}$; 6) $y^3 = a^3 - x^3$.

Javob: 1) $x = 1$; $y = 0$. 2) $x = -2$; $y = 0$. 3) $x = 0$, $y = 0$;
4) $y = x + 2$; 5) $x = 2a$; 6) $y + x = 0$.

3. Quyidagi funksiyalar to'la tekshirilsin va grafiklari yasalsin.

- 1) $y = x^4 - 2x + 10$; 2) $y = \frac{6x}{1+x^2}$;
3) $y = \frac{x}{x^2-1}$; 4) $y = \frac{x^2}{1+x}$;
5) $y = \frac{x^2}{3-x^2}$; 6) $y = x^3 - x$;
7) $y = (x+1)^2(x-2)$; 8) $y = |\sin 3x|$.

X. BOB. ANIQMAS INTEGRAL

§1. Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral. Aqinmas integralning xossalari. Integrallar jadvali

Ma'lumki, harakatdagi nuqtaning tezligini topish, shuningdek, egri chiziqqa urinma o'tkazish kabi masalalar funksiyani differensiallash tushunchasiga olib kelgan edi.

Nuqtaning har bir vaqt momentidagi tezligi ma'lum bo'lganda uning harakat qonunini topish, egri chiziqni uning har bir nuqtasidagi urinmalariga ko'ra aniqlash kabi masalalar ham ko'p uchraydi. Bunday masalalar yuqorida eslatib o'tilgan masalalarga teskari masalalar bo'lib, ular funksiyani integrallash tushunchasiga olib keladi.

Ta'rif. Biror chekli (a, b) yoki cheksiz oraliqdagi har bir x nuqtada differensiallanuvchi va hosilasi

$$F'(x) = f(x)$$

shartni qanoatlantiruvchi $F(x)$ funksiya berilgan $f(x)$ funksiya uchun boshlang'ich funksiya deyiladi. Masalan, $F(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) $x \in (-\infty; +\infty)$, funksiya uchun $F'(x) = \frac{a^x}{\ln a}$ boshlang'ich funksiya bo'ladi.

Ta'rif. Agar $F(x)$ va $G(x)$ berilgan $f(x)$ funksiyaning ixtiyoriy ikkita boshlang'ich funksiyalari bo'lsa, u holda biror C o'zgarmas sonda $G(x) - F(x) = C$ bo'ladi.

Ta'rif. Agar $F(x)$ biror (a, b) oraliqda $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lsa, u holda $F(x) + C$ funksiyalar to'plami shu oraliqda $f(x)$ funksiyaning aniqmas integrali deyiladi.

Berilgan funksiyaning aniqmas integrali $\int f(x)dx$ kabi belgilanadi va ta'rifga asosan, birorta $F(x)$ boshlang'ich funksiya bo'yicha

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

tenglik bilan aniqlanadi.

Bunda $\int$ -integral belgisi, $f(x)$ integral ostidagi funksiya, $f(x)dx$ integral ostidagi ifoda, x esa integrallash o'zgaruvchisi deyiladi. Berilgan

$f(x)$ funksiyani $\int f(x)dx$ aniqmas integralini topish amali bu funksiyani integrallash deyiladi.

Aniqmas integral quyidagi bir qator xossalarga ega:

$$\begin{aligned} (\int f(x)dx)' &= f(x); \quad d(\int f(x)dx) = f(x)dx; \quad \int F'(x)dx = F(x) + C; \\ \int dF(x) &= F(x) + C; \quad \int kf(x)dx = k\int f(x)dx; \\ \int [f(x) \pm g(x)]dx &= \int f(x)dx \pm \int g(x)dx. \end{aligned}$$

Agar $\int f(x)dx = F(x) + C$ bo'lsa, $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C$ bo'ladi.

Differensiallash va integrallash amallari o'zaro teskari amallar bo'lganligi uchun, hosilalar jadvalidan foydalanib, quyidagi integrallarni jadvalini hosil qilamiz.

- 1) $\int 0 \cdot dx = c$ (c -o'zgarmas son); 2) $\int dx = x + c$;
- 3) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ ($n \neq -1$); 4) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} + c$;
- 5) $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c$ ($x \neq 0$); 6) $\int x dx = \frac{x^2}{2} + c$;
- 7) $\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + c$; 8) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$;
- 9) $\int e^x dx = e^x + c$; 10) $\int \sin x dx = -\cos x + c$;
- 11) $\int \cos x dx = \sin x + c$; 12) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + c$ ($x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$);
- 13) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + c$ ($x \neq k\pi$);
- 14) $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + c$ ($x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$);
- 15) $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + c$ ($x \neq k\pi$);
- 16) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} \arcsin x + c, \\ -\arccos x + c. \end{cases}$
- 17) $\int \frac{dx}{1+x^2} = \begin{cases} \arctg x + c, \\ -\operatorname{arccotg} x + c; \end{cases}$ 18) $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$;
- 19) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + c$; 20) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$;
- 21) $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + c$.

Aniqmas integralni hisoblashda aniqmas integralning xossalari va jadvalidan foydalaniladi. Bunga aniqmas integralni bevosita hisoblash deyiladi.

Aniqmas integrallarni hisoblashda ko'pincha

$$\int u^n \cdot u' dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c \quad (n \neq -1) \quad \text{va} \quad \int \frac{u'}{u} dx = \ln|u| + c$$

formulalardan foydalanish qulay bo'ladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $d(F(x)) = (5^x + 2x)dx$ bo'lsa $F(x)$ topilsin.

Yechish: Izlanayotgan $F(x)$ funksiya ikkita funksiya va o'zgarmas son yig'indisidan iborat bo'lib, birinchi qo'shiluvchi $\frac{5^x}{\ln 5}$ ga, ikkinchi qo'shiluvchi x^2 ga va uchinchi qo'shiluvchi o'zgarmas sonidan iborat. Demak, $f(x) = \frac{5^x}{\ln 5} + x^2 + c$.

2. $\int (7x^5 + 3\sqrt[4]{x^3} + \frac{6}{x^2}) dx$ ni hisoblang.

Yechish: Bu yerda $f(x)$ funksiya uchta qo'shiluvchidan iborat. Integralni hisoblash uchun yig'indining aniqmas integrali haqidagi xossadan va integrallar jadvalidan foydalanamiz.

$$\int (7x^5 + 3\sqrt[4]{x^3} + \frac{6}{x^2}) dx = 7 \int x^5 dx + 3 \int x^{\frac{3}{4}} dx + 6 \int \frac{dx}{x^2} = \frac{7x^6}{6} + \frac{12}{7} x^{\frac{7}{4}} - \frac{6}{x} + c.$$

3. $\int (\frac{3}{x^5} - \frac{2}{x^4} + \frac{1}{x^3}) dx$ ni hisoblang:

$$\begin{aligned} \text{Yechish: } \int (\frac{3}{x^5} - \frac{2}{x^4} + \frac{1}{x^3}) dx &= 3 \int \frac{dx}{x^5} - 2 \int \frac{dx}{x^4} + \int \frac{dx}{x^3} = \\ &= 3 \int x^{-5} dx - 2 \int x^{-4} dx + \int x^{-3} dx = 3 \cdot \frac{x^{-5+1}}{-5+1} - 2 \cdot \frac{x^{-4+1}}{-4+1} + \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + \\ &+ c = -\frac{3}{4x^4} + \frac{2}{3x^3} - \frac{1}{2x^2} + c. \end{aligned}$$

4. $\int (3x^3 + 5x^2 - 8)^3 (9x^2 + 10x) dx$ ni hisoblang.

Yechish: Agar $u = 3x^3 + 5x^2 - 8$ deb olsak, $9x^2 + 10x = u'$ bo'ladi. U holda $\int (3x^3 + 5x^2 - 8)^3 (9x^2 + 10x) dx = \int u^3 \cdot u' \cdot dx = \frac{u^4}{4} + c = \frac{(3x^3 + 5x^2 - 8)^4}{4} + c$.

5. $\int \sin^3 x \cdot \cos x dx$ ni hisoblang.

Yechish: Agar $u = \sin x$ deb olsak $u' = \cos x$ bo'ladi. U holda

$$\int \sin^3 x \cdot \cos x dx = \int u^3 \cdot u' \cdot dx = \frac{u^4}{4} + c = \frac{\sin^4 x}{4} + c.$$

6. $\int \frac{2x}{x^2+5} dx$ integral hisoblansin.

Yechish: $u = x^2 + 5$ deb olsak, $u' = 2x$ bo'ladi. Shunday qilib, berilgan integral $\int \frac{u'}{u} dx$ ko'rinishga keladi. Bundan esa

$$\int \frac{2x}{x^2+5} dx = \int \frac{u'}{u} dx = \ln|u| + c = \ln(x^2 + 5) + c$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar.

1. Quyidagi:

- 1) $()' = 2x$; 2) $d() = x^3 dx$; 3) $d() = \cos x dx$;
4) $d() = \frac{dx}{x}$; 5) $d() = \frac{dx}{\cos^2 x}$; 6) $d() = \frac{dx}{1+x^2}$

tengliklardagi bo'sh joylar tegishli mulohazalar yordamida to'ldirilsin.

2. Quyidagi integrallar hisoblansin.

- 1) $\int (x^2 + 2x + \frac{1}{x}) dx$; 2) $\int \frac{10x^9+3}{x^4} dx$;
3) $\int \frac{(x^2+1)^2}{x^3} dx$; 4) $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx$;
5) $\int (\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}) dx$; 6) $\int e^x (1 - \frac{e^{-x}}{x^2}) dx$;
7) $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} dx$; 8) $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}$;
9) $\int \operatorname{ctg}^2 x dx$; 10) $\int \cos^2 \frac{x}{2} dx$;
11) $\int (\frac{2}{1+x^2} - \frac{3}{\sqrt{1-x^2}}) dx$; 12) $\int \frac{x^4}{1+x^2} dx$;
13) $\int (\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2})^2 dx$; 14) $\int \frac{1-\sin^3 x}{\sin^2 x} dx$.

Javob: 1) $\frac{x^3}{3} + x^2 + \ln|x| + c$; 2) $2x^5 - \frac{1}{x^3} + c$;
3) $\frac{x^2}{2} + 2\ln|x| - \frac{1}{2x^2} + c$; 4) $x(\frac{2}{3}\sqrt{x} + \frac{3}{4}\sqrt[3]{x}) + c$; 5) $2\sqrt{x} - 4\sqrt[4]{x} + c$;
6) $e^x + \frac{1}{x} + c$; 7) $-\operatorname{ctg} x - \operatorname{tg} x + c$; 8) $\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + c$;

9) $-\operatorname{ctg} x - x + c$; 10) $\frac{x}{2} + \frac{\sin x}{2} + c$; 11) $2\operatorname{arctg} x - 3\arcsin x + c$;

12) $\frac{x^3}{3} - x + \operatorname{arctg} x + c$; 13) $x + \cos x + c$; 14) $\cos x - \operatorname{ctg} x + c$.

3. Quyidagi integrallar hisoblansin:

1) $\int \frac{dx}{x^2-25}$; 2) $\int \frac{dx}{x^2+9}$; 3) $\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$; 4) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+5}}$;

5) $\int (\frac{3}{x^2+3} + \frac{6}{x^2-3}) dx$; 6) $\int (\frac{1}{\sqrt{2-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{x^2+2}}) dx$.

Javob: 1) $\frac{1}{10} \ln \left| \frac{x-5}{x+5} \right| + c$; 2) $\frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x}{3} + c$; 3) $\arcsin \frac{x}{2} + c$; 4) $\ln(x + \sqrt{x^2+5}) + c$;
5) $\sqrt{3}(\operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{3}} + \ln \left| \frac{x-\sqrt{3}}{x+\sqrt{3}} \right|) + c$; 6) $\arcsin \frac{x}{2} + \ln(x + \sqrt{x^2+2}) + c$.

4. Quyidagi integrallar hisoblansin:

1) $\int \frac{\sin x}{1+\cos x} dx$; 2) $\int \frac{dx}{x \ln x}$; 3) $\int \frac{x^2}{4+3x^3} dx$;

4) $\int \frac{x}{1+x} dx$; 5) $\int \frac{e^x}{e^x+5} dx$; 6) $\int \frac{x^3}{x+2} dx$;

Javob: 1) $-\ln|1+\cos x| + c$; 2) $\ln|\ln x| + c$; 3) $\frac{1}{9} \ln|4+3x^3| + c$;
4) $x - \ln|x+1| + c$; 5) $\ln(5+e^x) + c$;
6) $\frac{x^3}{3} - x^2 + 4x - 8\ln|x+2| + c$.

§2. Aniqmas integralni o'zgaruvchini almashtirish bilan integrallash. Aniqmas integralni bo'laklab integrallash. Kvadrat uchhad qatnashgan integrallarni hisoblash

Aniqmas integralni bevosita hisoblash mumkin bo'lmagan hollarda qo'llash mumkin bo'lgan usullardan biri o'zgaruvchini almashtirish usulidir. Bunda berilgan $\int f(x) dx$ integraldagi "x" o'zgaruvchidan yangi "t" o'zgaruvchiga biror $x = \varphi(t)$ funksiya orqali o'tiladi. Bunda $\varphi(x)$ funksiya differensiallanuvchi, hosilasi uzluksiz hamda unga teskari $t = \varphi^{-1}(x)$ mavjud deb olinadi. Bu holda

$$\int f(x) dx = \int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt$$

tenglik o'rinli bo'ladi. Bu tenglikning o'ng tomonidagi integral hisoblangandan so'ng, t o'zgaruvchi o'rniga $t = \varphi^{-1}(x)$ qo'yilib, berilgan integralning javobi olinadi. Berilgan integralni yuqoridagi tenglik yordamida hisoblash o'zgaruvchini almashtirish usuli deyiladi.

Berilgan integralni bevosita hisoblash mumkin bo'lmagan holda qo'llash mumkin bo'lgan usullardan yana biri bo'laklab integrallash usulidir.

Aytaylik, $u = u(x)$ va $v = v(x)$ funksiyalar differensiallanuvchi funksiyalar bo'lsin. U holda $d(uv) = vdu + u dv$ bo'lib, undan $u dv = d(uv) - vdu$ ni hosil qilamiz. Bu tenglikning ikkala tomonini hadma-had integrallab $\int u dv = \int d(uv) - \int vdu$ yoki $\int u dv = uv - \int vdu$ ni hosil qilamiz. Bunga bo'laklab integrallash formulasi deyiladi. Bu formula hisoblash ancha qiyin bo'lgan $\int u dv$ integralni hisoblashni soddaroq bo'lgan $\int vdu$ integralni hisoblashga olib keladi.

Demak, berilgan $\int f(x) dx$ integralni bo'laklab integrallash formulasi orqali hisoblashni quyidagi algoritm (ketma-ketlik) asosida amalga oshirish mumkin:

- 1) Integral ostidagi ifoda ikki bo'lakka ajratiladi;
- 2) Hosil bo'lgan bo'laklardan dx qatnashganini dv , ikkinchisini esa u orqali belgilanadi;
- 3) Hosil qilingan dv differensial bo'yicha biror v boshlang'ich funksiya topiladi. Buning uchun $v = \int dv$ aniqmas integralni hisoblab, unda ixtiyoriy o'zgarmas son olinadi;
- 4) u funksiya bo'yicha du differensial topiladi;
- 5) $\int vdu$ integral hisoblanadi;
- 6) $\int vdu$ ni ifodasini bo'laklab integrallash formulasiga qo'yiladi. Bunda u va dv ni shunday tanlash kerakki, natijada formuladagi $\int vdu$ jadval integrali yoki hisoblanishi osonroq bo'lgan integraldan iborat bo'lsin.

Ba'zi aniqmas integrallarni hisoblashda bo'laklab integrallash formulasini bir necha marta qo'llashga to'g'ri keladi.

Ba'zi integrallarni hisoblash uchun dastlab bir yoki bir necha marta bo'laklab integrallash orqali ularga nisbatan tenglama hosil qilinib, so'ngra tenglamani yechib ko'zlangan maqsadga erishiladi.

$\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}$ ko'rinishdagi integralni kvadrat uchhad qatnashgan integral deyiladi. Uni hisoblash uchun maxrajdagi kvadrat uchhad to'la kvadrat ajratiladi. Ya'ni, maxraj

$$ax^2 + bx + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \pm k^2\right]$$

ko'rinishda yoziladi. Bu yerda $\frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} = \pm k^2$ deb olingan. Shunday qilib, berilgan integral

$$\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \pm k^2}$$

ko'rinishga keldi. Bu integralda $x + \frac{b}{2a} = t$, $dx = dt$ almashtirish qilib berilgan integraldan

$$\frac{1}{a} \int \frac{dt}{t^2 \pm a^2}$$

ni hosil qilamiz. Bu esa integrallar jadvalidagi integraldir. Kvadrat uchhad qatnashgan integrallarning ikkinchi turi

$$\int \frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c} dx$$

ko'rinishda bo'ladi. Buni hisoblash uchun quyidagi ayniy almashtirishlarni bajaramiz.

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c} dx &= \int \frac{\frac{A}{2a}(2ax + b) + \left(B - \frac{Ab}{2a}\right)}{ax^2 + bx + c} dx = \\ &= \frac{A}{2a} \int \frac{2ax + b}{ax^2 + bx + c} dx + \left(B - \frac{Ab}{2a}\right) \int \frac{dx}{ax^2 + bx + c} = \\ &= \frac{A}{2a} \ln|ax^2 + bx + c| + \left(B - \frac{Ab}{2a}\right) \int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}. \end{aligned}$$

oxirgi integral 1-tipdagi integral bo'lib uni hisoblash usuli bizga ma'lum. Kvadrat uchhad qatnashgan integrallarning yana bir turi

$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

ko'rinishda bo'lib, uni hisoblash uchun maxrajida turgan ildiz ostidagi ifodani almashtirishlar yordamida $t^2 \pm k^2$ yoki $k^2 - t^2$ ko'rinishga keltiriladi va natijada jadvaldagi integrallardan biriga keltiriladi.

Kvadrat uchhad qatnashgan integrallarning to'rtinchi turi

$$\int \frac{Ax + B}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$$

ko'rinishda bo'lib, u ikkinchi turdagi integralni hisoblashda bajarilgan ishlar yordamida hisoblanadi. Ya'ni,

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax + B}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx &= \int \frac{\frac{A}{2a}(2ax + b) + (B - \frac{Ab}{2a})}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \\ &= \frac{A}{2a} \int \frac{2ax + b}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx + \left(B - \frac{Ab}{2a}\right) \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} \end{aligned}$$

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}}$ integral hisoblansin.

$$\begin{aligned} \text{Yechish: } \int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}} &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x+4} = t, x+4 = t^2 \\ x = t^2 - 4, dx = 2t dt \end{array} \right\} \Rightarrow \int \frac{2t dt}{(t^2-4) \cdot t} = \\ &= 2 \cdot \int \frac{dt}{t^2-4} = 2 \cdot \frac{1}{2 \cdot 2} \ln \left| \frac{t-2}{t+2} \right| + c = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x+4}-2}{\sqrt{x+4}+2} \right| + c. \end{aligned}$$

2. $\int \frac{\sin x dx}{\sqrt{1+2\cos x}}$ integral hisoblansin.

Yechish: Bu integralni bevosita hisoblab bo'lmaydi. Shuning uchun o'zgaruvchini almashtiramiz.

Agar $1 + 2\cos x = t$ deb olsak, u holda $-2\sin x dx = dt$ yoki $\sin x dx = \frac{-dt}{2}$ bo'ladi. Demak,

$$\int \frac{\sin x dx}{\sqrt{1+2\cos x}} = \int \frac{-\frac{dt}{2}}{\sqrt{t}} = -\sqrt{t} + c = -\sqrt{1+2\cos x} + c.$$

3. $\int \frac{\sqrt{x} dx}{1+\sqrt[4]{x^3}}$ integral hisoblansin.

$$\text{Yechish: } \int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[4]{x^3}} dx \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = t^4, t = \sqrt[4]{x} \\ dx = 4t^3 dt \end{array} \right\} \Rightarrow \int \frac{t^2}{1+t^3} \cdot 4t^3 dt =$$

$$\int \frac{t^3}{t^3+1} dt = 4 \int \left(t^2 - \frac{t^2}{t^3+1} \right) dt = 4 \int t^2 dt - 4 \int \frac{t^2}{t^3+1} dt =$$

$$\frac{4}{3} t^3 - \frac{4}{3} \ln|t^3+1| + c = \frac{4\sqrt[4]{x^3}}{3} - \frac{4}{3} \ln|\sqrt[4]{x^3}+1| + c.$$

4. $\int x e^x dx$ integral hisoblansin.

Yechish: Agar integral ostidagi $x e^x dx$ ifodani $u = e^x$, $dv = x dx$ deb bo'laklasak, u holda

$$du = e^x dx, \quad v = \int x dx = \frac{x^2}{2} + c \quad \text{bo'lib, bo'laklab integrallash}$$

formulasidan

$$\int x e^x dx = \frac{x^2}{2} e^x - \frac{1}{2} \int x^2 e^x dx$$

olib chiqadi. Ammo bunda hosil bo'lgan o'ng tomondagi integral berilgan integralga nisbatan murakkabroq ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, bunday bo'laklash maqsadga muvofiq emas. Bundan esa $u = x$, $dv = e^x dx$ deb olish kerakligini aniqlaymiz.

$$\int x e^x dx \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} u = x, du = dx \\ dv = e^x dx, v = e^x \end{array} \right\} \Rightarrow x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + c.$$

5. $\int x^2 \sin x dx$ integral hisoblansin.

$$\text{Yechish: } \int x^2 \sin x dx \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} u = x^2, dv = \sin x dx \\ du = 2x dx, v = -\cos x \end{array} \right\} \Rightarrow -x^2 \cos x +$$

$$\int 2x \cos x dx \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} u = x, dv = \cos x dx \\ du = dx, v = \sin x \end{array} \right\} \Rightarrow -x^2 \cos x +$$

$$+ 2 \left(x \sin x - \int \sin x dx \right) = -x^2 \cos x + 2x \sin x - 2(-\cos x) + c =$$

$$= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + c.$$

6. $\int \sqrt{1-x^2} dx$ integral hisoblansin.

Yechish:

$$\int \sqrt{1-x^2} dx \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} u = \sqrt{1-x^2}, dv = dx \\ du = -\frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}}, v = x \end{array} \right\} \Rightarrow x\sqrt{1-x^2} + \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

$$x\sqrt{1-x^2} - \int \frac{1-x^2-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = x\sqrt{1-x^2} - \int \sqrt{1-x^2} dx +$$

ko'rinishda bo'lib, uni hisoblash uchun ifodani almashtirishlar yordamida keltiriladi va natijada jadvaldagi

Kvadrat uchhad qatnas

ko'rinishda bo'lgan ishlar yordamida

klab integrallash

dan $u = e^x$, $du = e^x dx$ deb

$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + b}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax^2 + b} + x\sqrt{a}}{a} \right| + C, & b > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{-b}} \arcsin \frac{x\sqrt{a}}{\sqrt{-b}} + C, & b < 0 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} 2 &= t \\ \frac{2}{9} &= \frac{dt}{\sqrt{6}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{2}{9} \sqrt{6} + C$$

Yechish: $\int \frac{x-2}{x^2-2x-5} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2-2x-5| + 4 \int \frac{dx}{(x-1)^2-6} = \frac{1}{2} \ln|x^2-2x-5| + 2 \frac{1}{\sqrt{6}} \ln \left| \frac{\sqrt{6}-x+1}{\sqrt{6}+x-1} \right| + C = \frac{1}{2} \ln|x^2-2x-5| + \frac{\sqrt{6}}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{6}-x+1}{\sqrt{6}+x-1} \right| + C.$

9. $\int \frac{5x+3}{\sqrt{x^2+4x+10}} dx$ integral hisoblansin.

Yechish: $\int \frac{5x+3}{\sqrt{x^2+4x+10}} dx = \int \frac{\frac{5}{2}(2x+4) + (3-10)}{\sqrt{x^2+4x+10}} dx = \frac{5}{2} \int \frac{2x+4}{\sqrt{x^2+4x+10}} dx - 7 \int \frac{dx}{\sqrt{(x+2)^2+6}} = \frac{5}{2} \int (x^2+4x+10)^{-\frac{1}{2}} (x^2+4x+10)' dx - 7 \int \frac{dx}{\sqrt{(x+2)^2+6}} = 5\sqrt{x^2+4x+10} - 7 \ln|x+2+\sqrt{x^2+4x+10}| + C.$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Quyidagi integrallarni o'rniga qo'yish usuli bilan hisoblang.

- 1) $\int e^{-3x} dx$; 2) $\int \sqrt{4x-1} dx$; 3) $\int (3-2x)^4 dx$;
4) $\int \frac{dx}{\sqrt{3-2x}}$; 5) $\int \sin(a-bx) dx$; 6) $\int \sin^2 x \cdot \cos x dx$;

Demak, $\int \sin x dx = -\cos x + C$

7) $\int \cos^3 x \sin x dx$; 8) $\int \frac{1-2\cos x}{\sin^2 x} dx$; 9) $\int e^{x^3} \cdot x^2 dx$;

10) $\int \sqrt{x^2+1} dx$; 11) $\int x^2 \sqrt{x^3-8} dx$; 12) $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1+x^2}}$;

Javob: 1) $-\frac{1}{3} e^{-3x} + C$; 2) $\frac{1}{6} (4x-1)^{\frac{5}{2}} + C$; 3) $-\frac{(3-2x)^5}{10} + C$;

4) $\sqrt{3-2x} + C$; 5) $\frac{1}{6} \cos(a-bx) dx$; 6) $\frac{\sin^3 x}{3} + C$; 7) $-\frac{\cos^4 x}{4} + C$;

8) $\frac{1-\cos x}{\sin x} + C$; 9) $\frac{1}{3} e^{x^3} + C$; 10) $\frac{1}{3} \sqrt{(x^2+1)^3} + C$;

11) $\frac{1}{4} \sqrt{(x^3-8)^4} + C$; 12) $\frac{1}{2} \sqrt{(1+x^2)^2} + C$;

2. Quyidagi integrallarni bo'laklab integrallash formulasidan foydalanib hisoblang.

1) $\int \ln x dx$; 2) $\int x \ln(x-1) dx$; 3) $\int x e^{2x} dx$;

4) $\int x^2 \cos x dx$; 5) $\int x \arctg x dx$; 6) $\int (\ln x)^2 dx$;

7) $\int \frac{xdx}{\sin^2 x}$; 8) $\int x^3 e^{-x} dx$; 9) $\int \arcsin x dx$;

10) $\int \frac{\arcsin x dx}{\sqrt{1+x}}$; 11) $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$; 12) $\int \frac{xdx}{\cos^2 x}$;

Javob: 1) $x \ln|x| - x + C$; 2) $\frac{x^2}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} + x + \ln|x-1| \right) + C$;

3) $\frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$; 4) $x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C$;

5) $\frac{x^2+1}{2} \arctg x - \frac{x}{2} + C$; 6) $x[(\ln|x| - 1)^2 + 1] + C$;

7) $-x \ctg x + \ln|\sin x| + C$; 8) $-e^{-x}(x^3 + 3x^2 + 6x + 6) + C$;

9) $x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$; 10) $2\sqrt{1+x} \arcsin x + 4\sqrt{1-x} + C$;

11) $-\frac{\ln|x|+1}{x} + C$; 12) $x \tg x + \ln|\cos x| + C$.

3. Quyidagi integrallar hisoblansin.

1) $\int \frac{dx}{x^2+4x+14}$; 2) $\int \frac{dx}{x^2+x+1}$; 3) $\int \frac{dx}{x^2+3x+6}$;

4) $\int \frac{dx}{x^2-9x+25}$; 5) $\int \frac{dx}{x^2-7x+14}$; 6) $\int \frac{dx}{x^2-x+14}$;

7) $\int \frac{3x+4}{x^2+7x+14} dx$; 8) $\int \frac{2x-3}{x^2+x+5} dx$; 9) $\int \frac{7x-8}{x^2+5x+17} dx$;

10) $\int \frac{3x-11}{x^2+8x+18} dx$; 11) $\int \frac{x+7}{x^2+11x+42} dx$; 12) $\int \frac{x-3}{x^2-9x+23} dx$;

13) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-4x-3}}$; 14) $\int \frac{3x-5}{\sqrt{9+6x-3x^2}} dx$; 15) $\int \frac{dx}{\sqrt{2+x-x^2}}$;

$$16) \int \frac{dx}{\sqrt{2x^2-8x+9}}; 17) \int \frac{5x+3}{\sqrt{x^2+4x+10}} dx.$$

$$\text{Javob: } 1) \frac{1}{\sqrt{10}} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{\sqrt{10}} + c; 2) \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + c;$$

$$3) \frac{2}{\sqrt{15}} \operatorname{arctg} \frac{2x+3}{\sqrt{15}} + c; 4) \frac{2}{\sqrt{19}} \operatorname{arctg} \frac{2x-9}{\sqrt{19}} + c; 5) \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2x-3}{\sqrt{7}} + c;$$

$$6) \frac{2}{\sqrt{55}} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{55}} + c; 7) \frac{3}{2} \ln(x^2+7x+14) - \frac{13}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2x+7}{\sqrt{7}} + c;$$

$$8) \ln(x^2+x+5) - \frac{8}{\sqrt{19}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{19}} + c;$$

$$9) \frac{7}{2} \ln(x^2+5x+17) - \frac{51}{\sqrt{43}} \operatorname{arctg} \frac{2x+5}{\sqrt{43}} + c;$$

$$10) \frac{3}{2} \ln(x^2+8x+18) - \frac{23}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x+4}{\sqrt{2}} + c;$$

$$11) \frac{1}{2} \ln(x^2+11x+42) + \frac{3}{\sqrt{47}} \operatorname{arctg} \frac{2x+11}{\sqrt{47}} + c;$$

$$12) \frac{1}{2} \ln(x^2-9x+23) + \frac{3}{\sqrt{11}} \operatorname{arctg} \frac{2x-9}{\sqrt{11}} + c;$$

$$13) \ln|x-2+\sqrt{(x-2)^2-7}| + c;$$

$$14) -\sqrt{9+6x-3x^2} - \frac{2}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{x-1}{2} + c;$$

$$15) \arcsin \frac{2x-1}{3} + c; 16) \frac{1}{\sqrt{2}} \ln|x-2+\sqrt{x^2-4x+4.5}| + c;$$

$$17) 5\sqrt{x^2+4x+10} - 7\ln|x+2+\sqrt{x^2+4x+10}| + c.$$

§3. Ratsional kasrlar va ularni integrallash

Ta'rif. Ikkita ko'phad nisbatidan iborat funksiya ratsional kasr yoki ratsional funksiya deyiladi. Odatda u $R(x)$ bilan belgilanadi.

$$R(x) = \frac{Q_m(x)}{P_n(x)} = \frac{b_mx^m + b_{m-1}x^{m-1} + \dots + b_1x + b_0}{a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0}$$

Ta'rif. Agar $R(x)$ ratsional kasrda maxrajining darajasi $n > m$ bo'lsa, u to'g'ri, $n \leq m$ bo'lsa, noto'g'ri ratsional kasr deb ataladi.

Agar $R(x)$ noto'g'ri ratsional kasr bo'lsa, u holda uni quyidagicha yozish mumkin:

$$R(x) = \frac{Q_m(x)}{P_n(x)} = N_{m-n}(x) + \frac{G_r(x)}{P_n(x)}, r < n.$$

$$\text{Ta'rif. } R_1(x) = \frac{A}{x-a}, \text{ II. } R_2(x) = \frac{A}{(x-a)^k}, \text{ III. } R_3(x) = \frac{Ax+B}{x^2+px+q},$$

IV. $R_4(x) = \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$ ko'rinishdagi kasrlar eng sodda ratsional

kasrlar deb ataladi. Bu yerda A, B, a, p, q — haqiqiy sonlar, $k = 2, 3, 4, \dots$ va x^2+px+q kvadrat uchhad haqiqiy ildizlarga ega emas, ya'ni $D < 0$ deb olinadi.

$$\text{I. } \int R_1(x) dx = \int \frac{A}{x-a} dx = A \ln|x-a| + c.$$

$$\text{II. } \int R_2(x) dx = \int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \int (x-a)^{-k} d(x-a) =$$

$$\frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + c.$$

$$\text{III. } \int R_3(x) dx = \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx = \int \frac{\frac{A}{2}(2x+p) + (B-\frac{Ap}{2})}{x^2+px+q} dx =$$

$$= \frac{A}{2} \int \frac{(2x+p)dx}{x^2+px+q} + (B-\frac{Ap}{2}) \int \frac{dx}{x^2+px+q} = \left\{ \begin{aligned} x^2+px+q &= t \\ (2x+p)dx &= dt \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\int \frac{dt}{t} + (B-\frac{Ap}{2}) \int \frac{dx}{x^2+px+q} = \frac{A}{2} \ln|x^2+px+q| +$$

$$(B-\frac{Ap}{2}) \int \frac{d(x+\frac{p}{2})}{(x+\frac{p}{2})^2+m^2} =$$

$$= \frac{A}{2} \ln|x^2+px+q| + (B-\frac{Ap}{2}) \frac{1}{m} \operatorname{arctg} \frac{x+\frac{p}{2}}{m} + C.$$

$$\text{IV. } \int R_4(x) dx = \int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx = \int \frac{\frac{A}{2}(2x+p) + (B-\frac{Ap}{2})}{(x^2+px+q)^k} dx =$$

$$= \frac{A}{2} \int \frac{(2x+p)dx}{(x^2+px+q)^k} + (B-\frac{Ap}{2}) \int \frac{d(x+\frac{p}{2})}{[(x+\frac{p}{2})^2+m^2]^k} dx =$$

$$= \frac{A}{2} \int (x^2+px+q)^{-k} d(x^2+px+q) +$$

$$+ (B-\frac{Ap}{2}) \int \frac{d(x+\frac{p}{2})}{[(x+\frac{p}{2})^2+m^2]^k} = \frac{1}{(1-k)(x^2+px+q)^{k-1}} +$$

$$+ (B-\frac{Ap}{2}) \int \frac{dt}{(t^2+m^2)^k} = \frac{1}{(1-k)(x^2+px+q)^{k-1}} +$$

$$+ \frac{(B-\frac{Ap}{2})}{m^2} \int \frac{t^2+m^2-t^2}{(t^2+m^2)^k} dt = \frac{1}{(1-k)(x^2+px+q)^{k-1}} +$$

$$+ \frac{\left(B - \frac{Ap}{2}\right)}{m^2} \int \frac{dt}{(t^2 + m^2)^{k-1}} - \frac{\left(B - \frac{Ap}{2}\right)}{m^2} \int \frac{t^2 dt}{(t^2 + m^2)^k}$$

Bu yerda ikkinchi qo'shiluvchi maxrajida $k-1$ darajali kvadrat uchhad qatnashgan integraldan iborat. Oxirgi qo'shiluvchini bo'laklab integrallash formulasini qo'llab, undan ham maxrajida $k-1$ darajali kvadrat uchhad qatnashgan integral hosil qilinadi. Hosil bo'lgan integralda yana yuqoridagi ishlar takrorlanadi va pirovard natijada $R_1(x)$, $R_2(x)$ va $R_3(x)$ ko'rinishdagi integrallarga keltiriladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $\int \frac{5dx}{x+4}$ integral hisoblansin.

$$\text{Yechish: } \int \frac{5dx}{x+4} = 5 \int \frac{d(x+4)}{x+4} = 5 \ln|x+4| + C.$$

2. $\int \frac{13dx}{(x-5)^7}$ integral hisoblansin.

$$\begin{aligned} \text{Yechish: } \int \frac{13dx}{(x-5)^7} &= 13 \int \frac{d(x-5)}{(x-5)^7} = 13 \int (x-5)^{-7} \cdot d(x-5) = \\ &= 13 \cdot \frac{(x-5)^{-6}}{-6} + C = -\frac{13}{6(x-5)^6} + C. \end{aligned}$$

3. $\int \frac{5x-7}{x^2+3x+8} dx$ integral hisoblansin.

$$\text{Yechish: } \int \frac{5x-7}{x^2+3x+8} dx = \int \frac{\frac{5}{2}(2x+3) + (-7-\frac{15}{2})}{x^2+3x+8} dx = \frac{5}{2} \int \frac{2x+3}{x^2+3x+8} dx -$$

$$\begin{aligned} -\frac{29}{2} \int \frac{dx}{x^2+3x+8} &= \frac{5}{2} \ln|x^2+3x+8| - \frac{29}{2} \int \frac{d(x+1,5)}{(x+1,5)^2+5,75} = \\ &= \frac{5}{2} \ln|x^2+3x+8| - \frac{29}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{5,75}} \arctg \frac{x+1,5}{\sqrt{5,75}} + C = \frac{5}{2} \ln|x^2+3x+8| - \\ &-\frac{29}{\sqrt{23}} \arctg \frac{2x+3}{\sqrt{23}} + C. \end{aligned}$$

4. $\int \frac{(x-1)dx}{(x^2+2x+3)^2}$ integral hisoblansin.

$$\begin{aligned} \text{Yechish: } \int \frac{(x-1)dx}{(x^2+2x+3)^2} &= \int \frac{\frac{3}{2}(2x+2)-2}{(x^2+2x+3)^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{(x^2+2x+3)^2} dx - \\ &-2 \int \frac{dx}{[(x+1)^2+2]^2} = \frac{1}{2} \int (x^2+2x+3)^{-2} d(x^2+2x+3) - \\ &-2 \int \frac{dx}{[(x+1)^2+(\sqrt{2})^2]^2} = \left(\begin{matrix} x+1=t \\ dx=dt \end{matrix} \right) = -\frac{1}{2(x^2+2x+3)} - \\ &-2 \int \frac{dt}{(t^2+2)^2} = -\frac{1}{2(x^2+2x+3)} - \int \frac{t^2+2-t^2}{(t^2+2)^2} dt = \\ &= -\frac{1}{2(x^2+2x+3)} - \int \frac{t^2+2}{(t^2+2)^2} dt + \int \frac{t^2}{(t^2+2)^2} dt = \\ &= -\frac{1}{2(x^2+2x+3)} - \int \frac{dt}{t^2+2} + \int \frac{tdt}{(t^2+2)^2} \cdot t = -\frac{1}{2(x^2+2x+3)} - \\ &-\frac{1}{\sqrt{2}} \arctg \frac{t}{\sqrt{2}} - \frac{t}{2(t^2+2)} + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2+2} = -\frac{1}{2(x^2+2x+3)} - \\ &-\frac{1}{\sqrt{2}} \arctg \frac{t}{\sqrt{2}} - \frac{t}{2(t^2+2)} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctg \frac{t}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2(x^2+2x+3)} - \\ &-\frac{1}{\sqrt{2}} \arctg \frac{x+1}{\sqrt{2}} - \frac{x+1}{2(x^2+2x+3)} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctg \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C = \\ &= -\frac{x+2}{2(x^2+2x+3)} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctg \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C. \end{aligned}$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Quyidagi integrallar hisoblansin.

- 1) $\int \frac{3dx}{x-19}$; 2) $\int \frac{7dx}{x+5}$; 3) $\int \frac{3,5dx}{x-6,5}$;
- 4) $\int \frac{dx}{x^2+2x+5}$; 5) $\int \frac{dx}{3x^2-2x+4}$; 6) $\int \frac{dx}{x^2+3x+1}$;
- 7) $\int \frac{dx}{x^2-6x+5}$; 8) $\int \frac{dx}{2x^2-2x+1}$; 9) $\int \frac{dx}{3x^2-2x+2}$;
- 10) $\int \frac{3x-1}{5x^2-3x+2} dx$; 11) $\int \frac{xdx}{x^2+x+1}$; 12) $\int \frac{2x+7}{x^2+x-2} dx$;
- 13) $\int \frac{x-1}{x^2-5x+6} dx$; 14) $\int \frac{4x-2,4}{x^2-0,2x+0,17} dx$;
- 15) $\int \frac{(2x+1)dx}{(x^2+2x+5)^2}$; 16) $\int \frac{(3x+5)dx}{(x^2+2x+5)^2}$.

Javob: 1) $3 \ln|x-19| + C$; 2) $7 \ln|x+5| + C$;

- 3) $3,5\ln|x-6,5| + C$; 4) $\frac{1}{2}\arctg \frac{x+1}{2} + C$; 5) $\frac{1}{\sqrt{11}}\arctg \frac{3x-1}{\sqrt{11}} + C$;
 6) $\frac{1}{\sqrt{5}}\ln \left| \frac{2x+3-\sqrt{5}}{2x+3+\sqrt{5}} \right| + C$; 7) $\frac{1}{4}\ln \left| \frac{x-5}{x-1} \right| + C$; 8) $\arctg(2x-1) + C$;
 9) $\frac{1}{\sqrt{5}}\arctg \frac{3x-1}{\sqrt{5}} + C$; 10) $\frac{3}{2}\ln|x^2-x+1| + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctg \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$;
 11) $\frac{1}{2}\ln(x^2+x+1) - \frac{1}{\sqrt{3}}\arctg \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C$;
 12) $\ln \left| \frac{(x-1)^3}{x+2} \right| + C$; 13) $\ln \left| \frac{c(x-2)^2}{x-3} \right| + C$;
 14) $2\ln(x^2-0,2x+0,17) - 5\arctg \frac{10x-1}{4} + C$;
 15) $-\frac{x-9}{8(x^2+2x+5)} - \frac{1}{16}\arctg \frac{x+1}{2} + C$;
 16) $\frac{x-5}{4(x^2+2x+5)} + \frac{1}{8}\arctg \frac{x+1}{2} + C$.

§4. Ratsional kasrlarni integrallash

Aytaylik, $\int \frac{Q(x)}{f(x)} dx$ integralni hisoblash talab qilingan bo'lsin. Agar $\frac{Q(x)}{f(x)}$ kasr noto'g'ri bo'lsa, u holda uni $M(x)$ ko'phad bilan $\frac{F(x)}{f(x)}$ to'g'ri ratsional kasrning yig'indisi sifatida yozish mumkin. Bunda oxirgi to'g'ri kasrni eng sodda ratsional kasrlarning yig'indisi sifatida yozish mumkin. Bu sodda kasrlarning ko'rinishini maxrajidagi $f(x)$ ning ildizlariga qarab aniqlanadi. Bunda quyidagi hollar bo'lishi mumkin.

1-hol. Maxrajning ildizlari haqiqiy va har xil, ya'ni

$$f(x) = (x-a)(x-b) \cdot \dots \cdot (x-d)$$

Bu holda $\frac{F(x)}{f(x)}$ kasr I tipdagi eng sodda kasrlarga ajraladi. Ya'ni,

$$\frac{F(x)}{f(x)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \dots + \frac{D}{x-d} \text{ bo'lib,}$$

$$\int \frac{F(x)}{f(x)} dx = \int \frac{A}{x-a} dx + \int \frac{B}{x-b} dx + \dots + \int \frac{D}{x-d} dx = A\ln|x-a| + B\ln|x-b| + \dots + D\ln|x-d| + C \text{ bo'ladi.}$$

2-hol. Maxrajning ildizlari haqiqiy va ba'zilar karrali. Ya'ni,

$$f(x) = (x-a)^\alpha \cdot (x-b)^\beta \cdot \dots \cdot (x-d)^\delta.$$

Bu holda $\frac{F(x)}{f(x)}$ kasr I va II tipdagi eng sodda kasrlarga ajraladi.

3-hol. Maxrajning ildizlari orasida takrorlanmaydigan kompleks ildizlar bor. Ya'ni,

$$f(x) = (x^2+px+q) \cdot \dots \cdot (x^2+lx+s) \cdot (x-a)^\alpha \cdot \dots \cdot (x-d)^\delta.$$

Bu holda $\frac{F(x)}{f(x)}$ kasr I, II va III tipdagi eng sodda kasrlarga ajraladi.

4-hol. Maxrajni ildizlari ichida takrorlanadigan kompleks ildizlar bor. Ya'ni,

$$f(x) = (x^2+px+q)^\mu \cdot \dots \cdot (x^2+lx+s)^\nu \cdot (x-a)^\alpha \cdot \dots \cdot (x-d)^\delta.$$

Bu holda $\frac{F(x)}{f(x)}$ kasrning yoyilmasida IV tipdagi eng sodda kasrlar ham ishtirok etadi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $\int \frac{x^3+x+2}{x^2-7x+12} dx$ integral hisoblansin.

Yechish: Berilgan kasr noto'g'ri bo'lgani uchun dastlab uning butun qismini ajratamiz. Buning uchun x^3+x+2 ko'phadni $x^2-7x+12$ ko'phadga bo'lamiz.

$$\begin{array}{r} x^3+x+2 \\ - (x^2-7x+12) \\ \hline 2x^2+8x-10 \\ - (2x^2-14x+24) \\ \hline 22x-34 \\ - (22x-154) \\ \hline 120 \end{array}$$

$$\text{Demak, } \int \frac{x^3+x+2}{x^2-7x+12} dx = \int \left(x+7 + \frac{38x-82}{x^2-7x+12} \right) dx = \frac{1}{2}x^2 + 7x + \int \frac{38x-82}{x^2-7x+12} dx.$$

$\frac{38x-82}{x^2-7x+12}$ kasrning mahraji haqiqiy va har xil ildizlarga ega. Ya'ni $x^2-7x+12 = (x-3)(x-4)$ bo'lgani uchun oxirgi kasrni $\frac{38x-82}{x^2-7x+12} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-4}$ ko'rinishida yozish mumkin. Bundan,

$$\begin{aligned} 38x-82 &= A(x-4) + B(x-3); Ax+Bx-4A-3B=38x-82; \\ \begin{cases} A+B=38 \\ -4A-3B=-82 \end{cases} &\cdot \begin{cases} A+B=38 \\ 4A+3B=82 \end{cases} \cdot \begin{cases} -3A-3B=-114 \\ 4A+3B=82 \end{cases} \end{aligned}$$

$$A = -32; B = 70;$$

Demak,

$$\int \frac{x^2+x+2}{x^2-7x+12} dx = \frac{1}{2}x^2 + 7x - 32 \int \frac{dx}{x-3} + 70 \int \frac{dx}{x-4} = \frac{1}{2}x^2 + 7x - 32 \ln|x-3| + 70 \ln|x-4| + C.$$

2. $\int \frac{x^2+x+5}{x(x+3)(x-2)} dx$ integral hisoblangan.

$$\text{Yechish: } \frac{x^2+x+5}{x(x+3)(x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+3} + \frac{C}{x-2}.$$

Bu tenglikning har ikkala tomonini $x(x+3)(x-2)$ ifodaga ko'paytiramiz va quyidagiga ega bo'lamiz:

$$x^2 + x + 5 = A(x+3)(x-2) + Bx(x-2) + Cx(x+3);$$

$$x^2 + x + 5 = A(x^2 + x - 6) + B(x^2 - 2x) + C(x^2 + 3x);$$

$$x^2 + x + 5 = (A+B+C)x^2 + (A-2B+3C)x - 6A$$

$$\text{Demak, } \begin{cases} A+B+C=1, \\ A-2B+3C=1, \\ -6A=5. \end{cases} \quad \begin{cases} A+B+C=1, \\ A-2B+3C=1, \\ A=-\frac{5}{6}. \end{cases}$$

A ning qiymatini sistemaning dastlabki ikkita tenglamasiga qo'yib,

$$B = \frac{11}{15} \text{ va } C = \frac{11}{10} \text{ ni topamiz.}$$

$$\text{Demak, } \int \frac{x^2+x+5}{x(x+3)(x-2)} dx = -\int \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{x} dx + \frac{11}{15} \int \frac{dx}{x+3} + \frac{11}{10} \int \frac{dx}{x-2} = -\frac{5}{6} \ln|x| + \frac{11}{15} \ln|x+3| + \frac{10}{11} \ln|x-2| + C.$$

3. $\int \frac{2x^2-7x+8}{x^4-10x^2+9} dx$ integral hisoblansin.

Yechish: Dastlab integral ostidagi kasr maxrajining ildizlarini topamiz:

$$x^4 - 10x^2 + 9 = 0; x_1 = 1; x_2 = -1; x_3 = 3; x_4 = -3, \text{ bo'lgani uchun}$$

$$x^4 - 10x^2 + 9 = (x-1)(x+1)(x-3)(x+3) \text{ bo'lib berilgan kasrni}$$

$$\frac{2x^2-7x+8}{x^4-10x^2+9} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-3} + \frac{D}{x+3} \text{ ko'rinishida yozish mumkin bo'ladi.}$$

$$\text{Bundan esa } A = -\frac{3}{16}; B = \frac{17}{16}; C = \frac{5}{48}; D = -\frac{47}{48} \text{ larni topamiz.}$$

A, B, C, D larning qiymatlarini o'rnilariga qo'yamiz va integrallaymiz

$$\int \frac{2x^2-7x+8}{x^4-10x^2+9} dx = -\frac{3}{16} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{17}{16} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{5}{48} \int \frac{dx}{x-3} - \frac{47}{48} \int \frac{dx}{x+3} =$$

$$= -\frac{3}{16} \ln|x-1| + \frac{17}{16} \ln|x+1| + \frac{5}{48} \ln|x-3| - \frac{47}{48} \ln|x+3| + C =$$

$$= -\frac{3}{48} \ln|x-1|^3 + \frac{17}{48} \ln|x+1|^3 + \frac{5}{48} \ln|x-3| - \frac{47}{48} \ln|x+3| + C =$$

$$= \ln \sqrt[48]{\frac{(x+1)^3(x-3)^5}{(x-1)^9(x+3)^{47}}} + C.$$

4. $\int \frac{xdx}{(x^2+1)(x-1)}$ integral hisoblansin.

Yechish: Integral ostidagi kasrni sodda kasrlarga ajratamiz:

$$\frac{x}{(x^2+1)(x-1)} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1}. \text{ Bundan } x = (Ax+B)(x-1) + C(x^2+1)$$

yoki $x = Ax^2 - Ax + Bx - B + Cx^2 + C$. Bu tenglikdan

$$\begin{cases} A+C=0, \\ -A+B=1, \\ -B+C=0, \end{cases} \quad \begin{cases} A=-C, \\ B+C=1, \\ -B+C=0, \end{cases} \quad \begin{cases} A=-\frac{1}{2}, \\ B=\frac{1}{2}, \\ C=\frac{1}{2}. \end{cases} \text{ larni}$$

topamiz. Demak,

$$\int \frac{xdx}{(x^2+1)(x-1)} = -\frac{1}{2} \int \frac{x-1}{x^2+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} = -\frac{1}{2} \int \frac{xdx}{x^2+1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} = -\frac{1}{4} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \arctg x + \frac{1}{2} \ln|x-1| + C.$$

5. $\int \frac{x^4+4x^3+11x^2+12x+8}{(x^2+2x+3)^2 \cdot (x+1)} dx$ integral hisoblansin.

$$\text{Yechish: } \frac{x^4+4x^3+11x^2+12x+8}{(x^2+2x+3)^2 \cdot (x+1)} = \frac{Ax+B}{(x^2+2x+3)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+2x+3} + \frac{E}{x+1}. \text{ Bundan}$$

quyidagi tenglikni hosil qilamiz:

$$x^4 + 4x^3 + 11x^2 + 12x + 8 = (Ax+B)(x+1) + (Cx+D)(x^2+2x+3)(x+1) + E(x^2+2x+3)^2.$$

Bu tenglikdan noma'lum koeffitsientlarni topamiz. Ular $A = 1, B = -1, C = 0, D = 0, E = 1$.

Shunday qilib,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4+4x^3+11x^2+12x+8}{(x^2+2x+3)^2 \cdot (x+1)} dx &= \int \frac{x-1}{(x^2+2x+3)^2} dx + \int \frac{dx}{x+1} = \\ &= \int \frac{x+1-2}{(x^2+2x+3)^2} dx + \int \frac{dx}{x+1} = \int \frac{x+1}{(x^2+2x+3)^2} dx - 2 \int \frac{dx}{x^2+2x+3} + \int \frac{dx}{x+1} = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{(x^2+2x+3)^2} dx - 2 \int \frac{dx}{(x+1)^2+2} + \ln|x+1| + C = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \int (x^2 + 2x + 3)^{-2} d(x^2 + 2x + 3) - 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{\sqrt{2}} + \ln|x-1| + C = -\frac{1}{2(x^2+2x+3)} - \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{\sqrt{2}} + \ln|x+1| + C.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Quyidagi integrallar hisoblansin.

I. Maxraj haqiqiy va har xil ildizlarga ega bo'lgan hol.

$$1) \int \frac{x dx}{(x+1)(2x+1)}; \quad 2) \int \frac{x dx}{x^2-3x-2}; \quad 3) \int \frac{2x^2+41x-91}{(x-1)(x-3)(x-4)} dx; \quad 4) \int \frac{dx}{6x^3-7x^2-11x-6}$$

$$5) \int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x} dx;$$

$$\text{Javob: } 1) \ln \frac{|x+1|}{\sqrt{2x+1}} + C; \quad 2) \frac{1}{2} \ln[(x-2)^2 \cdot \sqrt{2x+1}] + C;$$

$$3) \ln \left| \frac{(x-1)^4(x-4)^5}{(x+3)^7} \right| + C; \quad 4) \frac{3}{11} \ln|3x+1| + \frac{2}{33} \ln|2x-3| - \frac{1}{3} \ln|x| + C;$$

$$5) \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + \ln \left| \frac{x^2(x-2)^5}{(x+2)^3} \right| + C$$

II. Maxraj haqiqiy ildizlarga ega va ulardan ba'zilar karrali bo'lgan hhhhol.

$$1) \int \frac{(x^2-3x+2)dx}{x(x^2+2x+1)}; \quad 2) \int \frac{(x+2)^2 \cdot dx}{x-1}; \quad 3) \int \frac{x^3-6x^2+11x-5}{(x-2)^4} dx; \quad 4) \int \frac{x^2 dx}{(x+2)^2 \cdot (x+4)^3}$$

$$5) \int \frac{x^5 dx}{(x-1)^2 \cdot (x^2-1)^3}; \quad 6) \int \frac{3x^2+1}{(x^2-1)^3} dx.$$

$$\text{Javob: } 1) \ln \left| \frac{x^2}{x+1} \right| + \frac{6}{x+1} + C; \quad 2) 4 \ln|x| - 3 \ln|x-1| - \frac{9}{x-1} + C;$$

$$3) C - \frac{1}{3(x-2)^3} + \frac{1}{2(x-2)^2} + \ln|x-2|; \quad 4) 2 \ln \left| \frac{x+4}{x+2} \right| - \frac{5x+12}{x^2+6x+8} + C;$$

$$5) \frac{(x+2)^2}{2} - \frac{1}{4(x-1)^2} - \frac{9}{4(x-1)} + \frac{31}{8} \ln|x-1| + \frac{1}{8} \ln|x+1| + C;$$

$$6) C - \frac{1}{(x^2-1)^2}$$

III. Maxraj takrorlanmaydigan kompleks ildizlarga ega bo'lgan hol.

$$1) \int \frac{dx}{x(x^2+1)}; \quad 2) \int \frac{dx}{1+x^3}; \quad 3) \int \frac{x dx}{x^3-1}; \quad 4) \int \frac{x^2 dx}{1-x^4};$$

$$5) \int \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+x)}; \quad 6) \int \frac{x^3-6}{x^4+6x^2+8} dx$$

$$\text{Javob: } 1) \ln \frac{|x|}{\sqrt{x^2+1}} + C; \quad 2) \frac{1}{6} \ln \frac{(x+1)^2}{x^2-x+1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C;$$

$$3) \ln \frac{|x-1|}{\sqrt{x^2+x+1}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C; \quad 4) \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C;$$

$$5) \ln \frac{x^4}{(x+1)^2(x^2+1)} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C; \quad 6) \ln \frac{x^2+4}{\sqrt{x^2+2}} + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} -$$

$$\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x\sqrt{2}}{2} + C.$$

IV. Maxraj takrorlanmaydigan kompleks ildizlarga ega bo'lgan hol.

$$1) \int \frac{x^3+x-1}{(x+2)^2} dx; \quad 2) \int \frac{dx}{x(4+x^2)^2(1+x^2)}; \quad 3) \int \frac{dx}{(x^2+9)^3};$$

$$4) \int \frac{dx}{(1+x^2)^4}; \quad 5) \int \frac{2x dx}{(1+x)(1+x^2)^2}; \quad 6) \int \frac{(5x^2-12)dx}{(x^2-6x+13)^2}$$

$$\text{Javob: } 1) \frac{2-x}{4(x^2+2)} + \frac{\ln(x^2+2)}{2} - \frac{1}{4\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} + C;$$

$$2) \frac{1}{16} \ln|x| - \frac{1}{18} \ln(x^2+1) + \frac{7}{288} \ln(x^2+4) - \frac{1}{24(x^2+2)} + C;$$

$$3) \frac{x}{216(x^2+9)} + \frac{x}{36(x^2+9)^2} + \frac{1}{648} \operatorname{arctg} \frac{x}{3} + C;$$

$$4) \frac{15x^5+40x^3+33x}{48(1+x^2)^3} + \frac{15}{48} \operatorname{arctg} x + C$$

$$5) \frac{x-1}{2(x^2+2)} - \frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{1}{14} \ln(1+x^2) + C;$$

$$6) \frac{13x-159}{8(x^2-6x+13)} + \frac{53}{16} \operatorname{arctg} \frac{x-3}{2} + C.$$

§5. Irratsional funksiyalarni integrallash

Agar $y=f(x)$ funksiya x argumentning kasr ko'rsatkichli darajalari ishtirok etgan algebraik ifodadan iborat bo'lsa, u irratsional funksiya deb ataladi. Masalan:

$$y = \sqrt[3]{x^6+x^3}+1, \quad y = 2x - 5\sqrt{x} + \sqrt[6]{x^5}, \quad y = \frac{1+\sqrt[4]{x}}{1+\sqrt{x}+x}$$

lar irratsional funksiyalardir.

Har qanday irratsional funksiyadan olingan aniqmas integral elementar funksiyalarda ifodalanmasligi mumkin.

$\int x^r(a+bx^s)^p dx$ integral binomial integral deb ataladi. Bu yerda r, s, p -ratsional va a, b -haqiqiy sonlardan iborat. Agar r, s, p sonlarning

uchalasi ham butun son bo'sa, unda integral ostida ratsional funksiya bo'ladi va bu holda, binomial integral elementar funksiyalarga ifodalanadi. Agar r, s, p sonlardan kamida bittasi butun son bo'lmasa, holda integral ostida irratsional funksiya hosil bo'ladi. Bunda binomial integral faqat quyidagi uch holda elementar funksiyalarda ifodalanishi mumkin.

1) p - butun son. Bu holda, $t = \sqrt[m]{x}$, $x = t^m$ almashtirish qilinadi. Bu yerda m integral ostidagi r va s sonlarining umumiy maxraji. Agar $r = \frac{k}{m}$, $s = \frac{q}{m}$ deb olsak, unda $x^r = t^k$, $x^s = t^q$, $dx = mt^{m-1}dt$ bo'ladi va binomial integral

$m \int t^{k+m-1}(a+bt^q)^p dt$ ko'rinishni olib, ratsional funksiyadan olingan integralga keladi.

2) $n = \frac{r+1}{s}$ - butun son. Bu holda $p = \frac{k}{m}$ bo'lsa, unda $a+bx^s = t^k$ almashtirishdan foydalaniladi. Bunda $(a+bx^s)^p = t^k$, $x^r = (\frac{t^m-a}{b})^{\frac{r}{s}}$, $dx = \frac{m}{bs} \cdot (\frac{t^m-a}{b})^{\frac{r}{s}-1} \cdot t^{m-1}dt$ bo'lib, binomial integral quyidagi ratsional kasrli integralga keladi:

$$\int x^r (a+bx^s)^p dx = \frac{m}{b^{\frac{r}{s}+1}} \int (t^m-a)^{n-1} \cdot t^{k+m-1} dt \text{ Ta'rif.}$$

3) $n = p + \frac{r+1}{s}$ - butun son. Bu holda $p = \frac{k}{m}$ bo'sa, unda $ax^{-s}+b=t^k$ almashtirish qilinadi. Bunda

$$(a+bx^s)^p = x^{ps}(ax^{-s}+b)^p = (\frac{a}{t^{m-b}})^p \cdot t^k, \quad x^r = (\frac{a}{t^{m-b}})^{\frac{r}{s}}$$

$dx = -\frac{ma}{s} (\frac{a}{t^{m-b}})^{\frac{r}{s}-1} \cdot \frac{t^{m-1}}{(t^{m-b})^2} dt$ bo'ladi va binomial integral quyidagi ratsional kasrli integralga keladi:

$$\int x^r (a+bx^s)^p dx = -\frac{ma^n}{s} \int \frac{t^{k+m-1}}{(t^{m-b})^{n-1}} dt.$$

Navbatda $\int R(x, x^{\frac{m}{n}}, \dots, x^{\frac{r}{s}}) dx$ integralni qaraymiz. Aytaylik, k soni $\frac{m}{n}, \dots, \frac{r}{s}$ kasrlarning umumiy mahraji bo'lsin. $x = t^k$, $dx = kt^{k-1}dt$ almashtirish qilamiz. U holda, har bir kasr ko'rsatkichli daraja butun

ko'rsatkichli darajaga almashadi va natijada, integral ostidagi funksiya t ning ratsional funksiyasidan iborat bo'ladi. Endi

$$\int R \left[x, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{m}{n}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{r}{s}} \right] dx$$

ko'rinishdagi integralni qaraymiz. Bu integral

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^k$$

almashtirish bilan ratsional funksiyani integrallashga keltiriladi. Bu yerda t soni $\frac{m}{n}, \dots, \frac{r}{s}$ kasrlarning umumiy maxraji.

Ba'zi hollarda $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$ ko'rinishdagi aniqmas integrallar ham uchraydi. Bunday integral Eyler almashtirishlari deb ataluvchi quyidagi almashtirishlar yordamida ratsional funksiyani integrallashga keltiriladi.

I. Eylerning birinchi almashtirishi. Agar $a > 0$ bo'lsa,

$\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm \sqrt{a}x + t$ almashtirish qilamiz. U holda,

$ax^2+bx+c = ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2$ bo'ladi. Bundan x ni t ning ratsional funksiyasi sifatida aniqlaymiz.

$$x = \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t}$$

Bu yerda dx ham t ning ratsional funksiyasidan iborat bo'ladi. Shunday qilib, $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm \sqrt{a}x + t = \sqrt{a} \cdot \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} + t$ bo'lib u t ning ratsional funksiyasi bo'ladi.

II. Eylerning ikkinchi almashtirishi. Agar $c > 0$ bo'lsa,

$\sqrt{ax^2+bx+c} = xt \pm \sqrt{c}$ almashtirish qilamiz. (aniqlik uchun $\sqrt{c}$ oldidagi $+$ ishorani olamiz). U holda $(\sqrt{ax^2+bx+c})^2 = (xt \pm \sqrt{c})^2$, $ax^2+bx+c = x^2t^2 + 2xt\sqrt{c} + c$. Bundan x ni t ning quyidagi ratsional funksiyasini aniqlaymiz.

$x = \frac{2\sqrt{c}t-b}{a-t^2}$. Shunday qilib, dx va $\sqrt{ax^2+bx+c}$ lar t orqali ratsional ifodalangani uchun x , dx va $\sqrt{ax^2+bx+c}$ larning t orqali ifodalangani berilgan integralga qo'yib t ga nisbatan ratsional funksiyaning integraliga kelimiz.

III. Eylerning uchinchi almashtirishi. Aytaylik α va β lar $ax^2 + bx + c$ uchxadning haqiqiy ildizlari bo'lsin.

$\sqrt{ax^2 + bx + c} = (x - \alpha)t$ deb olamiz. U holda, $ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta)$ bo'lgani uchun $\sqrt{a(x - \alpha)(x - \beta)} = (x - \alpha)t$, $a(x - \alpha)(x - \beta) = (x - \alpha)^2 t^2$, $a(x - \beta) = (x - \alpha)t^2$ bo'ladi. Bundan esa $x = \frac{a\beta - \alpha t^2}{a - t^2}$ ni hosil qilamiz. x , dx va $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ lar t ning ratsional funksiyasi bo'lganligi uchun, berilgan integral t ning ratsional funksiyasini integralidan iborat bo'ladi.

Ba'zi bir irratsional funksiyalarni trigonometrik almashtirishlar yordamida ham hisoblash mumkin.

$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ integralni qaraymiz. Bu yerda $a \neq 0$ va $c - \frac{b^2}{4a} \neq 0$ deb olamiz.

Ildiz ostidagi uchxadning ko'rinishini o'zgartiramiz.

$ax^2 + bx + c = a(x + \frac{b}{2a})^2 + (c - \frac{b^2}{4a})$, $x + \frac{b}{2a} = t$ deb olsak, $dx = dt$

bo'ladi va $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{at^2 + (c - \frac{b^2}{4a})}$ tenglik hosil bo'ladi. Bu yerda a ni va $c - \frac{b^2}{4a}$ larni qiymatlari turlicha bo'lishi mumkin. Ularning qiymatlariga qarab, ba'zi bir belgilashlardan so'ng berilgan integral quyidagi integrallardan biriga keltiriladi.

I. $\int R(t, \sqrt{m^2 t^2 + n^2}) dt$,

II. $\int R(t, \sqrt{m^2 t^2 - n^2}) dt$,

III. $\int R(t, \sqrt{n^2 - m^2 t^2}) dt$.

Bunda I integral $t = \frac{n}{m} \operatorname{tg} z$ almashtirish orqali, II integral $t = \frac{n}{m} \operatorname{sech}$ almashtirish orqali, III integral $t = \frac{n}{m} \sin t$ almashtirish orqali $\int R(\sin x, \cos x) dx$ integralni hisoblashga keltiriladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $\int \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})^2}$ integral hisoblansin.

Yechish: Bu integral parametrlari $r=-1$, $s=\frac{1}{3}$ va $p=-2$ bo'lgan binomial

integral bo'lib, uni $t=\sqrt[3]{x}$, $x=t^3$ almashtirish yordamida hisoblaymiz: bunda $dx = 3t^2 dt$ bo'ladi.

$$\int \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})^2} = \int \frac{3t^2 dt}{t^3(1+t)^2} = 3 \int \frac{dt}{t^2(1+t)^2} = 3 \left[\int \frac{dt}{t^2} - \int \frac{dt}{t(1+t)} \right] = 3 \left[-\ln|t| - \ln|t+1| + \frac{1}{t+1} \right] + c = 3 \ln \left| \frac{\sqrt[3]{x}}{1+\sqrt[3]{x}} \right| + \frac{3}{1+\sqrt[3]{x}} + c.$$

2. $\int \frac{dx}{\sqrt{x+2}\sqrt{x}}$ integral hisoblansin.

Yechish: Bu yerda x o'zgaruvchining daraja ko'rsatkichlari $\frac{1}{2}$ va $\frac{1}{3}$ bo'lgani uchun $x = t^6$, $dx = 6t^5 dt$ almashtirish qilamiz ($t = \sqrt[6]{x}$).

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x+2}\sqrt{x}} = \int \frac{6t^5 dt}{t^3 \sqrt{t^6+2}} = 6 \int \frac{t^2 dt}{t^2(t^3+2)} = 6 \int \frac{t^2+1-1}{t^2(t^3+2)} dx = 6 \int \frac{t^2+1}{t^2(t^3+2)} dt - 6 \int \frac{dt}{t^2(t^3+2)} = 2t^3 - 3t^2 + 6t - 6 \ln|t+1| + c = 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \ln|\sqrt[6]{x}+1| + c.$$

3. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x-\sqrt{1-2x}}}$ integral hisoblansin.

Yechish: Bu yerda $a=-2$, $b=1$, $c=0$, $d=1$, $\frac{m}{n} = \frac{1}{2}$, $\frac{r}{s} = \frac{1}{4}$. $1-2x = t^4$ almashtirish qilamiz. U holda, undan $x = \frac{1}{2}(1-t^4)$ va $dx = -2t^3 dt$ kelib chiqadi. Shunday qilib,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x-\sqrt{1-2x}}} = \int \frac{-2t^3 dt}{t^2-t} = -2 \int \frac{t^3 dt}{t(t-1)} = -2 \int \frac{t^2 dt}{t-1} = -2 \int \frac{t^2-1+1}{t-1} dt = -2 \int \frac{t^2-1}{t-1} dt - 2 \int \frac{dt}{t-1} = -2 \int (t+1) dt - 2 \ln|t-1| + c = -\sqrt{1-2x} - 2\sqrt[4]{1-2x} - 2 \ln|\sqrt[4]{1-2x}-1| + c.$$

4. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+4x-4}}$ integral hisoblansin.

Yechish: Bu yerda $a = 1 > 0$ bo'lgani uchun $\sqrt{x^2+4x-4} = x-t$ almashtirish qilamiz. Bu holda

$$x^2+4x-4 = x^2-2xt+t^2, \quad x = \frac{t^2+4}{2(t+2)}, \quad dx = \frac{t^2+4t-4}{2(t+2)^2},$$

$$\sqrt{x^2+4x-4} = x-t, \quad \sqrt{x^2+4x-4} = \frac{t^2+4}{2(t+2)} - t = \frac{4-4t-t^2}{2(t+2)}. \quad \text{Hosil}$$

bo'lgan tengliklarni berilgan integralga qo'yib quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+4x-4}} = \int \frac{\frac{t^2+4t-4}{2(t+2)^2}}{\frac{t^2+4}{2(t+2)} \cdot \frac{4-4t-t^2}{2(t+2)}} = -2 \int \frac{dt}{t^2+4} = -2 \cdot \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C =$$

$$= -\operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C = -\operatorname{arctg} \left(\frac{x-\sqrt{x^2+4x-4}}{2} \right) + C.$$

5. $\int \frac{(1-\sqrt{1+x+x^2})^2}{x^2\sqrt{1+x+x^2}} dx$ integral hisoblansin.

Yechish $\sqrt{1+x+x^2} = xt+1$ almashtirish qilamiz: U holda $1+x+x^2 = x^2t^2+2xt+1$ bo'lib, undan $x = \frac{2t-1}{1-t^2}$ va $dx = \frac{2t-2t-1}{(1-t^2)^2} dt$ larni hosil qilamiz. $\sqrt{1+x+x^2}$ ni t orqali ifodasini topish uchun x ning t orqali ifodasini $\sqrt{1+x+x^2} = xt+1$ tenglikka qo'yamiz. Demak, $\sqrt{1+x+x^2} = \frac{2t-1}{1-t^2} \cdot t + 1 = \frac{2t^2-t}{1-t^2} + 1 = \frac{2t^2-t+1-t^2}{1-t^2} = \frac{t^2-t+1}{1-t^2}$.

x , dx va $\sqrt{1+x+x^2}$ larni t orqali ifodalarini berilgan integralga qo'yamiz va soddalashtiramiz.

$$\int \frac{(1-\sqrt{1+x+x^2})^2}{x^2\sqrt{1+x+x^2}} dx = 2 \int \frac{t^2}{1-t^2} dt = -2 \int \frac{1-t^2-1}{1-t^2} dt = -2 \int \left(1 - \frac{1}{1-t^2}\right) dt =$$

$$= -2t + 2 \int \frac{dt}{1-t^2} = -2t + 2 \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C = -2t + \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C =$$

$$= -\frac{2(\sqrt{1+x+x^2}-1)}{x} + \ln \left| \frac{x+\sqrt{1+x+x^2}-1}{x-\sqrt{1+x+x^2}-1} \right| + C.$$

6. $\int \frac{dx}{x\sqrt{2+x-x^2}}$ integral hisoblansin.

Yechish: Bu yerda $2+x-x^2$ kvadrat uchhad $\alpha = -1$ va $\beta = 2$ haqiqiy ildizlarga ega va uni $2+x-x^2 = (x+1)(2-x)$ ko'rinishda yozish mumkin. Shuning uchun Eylerning uchinchi almashtirishidan foydalanamiz va undan quyidagi tengliklarga ega bo'lamiz:

$$\sqrt{2+x-x^2} = t(x+1), \quad \sqrt{(x+1)(2-x)} = t(x+1),$$

$$2-x = t^2(x+1), \quad x = \frac{2-t^2}{t^2+1}, \quad dx = \left(\frac{2-t^2}{t^2+1} \right)' dt = -\frac{6tdt}{(t^2+1)^2}.$$

Bundan tashqari $\sqrt{2+x-x^2} = t \left(\frac{2-t^2}{t^2+1} + 1 \right) = \frac{3t}{t^2+1}$ ekanligidan foydalanib, yuqoridagi integralni quyidagicha yozamiz va hisoblaymiz.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2+x-x^2}} = -6 \int \frac{tdt}{\frac{2-t^2}{t^2+1} \cdot \frac{3t}{t^2+1} (t^2+1)^2} =$$

$$= -2 \int \frac{dt}{2-t^2} = -2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}+t}{\sqrt{2}-t} \right| + C =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{(\sqrt{2}+t)^2}{2-t^2} \right| + C = -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{t^2+2\sqrt{2}t+2}{2-t^2} \right| + C =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2+x-x^2} + x - x^2 + x + 4}{3x} \right| + C.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Quyidagi integrallar hisoblansin.

- 1) $\int \sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})^4 dx$; 2) $\int x^{-1}(1+x^{\frac{1}{3}})^{-3} dx$;
- 3) $\int x^{5/3} \sqrt{(1+x^3)^2} dx$; 4) $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{1+x^3}}$.

Javoblar:

- 1) $\frac{2}{11} x\sqrt{x} + \frac{24}{11} x^{\frac{6}{5}} \sqrt{x^5} + \frac{36}{13} x^{\frac{6}{5}} \sqrt{x} + \frac{8}{5} x^2 \sqrt{x} + \frac{6}{17} x^2 \sqrt[5]{x^5} + C$;
- 2) $3 \left[\ln \left| \frac{\sqrt[3]{x}}{1+\sqrt[3]{x}} \right| + \frac{2 \cdot \sqrt[3]{x}+3}{2 \cdot (1+\sqrt[3]{x})^2} \right] + C$;
- 3) $\frac{1}{10} \sqrt{1+x^3}^5 - \frac{1}{5} \sqrt{(1+x^3)^5} + C$;
- 4) $\frac{1}{6} \ln \frac{u^2+u+1}{(u+1)^2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2u+1}{\sqrt{3}} + C$, bu yerda $u = \frac{\sqrt[3]{x^2}+1}{x}$.

2. Quyidagi integrallar hisoblansin.

- 1) $\int \frac{dx}{x(\sqrt{x}+\sqrt[5]{x^2})}$; 2) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}+2\sqrt[4]{x}}$;
- 3) $\int \frac{x dx}{(x+1)^{\frac{1}{2}}+(x+1)^{\frac{1}{3}}}$; 4) $\int \frac{x^2+\sqrt{1+x}}{\sqrt[3]{1+x}} dx$.

Javoblar:

- 1) $\ln \frac{x}{(1+\sqrt[5]{x})^{10}} + \frac{10}{10\sqrt{x}} - \frac{5}{5\sqrt{x}} + \frac{10}{3\sqrt[10]{x^3}} - \frac{5}{2\sqrt[10]{x^2}} + C$;
- 2) $2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} - 8\sqrt[4]{x} + 6\sqrt{x} + 48\sqrt[12]{x} + 3 \ln(1+\sqrt[12]{x}) +$
 $+\frac{33}{2} \ln(\sqrt[6]{x} - \sqrt[12]{x} + 2) - \frac{171}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2\sqrt[12]{x}-1}{\sqrt{7}} + C$;

$$3) 6\left[\frac{1}{9}(x+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{9}(x+1)^3 + \frac{1}{7}(x+1)^{\frac{7}{6}} - \frac{1}{6}(x+1) + \frac{1}{5}(x+1)^{\frac{5}{6}} - \frac{1}{4}(x+1)^{\frac{2}{3}}\right] + C;$$

$$4) 6\sqrt[3]{(1+x)^2} \left[\frac{(1+x)^2}{16} - \frac{(1+x)}{5} + \frac{\sqrt{(1+x)}}{7} + \frac{1}{4} \right] + C.$$

3. Quyidagi integrallar hisoblansin.

$$1) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+x+1}}; \quad 2) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+4x-4}};$$

$$3) \int \sqrt{x^2-2x-1} dx; \quad 4) \int \frac{dx}{x\sqrt{2+x-x^2}};$$

Javoblar:

$$1) \ln \frac{|cx|}{2+x+2\sqrt{x^2+x+1}}; \quad 2) \frac{1}{2} \arccos \frac{2-x}{x\sqrt{2}};$$

$$3) \frac{1}{2}(x-1)\sqrt{x^2-2x-1} - \ln|x-1+\sqrt{x^2-2x-1}| + C;$$

$$4) C - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2+x-x^2} + \sqrt{2}}{x} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right|.$$

§ 6. Trigonometrik funksiyalarni integrallash

Trigonometrik funksiyalar qatnashgan integrallar quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin:

$$I. \int \sin mx \cdot \cos nx dx; \quad \int \cos mx \cdot \cos nx dx; \quad \int \sin mx \cdot \sin nx dx$$

Bu yerda m va n lar haqiqiy sonlar

$$II. \int \sin^m x \cdot \cos^n x dx;$$

$$III. \int \sin^{2n} x dx; \quad \int \cos^{2n} x dx; \quad n > 0, n \in \mathbb{Z}$$

$$IV. \int \sin^{2m} x \cdot \cos^{2n} x dx; \quad m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}, m > 0, n > 0$$

$$V. \int R(\sin x) \cos x dx; \quad \int R(\cos x) \sin x dx;$$

$$VI. \int R(\sin x, \cos x) dx;$$

Bu integrallarning har biriga alohida-alohida to'xtalamiz.

$$I. \int \sin mx \cdot \cos nx dx; \quad \int \cos mx \cdot \cos nx dx; \quad \int \sin mx \cdot \sin nx dx$$

ko'rinishdagi integrallar trigonometrik funksiyalar ko'paytmasini yig'indiga almashtirish formulalari yordamida integrallanadi.

$$\text{Ular: } \sin mx \cdot \cos nx = \frac{1}{2} [\sin(m+n)x + \sin(m-n)x];$$

$$\cos mx \cdot \cos nx = \frac{1}{2} [\cos(m+n)x + \cos(m-n)x];$$

$$\sin mx \cdot \sin nx = \frac{1}{2} [\cos(m-n)x - \cos(m+n)x].$$

II. $\int \sin^m x \cdot \cos^n x dx$ ko'rinishdagi integrallarda quyidagicha bo'lishi mumkin:

1-hol. Sinusning daraja ko'rsatkichi m toq musbat son, ya'ni $m=2k+1$.

Bu holda integral ostidagi ifoda quyidagicha o'zgartiriladi.

$$\sin^m x = \sin^{2k+1} x = \sin^{2k} x \cdot \sin x = (\sin^2 x)^k \cdot \sin x =$$

$$= (1 - \cos^2 x)^k \cdot \sin x \text{ bo'lganligi uchun integral ostidagi ifoda}$$

$$\sin^m x \cdot \cos^n x dx = (1 - \cos^2 x)^k \cdot \cos^n x \cdot \sin x dx \text{ ko'rinishga keladi.}$$

Agar bu yerda $\cos x = t$ deb olsak, u holda $\sin x dx = -dt$ bo'lib, integral ostidagi ifoda $(1 - \cos^2 x)^k \cdot \cos^n x \cdot \sin x dx = -(1 - t^2)^k \cdot t^n dt$ ko'rinishga keladi va integral darajali funksiyalar yig'indisini integrallashdan iborat bo'ladi.

2-hol. Kosinusning daraja ko'rsatkichi n toq manfiy son, ya'ni $n=2k+1$ bo'lsin. U holda

$$\cos^n x = \cos^{2k+1} x = \cos^{2k} x \cdot \cos x = (\cos^2 x)^k \cdot \cos x =$$

$$= (1 - \sin^2 x)^k \cdot \cos x$$

bo'lib, integral ostidagi ifoda

$$\sin^m x \cdot \cos^n x dx = \sin^m x (1 - \sin^2 x)^k \cdot \cos x dx$$

ko'rinishga keladi. Agar $\sin x = t$ deb olsak, u holda $\cos x dx = dt$ bo'ladi va berilgan integral $\int t^m (1 - t^2)^k dt$ ko'rinishga kelib, u yana darajali funksiyalar yig'indisining integralidan iborat bo'ladi.

3-hol. Sinus va kosinuslar daraja ko'rsatkichlari yig'indisi $m+n$ juft manfiy son, ya'ni

$$m+n = -2k \quad (k > 0, k \in \mathbb{Z})$$

Bu holda integral ostidagi ifoda ikki xil ko'rinishga ega bo'ladi:

1) Integral ostidagi funksiya kasr bo'lib, uning surati sinusning darajasidan, maxraji esa kosinusning darajasidan yoki aksincha bo'lib, ularning daraja ko'rsatkichlari bir vaqtda juft yoki toq.

$m+n$ manfiy bo'lganligidan maxrajning daraja ko'rsatkichi suratning daraja ko'rsatkichidan katta ekanligi kelib chiqadi.

2) Integral ostidagi funksiya surati o'zgaras sonidan, maxraji esa daraja ko'rsatkichlari bir xil (juft yoki toq) bo'lgan sinus va kosinusning ko'paytmasidan iborat.

Qaralayotgan holda ($m+n = -2k$) $tg x = t$ yoki $ctgx = t$ almashtirish yordamida berilgan integral ko'phad yoki yangi o'zgaruvchi t ning butun manfiy ko'rsatkichli daraja yig'indisini integralidan iborat bo'ladi. $tg x = t$ almashtirish qilinganda

$$\sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, dx = \frac{dt}{1+t^2}$$

hosil bo'lishini, agar $ctgx = t$ almashtirish qilinsa

$$\sin x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \cos x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, dx = -\frac{dt}{1+t^2}$$

lar hosil bo'lishini nazarda tutamiz.

4-hol. Sinus va kosinuslar daraja ko'rsatkichlari yig'indisi $m+n$ nolga teng. Bunda m va n lar butun sonlar deb qaraladi.

Bu holda, integral ostidagi ifoda

$$\frac{\sin^m x}{\cos^n x} dx \text{ yoki } \frac{\cos^n x}{\sin^m x} dx$$

ko'rinishda bo'ladi. Agar $m > 0$ bo'lsa, berilgan integral $\int tg^m x dx$ ko'rinishga, agar $n > 0$ bo'lsa $\int ctg^n x dx$ ko'rinishga keladi. Bu integrallarning birinchisini $tg x = t$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$ almashtirish bilan, ikkinchisini esa $ctg x = t$, $dx = -\frac{dt}{1+t^2}$ almashtirish bilan hisoblanadi.

III. $\int \sin^{2n} x dx$; $\int \cos^{2n} x dx$ (n butun musbat son) ko'rinishidagi integrallar $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ va $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ formulalar yordamida soddaroq integrallarga keltiriladi va hisoblanadi.

IV. $\int \sin^{2m} x \cdot \cos^{2n} x dx$ (m va n lar butun musbat sonlar) ko'rinishdagi integrallarni hisoblashda ham $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ va $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ formulalaridan foydalaniladi. Ba'zi hollarda bu formulalar bir necha marta qo'llanilishi mumkin.

V. $\int R(\sin x, \cos x) dx$ integral sinus va cosinusning ratsional funksiya integralidan iborat bo'lib, u universal almashtirish deb ataluvchi

$$tg \frac{x}{2} = t \quad (-\pi < x < \pi)$$

almashtirish yordamida integrallanadi. Bunda biz har qanday trigonometrik funksiya $tg \frac{x}{2}$ orqali ratsional ifodalanishini nazarda tutamiz. Ya'ni

$$\sin x = \frac{2tg \frac{x}{2}}{1 + tg^2 \frac{x}{2}}; \quad \cos x = \frac{1 - tg^2 \frac{x}{2}}{1 + tg^2 \frac{x}{2}}$$

bo'lib, universal almashtirish natijasida

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}; \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}; \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

bo'lishiga ishonch hosil qilamiz.

VI. $\int R(\sin x) \cos x dx$ integral $\sin x = t$, $\cos x dx = dt$ almashtirish yordamida $\int R(t) dt$ integralga keltiriladi. $\int R(\cos x) \sin x dx$ integral esa $\cos x = t$, $\sin x dx = -dt$ almashtirish yordamida $-\int R(t) dt$ integralga keltiriladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $\int \sin 6x \cos 7x dx$ integral hisoblansin.

Yechish: Berilgan integralni hisoblash uchun $\sin 6x \cos 7x$ ko'paytmani yig'indi bilan almashtiramiz.

$$\int \sin 6x \cos 7x dx = \frac{1}{2} \int [\sin(6x+7x) + \sin(6x-7x)] dx = \frac{1}{2} \int (\sin 13x - \sin x) dx = \frac{1}{2} \int \sin 13x dx - \frac{1}{2} \int \sin x dx =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{\cos 13x}{13} + \cos x \right) + C = -\frac{\cos 13x}{26} + \frac{1}{2} \cos x + C.$$

2. $\int \cos 3x \cdot \cos 9x dx$ integral hisoblansin.

Yechish: Berilgan integralni hisoblash uchun $\cos 3x \cdot \cos 9x$ ni yig'indi bilan almashtiramiz.

$$\int \cos 3x \cdot \cos 9x dx = \frac{1}{2} \int [\cos(3x+9x) + \cos(3x-9x)] dx = \frac{1}{2} \int (\cos 12x + \cos 6x) dx = \frac{1}{24} \sin 12x + \frac{1}{12} \sin 6x + C.$$

3. $\int \sin 2x \cdot \sin 5x \, dx$ integral hisoblansin.

Yechish: Berilgan integralni hisoblash uchun $\sin 2x \cdot \sin 5x$ ni yig'indiga aymashtiramiz.

$$\begin{aligned} \int \sin 2x \cdot \sin 5x \, dx &= \frac{1}{2} \int [\cos(-3x) - \cos 7x] \, dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \cos 3x \, dx - \frac{1}{2} \int \cos 7x \, dx = \frac{1}{6} \sin 3x - \frac{1}{14} \sin 7x + C. \end{aligned}$$

4. $\int \sin^7 x \, dx$ integral hisoblansin.

Yechish:

$$\begin{aligned} \sin^7 x &= \sin^6 x \cdot \sin x = (\sin^2 x)^3 \cdot \sin x = (1 - \cos^2 x)^3 \cdot \sin x \\ \text{bo'lganligi} \quad \text{uchun} \quad \int \sin^7 x \, dx &= \int (1 - \cos^2 x)^3 \cdot \sin x \, dx = \\ &= \{ \cos x = t, \sin x \, dx = -dt \} = \int (1 - t^2)^3 (-dt) = - \int (1 - t^2)^3 (dt) = \\ &= - \int (1 - 3t^2 + 3t^4 - t^6) \, dt = -t + t^3 - \frac{3t^5}{5} + \frac{t^7}{7} + C = \\ &= -\cos x + \cos^3 x - \frac{3\cos^5 x}{5} + \frac{\cos^7 x}{7} + C. \end{aligned}$$

5. $\int \sin^4 x \cdot \cos^3 x \, dx$ integral hisoblansin.

Yechish: $\sin^4 x \cdot \cos^3 x = \sin^4 x \cdot \cos^2 x \cdot \cos x =$

$$= \sin^4 x (1 - \sin^2 x) \cos x = (\sin^4 x - \sin^6 x) \cdot \cos x \quad \text{bo'lgani uchun}$$

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x \cos^3 x \, dx &= \int (\sin^4 x - \sin^6 x) \cos x \, dx = \left\{ \begin{array}{l} \sin x = t \\ \cos x \, dx = dt \end{array} \right\} = \\ &= \int (t^4 - t^6) \, dt = \int t^4 \, dt - \int t^6 \, dt = \frac{t^5}{5} - \frac{t^7}{7} + C = \\ &= \frac{\sin^5 x}{5} - \frac{\sin^7 x}{7} + C. \end{aligned}$$

6. $\int \cos^2 x \sin^5 x \, dx$ integral hisoblansin.

Yechish: $\cos^2 x \sin^5 x = \cos^2 x \sin^4 x \sin x =$

$$= \cos^2 x (1 - \cos^2 x)^2 \sin x = (\cos^2 x - 2\cos^4 x + \cos^6 x) \sin x \quad \text{bo'lgani uchun}$$

$$\int \cos^2 x \sin^5 x \, dx = \int (\cos^2 x - 2\cos^4 x + \cos^6 x) \sin x \, dx =$$

$$\begin{aligned} &= \left\{ \begin{array}{l} \cos x = t \\ \sin x \, dx = -dt \end{array} \right\} = \int (t^2 - 2t^4 + t^6) (-dt) = - \int t^2 \, dt + 2 \int t^4 \, dt - \\ &- \int t^6 \, dt = -\frac{t^3}{3} + \frac{2t^5}{5} - \frac{t^7}{7} + C = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{2\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^7 x}{7} + C. \end{aligned}$$

7. $\int \frac{\sin^4 x}{\cos^8 x} \, dx$ integral hisoblansin.

Yechish: Bu yerda $m = 4$; $n = -8$; $m + n = -4$ juft manfiy son.

$tgx = t$ almashtirish qilamiz. U holda, $x = \arctgt$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$;

$$\sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}; \quad \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}.$$

Bularni berilgan integralga qo'yamiz:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin^4 x}{\cos^8 x} \, dx &= \int \frac{t^4}{\frac{1}{(1+t^2)^4}} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int t^4 (1+t^2) \, dt = \\ &= \int (t^4 + t^6) \, dt = \frac{t^5}{5} + \frac{t^7}{7} + C = \frac{tg^5 x}{5} + \frac{tg^7 x}{7} + C. \end{aligned}$$

8. $\int tg^8 x \, dx$ integral hisoblansin.

Yechish: $tgx = t$, $x = \arctgt$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$ almashtirish qilamiz. U

holda

$$\begin{aligned} \int tg^8 x \, dx &= \int t^8 \frac{dt}{1+t^2} = \int \frac{t^8}{1+t^2} \, dt = \int \frac{t^8 - 1 + 1}{1+t^2} \, dt = \\ &= \int \left(t^6 - t^4 + t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2} \right) \, dt = \frac{t^7}{7} - \frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3} - t + \\ &+ \arctgt + C = \frac{tg^7 x}{7} - \frac{tg^5 x}{5} + \frac{tg^3 x}{3} - tgx + \arctg(tgx) + C = \\ &= \frac{tg^7 x}{7} - \frac{tg^5 x}{5} + \frac{tg^3 x}{3} - tgx + x + C. \end{aligned}$$

9. $\int ctg^5 x \, dx$ integral hisoblansin.

Yechish: $ctgx = t$ almashtirish qilamiz. U holda $x = \text{arcc}tg t$ va

$dx = -\frac{dt}{1+t^2}$ bo'ladi. Bularni berilgan integralga qo'yamiz:

$$\int ctg^5 x \, dx = \int t^5 \left(-\frac{dt}{1+t^2} \right) = - \int \frac{t^5}{1+t^2} \, dt =$$

$$\begin{aligned}
&= -\int \left(t^3 - t + \frac{t}{1+t^2} \right) dt = -\frac{t^4}{4} + \frac{t^2}{2} - \frac{1}{2} \ln(t^2 + 1) + C = \\
&= -\frac{ctg^4 x}{4} + \frac{ctg^2 x}{2} - \frac{1}{2} \ln(1 + ctg^2 x) + C = \\
&= -\frac{ctg^4 x}{4} + \frac{ctg^2 x}{2} - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{\sin^2 x} + C = \\
&= -\frac{ctg^4 x}{4} + \frac{ctg^2 x}{2} - \ln|\sin x| + C.
\end{aligned}$$

10. $\int \cos^4 x dx$ integral hisoblansin.

$$\begin{aligned}
\text{Yechish: } \cos^4 x &= (\cos^2 x)^2 = \left[\frac{1}{2}(1 + \cos 2x) \right]^2 = \\
&= \frac{1}{4}(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x) = \frac{1}{4} \left(1 + 2\cos 2x + \frac{1}{2}(1 + \cos 4x) \right) = \\
&= \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\cos 4x = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x.
\end{aligned}$$

Shuning uchun

$$\begin{aligned}
\int \cos^4 x dx &= \int \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x \right) dx = \\
&= \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C.
\end{aligned}$$

11. $\int \sin^4 x \cos^2 x dx$ integral hisoblansin.

$$\begin{aligned}
\text{Yechish: } \sin^4 x \cos^2 x &= \sin^2 x \cdot \cos^2 x \cdot \sin^2 x = \\
&= (\sin x \cos x)^2 \sin^2 x = \left(\frac{1}{2}\sin 2x \right)^2 \sin^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x \sin^2 x = \\
&= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}(1 - \cos 4x) \cdot \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) = \frac{1}{16}(1 - \cos 4x)(1 - \cos 2x) = \\
&= \frac{1}{16}(1 - \cos 2x - \cos 4x + \cos 2x \cos 4x) = \\
&= \frac{1}{16} - \frac{1}{16}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 4x + \frac{1}{16}\cos 2x \cdot \cos 4x = \\
&= \frac{1}{16} - \frac{1}{16}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 4x + \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 2x) = \\
&= \frac{1}{16} - \frac{1}{16}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 4x + \frac{1}{32}\cos 6x + \frac{1}{32}\cos 2x =
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{16} - \frac{1}{32}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 4x + \frac{1}{32}\cos 6x.$$

Demak,

$$\begin{aligned}
\int \sin^4 x \cdot \cos^2 x dx &= \int \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{32}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 4x + \frac{1}{32}\cos 6x \right) dx = \\
&= \frac{1}{16}x - \frac{1}{64}\sin 2x - \frac{1}{64}\sin 4x + \frac{1}{192}\sin 6x + C.
\end{aligned}$$

12. $\int \frac{dx}{\sin^3 x}$ integral hisoblansin.

Yechish:

$$\text{10} \quad \frac{x}{2} = t, \quad \frac{x}{2} = \arctg t, \quad x = 2\arctg t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}.$$

Shuning uchun

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sin^3 x} &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\left(\frac{2t}{1+t^2} \right)^3} = \int \frac{2 \cdot (1+t^2)^3}{(2t)^3 \cdot (1+t^2)} dt = \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{(1+t^2)^2}{t^3} dt = \frac{1}{4} \int \frac{1+2t^2+t^4}{t^3} dt = \\
&= \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t^3} + \frac{2}{t} + t \right) dt = -\frac{1}{8t^2} + \frac{1}{2}\ln|t| + \frac{1}{8}t^2 + C = \\
&= -\frac{1}{8tg^2 \frac{x}{2}} + \frac{1}{2}\ln \left| tg \frac{x}{2} \right| + \frac{1}{8}tg^2 \frac{x}{2} + C = \\
&= -\frac{1}{8}ctg^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2}\ln \left| tg \frac{x}{2} \right| + \frac{1}{8}tg^2 \frac{x}{2} + C.
\end{aligned}$$

13. $\int \sin^4 x \cdot \cos x dx$ integral hisoblansin.

Yechish: Berilgan integral $\int R(\sin x) \cos x dx$ ko'rinishdagi integraldir. Uni hisoblash uchun $\sin x = t$ almashtirish qilamiz.

U holda $\cos x dx = dt$ bo'ladi. Shuning uchun,

$$\int \sin^4 x \cdot \cos x dx = \int t^4 \cdot dt = \frac{t^5}{5} + C = \frac{\sin^5 x}{5} + C.$$

14. $\int \cos^5 x \cdot \sin x dx$ integral hisoblansin.

Yechish: Bu integral $\int R(\cos x) \cdot \sin x dx$ ko'rinishdagi integraldir.

Uni hisoblash uchun $\cos x = t$ almashtirish qilamiz. U holda $\sin x dx = -dt$ bo'ladi. Shuning uchun

$$\int \cos^5 x \cdot \sin x dx = - \int t^5 \cdot dt = -\frac{t^6}{6} + C = -\frac{\cos^6 x}{6} + C.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Quyidagi integrallar hisoblansin:

$$1) \int \sin 2x \cdot \sin 5x dx; \quad 2) \int \sin 5x \cdot \sin \frac{x}{2} dx;$$

$$3) \int \sin \frac{3}{4}x \cdot \cos \frac{x}{4} dx; \quad 4) \int \sin 2x \cdot \cos 5x \cdot \sin 9x dx;$$

$$5) \int \sin x \cdot \cos 2x \cdot \cos 5x dx; \quad 6) \int \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 5x dx;$$

$$\text{Javob: } 1) \frac{1}{6} \sin 3x - \frac{1}{14} \sin 7x + C; \quad 2) -\frac{1}{11} \sin \frac{11x}{2} + \frac{1}{9} \sin \frac{9x}{2} + C;$$

$$3) -\cos \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cos x + C; \quad 4) \frac{1}{4} \left(\frac{\sin 12x}{12} - \frac{\sin 6x}{6} + \frac{\sin 2x}{2} - \frac{\sin 16x}{16} \right) + C;$$

$$5) -\frac{\cos 2x}{8} + \frac{\cos 4x}{16} - \frac{\cos 6x}{24} + C;$$

$$6) \frac{\sin 2x}{8} + \frac{\sin 4x}{16} + \frac{\sin 6x}{24} + \frac{\sin 8x}{32} + C;$$

2. Quyidagi integrallar hisoblansin:

$$1) \int \sin^3 x dx; \quad 2) \int \cos^5 x dx; \quad 3) \int \cos^9 x dx;$$

$$4) \int \sin^4 x \cdot \cos^7 x dx; \quad 5) \int \sin^7 x \cdot \cos^6 x dx; \quad 6) \int \sin^3 x \cdot \cos^2 x dx$$

$$\text{Javob: } 1) -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C; \quad 2) \sin x - \frac{2\sin^3 x}{3} + \frac{\sin^5 x}{5} + C;$$

$$3) \sin x - \frac{4}{3} \sin^3 x + \frac{6}{5} \sin^5 x - \frac{4}{7} \sin^7 x + \frac{1}{9} \sin^9 x + C;$$

$$4) \frac{\sin^5 x}{5} - \frac{3\sin^7 x}{7} + \frac{\sin^9 x}{9} - \frac{\sin^{11} x}{11} + C;$$

$$5) -\frac{\cos^7 x}{7} + \frac{\cos^9 x}{9} - \frac{3\cos^{11} x}{11} + \frac{\cos^{13} x}{13} + C; \quad 6) \frac{1}{5} \cos^5 x - \frac{1}{3} \cos^3 x + C.$$

3. Quyidagi integrallar hisoblansin:

$$1) \int \frac{\sin^5 x}{\cos^4 x} dx; \quad 2) \int \frac{\cos^7 x}{\sin^4 x} dx; \quad 3) \int \frac{\sin^3 x}{\cos^7 x} dx; \quad 4) \int \frac{\cos^3 x}{\sin^9 x} dx;$$

$$\text{Javob: } 1) -\cos x - \frac{2}{\cos x} + \frac{1}{3\cos^3 x} + C;$$

$$2) -\frac{1}{3\sin^3 x} + \frac{3}{\sin x} + 3 \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C.$$

$$3) \frac{tg^4 x}{4} + \frac{tg^6 x}{6} + C; \quad 4) -\left(\frac{ctg^4 x}{4} + \frac{ctg^6 x}{6} + \frac{ctg^8 x}{8} \right) + C;$$

4. Quyidagi integrallar hisoblansin:

$$1) \int tg^4 x dx; \quad 2) \int ctg^6 x dx; \quad 3) \int ctg^3 x dx; \quad 4) \int tg^7 x dx.$$

$$\text{Javob: } 1) \frac{tg^3 x}{3} - tg x + C; \quad 2) -\frac{1}{5} ctg^5 x + \frac{1}{3} ctg^3 x - ctg x - x + C;$$

$$3) -\frac{1}{2} ctg^2 x - \ln|\sin x| + C; \quad 4) \frac{1}{6} tg^6 x - \frac{1}{4} tg^4 x + \frac{1}{2} tg^2 x + \ln|\cos x| + C.$$

5. Quyidagi integrallar hisoblansin:

$$1) \int \sin^4 x dx; \quad 2) \int \cos^6 x dx; \quad 3) \int \sin^6 x dx; \quad 4) \int \sin^8 x dx.$$

$$\text{Javob: } 1) \frac{3x}{8} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C;$$

$$2) \frac{1}{8} \left(\frac{5}{2} x + 2 \sin 2x + \frac{3}{8} \sin 4x - \frac{1}{6} \sin^3 2x \right) + C;$$

$$3) \frac{1}{8} \left(\frac{5}{2} x - 2 \sin 2x + \frac{3}{8} \sin 4x + \frac{1}{6} \sin^3 2x \right) + C;$$

$$4) \frac{1}{128} \left(\frac{1}{8} \sin 8x - \frac{4}{3} \sin 6x + 7 \sin 4x - 28 \sin 2x \right) + \frac{35}{128} x + C.$$

6. Quyidagi integrallar hisoblansin:

$$1) \int \sin^2 x \cdot \cos^2 x dx; \quad 2) \int \sin^4 x \cdot \cos^4 x dx;$$

$$3) \int \sin^2 x \cdot \cos^4 x dx; \quad 4) \int \sin^4 x \cdot \cos^6 x dx.$$

$$\text{Javob: } 1) \frac{1}{8} x - \frac{1}{32} \sin 4x + C;$$

$$2) \frac{1}{128} \left(3x - \sin 4x + \frac{1}{8} \sin 8x \right) + C;$$

$$3) \frac{1}{64} \left(4x - \sin 4x + \sin 2x - \frac{1}{3} \sin 6x \right) + C;$$

$$4) \frac{1}{16} \left(\frac{3}{16} x - \frac{1}{16} \sin 4x + \frac{1}{128} \sin 8x + \frac{1}{20} \sin^5 2x \right) + C.$$

7. Quyidagi integrallarni hisoblang.

$$1) \int \frac{dx}{\cos^3 x}; \quad 2) \int \frac{dx}{\sin^5 x};$$

Javob: 1) $-\frac{1}{8}ctg^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2}\ln\left|tg\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right| + \frac{1}{8}tg^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) + C;$
 2) $\frac{1}{16}\left(-\frac{1}{4}ctg^4\frac{x}{2} - 2ctg^2\frac{x}{2} + 6\ln\left|tg\frac{x}{2}\right| + 2tg^2\frac{x}{2} + \frac{1}{4}tg^4\frac{x}{2}\right) + C.$

§7. Giperbolik funksiyalarni integrallash

Giperbolik funksiyalar e^x va e^{-x} lardan tuzilgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat edi.

$$\begin{aligned} shx &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}, & chx &= \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \\ thx &= \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, & cthx &= \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}. \end{aligned}$$

Bulardan quyidagi formulalarni osongina keltirib chiqarish mumkin:
 $ch^2x - sh^2x = 1, \quad ch2x = ch^2x + sh^2x, \quad sh2x = 2shx \cdot chx,$
 $sh^2x = \frac{1}{2}(ch2x - 1), \quad ch^2x = \frac{1}{2}(ch2x + 1).$

Giperbolik funksiyalarning hosilalari quyidagilardan iborat:

$$\begin{aligned} (shx)' &= chx, & (chx)' &= shx, \\ (thx)' &= \frac{1}{ch^2x}, & (cthx)' &= -\frac{1}{sh^2x}. \end{aligned}$$

Giperbolik funksiyalarning integrallarini ularning hosilalaridan foydalanib keltirib chiqarish mumkin.

$$\begin{aligned} \int shx dx &= chx + C, & \int chx dx &= shx + C, \\ \int \frac{dx}{sh^2x} &= -cthx + C, & \int \frac{dx}{ch^2x} &= thx + C. \end{aligned}$$

Ba'zan $\int R(x, \sqrt{a^2 - x^2}) dx$ va $\int R(x, \sqrt{x^2 + a^2}) dx$ ko'rinishdagi integrallarni hisoblashda mos ravishda $x = a \operatorname{cht}$ va $x = a \operatorname{asht}$ o'rniga qo'yishlardan foydalanish qulay bo'ladi. Bunda:

$$\begin{aligned} \text{agar } x &= a \operatorname{cht} \text{ bo'lsa, } t = \ln\left|\frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a}\right|, \\ \text{agar } x &= a \operatorname{asht} \text{ bo'lsa, } t = \ln\left|\frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{a}\right|. \end{aligned}$$

Bulardan tashqari quyidagicha o'rniga qo'yishdan ham foydalanish mumkin:

agar $x = tht$ bo'lsa, $t = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $\int sh^2x dx$ hisoblansin.

Yechish: $\int sh^2x dx = \frac{1}{2} \int (ch2x - 1) dx = \frac{1}{4} sh2x - \frac{1}{2} x + C.$

2. $\int sh^3x dx$ integral hisoblansin.

Yechish: $\int sh^3x dx = \int sh^2x (chx)' dx = \frac{1}{2} \int (ch^2x - 1) d(chx) =$
 $= \frac{1}{2} \int ch^2x \cdot d(chx) - \frac{1}{2} \int d(chx) = \frac{1}{6} ch^3x - \frac{1}{2} chx + C.$

3. $\int sh^4x dx$ integral hisoblansin.

Yechish: $\int ch^4x dx = \int (ch^2x)^2 = \frac{1}{4} \int (ch2x + 1)^2 dx =$
 $= \frac{1}{4} \int (ch^22x + 2ch2x + 1) dx = \frac{1}{4} \int ch^22x dx + \frac{1}{2} \int ch2x dx + \frac{1}{4} \int dx =$
 $= \frac{1}{4} \int \frac{1+ch4x}{2} dx + \frac{1}{4} sh2x + \frac{1}{4} x = \frac{1}{8} x + \frac{1}{32} sh4x + \frac{1}{4} sh2x + \frac{1}{4} x + C.$

4. $\int sh^4x \cdot ch^4x dx$ hisoblansin:

Yechish: $shx \cdot chx = \frac{1}{2} sh2x$ dan foydalanamiz:

$$\begin{aligned} \int sh^4x \cdot ch^4x dx &= \frac{1}{16} \int sh^42x dx = \frac{1}{16} \int \frac{(ch4x - 1)^2}{4} dx = \\ &= \frac{1}{64} \int (ch^24x - 2ch2x + 1) dx = \frac{1}{64} \int \left(\frac{1+ch8x}{2} - 2ch4x + 1\right) dx = \\ &= \frac{1}{64} \left(\frac{3}{2} x - \frac{1}{2} sh4x + \frac{1}{16} sh8x\right) + C. \end{aligned}$$

5. $\int \frac{dx}{thx-1}$ hisoblansin.

Yechish: $\int \frac{dx}{thx-1} = \int \frac{chx dx}{shx - chx} = \int \frac{chx(shx + chx)}{sh^2x - ch^2x} dx =$
 $= - \int shx \cdot chx dx - \int ch^2x dx = -\frac{1}{2} \int sh2x dx - \int \frac{ch2x + 1}{2} dx =$
 $= -\frac{1}{4} ch2x - \frac{1}{4} sh2x - \frac{1}{2} x + C.$

6. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 - 3}}$ integral hisoblansin.

Yechish: $x = \sqrt{3} \operatorname{cht}$ deb olsak, $dx = \sqrt{3} shtdt$ bo'ladi. Demak,

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2-3}} &= \int \frac{3ch^2 t \cdot \sqrt{3} sh t dt}{\sqrt{3ch^2 t-3}} = 3\sqrt{3} \int \frac{ch^2 t \cdot sh t dt}{\sqrt{3} \cdot sh t} = \\ &= 3 \int ch^2 t dt = \frac{3}{2} \int (ch 2t + 1) dt = \frac{3}{4} sh 2t + \frac{3}{2} t + c \\ &= \frac{1}{2} x \sqrt{x^2-3} + \frac{3}{2} \ln |x + \sqrt{x^2-3}| + c.\end{aligned}$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

Quyidagi integrallar hisoblansin.

- 1) $\int ch^2 x dx$; 2) $\int ch^3 2x dx$; 3) $\int sh^4 x dx$;
- 4) $\int \frac{dx}{sh^2 x + ch^2 x}$; 5) $\int cth^3 x dx$; 6) $\int sh^5 x \cdot ch^2 x dx$;
- 7) $\int ch^2 x \cdot sh^2 x dx$; 8) $\int \frac{dx}{cthx-1}$; 9) $\int \frac{dx}{ch^3 x \cdot sh^2 x}$;
- 10) $\int \frac{dx}{sh^2 \frac{x}{2} + ch^2 \frac{x}{2}}$.

- Javob: 1) $\frac{1}{4} sh 2x + \frac{1}{2} x + C$; 2) $\frac{1}{2} sh 2x + \frac{1}{6} sh^3 2x + C$;
- 3) $\frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} x - sh 2x + \frac{1}{8} sh 4x \right) + C$; 4) $arctg(thx) + C$;
- 5) $\ln|shx| - \frac{1}{2sh^2 x} + C$; 6) $ch^3 x \left(\frac{1}{7} ch^4 x - \frac{2}{5} chx + \frac{1}{3} \right) + C$;
- 7) $\frac{1}{32} sh 4x - \frac{1}{8} x + C$; 8) $\frac{1}{2} sh^2 x + \frac{1}{4} sh 2x - \frac{1}{2} x + C$;
- 9) $-\frac{1}{shx} - \frac{shx}{2ch^2 x} - 3 arctge^x + C$; 10) $2arctg\left(th\frac{x}{2}\right) + C$;

XI. BOB. ANIQ INTEGRAL

§1. Aniq integral va uning xossalari. Aniq integralni hisoblash usullari

$[a, b]$ kesmada $f(x)$ funksiya aniqlangan bo'lsin. $[a, b]$ kesmani $a = x_0 < x_1 < x_2 \dots < x_n = b$ nuqtalar bilan n ta bo'lakka ajratamiz. Har bir $[x_{i-1}, x_i]$ kesmadan ixtiyoriy ξ_i nuqta olib

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

indini tuzamiz. Bunda $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

ko'rinishidagi yig'indi integral yig'indi deyiladi. Uning $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ dagi limiti mavjud va chekli bo'lsa, unga $f(x)$ funksiyaning a dan b gacha aniq integrali deyiladi hamda

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

ko'rinishida yoziladi.

Bu holda $f(x)$ funksiya $[a, b]$ kesmada integrallanuvchi deyiladi. $F(x)$ funksiyaning integrallanuvchi bo'lishi uchun $[a, b]$ kesmada uzluksiz bo'lishi yoki chekli sondagi chekli uzilishlarga ega bo'lishi kifoyadir.

Aniq integral quyidagi bir qator xossalarga ega:

$$1. \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx;$$

$$2. \int_a^b f(x) dx = 0, \text{ agar } a = b \text{ bo'lsa};$$

$$3. \int_a^b k f(x) dx = k \cdot \int_a^b f(x) dx;$$

$$4. \int_a^b [f(x) \pm \varphi(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b \varphi(x) dx;$$

5. Agar $[a, b]$ kesmada $f(x) \geq 0$ va integrallanuvchi bo'lsa, u holda

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0 \text{ tengsizlik o'rinli bo'ladi};$$

6. Agar $[a, b]$ kesmada $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar integrallanuvchi hamda $f(x) \leq g(x)$ bo'lsa, u holda ularning aniq integrallari uchun $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ tengsizlik o'rinli bo'ladi.

7. Agar $a < c < b$ va $f(x)$ funksiya $[a, c]$, $[c, b]$ kesmalarda integrallanuvchi bo'lsa, unda $[a, b]$ kesmada ham integrallanuvchi va $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ tenglik o'rinli bo'ladi.

8. Agar $[a, b]$ kesmada ($a < b$) integrallanuvchi $y=f(x)$ funksiyaning shu kesmadagi eng kichik va eng katta qiymatlari m va M bo'lsa, u holda ular uchun $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$ tengsizlik o'rinli bo'ladi;

9. Agar $|f(x)|$ funksiya $[a, b]$ kesmada integrallanuvchi bo'lsa, u holda $f(x)$ funksiya ham bu kesmada integrallanuvchi va quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi: $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$;

10. Agar $f(x)$ funksiya $[a, b]$ kesmada uzluksiz bo'lsa, bu kesmada shunday ξ nuqta mavjud bo'ladiki, unda

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$$

tenglik o'rinli bo'ladi.

Agar $F(x)$ uzluksiz $f(x)$ funksiyaning biror boshlang'ich funksiyasi bo'lsa, u holda

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

tenglik o'rinli bo'ladi. Bu tenglik aniq integralni hisoblashning Nyuton-Leybnis formulasi deyiladi.

Ba'zi aniq integrallarni hisoblashda bo'laklab integrallash formulasi deb ataluvchi

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

formuladan foydalaniladi.

Berilgan uzluksiz $y = f(x)$ funksiya $[a, b]$ kesma bo'yicha olingan

$$\int_a^b f(x) dx$$

aniq integralni ba'zi hollarda biror $x = \varphi(t)$ differensiallanuvchi funksiya orqali "eski" x o'zgaruvchidan "yangi" t o'zgaruvchiga o'tish usulida foydalanib hisoblash mumkin bo'ladi. Bunda quyidagi shartlar qo'yiladi:

1. $\varphi(a) = \alpha$, $\varphi(b) = \beta$;
 2. $\varphi(t)$ va $\varphi'(t)$ funksiyalar $t \in [\alpha, \beta]$ kesmada uzluksiz;
 3. $f[\varphi(t)]$ murakkab funksiya $[\alpha, \beta]$ kesmada aniqlangan va uzluksiz.
- Bu shartlarda ushbu formula o'rinli bo'ladi:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt$$

Bu formula aniq integralda o'zgaruvchini almashtirish formulasi deyiladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $\int_1^2 (x^2 + \frac{1}{x^4}) dx$ integral hisoblansin:

$$\text{Yechish: } \int_1^2 (x^2 + \frac{1}{x^4}) dx = \int_1^2 x^2 dx + \int_1^2 x^{-4} dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 - \frac{1}{3x^3} \Big|_1^2 =$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{3 \cdot 1^3} = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{24} + \frac{1}{3} = \frac{8}{3} - \frac{1}{24} = \frac{64-1}{24} = \frac{63}{24} = \frac{21}{8}.$$

2. $\int_0^4 (1 + e^{\frac{x}{4}}) dx$ integral hisoblansin.

$$\text{Yechish: } \int_0^4 (1 + e^{\frac{x}{4}}) dx = \int_0^4 dx + \int_0^4 e^{\frac{x}{4}} dx = x \Big|_0^4 + 4e^{\frac{x}{4}} \Big|_0^4 = 4 -$$

$$0 + 4e^{\frac{4}{4}} - 4e^{\frac{0}{4}} = 4 + 4e - 4 = 4e.$$

3. $\int_{-1}^7 \frac{dx}{\sqrt{3x+4}}$ ni hisoblang.

$$\text{Yechish: } \int_{-1}^7 \frac{dx}{\sqrt{3x+4}} = \int_{-1}^7 (3x+4)^{-\frac{1}{2}} d(3x+4) \cdot \frac{1}{3} =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{(3x+4)^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} \Big|_{-1}^7 = \frac{1}{3} \cdot \frac{(3x+4)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \Big|_{-1}^7 = \frac{2}{3} \sqrt{3x+4} \Big|_{-1}^7 =$$

$$= \frac{2}{3} \left(\sqrt{3 \cdot 7 + 4} - \sqrt{3 \cdot (-1) + 4} \right) = \frac{2}{3} (5 - 1) = \frac{8}{3}.$$

4. $\int_0^5 \frac{x dx}{\sqrt{1+3x}}$ integral hisoblansin:

$$\text{Yechish: } \sqrt{1+3x} = t, \quad 1+3x = t^2, \quad 3x = t^2 - 1, \quad x = \frac{t^2-1}{3},$$

$$dx = \frac{2tdt}{3}. \text{ Endi yangi chegaralarni aniqlaymiz: } x = 0 \text{ da } \sqrt{1+3 \cdot 0} = t_1$$

$$\text{dan } t_1 = 1. \quad x = 5 \text{ da } \sqrt{1+3 \cdot 5} = t_2 \text{ dan } t_2 = 4 \text{ kelib chiqadi.}$$

Topilganlarni berilgan integralga qo'yamiz:

$$\int_0^5 \frac{x dx}{\sqrt{1+3x}} = \int_1^4 \frac{\frac{t^2-1}{3}}{t} \cdot \frac{2tdt}{3} = \frac{2}{9} \int_1^4 (t^2-1) dt = \frac{2}{9} \int_1^4 t^2 dt -$$

$$- \frac{2}{9} \int_1^4 dt = \frac{2}{9} \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_1^4 - \frac{2}{9} t \Big|_1^4 = \frac{2t^3}{27} \Big|_1^4 - \frac{2}{9} t \Big|_1^4 = \frac{128}{27} - \frac{2}{27} - \frac{8}{9} + \frac{2}{9} = 4$$

5. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2+\cos x}$ integral hisoblansin:

Yechish: $tg \frac{x}{2} = t$ almashtirish qilamiz: U holda $\frac{x}{2} = \arctg t$,
 $x = 2\arctg t$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ bo'ladi. Bundan tashqari yangi
o'zgaruvchi t ning qiymatlarini aniqlaymiz. $x = 0$ da $t_1 = 0$ va $x = \frac{\pi}{2}$ da
 $t_2 = 1$. Ularni e'tiborga olsak, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2+\cos x} = \int_0^1 \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{2+\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int_0^1 \frac{2dx}{2+2t^2+1-t^2} =$
 $= 2 \int_0^1 \frac{dt}{t^2+3} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctg \frac{t}{\sqrt{3}} \Big|_0^1 = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctg \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctg 0 =$
 $= \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{6} - \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 0 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

6. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$ integral hisoblansin.

Yechish: $x = \sin t$ almashtirish qilamiz. U holda $dx = \cos t dt$. $x = \frac{1}{2}$
bo'lganda $\sin t = \frac{1}{2}$ bo'lib, undan $t_1 = \frac{\pi}{6}$ kelib chiqadi. $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ bo'lganda
 $\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$ bo'lib, undan $t_2 = \frac{\pi}{3}$ kelib chiqadi. Demak,

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t dt}{\sin t \sqrt{1-\sin^2 t}} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t dt}{\sin t \cdot \cos t} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dt}{\sin t} =$$

$$= \ln tg \frac{t}{2} \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \ln tg \frac{\pi}{6} - \ln tg \frac{\pi}{12} = \ln \frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}.$$

7. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx$ integral hisoblansin.

Yechish: Bu integralni bo'laklab integrallash formulasidan foydalanib
integrallaymiz. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x, dv = \cos x dx \\ du = dx, v = \sin x \end{array} \right\} = x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} -$
 $-\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2} \cdot \sin \frac{\pi}{2} + \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} - \cos 0 = \frac{\pi}{2} - 1 = \frac{\pi-2}{2}.$

8. $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ integral hisoblansin.

Yechish: $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \left\{ \begin{array}{l} u = \ln x, dv = \frac{dx}{\sqrt{x}} \\ du = \frac{dx}{x}, v = 2\sqrt{x} \end{array} \right\} = 2\sqrt{x} \ln x \Big|_1^{e^2} -$

$$- 2 \int_1^{e^2} \frac{\sqrt{x}}{x} dx = 4e - 4\sqrt{x} \Big|_1^{e^2} = 4e - 4e + 4 = 4.$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. Quyidagi integrallar hisoblansin.

- 1) $\int_0^1 \sqrt{1+x} dx$; 2) $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{(11+5x)^3}$; 3) $\int_1^2 (x + \frac{1}{x})^2 dx$;
4) $\int_4^9 \sqrt{x}(1+\sqrt{x}) dx$; 5) $\int_1^2 (\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}) dx$; 6) $\int_0^1 (e^x - 1)^4 e^x dx$.
Javob: 1) $\frac{2}{3}(\sqrt{8}-1)$; 2) $\frac{7}{72}$; 3) $4\frac{5}{6}$; 4) $45\frac{1}{6}$; 5) ≈ 0.08 ;

6) $0.2(e-1)^5$.

2. Quyidagi integrallarni bo'laklab integrallash formulasidan foydalanib hisoblang.

- 1) $\int_0^1 x e^{-x} dx$; 2) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{x dx}{\sin^2 x}$; 3) $\int_0^{\pi} x^3 \sin x dx$; 4) $\int_0^{e-1} \ln(x+1) dx$;
5) $\int_1^2 x \log_2 x dx$; 6) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} e^{2x} \cos x dx$; 7) $\int_1^e \ln^3 x dx$; 8) $\int_0^{a\sqrt{7}} \frac{x^3 dx}{\sqrt[3]{a^2+x^3}}$;
9) $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2} dx$.

Javob: 1) $1 - \frac{2}{e}$; 2) $\frac{\pi(9-4\sqrt{3})}{36} + \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$; 3) $\pi^3 - 6\pi$; 4) 1; 5) $2 - \frac{3}{4 \ln 2}$;
6) $\frac{e^{\pi-2}}{5}$; 7) $6 - 2e$; 8) $\frac{141a^3 \sqrt[3]{a}}{20}$; 9) $\frac{\pi a^2}{4}$.

3. Quyidagi integrallarni o'zgaruvchini almashtirish formulasidan foydalanib hisoblang.

- 1) $\int_4^9 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} dx$; 2) $\int_0^1 \frac{\sqrt{x} dx}{1+x}$; 3) $\int_3^8 \frac{x dx}{\sqrt{1+x}}$; 4) $\int_0^1 \frac{x dx}{1+\sqrt{x}}$;

$$5) \int_0^1 \frac{\sqrt{e^x} dx}{\sqrt{e^x + e^{-x}}}; \quad 6) \int_1^2 \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx; \quad 7) \int_0^1 x^2 \sqrt{1 - x^2} dx;$$

$$8) \int_0^1 \sqrt{(1 - x^2)^3} dx; \quad 9) \int_0^{-\ln 2} \sqrt{1 - e^{2x}} dx;$$

$$\text{Javob: } 1) 7 + 2\ln 2; \quad 2) 2 - \frac{\pi}{2}; \quad 3) \frac{32}{3}; \quad 4) \frac{5}{3} - 2\ln 2; \quad 5) \ln \frac{e^x + \sqrt{1 + e^x}}{1 + \sqrt{2}};$$

$$6) \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}; \quad 7) \frac{\pi}{16}; \quad 8) \frac{3}{16}\pi; \quad 9) \frac{\sqrt{3}}{2} + \ln(2 - \sqrt{3}).$$

§2. Aniq integralni taqribiy hisoblash. Xosmas integrallar

Aniq integralni hisoblashning yuqorida ko'rib o'tilgan usullarida $\int_a^b f(x) dx$ integralni hisoblash $f(x)$ funksiyaning biror $F(x)$ boshlang'ich funksiyasini topish va uning qiymatini hisoblashdan iborat edi. Ammo ayrim aniq integrallar uchun bu usullarni qo'llashda quyidagi muammolarga duch kelishimiz mumkin:

- 1) $F(x)$ boshlang'ich funksiyani topish murakkab;
- 2) $F(x)$ boshlang'ich funksiya murakkab bo'lib, uning $F(a)$ va $F(b)$ qiymatlarini hisoblash qiyinchilik tug'diradi;
- 3) $F(x)$ funksiya elementar funksiyalarda ifodanmaydi;
- 4) Integral ostidagi $f(x)$ funksiya jadval ko'rinishida berilgan.


Bunday hollarda aniq integralni taqribiy hisoblashga to'g'ri keladi. Bu masalani Yechish uchun turli formulalar topilgan bo'lib, ular umumiy holda kvadratur formulalar deyiladi. Quyida bu formulalardan ba'zilarini keltiramiz.

1. To'g'ri to'rtburchaklar formulasi. Bu formulani keltirib chiqarish uchun dastlab $[a, b]$ kesmani $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ nuqtalar bilan n ta teng bo'lakka bo'lamiz. Bunda har bir bo'lakning uzunligi $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ga teng bo'ladi (1-chizma)

Integral ostidagi $f(x)$ funksiyaning $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$ nuqtalardagi qiymatlarini $y_0, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, y_n$ lar bilan belgilaymiz va quyidagi

yig'indilarni tuzamiz:

$$y_0 \cdot \Delta x + y_1 \cdot \Delta x + y_2 \cdot \Delta x + \dots + y_{n-1} \Delta x; \quad y_0 \Delta x + y_1 \Delta x + y_2 \Delta x + \dots + y_n \Delta x.$$



1-chizma


Bu yig'indilarni har biri $f(x)$ funksiya uchun $[a, b]$ kesmada integral yig'indi bo'lib, ular uchun quyidagi taqribiy formulalarni yozish mumkin:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} (y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1})$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} (y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n)$$

Bu formulalar to'g'ri to'rtburchaklar formulasi deyiladi.

II. Trapetsiyalar formulasi. Yuqorida ko'rib o'tilgan to'g'ri to'rtburchaklar formulasida biz $y = f(x)$ egri chiziqni zinopayali chiziqlar bilan almashtirgan edik. Agar biz $y = f(x)$ ni ichki chizilgan siniq chiziqlar bilan almashtirsak, aniq integralning aniqroq qiymatini hosil qilamiz. Bunda $aABb$ egri chiziqli trapetsiya yuqoridan $AA_1, A_1A_2, \dots, A_{n-1}B$ vatarlar bilan chegaralangan trapetsiyachalar yig'indisidan iborat bo'ladi (2-chizma). Bunda birinchi




trapetsiyachaning yuzi $\frac{y_0+y_1}{2} \cdot \Delta x$, ikkinchisining yuzi $\frac{y_1+y_2}{2} \cdot \Delta x$ va hokazo bo'lib $\int_a^b f(x) dx \approx (\frac{y_0+y_1}{2} \cdot \Delta x + \frac{y_1+y_2}{2} \cdot \Delta x + \dots + \frac{y_{n-1}+y_n}{2} \cdot \Delta x)$ yoki

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} \left(\frac{y_0+y_n}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} \right)$$

bo'ladi. Bu formula aniq integralni taqribiy hisoblashning trapetsiyalar formulasi deyiladi. Bu yerda n soni ixtiyoriy tanlanadi, n soni qanchalik katta bo'lsa, integralning qiymati shunchalik aniq bo'ladi.

III. Parabola formulasi (Simpson formulasi). $[a, b]$ kesmani $n = 2m$ ta teng bo'laklarga bo'lamiz. $[x_0, x_1]$ va $[x_1, x_2]$ kesmalarga mos kelgan va $y = f(x)$ egri chiziqli bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiyachalarning yuzlarini $M_0(x_0, y_0)$, $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$ nuqtalardan o'tuvchi parabola bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiya bilan almashtiramiz. Bunday egri chiziqli trapetsiyani parabolik trapetsiya deyiladi (3-chizma).

O'qi Oy o'qiga parallel bo'lgan parabo'lani tenglamasi $y = Ax^2 + Bx + C$ dan iborat bo'ladi.



3-chizma

A, B, C koeffitsientlar parabolaning berilgan uchta nuqtadan o'tish shartidan topiladi. Qolgan kesmalar uchun ham yuqoridagidek parabolalarni yasaymiz. Hosil bo'lgan parabolik trapetsiyachalar yuzlarining yig'indisi integralning taqribiy qiymatini beradi. U quyidagi formuladan iborat boladi:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6m} [y_0 + y_{2m} + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{2m-2}) + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{2m-1})].$$

Bu formula Simpson formulasi deyiladi.

Yuqorida biz $\int_a^b f(x) dx$ integralni integrallash kesmasi $[a; b]$ chekli va integral ostidagi funksiya uzluksiz bo'lgan hollarda o'rgandik.

Ta'rif. $y = f(x)$ funksiyaning $[a, +\infty)$ cheksiz yarim oraliq bo'yicha I tur xosmas integrali deb yuqori chegarasi o'zgaruvchi $F(b)$ integralning $b \rightarrow +\infty$ bo'lgandagi limitiga aytiladi va u

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ deb belgilanadi. Demak, ta'rifga asosan, u

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

ko'rinishida belgilanadi.

Agar yuqoridagi tenglamaning o'ng tomonidagi limit mavjud va chekli bo'lsa, u holda xosmas integral yaqinlashuvchi, aks holda, uzoqlashuvchi deyiladi.

Ko'p hollarda xosmas integralning aniq qiymatini bilish shart bo'lmasdan, uning yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchi ekanligini va yaqinlashuvchi bo'lgan holda qiymatini baholash yetarli bo'ladi.

I. Agar $a \leq x < \infty$ cheksiz yarim oraliqda $0 \leq f(x) \leq g(x)$ va $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ xosmas integral yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ xosmas integral ham yaqinlashuvchi va quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \leq \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

Ta'rif. Agar $a \leq x < \infty$ cheksiz yarim oraliqda $0 \leq g(x) \leq f(x)$ va $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ xosmas integral uzoqlashuvchi bo'lsa, u holda $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ xosmas integral ham uzoqlashuvchi bo'ladi.

Ta'rif. Agar $x \geq a$ bo'lganda $|f(x)| \leq g(x)$ va $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ xosmas integral yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ xosmas integral ham yaqinlashuvchi va

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} |f(x)| dx \leq \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

tengsizlik o'rinli bo'ladi.

Ta'rif. Agar $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ xosmas integral yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ xosmas integral absolyut yaqinlashuvchi deyiladi. Agar birinchi integral yaqinlashuvchi, ikkinchi integral uzoqlashuvchi bo'lsa, u holda birinchi xosmas integral shartli yaqinlashuvchi deb ataladi.

Agar $f(x)$ funksiya $(-\infty; +\infty)$ oraliqda aniqlangan bo'lsa, uning bu oraliq bo'yicha I tur xosmas integrali yuqorida kiritilgan xosmas integrallar orqali quyidagicha ifodalanadi.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx.$$

Endi chegaralanmagan funksiyalar uchun aniq integral tushunchasini umumlashtiramiz. Berilgan $y = f(x)$ funksiya $(a; b]$ yarim oraliqda chegaralanmagan, ammo ixtiyoriy $\varepsilon \in (0, b-a]$ uchun bu funksiya $[a+\varepsilon, b]$ kesmada chegaralangan va integrallanuvchi bo'lsin. Bu holda, $F(\varepsilon) = \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$, $\varepsilon \in (0, b-a]$ funksiyaning qarash mumkin.

Ta'rif. $F(\varepsilon)$ funksiyaning $\varepsilon \rightarrow 0+0$ holdagi o'ng limiti berilgan $f(x)$ funksiyaning $[a, b]$ kesma bo'yicha II tur xosmas integrali deyiladi va u quyidagicha belgilanadi:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} F(\varepsilon) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

Agar $y = f(x)$ funksiya $x = a$ nuqtada chegaralanmagan bo'lsa, u holda $[a; +\infty)$ yoki $(-\infty; a]$ cheksiz yarim oraliqlar bo'yicha quyidagi aralash turdagi xosmas integrallar bilan aniqlanadi:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^{+\infty} f(x) dx \quad (a < b < +\infty)$$

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^a f(x) dx \quad (-\infty < c < a)$$

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ integralni to'g'ri to'rtburchaklar formulasidan foydalanib taqribiy hisoblansin.

Yechish. Buning uchun $[0; 1]$ integrallash kesmasini $n = 10$ ta bo'lakka bo'lamiz va hisoblashlar natijalarini quyidagi jadvalda keltiramiz:

i	$x_i = 0.1i$	$1 + x_i^2$	$f(x_i) = \frac{1}{1 + x_i^2}$	$\sum_i f(x_i)$
1	0.1	1.01	0.9901	0.9901
2	0.2	1.04	0.9615	1.9516
3	0.3	1.09	0.9174	2.8690
4	0.4	1.16	0.8621	3.7311
5	0.5	1.25	0.8000	4.5311
6	0.6	1.36	0.7353	5.2664
7	0.7	1.49	0.6711	5.9375
8	0.8	1.64	0.6098	6.5473
9	0.9	1.81	0.5525	7.0998
10	1.0	2	0.5000	7.5998

Bizning misolda $\Delta x = \frac{1-0}{10} = 0.1$ bo'lgani uchun, to'g'ri to'rtburchaklar formulasiga asosan, quyidagi natijani hosil qilamiz.

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \approx 0,1 \cdot 7,5998 = 0,75998$$

2. $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ integralni trapetsiyalar formulasi yordamida taqribiy hisoblang. Bunda ham $n = 10$ deb oling.

Yechish: $\frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{10} = \frac{1}{10} = 0,1$; $\frac{y_0+y_n}{2} = \frac{1+0,5}{2} = 0,75$

$y_1 + y_2 + \dots + y_9 = 7,0998$ bo'lgani uchun

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \approx 0,1 \cdot [0,75 + 7,0998] = 0,78498.$$

3. $\int_1^9 \sqrt{6x-5} dx$ integralni Simpson formulasi yordamida taqribiy hisoblansin. Bunda $n = 8$ deb oling.

Yechish: $h = \frac{b-a}{n} = \frac{9-1}{8} = 1$. Bo'linish nuqtalarini x_i bilan va funksiyaning unga mos qiymatlarini y_i bilan belgilaymiz. U holda,

$$x_0 = 1, y_0 = \sqrt{6 \cdot 1 - 5} = \sqrt{1} = 1,0000,$$

$$x_1 = 2, y_1 = \sqrt{6 \cdot 2 - 5} = \sqrt{7} \approx 2.6458,$$

$$x_2 = 3, y_2 = \sqrt{6 \cdot 3 - 5} = \sqrt{13} \approx 3.6056,$$

$$x_3 = 4, y_3 = \sqrt{6 \cdot 4 - 5} = \sqrt{19} \approx 4.3589,$$

$$x_4 = 5, y_4 = \sqrt{6 \cdot 5 - 5} = \sqrt{25} = 5.0000,$$

$$x_5 = 6, y_5 = \sqrt{6 \cdot 6 - 5} = \sqrt{31} \approx 5.5678,$$

$$x_6 = 7, y_6 = \sqrt{6 \cdot 7 - 5} = \sqrt{37} \approx 6.0828,$$

$$x_7 = 8, y_7 = \sqrt{6 \cdot 8 - 5} = \sqrt{43} \approx 6.5574,$$

$$x_8 = 9, y_8 = \sqrt{6 \cdot 9 - 5} = \sqrt{49} = 7.0000.$$

Topilgan bu qiymatlarni

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6m} [y_0 + y_{2m} + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{2m-2}) + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{2m-1})]$$

Simpson formulasiga qo'yamiz:

Bizda $2m = 8$, $b - a = 9 - 1 = 8$ bo'lgani uchun $\frac{b-a}{6m} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$
Demak,

$$\int_1^9 \sqrt{6x-5} dx \approx \frac{1}{3} [1 + 7 + 2(3.6056 + 5.0000 + 6.0828) + 4(2.6458 + 4.3589 + 5.5678 + 6.5574)] = \frac{1}{3} (8 + 2 \cdot 14.6884 + 4 \cdot 19.1299) = 37.9655.$$

4. $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$ xosmas integral topilsin.

Yechish:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-x} dx = - \lim_{b \rightarrow +\infty} (-e^{-x}) \Big|_0^b = - \lim_{b \rightarrow +\infty} (e^{-x}) \Big|_0^b = - \lim_{b \rightarrow +\infty} e^{-b} + \lim_{b \rightarrow +\infty} e^0 = - \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^b} + 1 = 1.$$

Demak, berilgan xosmas integral yaqinlashuvchi ekan.

5. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ xosmas integral hisoblansin.

Yechish: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{1+x^2} =$
 $= \lim_{a \rightarrow -\infty} (\arctg 0 - \arctg a) + \lim_{b \rightarrow +\infty} (\arctg b - \arctg 0) =$
 $= \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctg a + \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctg b = -\arctg(-\infty) + \arctg(+\infty) =$
 $= -\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$

Demak, berilgan xosmas integral yaqinlashuvchi.

6. $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ xosmas integral hisoblansin.

Yechish: $x = 0$ da integral ostidagi funksiya cheksiz uzilishga ega.

Demak, ta'rifga asosan

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \lim_{a \rightarrow +0} \int_a^1 \frac{dx}{x} = \lim_{a \rightarrow +0} \ln x \Big|_a^1 + \lim_{a \rightarrow +0} (\ln 1 - \ln a) =$$

 $= - \lim_{a \rightarrow +0} \ln a = -(-\infty) = \infty.$

Demak, berilgan integral uzoqlashuvchidir.

7. $\int_{-1}^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}$ xosmas integral hisoblansin.

Yechish: Bu yerda integral ostidagi funksiya $[-1; 2]$ integrallash kesmasining ichki $x = 1$ nuqtasida cheksiz uzilishga ega. Shuning uchun ta'rifga asosan,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} &= \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} + \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} = \lim_{a \rightarrow 1} \int_{-1}^a \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} \\ &+ \lim_{a \rightarrow 1} \int_a^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} = \lim_{a \rightarrow 1} \int_{-1}^a (x-1)^{-\frac{2}{3}} d(x-1) + \\ &+ \lim_{a \rightarrow 1} \int_a^2 (x-1)^{-\frac{2}{3}} d(x-1) = 3 \lim_{a \rightarrow 1} \sqrt[3]{x-1} \Big|_{-1}^a + 3 \lim_{a \rightarrow 1} \sqrt[3]{x-1} \Big|_a^2 \\ &= 3 \lim_{a \rightarrow 1} (\sqrt[3]{a-1} + \sqrt[3]{2}) + 3 \lim_{a \rightarrow 1} (\sqrt[3]{1} - \sqrt[3]{a-1}) = 3 \cdot \sqrt[3]{2} + 3 = \\ &= 3(\sqrt[3]{2} + 1). \end{aligned}$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar:

1. Quyidagi integrallarni to'g'ri to'rtburchaklar formulasidan foydalanib taqribiy qiymatini toping.

$$1) \int_1^{10} \frac{dx}{x} (n=10); \quad 2) 4 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx (n=10);$$

$$3) \int_0^{2\pi} x \sin x dx (n=12).$$

Javob: 1) 2,31; 2) 2,904; 3) -6,28332.

2. Trapetsiyalar formulasidan foydalanib, quyidagi integrallarni taqribiy hisoblang.

$$1) \int_0^1 \frac{dx}{1+x} (n=8); \quad 2) \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} (n=12); \quad 3) \int_1^9 \sqrt{6x-5} dx (n=10)$$

Javob: 1) 0,69315; 2) 0,83566; 3) 37,8183.

3. Simpson formulasidan foydalanib quyidagi integrallar taqribiy hisoblansin.

$$1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx (n=10); \quad 2) \int_0^1 \sqrt{1-x^3} dx (n=10); \quad 3) \int_2^5 \frac{dx}{\ln x} dx (n=6).$$

Javob: 1) 1,0000; 2) 0,837; 3) 2,59.

4. Quyidagi xosmas integrallar hisoblansin.

$$\begin{aligned} 1) \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-4}}; \quad 2) \int_0^2 \frac{x^3 dx}{\sqrt{4-x^2}}; \quad 3) \int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2}; \quad 4) \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^3} dx; \\ 5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x-2}; \quad 6) \int_0^{+\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1} dx; \quad 7) \int_{-\infty}^0 x e^x dx; \quad 8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2}; \\ 9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+x+1)^2}. \end{aligned}$$

Javob: 1) $\frac{2}{3} \sqrt[3]{125}$; 2) $\frac{16}{3}$; 3) uzoqlashuvchi; 4) $\frac{1}{4}$; 5) $\frac{2}{3} \ln 2$; 6) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$;

7) -1; 8) π ; 9) $\frac{4\pi}{3\sqrt{2}}$.

§3. Aniq integralning geometrik tatbiqlari

$y = f(x) \geq 0$ funksiyaning grafigi, $x = a$ va $x = b$ vertikal to'g'ri chiziqlar hamda $y = 0$, ya'ni Ox o'qi bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiyaning yuzasi


$$S = \int_a^b f(x) dx$$

aniq integral bilan hisoblanishi bizga ma'lum (1-chizma)


Agar $[a, b]$ kesmada $f(x) \leq 0$ bo'lsa, u holda egri chiziqli trapetsiya Ox o'qidan pastda joylashgan bo'lib, uning qiymati manfiy son bo'ladi. Shu sababli, bu holda, egri chiziqli trapetsiya'ning yuzasi

$$S = - \int_a^b f(x) dx = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$

formula bilan topiladi (2-chizma)



1-chizma




2-chizma

$y = f(x)$ va $y = g(x)$ ($f(x) \geq g(x)$) egri chiziqlar hamda $x = a$ va $x = b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan geometrik shaklning yuzasi

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

formula bilan hisoblanadi (3-chizma).



3-chizma

Agar egri chiziq $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ ($t \in [\alpha; \beta]$) parametrik tenglama bilan berilgan bo'lsa, u holda egri chiziqli trapetsiya'ning yuzasi

$$S = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b y dx = \int_a^b \psi(t) d\varphi(t) = \int_a^b \psi(t) \varphi'(t) dt$$

formuladan topiladi.

Tekislikdagi $y = f(x)$, $x \in [a, b]$ funksiya bilan berilgan egri chiziqning AB yoyi uzunligi

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

formula bo'yicha hisoblanadi.

Agar egri chiziq $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ ($t \in [\alpha; \beta]$) parametrik tenglama bilan berilgan bo'lsa, u holda, yoy uzunligi

$$l = \int_a^b \sqrt{[\varphi'(x)]^2 + [\psi'(x)]^2} dt$$

formula bilan hisoblanadi.

Aytaylik biror jismning Ox o'qiga perpendikulyar bo'lgan tekislik bilan kesimi yuzi $S(x)$ bo'lsin. Bu kesim ko'ndalang kesim deb ataladi va u $[a, b]$ kesmada uzluksizdir. Bu holda, berilgan jismning hajmi

$$V = \int_a^b S(x) dx$$
 formula bilan aniqlanadi.

$y = f(x)$ egri chiziq $x = a$, $x = b$ to'g'ri chiziqlar va Ox o'qi bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiya'ning Ox o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismning hajmi

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

formuladan, sirti esa

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

formuladan topiladi.

$x = \varphi(y)$ egri chiziq, $y = c$, $y = d$ to'g'ri chiziqlar va Oy o'qi bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiya'ning Oy o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismning hajmi


$$V = \pi \int_c^d x^2 dy = \pi \int_c^d \varphi^2(y) dy$$

formuladan topiladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. $x \in [0; 2\pi]$ bo'lganda, $y = \sin x$ sinusoida va Ox o'qi bilan chegaralangan yuza topilsin.


Yechish: $x \in [0; \pi]$ da $\sin x \geq 0$ va $x \in [\pi; 2\pi]$ da $\sin x \leq 0$ bo'lgani uchun $S = \int_0^\pi \sin x dx + \left| \int_\pi^{2\pi} \sin x dx \right| = -\cos x \Big|_0^\pi + \left| -\cos x \Big|_\pi^{2\pi} \right| = -\cos \pi + \cos 0 + |-\cos 2\pi + \cos \pi| = 1 + 1 + |-1 - 1| = 2 + 2 = 4$ (4-chizma).



4-chizma

2. $y = \sqrt{x}$ va $y = x^2$ egri chiziqlar bilan chegaralangan yuza topilsin.

Yechish: Dastlab $y = \sqrt{x}$ va $y = x^2$ egri chiziqlarni kesishish nuqtalarini topamiz (5-chizma).



5-chizma

$y = \sqrt{x}$ va $y = x^2$ dan $x = x^4$ kelib chiqadi. Undan esa $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ larni topamiz. Demak,

$$S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

3. $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ ellips bilan chegaralangan sohaning yuzi topilsin.

Yechish: Ellipsning yuqori yarim qismini yuzini topamiz va uni ikkiga ko'paytiramiz. Bu yerda x o'zgaruvchi $-a$ dan $+a$ gacha o'zgarganda t o'zgaruvchi π dan 0 gacha o'zgaradi. Demak,

$$S = 2 \int_\pi^0 b \sin t (-a \sin t) dt = -2ab \int_\pi^0 \sin^2 t dt = 2ab \int_0^\pi \sin^2 t dt = 2ab \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = ab \int_0^\pi (1 - \cos 2t) dt = ab \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^\pi = ab \left(\pi - 0 - \frac{1}{2} \sin 2\pi + \frac{1}{2} \sin 0 \right) = ab(\pi - 0) = \pi ab.$$

4. $x^2 + y^2 = r^2$ aylana uzunligi topilsin.

Yechish: Dastlab aylananing birinchi chorakda yotgan bo'lagining uzunligini topamiz. U holda AB yoy uzunligi $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ bo'ladi va undan esa

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \text{ ni aniqlaymiz. Shunday qilib,}$$

$$\frac{1}{4} l = \int_0^r \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx = \int_0^r \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx = r \arcsin \frac{x}{r} \Big|_0^r = r \cdot \arcsin 1 - r \arcsin 0 = r \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi r}{2}.$$

Butun aylananing uzunligi esa $l = 4 \cdot \frac{\pi r}{2} = 2\pi r$ ga teng bo'ladi.

5. $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ astroidaning uzunligi topilsin.

Yechish: Egri chiziq har ikkala koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik bo'lgani uchun dastlab uning to'rttan bir qismining uzunligini topamiz. Buning uchun x'_t va y'_t larni topamiz. $x'_t = (a \cos^3 t)' = -3a \cos^2 t \cdot \sin t$, $y'_t = (a \sin^3 t)' = 3a \sin^2 t \cdot \cos t$ bo'lib, t parametr 0 dan $\frac{\pi}{2}$ gacha o'zgaradi. Demak,

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} S &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} dt = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{9a^2 \cos^4 t \cdot \sin^2 t + 9a^2 \sin^4 t \cdot \cos^2 t} dt = \\ &= 3a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^2 t \cdot \sin^2 t} dt = 3a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cdot \cos t dt = \frac{3a}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt = \end{aligned}$$

$$= -\frac{3a}{4} \cos 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{3a}{4} (\cos \pi - \cos 0) = -\frac{3a}{4} (-1 - 1) = \frac{3a}{2}.$$

$$\text{Demak, } S = 4 \cdot \frac{3a}{2} = 6a.$$

6. Asos yuzasi S ga teng ko'pburchak va balandligi H bo'lgan piramidaning hajmini toping.

Yechish: Geometriya kursidan ma'lumki, piramida asosiga parallel bo'lgan tekislik bilan kesilsa, kesimda asosiga o'xshash ko'pburchak hosil bo'ladi hamda kesim va asos yuzalarining nisbati ulardan piramida uchigacha bo'lgan masofalar kvadratlarinig nisbati kabi bo'ladi. Agar piramida asosidan h ga teng masofada asosiga parallel tekislik o'tkazilganda hosil bo'lgan kesimning yuzasini $S(h)$ deb olamiz. U holda piramida uchidan kesimgacha masofa $H - h$ bo'lganligi uchun quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\frac{S(h)}{S} = \frac{(H - h)^2}{H^2}; S(h) = \frac{S}{H^2} (H - h)^2.$$

Shunday qilib integrallash o'zgaruvchisi h bo'lib, u 0 dan H gacha o'zgaradi. Demak,

$$V = \int_0^H \frac{S}{H^2} (H - h)^2 dh = \frac{S}{H^2} \int_0^H (H^2 - 2Hh + h^2) dh = \frac{S}{H^2} (H^2h - Hh^2 + \frac{h^3}{3}) \Big|_0^H = \frac{S}{H^2} (H^3 - H^3 + \frac{H^3}{3}) = \frac{S}{H^2} \cdot \frac{H^3}{3} = \frac{SH}{3}.$$


7. $y = 4x - x^2$ parabola va OX o'qi bilan chegaralangan shaklning OX o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismning hajmini toping.

Yechish: Dastlab integrallash chegaralarini topamiz. Buning uchun $y = 4x - x^2$ va $y = 0$ tenglamalarni birgalikda yechamiz. Demak, $4x - x^2 = 0$ bo'lib, undan $x_1 = 0$ va $x_2 = 4$ kelib chiqadi. Shunday qilib, egri chiziq OX o'qini ikkita $(0; 0)$ va $(4; 0)$ nuqtalarda kesib o'tadi va integrallash chegarasi 0 dan 4 gacha bo'ladi. Izlanayotgan hajm

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^4 y^2 dx = \pi \int_0^4 (4x - x^2)^2 dx = \pi \int_0^4 (16x^2 - 8x^3 + x^4) dx = \\ &= \pi \left(\frac{16x^3}{3} - 2x^4 + \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^4 = \pi \left(\frac{16}{3} \cdot 64 - 2 \cdot 4^4 + \frac{4^5}{5} \right) = \\ &= \left(\frac{1024}{3} - 512 + \frac{1024}{5} \right) \pi = \frac{512}{15} \pi = 34,2\pi. \end{aligned}$$

8. $2y = x^2$ va $2x + 2y - 3 = 0$ chiziqlar bilan chegaralangan shaklni OX o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismning hajmi topilsin.

Yechish: $2y = x^2$ dan $y = \frac{1}{2}x^2$ bo'lib uning grafigi paraboladan iborat. $2x + 2y - 3 = 0$ dan $2x + 2y = 3$ yoki $\frac{x}{1.5} - \frac{y}{1.5} = 1$ bo'lib, u to'g'ri chiziqdan iborat. Ularni yasaymiz (6-chizma).



6-chizma

Berilgan chiziqlar bilan chegaralangan OAB shaklning ox o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismning hajmi A_1ABB_1 va A_1AOBB_1 egri chizikli trapetsiyalarning ox o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismlar hajmlarining ayirmasidan iborat bo'ladi: Ularni har birini alohida-alohida topamiz:

$$\begin{aligned} V_1 &= \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx = \pi \int_{-3}^1 (1.5 - x)^2 dx = -\pi \int_{-3}^1 (1.5 - x)^2 d(1.5 - x) = \\ &= -\frac{\pi}{3} (1.5 - x)^3 \Big|_{-3}^1 = -\frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{8} - \frac{729}{8} \right) = \frac{91\pi}{3}; \end{aligned}$$

$$V_2 = \frac{\pi}{4} \int_{-3}^1 x^4 dx = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{x^5}{5} \Big|_{-3}^1 = \frac{\pi}{20} (1 + 243) = \frac{\pi}{20} \cdot 244 = \frac{61}{5} \pi$$

$$\text{Demak, izlanayotgan hajm } V = V_1 - V_2 = \frac{91\pi}{3} - \frac{61\pi}{5} = 18\frac{2}{15}\pi.$$

9. $y = x^2$ va $8x = y^2$ parabolalar bilan chegaralangan shaklning oy o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismning hajmi topilsin.

Yechish: $y = x^2$ va $8x = y^2$ parabolalarni yasaymiz. Dastlab ularning kesishish nuqtalarini topamiz (7-chizma).


Buning uchun $y = x^2$ va $8x = y^2$ larni birgalikda yechamiz.

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y^2 = 8x \end{cases}$$

Bundan $y_1 = 0$, va $y_2 = 4$ ni topamiz.

Demak,

$$V = \pi \int_0^4 \left(y - \frac{y^4}{64} \right) dy = \pi \left(\frac{y^2}{2} - \frac{y^5}{320} \right) \Big|_0^4 = \pi \left(\frac{4^2}{2} - \frac{256 \cdot 4}{320} \right) = \pi \left(8 - \frac{16}{5} \right) = \frac{24\pi}{5}.$$



7-chizma

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. Quyidagi chiziqlar bilan chegaralangan yuzalar hisoblansin:

- 1) $y = 4 - x^2$ va $y = 0$;
- 2) $y = 3 - 2x - x^2$ va $y = 0$;
- 3) $xy = 4$, $x = 1$, $x = 4$, $y = 0$;
- 4) $y^2 = x^3$, $y = 8$, $x = 0$;
- 5) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ sikloidaning bir davri (arkasi) va ox o'qi
- 6) $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ astroida;
- 7) $4y = x^2$ va $y^2 = 4x$;
- 8) $xy = 6$ va $x + y - 7 = 0$.

Javoblar:

- 1) $\frac{32}{3}$; 2) $\frac{32}{3}$; 3) $8 \ln 2$; 4) $19,2$;

- 5) $3\pi a^2$; 6) $\frac{3\pi a^2}{8}$; 7) $\frac{16}{3}$; 8) $17,5 - 6 \ln 6$.

2. $y^2 = x^3$ yarim kubik parabolaning $(0; 0)$ va $(4; 8)$ nuqtalar bilan chegaralangan qismining uzunligi topilsin.

$$\text{Javob: } \frac{8}{27} (10\sqrt{10} - 1).$$

3. $y = \ln \cos x$ egri chiziqni absissalari $x = 0$ va $x = \frac{\pi}{4}$ bo'lgan nuqtalar bilan chegaralangan qismining uzunligi topilsin.

$$\text{Javob: } \ln \operatorname{tg} \frac{3\pi}{8}.$$

4. $x = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2} \ln y$ egri chiziqning ordinatalari $y = 1$ va $y = 2$ bo'lgan nuqtalar bilan chegaralangan qismining uzunligi topilsin.

$$\text{Javob: } \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \ln 2.$$

5. $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ astroida yoyining uzunligi topilsin.

$$\text{Javob: } 6a.$$

6. $y^2 = 2x^3$ va $x^2 + y^2 = 20$ chiziqlardan hosil qilingan chiziqning uzunligi topilsin

$$\text{Javob: } \frac{8}{27} (10\sqrt{10} - 1) + 4\sqrt{5} \operatorname{arctg} 2.$$

7. $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ sikloidaning bitta arkasi uzunligini toping.

$$\text{Javob: } 8a.$$

8. $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ astroidaning ox o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jism sirtining yuzi topilsin.

$$\text{Javob: } \frac{12}{5} \pi a^2.$$

9. $y = \frac{x^2}{2}$ egri chiziqning $y = \frac{3}{2}$ to'g'ri chiziq bilan kesishgan qismning oy o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jism sirtining yuzi topilsin.

$$\text{Javob: } \frac{14\pi}{3}.$$

10. Quyidagi chiziqlar bilan chegaralangan figuralarning aylanishidan hosil bo'lgan jismlarning hajmlari topilsin.

- 1) $xy = 4, x = 1, x = 4, y = 0$, ox o'q atrofida;
- 2) $y^2 = 4 - x, y = 0$, oy o'q atrofida;
- 3) $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right), x = 0, y = 0 (x > 0)$, ox o'qi atrofida;
- 4) $x^2 - y^2 = 4, y = \pm 2$, oy o'qi atrofida;
- 5) $y = x^3, x = 0, y = 8$, oy o'qi atrofida;
- 6) $y = \frac{1}{1+x^2}, x = \pm 1, y = 0$, ox o'qi atrofida.

Javob: 1) 12π ; 2) $\frac{512\pi}{15}$; 3) $\frac{\pi}{4}\left(\frac{5\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$; 4) $\frac{64\pi}{3}$; 5) $19,2\pi$; 6) $\frac{(n+2)\pi}{4}$

4§. Aniq integralning fizik va mexanik tatbiqlari

Kattaligi o'zgaruvchan va $f(x)$ funksiya bilan aniqlanadigan kuch moddiy nuqtani $[a, b]$ kesma bo'yicha harakatlantirganda bajarilgan A ish

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

formula bilan hisoblanadi.

Biror o'zgarmas tezlik bilan to'g'ri chiziq bo'ylab tekis harakat qilayotgan moddiy nuqtaning $[a, b]$ vaqt oralig'ida bosib o'tgan S masofasi $S = v(b - a)$ formula bilan hisoblanadi.

Tezligi har bir t vaqtda o'zgaruvchan va $v = v(t)$ funksiya bilan aniqlanadigan notekis harakatda moddiy nuqtaning $[a, b]$ vaqt oralig'ida bosib o'tgan s masofasi

$$S = \int_a^b v(t) dt$$

formula bilan aniqlanadi.

Ma'lumki, inersiya momenti tushunchasi mexanikaning muhim tushunchalaridan biri hisoblanadi. Tekislikda m massaga ega bo'lgan A moddiy nuqta berilgan bo'lib, bu nuqtadan biror l o'qqacha (yoki O nuqttagacha) bo'lgan masofa r ga teng bo'lsin. U holda $J = mr^2$ miqdor A

moddiy nuqtaning l o'qqa (O nuqtaga) nisbatan inersiya momenti deb ataladi.

Masalan, tekislikdagi m massaga ega bo'lgan $A = A(x, y)$ moddiy nuqtaning koordinata o'qlariga hamda koordinata boshiga nisbatan inersiya momentlari mos ravishda

$$J_x = mx^2, \quad J_y = my^2, \quad J_0 = m(x^2 + y^2)$$

formulalar orqali hisoblanadi.

Masalan, tekislikda har biri mos ravishda $m_0, m_1, \dots, m_{n-1}$ massaga ega bo'lgan $A_0(x_0, y_0), A_1(x_1, y_1), \dots, A_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1})$ moddiy nuqtalar sistemasining koordinata o'qlariga hamda koordinata boshiga nisbatan inersiya momentlari mos ravishda

$$J_x^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} m_k x_k^2, \quad J_y^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} m_k y_k^2, \quad J_0^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} m_k (x_k^2 + y_k^2)$$

formulalar orqali ifodalanadi.

Biror $y = f(x)$ egri chiziq yoyi bo'yicha massa tarqatilgan bo'lsin. Bu massali egri chiziq yoyining koordinata o'qlari hamda koordinata boshiga nisbatan inersiya momentlari

$$J_x = \int_a^b x^2 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx, \quad J_y = \int_a^b f^2(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

$$J_0 = \int_a^b (x^2 + f^2(x)) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

formulalar orqali ifodalanadi.

Oxy tekislikda massalari $m_1, m_2, \dots, m_n$ bo'lgan $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), \dots, P_n(x_n, y_n)$ material nuqtalar sistemasi berilgan bo'lsa, u holda, $x_i m_i$ va $y_i m_i$ ko'paytmalar m_i massaning ox va oy o'qlariga nisbatan statik momentlari deyiladi.

Berilgan sistemaning og'irlik markazi koordinatalarini x_c va y_c lar bilan belgilaymiz. U holda, mexanika kursidan ma'lum bo'lgan

$$x_c = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2 + \dots + x_n m_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

$$y_c = \frac{y_1 m_1 + y_2 m_2 + \dots + y_n m_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

formulalarni yozishimiz mumkin.

$y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) tenglama bilan berilgan AB egri chiziqli yoyining og'irlik markazi koordinatalari quyidagi integrallar bilan aniqlanadi:

$$x_c = \frac{\int_a^b x ds}{\int_a^b ds} = \frac{\int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx}{\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx}$$

$$y_c = \frac{\int_a^b f(x) ds}{\int_a^b ds} = \frac{\int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx}{\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx}$$

$y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$, $x = a$, $x = b$ chiziqlar bilan chegaralangan tekis figura og'irlik markazining koordinatalari

$$x_c = \frac{\int_a^b x [f_2(x) - f_1(x)] dx}{\int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx}, \quad y_c = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b [f_2^2(x) - f_1^2(x)] dx}{\int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx}$$

formulalardan topiladi.

Mavzuga doir yechimlari bilan berilgan topshiriqlardan namunalar

1. Vintsimon prujinaning bir uchi mustakamlangan, ikkinchi uchiga esa $F = F(x)$ kuch ta'sir etib prujinani qismoqda. Agar prujinaning qisilishi unga ta'sir etayotgan $F(x)$ kuchga proporsional bo'lsa, prujinani a birlikka qisish uchun $F(x)$ kuchni bajargan ishini toping.

Yechish: Agar $F(x)$ kuch ta'sirida prujinaning qisilish miqdorini x deb olsak, u holda $F(x) = kx$ bo'ladi. Bunda k – proporsionallik koeffitsienti (qisilish koeffitsienti). Bajarilgan ishini topish formulasidan foydalanamiz:

$$A = \int_0^a kx dx = k \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^a = \frac{k \cdot a^2}{2}$$

2. Tezligi $v(t) = t^2 + 3t$ qonun bo'yicha o'zgaradigan notekis harakatda [3; 8] vaqt oralig'ida bosib o'tilgan S masofa topilsin.

Yechish: $S = \int_a^b v(t) dt$ formuladan foydalanamiz. Demak,

$$S = \int_3^8 (3t + t^2) dt = 3 \int_3^8 t dt + \int_3^8 t^2 dt = \frac{3t^2}{2} \Big|_3^8 + \frac{t^3}{3} \Big|_3^8 = \frac{3 \cdot 64}{2} - \frac{3 \cdot 9}{2} + \frac{8^3}{3} - \frac{3^3}{3} = 96 - \frac{27}{2} + \frac{512}{3} - \frac{27}{3} = 87 + \frac{1024 - 81}{6} = 87 + \frac{943}{6} = 244 \frac{1}{6}$$

3. Ox o'qining yuqorisida joylashgan $x^2 + y^2 = a^2$ yarim aylana og'irlik markazining koordinatalari topilsin.

Yechish: Og'irlik markazining ordinatasini topamiz.

$$y = \sqrt{a^2 - x^2}, \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \quad ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx, \quad ds = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx,$$

$$y_c = \frac{\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx}{\pi a} = \frac{a \int_{-a}^a dx}{\pi a} = \frac{2a^2}{\pi a} = \frac{2a}{\pi}.$$

$x_c = 0$ bo'ladi. Chunki yarim aylana Oy o'qqa nisbatan simmetrik joylashgan.

4. $y^2 = ax$ parabolaning $x = a$ to'g'ri chiziqli bilan kesishishidan hosil bo'lgan segmentning og'irlik markazi koordinatalari topilsin.

Yechish: Masalaning shartidan $f_2(x) = \sqrt{ax}$ va $f_1(x) = -\sqrt{ax}$.

Shuning uchun

$$x_c = \frac{2 \int_0^a x \sqrt{ax} dx}{2 \int_0^a \sqrt{ax} dx} = \frac{2\sqrt{a} \int_0^a x^{\frac{3}{2}} dx}{2\sqrt{a} \int_0^a x^{\frac{1}{2}} dx} = \frac{\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} \Big|_0^a}{\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^a} = \frac{3}{5} a.$$

Segment ox o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgani uchun $y_c = 0$ bo'ladi.

5. Asosi b ga va balandligi h ga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning asosiga nisbatan inersiya momenti topilsin.

Yechish: To'g'ri to'rtburchakda uning asosidan y masofada joylashgan va kengligi dy bo'lgan elementar polosa ajratamiz. Bu polosaning massasi shu polosaning yuziga, ya'ni $ds = b dy$ ga teng.

Bundan tashqari,

$$dJ_x = by^2 dy \quad \text{va} \quad J_x = \int_0^h by^2 dy = \frac{bh^3}{3}$$

Mustaqil yechish uchun topshiriqlar

1. Jism $v = \sqrt{1+t}$ m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. Jismning harakat boshlangandan keyingi 10 sek davomida bosib o'tgan yo'li topilsin.

Javob: 23,7.

2. Moddiy nuqtaning harakat tezligi $v = (4t^3 - 2t + 1)$ m/s formula yordamida aniqlanadi. Nuqtaning dastlabki 4 sek davomidagi bosib o'tgan yo'li topilsin.

Javob: 244m.

3. Massasi m ga teng bo'lgan jismni yerdan h balandlikka ko'tarish uchun sarf qilish kerak bo'lgan ish aniqlansin.

Ko'rsatma: Yer markazidan x masofada markazga tortish kuchi F ushbu $F:mg = R^2:x^2$ proporsiyadan aniqlanadi. Bunda R — yer sharining radiusi.

$$\text{Javob: } \int_R^{R+h} \frac{mgR^2}{x^2} dx = \frac{mgRh}{R+h}$$

4. $F = 8N$ kuch, prujinani 6 sm ga cho'zishi uchun qancha ish bajarishi kerak?

Javob: 24 j

5. $x = 0, x = a, y = 0$ va $y = b$ chiziqlar bilan chegaralangan to'g'ri to'rtburchakning ox va oy o'qlarga nisbatan inersiya momentari topilsin.

Ko'rsatma: To'g'ri to'rtburchakni gorizontaal yuzlarga ajratib, har bir yuzni undan ox o'qqacha bo'lgan masofa kvadratiga, ya'ni y^2 ga ko'paytiramiz. Ko'paytmalarni qo'shib limitga o'tsak, quyidagini hosil qilamiz:

$$I_x = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum a \Delta y \cdot y^2 = \int_0^b ay^2 dy.$$

Shunga o'xshash $I_y = \int_0^a bx^2 dx$

$$\text{Javob } I_x = \frac{ab^3}{3}; I_y = \frac{a^3b}{3}$$

6. $x = 0$ va $x + y = a$ chiziqlar bilan chegaralangan uchburchakning ox va oy o'qlarga nisbatan statik momenti va og'irlik markazining koordinatalari topilsin.

Ko'rsatma: Statik momentlar quyidagilardan iborat:

$$M_x = \int_0^a xy dy, \quad M_y = \int_0^a xy dx.$$

og'irlik markazining koordinatalari:

$$x_c = \frac{M_y}{S}, \quad y_c = \frac{M_x}{S}$$

Bunda S — shaklning yuzi

$$\text{Javob: } M_x = M_y = \frac{a^3}{6}; x_c = y_c = \frac{a}{3}.$$

7. $x^2 + y^2 = R^2$ aylananing birinchi chorakda yotuvchi yoyining Oy o'qiga nisbatan inersia momenti topilsin.

$$\text{Javob: } 0,25\pi R^3.$$

8. $y^2 = 4ax$ parabola va $x = a$ to'ri chiziq bilan chegaralangan shaklning Oy o'qiga nisbatan inersia momenti topilsin.

$$\text{Javob: } \frac{8}{7}a^4.$$

9. $y^2 = 2x$ parabolani $x = 0$ dan $x = 2$ gacha bo'lgan yoyning ox va oy o'qlarga nisbatan statik momentlari topilsin.

$$\text{Javob: } M_x = \frac{1}{3}(5\sqrt{5} - 1); M_y = \frac{9}{8}\sqrt{5} + \frac{1}{16}\ln(2 + \sqrt{5}).$$

10. $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = chx$ zanjir chiziqning $A(0;1)$ nuqtadan $B(a; cha)$ nuqtagacha bo'lgan yoyi og'irlik markazining koordinatalari topilsin.

$$\text{Javob: } x_c = a - th \frac{a}{2}; y_c = \frac{a}{2sha} + \frac{cha}{2}.$$

11. $4x^2 + 9y^2 = 36$ ellips va $x^2 + y^2 = 9$ aylananing kesishishidan hosil bo'lgan shaklning birinchi chorakdagi qismi og'irlik markazining koordinatalari topilsin.

$$\text{Javob: } x_c = \frac{4}{\pi}; y_c = \frac{20}{3\pi}.$$

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Каримов И.А. Юсак маънавият — енгилмас куч. Тошкент, "Маънавият"- 2009
2. Каримов И.А. Баркамол авлод - Ўзбекистон таракқиётининг пойдевори. Тошкент :-1998 й.
3. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда. Тошкент:- 2000 й.
4. Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги қонуни. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Т.: Шарқ. 1997.
5. Абдухамидов А.У, Насимов Х.А, Носиров У.М, Хусанов Ж.Х. Алгебра ва математик анализ асослари. I,II қисм, Тошкент, 2008.
6. Азларов Т, Мансуров Х. Математик анализ, 1-қисм, Тошкент, "Ўқитувчи" 1994.
7. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. Москва, "Наука" 1969.
8. Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Москва, 1980.
9. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математического анализа. Москва, "Наука" 1990.
10. Жўраев Т, Саъдуллаев А.ва бошқ. Олий математика асослари, 1-қисм, Тошкент, "Ўзбекистон" 1995.
11. Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математического анализа. Москва, «Высшая школа» 1964.
12. Коплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Харьков, 1974.
13. Лисичкин В.Т, Соловейчик И.Л. Математика. Москва, «Высшая школа» 1991.
14. Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. Москва, "Наука" 1970.
15. Махмудов Х, Ахлимирзаев А, Юсупова А. Математика. Андижон, 2012.
16. Минорский В.П. Олий математикадан масалалар тўплами. Тошкент, "Ўқитувчи" 1977.
17. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Част I. Москва, "Наука" 1985.
18. Расулов Н.Р, Сафаров И.И, Мухитдинов Р.Т. Олий математика. Тошкент, 2012.
19. Рогов А.Т. Задачник по высшей математике для техникумов. Москва, 1973.
20. Семигин Н.Я. и др. Сборник задач по высшей математике. Москва, 1967.
21. Сўфиев Т. Мактабда математик анализ элементлари. Тошкент, "Ўқитувчи" 1983.

MUNDARIJA

SO'Z BOSHI.....	3
I.BOB. TO'PLAMLAR.....	5
§1. To'plam tushunchasi. To'plamlar ustida amallar.....	5
§2. Haqiqiy sonlar. Haqiqiy sonning absolyut qiymati.....	8
II.BOB. KOMPLEKS SONLAR.....	13
§1. Kompleks son tushunchasi. Kompleks sonlar ustida arifmetik amallar.....	13
§2. Kompleks sonni geometrik tasvirlash. Kompleks sonning trigonometrik shaklda yozilishi. Trigonometrik shakldagi kompleks sonlar ustida amallar.....	17
III. BOB. MATEMATIK MANTIQ VA KOMBIRATORIKA ELEMENTLARI.....	23
§1. Matematik mantiq elementlari.....	23
1.4. Matematik tushuncha. Tushuncha hajmi va mazmuni. Tushunchani ta'riflash usullari.....	23
1.5. Fikr tushunchasi. Fikrning inkori.....	24
1.6. Fikrlarni konyunktsiya, dizyunktsiya, implikatsiya va ekvivalentsiyasi.....	26
§2. Kombinatorika elementlari.....	29
IV.BOB. FUNKSIYA TUSHUNCHASI. FUNKSIYA GRAFIGI.....	36
§1. Funksiya tushunchasi.....	36
§2. Asosiy elementar funksiyalar.....	41
V.BOB. TEKISLIKDAGI ANALITIK GEOMETRIYA.....	46
§1. Tekislikdagi analitik geometriyaning sodda masalalari.....	46
§2. To'g'ri chiziqlarga doir asosiy masalalar.....	52
§3. Ikkinchi tartibli egri chiziqlar.....	66
3.1. Aylana.....	66
3.2 Ellips.....	69
3.3 Giperbola.....	73
3.4 Parabola.....	78
§ 4. Koordinatalarni almashtirish. Ikkinchi tartibli chiziqlar klassifikatsiyasi va ularni kanonik ko'rinishga keltirish.....	81
§ 5. Qutb koordinatalar sistemasi.....	87
VI. BOB. FAZODA ANALITIK GEOMETRIYA.....	90
§1. Fazodagi ikki nuqta orasidagi masofa. Kesmani berilgan nisbatga bo'lish. Fazoda tekislik va uning xossalari.....	90
§2. Fazoda to'g'ri chiziq tenglamalari.....	98
§3. To'g'ri chiziq va tekislik orasidagi munosabatlar.....	103
§ 4. Ikkinchi tartibli sirtlar.....	109
§ 5. Vektorlar va ular ustida amallar. Vektorlarning skalyar ko'paytmasi.....	117
§6. Ikki vektorning vektor ko'paytmasi.....	126
§7. Uch vektorning aralash ko'paytmasi.....	130
VII. BOB. CHIZIQLI ALGEBRA ELEMENTLARI.....	134
§1. Determinantlar va ularning xossalari.....	134
§2. Matritsalar va ular ustida amallar. Teskari matritsa.....	140
§3. Chiziqli tenglamalar sistemasi.....	150
VIII.BOB. SONLI KETMA-KETLIK VA FUNKSIYANING LIMITI.....	161

§1. Sonli ketma-ketlik va uning limiti.....	161
§2. Funksiyaning limiti.....	171
§3. Funksiyaning uzluksizligi va uzilishi.....	179
IX.BOB. FUNKSIYANING HOSILASI VA DIFFERENSIALI.....	185
§1. Funksiyaning hosilasi. Hosilaning geometrik va mexanik ma'nolari.....	185
§2. Murakkab va oshkormas funksiyalarning hosilalari. Parametrik shaklda berilgan funksiyaning hosilasi. Teskari funksiyaning hosilasi. Gipربولik funksiyalarning hosilalari.....	192
§3. Funksiyaning differensial.....	199
§4. Differensial hisobning asosiy teoremlari. Teylor formulasi.....	205
§5. Aniqmasliklarni ochish. Lopital qoidasi.....	212
§6. Funksiyaning o'sishi va kamayishi. Funksiyaning ekstremumlari.....	218
§7. Funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlari.....	225
§8. Funksiya grafigining qavariqlik va botiqlik intervallari. Buriish nuqta. Funksiya grafigining asimptotalari. Funksiyani tekshirishning umumiy sxemasi.....	234
X.BOB. ANIQMAS INTEGRAL.....	241
§1. Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral. Aniqmas integralning xossalari. Integrallar jadvali.....	241
§2. Aniqmas integralni o'zgaruvchini almashtirish bilan integrallash. Aniqmas integralni bo'laklab integrallash. Kvadrat uchhad qatnashgan integrallarni hisoblash.....	245
§3. Ratsional kasrlar va ularni integrallash.....	252
§4. Ratsional kasrlarni integrallash.....	256
§5. Irratsional funksiyalarni integrallash.....	261
§6. Trigonometrik funksiyalarni integrallash.....	268
§7. Gipربولik funksiyalarni integrallash.....	278
XI. BOB. ANIQ INTEGRAL.....	280
§1. Aniq integral va uning xossalari. Aniq integralni hisoblash usullari.....	280
§2. Aniq integralni taqribiy hisoblash. Xosmas integrallar.....	286
§3. Aniq integralning geometrik tatbiqlari.....	295
§4. Aniq integralning fizik va mexanik tatbiqlari.....	304
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....	310

A. AXLIMIRZAYEV, A. RIZAYEV, M. IBRAGIMOV, M. QO'CHQAROV

OLIV MATEMATIKA

I qism

O'QUV QO'LLANMA

Toshkent - "INNOVATSIYA-ZIYO" - 2022

Muharrir Xolsaidov F.B.

Nashriyot litsenziyasi AI № 023, 27.10.2018.
Bosishga 5.04.2022 da ruxsat etildi. Bichimi 60x90.
"Times New Roman" ganitulasi.
Ofset bosma usulida bosildi.
Shartli bosma tabog'i 20. Nashr bosma tabog'i 19,75
Adadi 100 nusxa.

ISBN 978-9943-5867-8-9



9 789943 586789